

161
L A Z A R I
R I V E R I I
C O N S I L I A R I I.
E T M E D I C I R E G I I.
A T Q V E

*In Monspelienſi Vniuerſitate Medicina Profeſſoris, & Doctorum
Monspelienſium Decani,*

P R A X I S M E D I C A
C V M T H E O R I C A.
E D I T I O P O S T R E M A.

CVI ACCESSIT INDEX RERVM LOCVPLETISSIMVS.



V E N E T I I S. M. D C. L X I I I.

Apud Franciscum Brogiolum.

DE LICENTIA SUPERIORVM, ET, PRIVILEGIIS:

I N D E X

Librorum, & Capitulorum

P R A X E O S M E D I C A E.

LIBER I.

De affectibus capitis :

Cap. I.	D e frigida cerebri intemperie.	145
II.	De affectibus soporosis, comate, lethargo, carae, & apoplexia.	149
III.	De comate vigilia.	153
IV.	De caracho seu catalepsi.	154
V.	De paralyfi.	154
VI.	De convulsione.	158
VII.	De epilepsia.	160
VIII.	De epilepsia a parturitione.	164
IX.	De vertigine.	ibid.
X.	De tremore.	166
XI.	De ptorescencia.	ibid.
XII.	De cerebri abcessu, & sphacelo.	169
XIII.	De mania.	170
XIV.	De melancholia.	172
XV.	De catarrho.	174
XVI.	De dolore capitis.	177

LIBER II.

De affectibus oculorum :

Cap. I.	D e gutta serena.	180
II.	De humoris varietate affectibus.	182
III.	De humoris crystallini affectibus.	183
IV.	De humoris aquei affectibus, ac praecipue de suffusione ib.	187
V.	De dilatatione pupillae.	187
VI.	De angustia pupillae.	188
VII.	De albugine seu macula, & alijs cornea coloribus mutatis.	ibid.
VIII.	De ophthalmia.	189
IX.	De hydropo, seu pure sub cornea.	194
X.	De phlyctena.	195
XI.	De cornea, & adnata ulceribus.	ibid.
XII.	De cornea cancro.	ibid.
XIII.	De rugura cornea.	196
XIV.	De vasa procedentia.	ibid.
XV.	De agulopo, & fistula lachrymali.	ibid.
XVI.	De rhyade, & encanthide.	197
XVII.	De epiphora.	ibid.
XVIII.	De pterygio seu ungue oculorum.	198

LIBER III.

De affectibus aurium :

Cap. I.	D e ardore, & graui auditu.	199
II.	De sonitu aurium.	201
III.	De dolore aurium.	202
IV.	De exantibus praeter naturam ab aurium canitibus.	206

LIBER IV.

De affectibus narium :

Cap. I.	D e narium viceribus, & exana.	207
II.	De sercomate, & polypo.	208

III.	De leso ossifluo.	ibid.
IV.	De sacore narium.	209
V.	De coryza.	ibid.
VI.	De siernutitione.	ibid.
VII.	De haemorrhagia narium.	ibid.

LIBER V.

De affectibus linguae :

Cap. I.	D e lingua inflammatione, alijsque eiusdem tumoribus.	215
II.	De ranula sub lingua.	216
III.	De gustu laeso.	217
IV.	De paralyfi linguae, eiusque motu laeso.	217

LIBER VI.

De affectibus dentium, gingivarum, faucium, rulae, & laryngis.

Cap. I.	D e dolore dentium.	219
II.	De dentium nigredine, & erosione.	221
III.	De gingivarum erosione, & exulceratione.	222
IV.	De fluxu sanguinis ex gingivis.	ibid.
V.	De oris, & faucium ulceribus.	223
VI.	De vula relaxatione.	224
VII.	De angina.	224

LIBER VII.

De morbis thoracis :

Cap. I.	D e asthma.	229
II.	De pleuritide.	232
III.	De peripneumonia.	236
IV.	De empyema.	237
V.	De hydropo pectoris.	239
VI.	De haemorrhoea seu sanguinis spatu.	239
VII.	De phthisi.	242

LIBER VIII.

De affectibus cordis :

Cap. I.	D e syncope.	248
II.	De palpitatione cordis.	250
III.	De umbellata vena.	252

LIBER IX.

De affectibus ventriculi :

Cap. I.	D e inappetentia, & cibi fastidio.	254
II.	De fame canina.	257
III.	De pica, & malacia.	259
IV.	De furi morbosa.	260
V.	De ventriculi concolitione laesa.	261
VI.	De singulis.	262
VII.	De nausea, & vomitu.	264

De a VIII. De

VIII.	De vomica sanguinis.	169.
X.	De cholera morbo.	169.
XI.	De dolore ventriculi.	170.
XI.	De inflammatione, abscessu, & ulcere ventriculi.	172.

LIBER X.

De affectibus intestinorum.

Cap. I.	De dolore colico.	174.
II.	De alioque affectu.	176.
III.	De obstructione aini.	178.
IV.	De lentetia, & caliditate passiva.	179.
V.	De Dysuria.	180.
VI.	De dysmetria.	181.
VII.	De teneismo.	188.
VIII.	De luctu hepatico.	189.
IX.	De lumbricis.	190.
X.	De hemorrhoidum fluxu.	191.
XI.	De dolore hæmorrhoidum.	195.

LIBER XI.

De affectibus hepatis.

Cap. I.	De calida hepatis intemperie.	198.
II.	De hepatis inflammatione, abscessu, & ulcere.	199.
III.	De obstructione hepatis.	201.
IV.	De altera.	205.
V.	De secundæ hepatis.	206.
VI.	De hydropsi.	209.

LIBER XII.

De affectibus lienis.

Cap. I.	De inflammatione lienis.	213.
II.	De dolore lienis.	213.
III.	De obstructione, & tumore seu inflatione lienis.	214.
IV.	De serro lienis.	214.
V.	De melancholia hypochondriaca.	215.
VI.	De scorbutica affectione.	219.

LIBER XIII.

De affectibus mesenterij, pancreatis, & omenti.

Cap. I.	De obstructione mesenterij.	221.
II.	De inflammatione mesenterij.	223.
III.	De abscessu, ulcere, & serro mesenterij.	224.
IV.	De morbo pancreatico.	224.
V.	De affectibus omenti.	225.

LIBER XIV.

De affectibus renum, & vesicæ.

Cap. I.	De dolore nephritico, & calculo renum.	325.
II.	De calculo vesicæ.	327.
III.	De inflammatione renum, & vesicæ.	325.
IV.	De miltu sanguineo.	327.
V.	De ulcere renum, & vesicæ.	329.
VI.	De diabete.	341.
VII.	De urina incontinentia.	342.
VIII.	De ischuria, & stranguria.	343.
IX.	De dysuria, seu ardore urinae.	345.

LIBER XV.

De morbis mulierum.

Cap. I.	De chloresia, seu pallida virginitate.	317.
II.	De supposito menstruo.	348.
III.	De fluxu mensuum immundo.	352.
IV.	De fluxu muliebri.	354.
V.	De ferre vterum.	356.
VI.	De hysterica passione.	358.
VII.	De vterini inflammatione.	364.
VIII.	Ulcere vteri.	365.
IX.	De scorbia vteri.	367.
X.	De cancro vteri.	368.
XI.	De vterini gangrena, & sphacelo.	369.
XII.	De vteri inflatione, & hydropsi.	372.
XIII.	De vteri procidentia.	373.
XIV.	De vteri clausura.	373.
XV.	De sterilitate.	374.
XVI.	De morbo acuto, & chronico prægnaantium.	378.
XVII.	De abortu.	385.
XVIII.	De partu difficili.	385.
XIX.	De partu morbo.	385.
XX.	De secunda retenta.	386.
XXI.	De fluxu lochiorum immundo.	386.
XXII.	De supposito lochiorum.	386.
XXIII.	De terminibus à partu.	386.
XXIV.	De morbo acuto, & chronico prægnaantium.	386.

LIBER XVI.

De affectibus articulorum, & rheumatismo.

Cap. I.	De arthritis.	389.
II.	De dolore sphaudico.	396.
III.	De rheumatismo.	398.

LIBER XVII.

De febribus.

SECTIO I.

De febribus simplicibus.

Cap. I.	De febre ephemera.	400.
II.	De synocha simplici.	401.
III.	De febre hectica.	402.

SECTIO II.

De febribus putridis.

Cap. I.	De febribus putridis.	404.
II.	De symptomatibus febribus putridis, comitisibus.	413.
III.	De febre tertiana intermitte.	415.
IV.	De febre quotidiana intermitte.	418.
V.	De febre quarta intermitte.	419.
VI.	De febribus compositis, seu complicatis, & speciatim de hemitricis.	422.

SECTIO III.

De febribus pestilentibus.

Cap. I.	De febre pestilenti.	423.
II.	De variolis, & morbillis.	423.



PRAXEOS MEDICÆ LIBER PRIMVS.

DE AFFECTIBVS CAPITIS.

P R Æ F A T I O.



Ncapitis affectum serie illos omnes comprehendimus, qui cerebri substantiam, aut meninges occupant. Licet enim oculi, aures, lingua, dentes, gingivæ, fauces, & columella, capitis constitutionem ingrediantur: earum tamen partium affectus, clarioris doctrinæ gratia, separatim libris exponere vilius est. cerebri ac nervorum morbos, capitis affectum uomine, per excellentiam, insigrire. Illi autem affectus ex cerebri actionum lesionibus erunt desumendi: quæ quidem actiones sensum, & motum respiciunt, tum etiam actiones naturales, quæ ad alius nutritionem spectant. Sensus vero diuiduntur in internos, & externos. Interni principes actiones comprehendunt, imaginatione, & rationationem, & memoriam; tum etiam somnum, & vigiliam. Ad quarum functionum symptomata referunt, phrenitis, mania, melancholia, coma, lethargus, curus, apoplexia, catatonia, & coma vigil. Sensus vero externi quicquid vulgo sentiuntur, visus, auditus, olfactus, gustus, & tactus. Quia tamen quatuor prioribus partes peculiares, tanquam propria eorum organa, destinatae sunt, quæ varios patiuntur morbos, in propriis libris explicandos; ideo in hoc libro symptomata tantum exponemus, quæ sensum tactus respiciunt; quandoquidem illa à cerebro affecto, vel alius membranis, immèdiatè procedunt: & vel paralyfim in sensu tactus abolito, aut imminuto; vel dolore capitis in deprimato, respiciunt. Motus autem voluntarij lesiones reperiuntur in convulsione, epilepsia, paralyfi, apoplexia, vertigine, tremore. Denique affectus ad actiones cerebri naturales spectantes, in interperie consistunt, vel in excretorum vitio, ex quo catarrhus generatur. Nos omnes illos affectus ad propria capita reducimus, eo tamen ordine, qui ad therapiam instituendam magis conueniens est. Atque ita primum frigidam cerebri interperiem proponimus: mox omnes affectus, qui ab illa oriuntur, subiungimus; quia eorum curationis fundamentum ab illius curatione desumi debet. Postmodum vero affectus à calida interperie, & calidis humoribus oriundos, exponimus. Quæ omnia in singulorum capitum perillustratione clarius apparebunt.

C A P V T. PRIMVM.

De frigida cerebri interperia.

Omnès interperies vulgò diuiduntur in pathologia in simplices & compositas, matriciales & immatutales. Simplices raro inueniuntur; tum etiam immatutales; nec nisi à causis procatartidis producuntur; & vel sponte, vel leuissimis remedijs euanescent. Materiales vero, omnes capitis affectus producunt: illarum ideo tractationi sedulo incumbendum est; quod tamen seorsim paucissimi auctores præstiterunt; propterea quod in capitione affectuum,

qui ab illis interperiebus producuntur, earum etiam explicatio sufficienter proponitur. Nos itaque eorum velligis inherentes, calidæ cerebri interperies, tum etiam humida & sicca theoriam ad affectuum qui ab ipsis producuntur, tractationes remittimus. Sed quia maximus capitis affectuum numerus à frigida & pituitosa cerebri interperie dependet, operæ pretium censuimus, illius theoriam in huius tractationis lumine seorsim proponere: vt postmodum illius curatio sit veluti basis curationum omnium, quæ dictis affectibus erunt adscribendæ, & remedia quæ eorum cause debebuntur, ex hoc capite depromi valeant, atque ita inanis eorum repetitio, (quæ omnes peremporia præctica Medicinæ scriptores laborare solent, & inde sua volumina inutiliter augere, atque deficciorem, ad magis rronibus laboriosam atque tactiosam reddere,) à nobis cuitetur.

Frigida igitur cerebri interperies composita, & cum materia coniuncta vt plurimum pituitosa est; quia cerebrum est metropolis pituitæ, & frigiditas diu durans illi accersit humiditates. Quamuis enim interdum humor melancholicus copulatus sit, raro tamen ille humor in cerebro gignitur, quemadmodum pituita: sed in hypochondrijs vt plurimum cumulat, & ad cerebrum transiit, in coque, grauissima symptomata producit.

Causa, frigida ac pituitosa cerebri interperia sunt. Alimenta frigida & humida, quæ facili in pituitam abeunt, tum etiam, dum concoquuntur, ventriculum & hepate refrigerando, faciunt, vt multam pituitam producant, quæ postmodum magna copia ad cerebrum transiit.

Nimis alimentorum, non solum frigidorum, sed etiam laudabilium quantitas, quæ calorem natuum ebruit, & cruditates gignit.

Cibi assuupti statim à somno, vel ante somnum, vel antequam priores sint concocti: ex ipsis enim cruditates plurime oriuntur, quæ materiam pituitosam cerebro suppeditant.

Omissa naturalis consuetudo pituitam euacuandi per vomitum, aut cecissum vel artificialem per medicamentum, purgantia, diuretica, sudorifica, vel frequentes exercitationes.

Ortus ex parentibus frigida cerebri interperie laborantibus.

Ætas senilis, quæ propter caloris inopiam multam generat pituitam; tum quoque puerilis, propter ingluuiem & incautam victus rationem.

Regio frigida & humida, quales sunt, quæ stagnis, paludibus, aut maioribus fluminibus sunt vicine, ac boreæ nubibus imbribusque posita, & quæ sunt magis septentrionales. Somni longi & profundi, præsertim à cibo.

Vita sedentaria, otiosa, sine curis, studio, motore, aut cum his valde excedentibus; quia calorem natuum dissipando, præcipue in cerebro, illud refrigerant.

Ad has causas etiam referri potest hepate calidum & humidum; quod multos vapores transmittit ad cerebrum, quia eo conuulsione, & in materiam pituitosam abeunt.

De a Signa

Signa frigidae intemperaturae cerebri defumuntur tum à causis laeva propius, quarum praesentia in temperiei huius magis conspicua faciet; tum praecipue ab effectibus qui vti signa in examini habeant, à suis frontibus illos manifestant, nempe ab actionibus passionibus, excrementis & habitibus corporis.

Acciones animales frigida cerebri intemperiem indicant, sicut sunt mens torpida & habes, ingenium tardum & obsequium, imbecilla memoria, maxime ad hominum pro et rebus & iniquis coniugibus, profundior casus, cathartus dolor capitis aut à nimia pathemata obliuiscitur.

Infirmum frigoris aequum, nempe pluviarum, niuium, siccitatis, flagrantium, aut ium & retum abarump.

Sentiam omniem inertiam & habentia.

Motus tardus, sed in eo duratior, si spiritus crassiores minus dissoluantur.

Passiones frigida cerebri intemperiem indicantes sunt morbi frigidi, vi paralytici, huiusmodi catarrus, & alij quum plurimisque vi ager aures obnoxius fuerit, cum hac intemperie labore coniunguntur.

Idipsum confirmabit, si ager coelo sereno, & in calida & sicca aeris constitutione melius habeat: in frigida vero & humida hyemali nampe pluviosa & austruina, peius.

Excrementa pituitosa per os & nares frequenter, & copiose reiecia manifestissima humoris pituitosi redundantiam in cerebro ostendunt.

Ex habitu corporis defumuntur signa, tam generalia, quam specialia huius intemperiei.

Generalia ex toto habitu corporis defumuntur. Si enim totus corporis habitus frigidus sit, à humida, cerebrum, proculdubio, omnium corporis partium frigidissimum & humidissimum, tale futurum est.

Cutis ergo ad tactum frigida, eadem mollis, laevis & habet corpus frigidum molli & obeso, non autem carnosum, namque angustia frigida temperiem significant.

Signa specialia frigida cerebri intemperiem indicantia in capite considerantur, ut sunt: Facies pallor, venarum carentia in oculis, capilli molles, quae tunc tenues ab intemperie orientes, deinde rufae ac minime crispae, rota viti sine caluitate perscrutantes, à frigore externo capitis facili lesio, calcificationibus iuuantur.

Quod ad prognosin attinet, haec intemperies curatu difficilis est, & saepe gravissimum capitis affectum producit. Quae à longo tempore contrahita est, difficultas curatur; quae à naturae, nonquamquam etiam quae à hereditaria, & quae in corpore leni reperitur, per longum tempus illud obliuiscitur. Tempus hybernum huc curatori idoneum non existeret, vero melius curatio licceat.

Curatio duabus indicationibus pericritur, nimirum pituitae redundantia euacuatione, & ipsius intemperies per contraria correctio. Quibus indicationibus debet satis fieri triplex instrumentum, diætetico, chirurgico & pharmaceutico.

Diæta calefaciens & exsiccans iustitanda est. Ac primum eligatur aer purus ad calidum & siccum vergens, qui tamen in caliditate non multum excedat humores enim, in capite contentos fundere ac liquare possit, sique catarrhos aliosque affectus producere; quod saepe contingit, ut qui sub solis radiis morantur vel caput ignem calefaciunt. In frigore vero non potest nupium excedere, modo in actum qualitatibus fit temperatus; ad calidum magis tamen, quam ad frigidum delectat. Cubiculum in quo aeger degere consuevit, non angustum sit, nec depressum, nec humefens, aut aliquo situ obdolum, sed peruium & persilum, siccioribus ventis expositum. Temporibus humidis, nubiosis, ac frigidis, alter aut interdum poterit aer cubiculi herbas calidas ac odoratis paucissimo liras, vel salvia, maiorana, lauendula, rosmarinus, thymus, serpillum, vel etiam ipsam in ignem coniectis, aut etiam lignis siccioribus in igne accensis; ut praecipue nupierum. Ignis autem fit inlequens, qui acriem conciliat sufficienter exsiccat, sufflans in aëribus excitat, admodum graues sunt, si cōdum, ab humore quodam humefactum, non parum conferre possunt. In eorum tamen vi cautio magna adhibenda est, tum ut moderatissimi exsiccantur. Si enim nimii sint, quoscunque homines efficiunt, & humores fundendo, graues

catarrhos excipiant. Tum etiam, patientis confectio aduertatur, in oculis enim capitis ita facile replentur, & à sufflans alteratur, ut quilibet, si capitis dolorum indidant. Sufflans temperatus & vitiis parabitur ex succo, rioris, cuius tenuia ramenta carbonibus eruit miscenda, nus graues est, & optime siccatur, roboraturque cerebrum, si ius ex ladicio luccino quod pueri animum nominantur, vel magis compositis ita praeficit.

Signa autem benioimonia 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-228

drī, & liquoris, vel facchari, & cinamomi quantum satis ad saporis gratiam. Fiat bochetum, quo utitur pro potu ordinato toto diezate tempore, utendo interea pane biscocto & annato, carnis assis & non elixis, amygdalis torrefactis, patulis, nucleus pines, prunis cum faccharo coctis, & similibus.

In vi decocti iudorifici hoc perpetuo obseruandum est, vel semel in septimana purgans aliquid medicamentum, propinquet, omnia ea die potione iudorifica. Quandoquidem per id totius humorum portio tantum educitur, remanente crassiore, que per alium expurganda est. Præterea, quia vltimum in vi diezate alius confiringatur, clyster tertio aut quarto quoque die inieciendus est.

Si adhuc pluribus machinis morbus iste oppugnandus videtur, durante diezate facculi sequentes capiti admoventi poterunt.

℞. Sem. anisi, feniculi & baccarum lauri contusana 3 iij. mly. it. salis communis lb. ss. Torrefiant omnia in sartagine oleum affundendo vini generosi quantum satis. Liq. implicantur duo lappi, qui applicentur sincipiti raso, caude, vicissim. post assumptam potione iudorificam.

Deterio sudore emplastrum caput roborans capiti admoventur, in sequentem modum compositum.

℞. Succini pellucidissimi, malthices, ana 3 iij. Galbani opopansis, ana 3 i. visci quercini 3 iij. sem. poronis maris 3 i. olei nucis moschat. q. d. fiat ex omnibus massa emplastrum, que extendatur super alutem in formam oualem, & applicetur sincipiti raso post deterium sudorem.

Vel admoventi potest emplastrum caput roborans, quod in officinis Monipeli Pharmacoporum habetur, licet in dispensatorijs non reperitur, cuius descriptio talis est.

℞. Storacis benioini, adami ana 3 iij. radic. pennis, ieros Flor. visci quercini, malthices, ana 3 i. Syracis aliquid. q. d. fiat emplastrum, de cuius 3 iij. fiat emplastrum oualis figure, applicandum forate coronali.

Si vero emplastrum magis attenuans & resoluens habere cupias, quod epispasticum vulgo nominatur, in hunc modum parari poterit.

℞. Massa emplastrum de mucilag. 3 ii. radic. ieros Florent hermodactyl. pyrethri, sem. lappulagriz, cubeborum. Isteros columbini, & sem. sinapi, ana 3 iij. nucis moschat. caryophyll. cinam. piperis longi & nigri, ana 3 iij. Syracis liquide q. d. fiat massa emplastrum, cuius portio extendatur super alutem in formam oualem, & sincipiti applicetur.

Post vniuersales euacuationes, particularis etiam commodè usurpata poterunt: que sunt per erethina, sternutatoria, & apoplegmatisos; quorum formula in hunc modum componi poterunt.

℞. Fol. maioranae, saluæ, betonicæ, ana M. i. Terantur in mortario marmoreo, sensim affundendo aque betonicæ, & vni albi, ana 3 iij. Exprimitur fuscus, & erethinum, quod paulo actius efficitur, si rad. iteos 3 iij. prædictis adijciatur.

Vius hodie inualuit folia nicotianæ sicca & digitis contrita in nares inmittere, vel puluerem eorum naribus attahere: si que parati facile erethinum habetur, quo magis humores copia a cerebro elicitur.

Sternutatoria verò sic parari poterunt.

℞. Fol. maioranae, saluæ & rosamarinij siccorum, ana 3 iij. radic. pyrethri, & helibori albi ana 3 iij. moschi grana. iij. fiat pulvis, qui pennæ tubulo insuffletur in nares. Vel

℞. Radic. zinziberis, & ieros Florent. ana 3 i. castorei 9. caryophyll. gr. vi. fiat sternutatorium. Præstantissimum sternutatorium sit ex heliboro nigro, cum parte equali facchari candi in subtilissimum puluerem redacto. Quod etiam ad catarrhi curationem plurimum confert.

Apoplegmatisos componuntur in formam masticatorij, vel gargaris masticatorij ita parari poterunt.

℞. Rad. pyrethri 3 iij. sem. sinapi, & lappulagriz, ana 3 iij. Excipiuntur cera alba, & formentur globuli, quorum vnus masticetur prono capite manè, continuè spuenendo.

In vulgata vii habetur radix ieros Florentis masticata,

que in leuioribus affectibus potest sufficere. Mitior adhuc est mastiche sola, que humorem attahit ad eos circa illius cæliationem quod reliquum non præstat.

Gargarisma verò in hunc modum erit præscribendum. ℞. Sem. lappulagriz 3 iij. m. sinapi 3 iij. rad. pyrethri 3 iij. Coquantur in hydronelate ad 3 iij. in quibus calidule oxy-mel. scilicet 3 iij. fiat gargarisma.

In vii tamen horum remediatorum hoc obseruandum est, eam euacuationem, que per palatum fit, esse commodiorem, quandoquidem illa a natura cerebri expurgationi simpliciter destina est. At natura odoratus & respirationis gratia sicut illi, eo que natura abutitur; quando humores in cerebro maiori copia redundantes per hanc viam expurgantur. Præterea per palatum via leuior est, neque ea excretionis tantopere cerebrum coquantur, quemadmodum illa que fit per nares. Attamen erethina humores potentius educunt, quia non solum medicamenti qualitas, aut vapor, ut in apoplegmatisos, sed & ipsa eius subtilitas cerebrum stimulat.

Ocul. ruandum etiam erethinorum viis esse suspectum, dum oculi sunt affecti, vel nares viceribus obnoxie, vel æger in hæmorrhagiam facile incidit, aut etiam vertiginem, quam sternutatoria in primis excitare valent, cerebrum vehementius concutendo.

Eri luna liquida in nares ex vii manus attrahuntur, vel supino corpore naribus inhiandunt; ore tamen prius aqua, vel vino repleto, vel liquor per palatum in os infundatur, quousque quod sic inlit, etiam humores efficaciter per iacuos educit.

Apoplegmatisos cautè usurpandi sunt in ijs, qui fluxioni in pectus, & tibi lunt obnoxii.

Ad particularem etiam capitis euacuationem vtiliter adhibentur vesicatoria p. steriort parti ceruicis, in formam emplastrum, quod a Pharmacopis Monipeliensibus compositum habetur, licet in ordinarijs dispensatorijs non habetur. Illius autem formula talis est.

℞. Galbanæ ammoniacæ ana 3 iij. pulueris cantharid. lb. 3 iij. sinapi piperis ana lb. 3 iij. viridis aris pyrethri ana 3 iij. caryophyll. 3 iij. ceræ lb. 3 iij. picis, resinz, cerebuth. ana. quartarii. olei parati. fiat massa emplastrum, cuius 3 iij. vel ij. extenditur super alutem, & postiori parti ceruicis admoventur.

Exterius capiti admoventur pulueres, & cucule, quibus cerebrum roboratur, cuiusque calor intenditur, ac humoris reliquæ discutuntur.

℞. Pulueris ieros Florent. lb. 3 iij. loracis & benioini, ana 3 iij. fiat pulvis tenuissimus, capillis inspergendus in lecti inuoluto, & manè pectine decutendus.

Hic pulvis est odore gratissimus, cerebrum roborat, & capillos valde exsiccat, ita vt a delicatioribus in viam vocari valeat. Si tamen illius efficaciam intendere volueris, caryophyllos, nucem moschatam, & cinamomum addere licebit.

℞. Flor. flechados, anthos, & rosar. rub. ana P. 3 iij. betonicæ sicca 3 iij. sem. coriandi, ligui rodii, thuris, malthices, nucis moschatæ, ieros Florent. ana 3 iij. benioini, vermicis, macis car. ophyl. ana 3 iij. fiat omnium pulvis, qui excipiantur rasura scariæ, vel cotone moschato, & cum panno serico rubro fiat cucula interpernea, pileo affluenda, vel in formam ca antica perpetuo gelanda.

Sequenti etiam suffumigio caput non parum exsiccare poterit.

℞. Ligni aloes, thuris, malthices, succini pellucidi, santali citrini, rosar. rub. & sol. betonicæ siccorum, ana 3 iij. cinamomi, macis, caryophyllor. 3 iij. raris calamitæ, ana 3 iij. fiat ex omnibus pulvis erasilor, qui aspergatur super prunas, & fumum hauriat manè ieiuno stomacho; ore, & naribus apertis, capite linteo circumuoluto, ne fumus tam iacue exhalet, eo que vtatur bis, aut ter in septimana.

Vel si a suffumigio dolor capitis exciteret, eo saltem suffumigetur singulis noctibus operimenta capitis, in quem vius potest etiam præcibus leuare parati u. scilicet.

℞. Thuris, malthices 3 iij. raris calamitæ, benioini, & sandaracæ, ana 3 iij. macis & caryophyll. ana 3 iij. fiat pulvis crassior pro suffuio.

C A P V T I I.

De affectibus soporosis, comate, lethargo, coma, & apoplexia.

SOmni præternaturalis quatuor præcipue proponuntur differentie, coma, lethargus, carus, & apoplexia, quæ cum ut plurimum ab ipsâ causâ oriuntur, eandem curationem postulant, ideo vniûs hoc capitæ comprehendi possunt.

Differt autem inter se quatuor isti affectus, quod in comate, seu cataphora, seu subeta Auenienze est quidem somnus profundus, sed a quo æger excitatur, & oculos aperit & respondet, moxque iterum profundè dormit: in lethargo est somnus comati similis, sed cum febre & delirio: in carô æger febre caret, ut in comate, sed in eo somnus est profundior, ita vt æger excitatus oculos vix aperiat, & non respondeat, sicuti in prædictissatamen vellicatus sentiat, & integra maneat respiratio. In apoplexia somnus est profundissimus, & omnimoda sensus & motus priuatio, excepta respiratio: atq; ita æger neque oculos aperit, neque respondet, neque sentiat & respiratioem habent difficilem.

Causæ horum affectuum plurimæ assignari possunt. Prima & potissimâ est humor pituitosus, vel aquosus in cerebro præternaturaliter contentus, qui in minori copia cumulat, & cerebri substantiam irrotrans, ac refrigerans, euiusque meatus insensibiles obturat, coma generare solet. Si verò in eadem copia collectus patredinem concipiat, siue in tumorem collectus sit, siue per totam substantiam dispersus, lethargum producit. Quando vero maior copia collectus est sine patredine, & totius propemodum cerebri substantiæ inbibitis, earum efficere consuevit. Ac denique si copia adhuc maiori afflens non solum cerebri substantiam, sed etiam ventriculos oppleat, aut saltem mole cerebri concidente comprimat & angustet: necnon principium neruorum in basi caluarie a cerebro prodens premat, & spiritui animali transitum præcludat, apoplexiam facit.

Secundò a sanguine etiam redundante in cerebro soporosi affectus generari solent, si nimirum nimia copia in illius vas contentus crudior, serosior, ac frigidior fuerit, spiritus animales condensat, & motui ineptos efficit, tum copia cerebrum grauando, liberum eorum commestum impedit, ac pro maiori, vel minori copia, maiori, vel minori rigiditate grauorem, aut leuiorem affectum producit; sicque tum coma, tum carus, tum apoplexia ab hac causâ generari possunt.

A sanguine etiam extrusato, & cerebri ventriculos oppleente, vel comprimente, affectus soporosi, præsertim apoplexia, generari solet. Id autem contingit rupta vena in cerebro, vel ob plethoram ad vasa, vel ob contusionem capitis insignem, vel etiam ob vulnus punctum, aut caesum factum, quo vna in cerebro diuidi, multumque sanguinem profundere consueuerunt. Sola etiam cranij fractura cerebrum compungendo ita perire, ac comatosum affectum producere potest.

Tertio à tumore in cerebro genito, & pondere suo grauante, comatosum affectum generari posse dubium non est. Et nunc rei exemplum releruat a Platone in Barone, quodam obieratum, qui longo tempore arconitus, & somnolentus, nihil secundum rationem agebat: cibum nec petebat, nec nisi per vim intrinsum capiebat, nec lectum nisi coactus accedebat, sed ad nensam tota die brachio innixus, oculisque clausis veluti dormiens ferebatur, nec nisi interrogatus spiritusque admonitus quicquam, sed tunc quoque quæ ad rem munimè pertinebant, respondebat. Ac post obitum illius aperta caluarie, inuenta est in cerebro glandula magna, ducta supra callosum corpus genicæ, cuius causâ esse potuit ictus quem, in capite longè ante morbi principium acceperat.

Quartò vapores immodici ad cerebrum delati comatosi affectus sympathici causâ esse possunt. Si enim copiosi & halitiosi sint, spiritus animales aggrauant, & veluti caligine

Quia vero huiusmodi intemperies contrariissima est, ponamus præiuta: procurrent, etiam post vneriales & particulares euacuationes, solet efficere; vniuersa etiam remedia præscribenda sunt, quibus per intervalla humor educatur, & in cerebro melior illa dispositio, quæ prædictis remedijs inducta est, diutius conservetur. In hunc finem repurgas magistralis componi poterit ex materia in apozematâ supra præpositis, triplicata purgantium dosi, quo vteretur bis, aut ter in menſe ad 3.ij. vel 3.ij. cum decocto betonicæ & maioranæ.

Vel in locum syrups, sequentibus pulvis vniuersalibus afflictere poterit.

℞. Aloes optimæ 3. fl. turbit. gammofæ, hermodactyl. & agarici recenter trochiscati, ana 3. ij. diagridij 3.4. zinzibetis, & caryophyll. ana 3. fl. croci & salis gemmæ, ana gr. vij. Pulueretur omnia, & peritundatur lucco maioranæ, ac denud efficeatur in vinbra. Pottea excipiantur oxymeliste scillitico, & fiat massa pilularum, de qua capiat 3. fl. vel 3. il. semel in septimana, duobus horis ante prædictum.

Postridè syrups, aut pilularum, tum etiam bis, aut ter in septimana capias dosim opiate sequentis.

℞. Conferu, rad. acori, aut zinzibetis 3. corticis citri condit. ana 3.4. conferu flor. saluæ & rosarum ana 3. vi. nucis moschatæ condit. 3. fl. myrbal. condit. 1. th. riace veteris, & confectiõis alkerutis, ana 3. ij. puluis electridij dianibæ & diamofchi dulcis, ana 3.4. Cum syrups condire corticis citri fuit opiate, de qua capiat ad magnitudinem castane manè duobus horis ante pulum, superbibendo parum vini generis iuedocierit diluti.

Pote itus cerebrum roborabit balsamum sequens, cuius gutta 3.ij. vel 3.ij. per intervalla sumi poterunt cum vino, vel pululo.

℞. Ol. nucis moschatæ 3. ij. pulu. maioranæ, anthos, & car. bes. an. 3. fl. moschi, ambræ griseæ an. 3.4. Cum sufficienti quantitate olei cranij humani, reducantur ad balsami consistentiam.

Oleum cranij humani huic vsui idoneum parabitur, ponendo ralsam cranij non vniuersum in retorta cum vini albi 3.4. & digeratur in B.M. per aliquot dies, pottea distillentur in arena ad siccitatem prodiit oleum aque supernatans.

Hoc balsamo possunt etiam iungi nares interiores horum somni ad cerebrum efficaciter roborandum. Aliud tamen balsamum paratu facilius ad nares saltem interius inungendas, & valde efficax componi poterit in hunc modum.

℞. Ol. de flor. arantiorum 3. ij. ceræ albe 3.4. Liqueuntur leuissimo calore. Deinde adde ol. succini purissimi 3. fl. olei stilicij saluæ, & rosarum, ana gutt. x. olei spicæ gutt. v. Fiat balsamum.

Vtissimum etiam erit causticum inurere posteriori parti ceruicæ, ut materia, quæ in cerebro sensum colligitur, per hanc etiam viam sensum euacuetur.

Denique ad cerebrum exsiccatum atque roborandum efficacissime sunt aque thermales sulphureæ, nitrosæ, ac bituminosæ, quales sunt nostre Beluicæ. Ex quibus sunt embrocationes, seu irrigationes capitis per aliquot dies, præmissis vacuationibus vniuersalibus earumque vsu grauissimos capitis affectus discuti quodsiiana docet experientia.

Valissimæ etiam erunt aque thermales in potu vsurpatæ ad roborandum stomachum, qui cerebro maxime compatitur. Ad eundem finem præscribendus erit pulvis digestus in hunc modum.

℞. Coriandri præpar. 3. il. sem. anisi, & feniculi dulc. ana 3. ij. sem. an. & nuc. moschi ana 3. ij. coralli præparat. ralsuræ eboris, & marg. præp. ana 3.4. facchari rosat. ad pondus omnium, vel pro delicatioribus, pondus omnium duplum; fiat puluis, de quo capiat cochli 3. post singulorum pulsus, nihil de super commedendo, vel bibendo.

ne suffundunt, quemadmodum nubes in maiori mundo. Solis radios obtenebrans. Si vero crudiores fuerint, cerebrum adeo humectant, ut languidum ad adiones obducant fiat. Sic ebrii sopore profundissimo a vaporum ex vivo, & crudis alimentis eleuatur copia, detinentur. Sic pueri lumbicis laborantes comatosi affectibus corripiuntur, crassius & copiosius vaporibus ex crudorum & pituitosorum humorum copia eleuatis. Sic in febribus nonnullis intermittuntibus sopor inextinguibilis accessibus initio contingit, ob crudorum, & putrescentium in venis humorum, praeteritis melaeris contentorum, copia; qui a calore febribus proximo attenuati, multos vapores ad caput transmittunt, talesque soporem inducunt, qui interdum, cessante frigore, vel rigore cessat; interdum vero vsque ad finem paroxysmi permanet, proxi vapores crassiores, aut tenuiores magis, aut minus copiosi facilius, aut difficilius discutuntur.

Quinto a medicamentis narcoticis nimia copia assumptis somnus ita profundus excutitur, ut multi ex impudenti opij vsu in somnum perpetuum demersi fuerint. Talis etiam vis narcotica in quibusdam animalibus reperitur, ut in torpedine. Sic etiam ex morbo Alpidis soporem lethalem induci refert Plutarchus in Cleopatraz interitu. In humanis etiam corporibus qualitas haec narcotica generatur ex maligna humorum putredine, quae in malignis ac pestilentibus febribus reperitur, unde comatosus affectus in huiusmodi febribus saepissime contingit, qui malignitatis certissimus est index, & futurae mortis non raro praenunciatur.

Signa diagnostica varias sopororum affectionum differentias indicantia, in carum distinctione in principio huius capitis fuisse propoita. Ac signa causarum hos affectus producentium ita se habent.

A pituitosis humoribus in cerebro resurgantibus affectus soporosis produci testantur habitus pituitosis, aetas senilis, aut puerilis, regio & tempestas frigida & humida, conuersa per os & nares pituitosa excretionis superflua; & quod aeger ante inuasionem capitis grauitate oculorum obtenebratione, & totius corporis segnitie affectus fuerit, quodque non raro in ipso morbo pituita per os & nares effluit, aut in gulam defluens ab aegro frequenter deglutitur.

A sanguine vero sopororum affectum generari significat; pethiorica dispositio, rubor faciei, & capitis dolor affectum praecedens.

Tumor in cerebro genitus vix vili indicij internosci potest, sed sola caluariz apertione post obitum aegrotantis detegitur, ut in casu supra proposito ostenditur.

Sympaticum affectum & a vaporibus ad cerebrum eleuatis oriundum ostendunt, primo absentia eorum signorum, quae idiopathicum affectum significant. Secundo signa indicantia peculiarem affectum partium a quibus vapores ad cerebrum transmittuntur. Sic a ventriculo vapores huiusmodi eleuari testantur, scapula praecedens, nactus aculi, aut nidorosi, aliaque crudorum humorum in ventriculo, aliisque partibus ventris inferioris redundantium indicia. Si vero a lumbicis oriatur, propria eorum signa apparebunt, proprio capite descripta.

Quod ad prognosin attinet: omnis soporosis affectus periculosus est; sed quo maior & profundior est somnus, a quo aeger difficultius expulsetur, eo maior potest virg periculum. Atque ita cum comate, & lethargo periculosus est affectus apoplexia carus, quae si fortis fuerit, omnino incurabilis censetur ab Hipp. Aphor. 42. sect. 2. qui sic habet. *Apoplexiam fortem solvere est impossibile, debilem vero non facile.* Fortis vero dicitur apoplexia, in qua respiratio inaequalis, inordinata & interdum intermittens est. Si vero ita se habens respiratio magna vi exerceatur, fortior censenda est; si autem respiratio penitus probocatur, fortissimi mo est. Contra vero vi respiratio aliquem feruat ordinem debilius existit, quae doctrina proponitur a Gal. comment. Aphor. 42. dist. 2.

Valde periculosus est comatosus affectus, qui acutissimo morbo superuenit. Vel enim calor natus extinctionem significat, vel malignam & venenatam qualitatem, quae in

febris malignis cerebrum plerumque solet impetere. Qui per consensum partium interiorum fit comatosus affectus, & a vaporibus ex ipso eleuatis, minus infert periculum.

Lethargo affecti in septem diebus moriuntur, si vero hos eluserint, sani euadunt. Hipp. secunda de morbis.

Affectus comatosi in senibus vel plurimum lethales esse consueuerunt. Cum enim propter caloris natui inopiam, debilem habeant facultatem concoctricem, & expultricem, sit, ut materiam morbosam lupare & expellere nequeant, eam in primis quae in cerebro redonat; siquidem cerebrum cum sit pars corporis frigidissima, aduentante leno caloris immunitatem, & tandem extinctionem citius quam reliqua, pati consuevit.

In lethargo parotides superuenientes, vel pus ex auribus effluens cum immutatione symptomatum salutare; significat enim dominum naturae super causam morbosam, quam vel expellit ad emunctoria nondum persecta concoctam, vel in pus conuertit per ductus naturales euacuat.

Qui ex lethargo seruantur, empyici fiant, ex Hipp. in Coac. & 3 de morbis. Haec sententia, ut sonat, & ut plerique interpretantur, experientiae non respondet. Vix enim verum empyema ex lethargo genitum, vili videre contigit. Sed ventati est consuetudo Mercurialis interpretatio, quae vel empyicos, vel purgatos hoc loco esse intelligendos, quibus per aures, vel nares materia purulenta euacuetur. Docuit enim Galen. comment. Aphor. 7. sect. 5. & Aphor. 44. sect. 7. per empyema Hippocratem non solum quae in thorace, sed quae etiam in singulis partibus sit, suppurationem intelligere.

Saporosis affectui a causa frigida oriundo phrenitidem succedere bonum; quandoquidem a calore intensiore phrenitidem efficiunt materia pituitosa, affectum sopororum producentem concoquitur.

Apoplectici in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. Hip. de morbis, & Aph. 51. sect. 6. Illa autem icteris acuta esse debet, & effusionalis, ab humorum, & spirituum effuscentia oriunda, vel possit materiam morbosam discutere, si autem remissior fuerit, & symptomata, qualis apparere consuevit in apoplexia, quae a dispositione inflammationis cerebri, & nimia sanguinis copia in venis illius contenta, exoritur, morbum non immittit, quin potius phrenitica quaedam symptomata accersit, quae facultates animales debilitant. Et in hac causa phrenitis soporosis affectus superueniens non est bona; vi in superiori prognostico dicebatur. Praeterea febris morbum soluturam alia conditione indiget, ut nimirum a principio morbi accedens natura adhuc in suo robore consistens validos conatus exercere potest, quae enim iam progressu morbo lapsa peruenit, salutaris non est, ut docuit Hipp. in Coacis. *Apoplectica, inquit, affectusque deprece & coartatio modo fientes, febre temporis progressu accedente pernicio.*

Apoplectici, & nonnulli superuenientes mala; illa enim fundantia humanae naturae oppressorem significat.

Ad horum affectuum curationem, sicut, & reliquorum omnium, tria instrumenta medicum necessaria sunt, diæta, chirurgica, & pharmacia.

Diæta in horum affectuum principio tenuissima est imperanda, quia morbi vult acutissimus, adeo solis iussus aegri nutriendi sunt, per diluicia interualla viuantur. In declaratione verò, & in curatione prophylactica eadem diæta conuenit, quae in frigida cerebri intemperie descripta est.

Reliqua duo instrumenta sequenti methodo sunt viuandis.

Quandoquidem huiusmodi affectus soporosis praecipites sunt, & periculo pleni, secundum Medici diligentiam potulant, & in talibus casibus remedia festinanter administranda sunt.

Primo igitur Medicus ad affectum aliquem sopororum vocatus, agrum constitit a graui illo somno excitare conabitur, omnibus sensibus obiecta vehementer offerendo. Atque adeo oculi radijs solaribus, & luci splendidi obiectis.

Aures clamoribus, strepitu, fonitu concutienda, & in primis ager proprio nomine magna voce sæpe appellandus est.

Narius acris, vt ruta, castoreum, acetum, obijcienda. In os & palatum stydem acria inijcienda.

Tactus frictionibus, velicationibus, pilorum euulsionibus, ligaturis, digitorum complicationibus & alijs humilimodi irritandus.

Clyster lavans præscribitur, primum ex decocto compumæ, ut citius pareatur, in hunc modum.

¶ Decocto communis clysteris ʒi. s. hæræ pieræ, & diaphanæ ʒi. i. o. lilior & rutæ, ana ʒi. 4. s. mellis anthosati ʒi. i. lialis ʒi. 4. fiat clyster, inijciendus statim.

Dum hæc fiunt, sero apud le medicari debet Medicus, an venæ sectio celebranda sit, quandoquidem in hæc affectibus, quod dicit Celsus de apoplexia, languis in detractione, vel occisione, vel liberat. Conuenit autem venæ sectio, si sanguis causæ principalis, vel adiuuantis, vel sine qua non, rationem habeat, viresque ferant.

Vires autem non actionum animalium ablatione æstimande sunt, sed quales ante morbi inuasionem fuerant. Si enim tum satis fortes fuerint, etiam nunc permittunt, nisi plane fortis sit apoplexia. Neque vires sunt debiles per resolutionem, sed per oppressionem.

Si verò nullo modo languis peccet, aut vires sint verè deiectæ, aut ager admodum senex, venæ sectio omittenda.

Statim quoque & sine omni mora, siue noctu, siue interdium, venæ sectio corripitur, affeetus infunditur, & quidem ante clysterem, si quamprimum iniectionis non fuerit. Fricetur tamen prius corpus, & aperitur vena in brachio.

Hoc etiam aduertendum est, vtilius ac tutius esse non, vna voce mittere quantum opus est sanguinis, sed per vices, inter tamen paucorum horarum spatium. Nam per iterata illam sanguinis missionem, & materia facilius mouetur, & vires non deiciuntur. Impulicatur post primam venæ sectionem ægri facies, & pulsus exploretur. Et si color faciei viuidior reddatur, & respiratio facilior, ac pulsus bene habeat, optimè sperandum, & confidentius venæ sectio repetenda.

Vulnus in venæ sectione fiat ampliori foramine; alius enim sanguis, qui crassior est, statim sublit.

Quo magis abundat sanguis, eo liberalius detrahi debet, si verò pituita magis luxuriet, parcius manu mittendum est, ne calor naturalis, ad hunc affectum discutiendum tan-topere necessarius, quadam tenus infringatur.

Copiose & frequenter sanguinis detractionis in apoplexia exemplum singulare proponitur à Zacuto Lusitano, lib. i. *hystoria Medorum principum*, lib. 33. his verbis. *Nobilis quidam femina inueniatur, in omnium rerum delirium, deinde in veram apoplexiam cum mensuris effusus incidit. Cui cum plura, tam in superioribus, quam in inferioribus partibus essent celebrata auxilia, per ligaturas, acres clysteres, scarificata cucurbita dorso applicata, neglecta indicatione, quæ à mensuris alii fluente desumitur, ex utroque ex procrastinatione periculum, cum viribus effe valentibus, factis frictionibus crurum, & cucurbitulis femoribus applicatis, alio herarum spatio, quater à cephalica copiose sanguinem misto, à quo præsidio loqui capis, & conuulsi.*

Quidam prædici recentiores audent in apoplexiis iugulares venas aperire, sicque omnes propemodum liberati affirmant, in eaque apertione hæc methodo progrediuntur. Primum colum leuiter confringunt lineo, apertione facta statim laxant, sanguis sponte hui, sine ligatura, quæ posset languinem ad caput attrahere; vulnus postea occultum emplastrum glutinante fine ligatura, & eoque facili sanguinem cohiberi adferunt. Quod confirmat Zacutus Lusitanus, qui tamen ligaturam adhibet, *obseru. 79. lib. 2. Praxis Medicæ admirandæ*; ubi refert historiam angine acutissime, in qua permissiorum Medicorum consilio venæ iugulares aperte fuerunt; vnde sequens est irreparabilis (vt ipse loquitur), sanguinis fluxus, quo ager in omnimodum vitium iacturam lapsus est. Vocatur Zacutus accurrit, emplastrum Galenicum superimpoluit, quo ipse lib. 5. *meth. 5. 4.* ad arteriarum, & iugularum hæmorrhagias se-

citer vitæque collo commodè ligato, eger iam exhaustus reuincitur, & a morbo liberatur. Emplastrum verò componitur ex thure, aloë, & pils i porcinis, albu mine, qui subactis, dupla thuris ad aloe quantitate, vt docet Gal. *lib. 1. de ex. 1. 1. 1.*; aliquando vero æquali vtriusque quantitate, in durioribus scilicet corporibus. Superiorem operationem Gal. comprobat, cum dicit hoc emplastrum venarum iugularum profluvium citra vinculum sistere. Hoc etiam animaduerti velim, in apoplexia languinem ex vena aperta, tanto impetu non profluere, quemadmodum in angina; quæ in illa sanguis est refrigeratus, ac veluti congelatus; vt docuit Hippocrates 1. *de morbis*, & ea ratione creditur venas & arterias carotides obstruere; in hac vero feruens effluat ac tenuis, cum anginosi febre acutissima laborare solent.

Purgatio infundatur paucis horis post venæ sectionem, neglecta temporum electione. Neque enim in purgando cunctabundus nimis, aut timidus esse debet Medicus, cum morbus valde virgat, & breui fæ pœccatur tempora, Et illa purgatio forti medicamento debet fieri, quæ humor consumax est, & obruta facultas, nec nisi vehementioribus irritatur.

Illud autem medicamentum vulgo fieri solet ex ʒi. i. electarij diacarthami, dissoluta cum aqua betonice, addendo castorei ʒi. s. Vel

¶ Turbith. electi ʒi. 4. agarici recenter trochisc. ʒi. 3. i. zinzib. ʒi. 1. i. sem. feniculi ʒi. i. castorei gr. vi. Infundantur in sufficienti quantitate aquæ betonice. In colat ʒi. iij. dissolue electarij diacarthami ʒi. 3. i. Turpi rosac. ʒi. 4. fiat potio. Vel

¶ Massa pilul. cochui ʒi. i. castorei gr. iij. Malaxentur cum aqua betonice, formentur pilule sepelem; & si ægus non possit deglutire, dissoluantur in aqua saluæ, lauendulæ, vel betonice. Vel

¶ Massa pilul. cochui, & de agarico, ana ʒi. s. trochisc. alhandal, diagridij & castorei, ana gr. iij. Fiat massa cum melle anthosato, quæ dissoluitur in aqua saluæ. Vel fiat talis potio.

¶ Fel. lenæ ʒi. s. agar. albi ʒi. s. turbith. electi ʒi. i. zinzib. & galange, ana ʒi. s. Coquantur in aqua saluæ & trochirum. Colat ʒi. iij. adde electarij diacarthami ʒi. i. castorei ʒi. 3. i. oxymelitis simplicis ʒi. s. Fiat potio.

In lethargo purgatio ab initio mitior esse debet, propter febrem continuam consumendam, ex agarico, cum aliquod rhab. addi potest, vel scammonij, aut pilulis de hœca cum agarico, cum bilis plenius humorum ad caput vehiculum sit. In morbi tamen progressu, cum iam materia ad caput fluxit, & in eo hæret, purgantibus etiam prædictis vtendum est.

Itallianus scammonij ʒi. i. cum castorei ʒi. i. in oxymelite exhibet, quo multos lethargicos depioratos se reuincisse refert. Et Oribasius ex Rusto Ephesio refert, nullum aliud esse lethargo correptis æquè vtile, atque efficax medicamentum ad purgandum pituitam, quam bilis admixta, in caput detulit, quam scammonium cum castoreo exhibuit.

Sæpe vero accidit facultates esse ita oppressas, vt medicamenta in actum minime deducantur, atque adeo etiam nihil operentur: quod mali omnis est, & ita affectu vltimum pereunt. Attamen quia, vt inquit Celsus, quando humilimodi temperantes ingruunt, remedia etiam cum aliqua temeritate rapienda sunt, & omnino periculum in hoc morbo aliquid tentare permittit. Nam vt Serenus habet, *Medici hæc potiora putant, quam dulci morte perire*. Et, vt idem Celsus, *multa in præcipitijs pericula recte sunt, quæ alia esset emittenda*. Ideo propositis remedijs non proficientibus, ad ea quæ ex antimonio parantur licet transire, præsertim ea, quæ inuis vehementia sunt, qualis est aqua benedicta, ex croco metallorum composita; quæ per purpura & inferiora potenter expurgans, tantam pituitæ copiam non solum à ventriculo, partibusque inferioribus, sed etiam à cerebro educit, vt hac euacuatione interdum ægri liberentur. Et bona fide testari possumus, nos virum nobiliem ex primoribus huius ciuitatis vidisse, ter intractabili morbo ab apoplexia hoc solo remedio liberatum. Quamuis autem

autem nonnulli etiam viri doctissimi vomitorium vsum in huius affectibus improbant; tamen experientia magis credendum est; quae etiam nos docet quotidianis experimentis pueros comate affectos sale vitrioli vomituum promptus & tutius, quam vilo alio remedio liberari.

Tinctura incognita in aqua vice extracta & ad 3.ij. cum melle excepta, & in os infusa potenter educit.

Interim medicamentum purgante exhibito, antequam operari incipiat, & dum etiam operatur, reuulentia omnium generum in vsum reuocanda sunt non solum frictiones, & ligaturae antea propositae, sed etiam cucurbitulae dorso, scapulis, brachijs, & semioribus affixae, sine scarificatione, si languinis multo sufficienti celebrata sit, & cum scarificatione, saltem eorum aliquae, si phlebotomia fuerit omissa.

In apoplexia non admoveantur cucurbitulae posteriori thoracis parti, aut hypochondrijs, ne contractis thoracis & abdominis musculis, respiratio magis impediatur.

Summum & vnicum remedium habentur, praesertim, in apoplexia cucurbitulae capiti impostae. Quod remedium genitis insignis ille Medicus Fracastorius apoplexiam correptus nutibus suis indicasse fertur; sed non intellectus perijt.

Zacutus Lusitanus *lib. 3. de Medecorum principum historijs*, refert desperatam apoplexiam, cucurbitula bis occipiti admodum cum profundis scarificationibus, a se curatam fuisse.

Vesicatorium posteriori parti cervicis & scapulis admoveatur.

Clysteres acres iniciantur duo, vel tres eadem die.

℞. Fol. picear. hylospi. calamenti. origani. salutar. rutae, & centaury. minoris, ana M. i. sem. carthami ʒ. ʒ. sem. feniculi & cumini, ana ʒ. iij. agarici albi in modulo inclusi ʒ. ii. pulpa colocynth. in eodem modulo inclusa ʒ. ii. Coquantur ad ʒ. ij. In colat. dissol. hiez. piceae ʒ. ʒ. diaphenici ʒ. i. olei rutacei ʒ. ij. Fiat clyster.

Chymici clysteribus admissens aq. benedictae ʒ. ij. vel ʒ. ʒ. sic potenter purgant.

Aq. autem huius dosis augeri potest ad ʒ. iv. & ʒ. v.

Imò vero antequam & phiala educatur, aliquantum agitari debet; ut nonnulli pulveris in fundo residens admisceatur, unde vires efficaciores eadunt. Idco vtriusque clysteris ex aqua benedicta, vel vino Em-tico, hac formula praescribere soleo, qui in multis affectibus, praesertim colicis doloribus, miranda praestant.

℞. Decocti emollientis ʒ. ii. diaphenici ʒ. i. aq. benedictae turbidae ʒ. iv. Fiat clyster.

Si clyster debito tempore non reddatur, glande alijs protrahatur.

℞. Pul. hiez. piceae Gal. ʒ. ii. pulpa colocynthidos, agarici albi, ana ʒ. ʒ. diaphenici ʒ. i. salis gemmi ʒ. ii. mellis ad debitam consistentiam cocti quantum satis; fiant suppositoria.

Saepe tamen accidit, ut sphincter ani resoluatur, unde anus plane pateat, ac clysteres sine fructu iniciantur, cum retineri non possint; qui calidus plerumque desperatus est.

Naribus admoveantur calidior cum aceto, quae spe cifica proprietate somnum excitare creduntur.

Efficax etiam remedium est, si acetum accerrimum supra laminam candentem effundatur, & vapor ab agro naribus excipiat. Adhuc efficacius erit, si aceto addatur semen nigellae, rutae, & calioreum, Ipsum etiam acetum modice calefactum & naribus adhibuit excitat potenter, si accerrimum sit, & adhuc potentius, si ei piper & calioreum admisceantur. Excitat etiam a somno suffusus sulphuris.

Pili caprae vrsi & cornu cervi & caprae vsum, & naribus ad motum potentissima sunt ad excitandum altissimè dormientem.

Succini albi fumus ad apoplecticos excitandos praestantissimus est, si tum illius oleo tempora & nares saepe illinantur.

Plant etiam frictiones in plantis pedum cum sale & acetum, manibus inunctis oleo rutae & de castoreo lingua & palatum inungantur theriaca veteri, in aqua caelesti, aut

apoplectica dissoluta. Sed advertendum est ne theriaca, recens adhuc sit: nam ratione opus somnum inducit. Ad eundem vsum reuocari potest aurea Alexandrina, & correctio ancardina. Sanap etiam poteri coeli in vino forti, & eo palatum inungi Pyrethri radices in oxymelite coctae idem praestant. Omnibus vero huius calioreum vtiliter admiscetur.

Vniuersali euacuatione peracta, & purgato corpore, ea pot euacuandum est, tam sensibilibus, quam insensibilibus.

Sensibilibus per nares & palatum, erithinis, & sternutatorum, ian curatio frigida intemperie cerebri proposita, & aunditionibus palati supra descriptis Huius omnibus addantur ruta, calioreum, acetum.

At de sternutatorijs hoc advertendum, si affectus perseveret, & ager difficulter excitetur, eorum vsum commodissimum est; non tamen diutius in ijs persisterendum, ne caput replent, humores commouant, ac fundant. Sed initio morbi ad intempus sternutatorum vsum abstinendum, cum magis ab ijs tum materia fundatur, & partibus impingatur, unde morbus fit contumax, vel interdum lentior aff. d. ius in apoplexiam degenerat.

Tandem insensibilibus reuolentia applicanda, quae in sequentem modum componi possunt.

℞. Baccarum lauri & ungueria. ana ʒ. i. rad. angelicae, zedoariae, imperatoriae ʒ. i. lobelb. ten. lauri, rorism. ana M. i. urae, lauricae, maioranae, flor. lant. ana M. ʒ. Coquantur in aceti sufficienti quantitate. Hoc decocto spongia, aut linteam imbutum aut lapa, capiti calide applicentur. Mirum quantum auxilij soporosis affectibus hoc remedium affert. Brachia quoque & manus eo abstergantur, quoque crura & pedes ite entur.

℞. Callores ʒ. ʒ. capil. hominis vltiorum ʒ. iij. succi rutae, aceti, & olei communis, ana ʒ. ʒ. Coquantur ad vnguenti consistentiam, quo illinatur caput calide post solum. Vel

℞. Olei colimicaforei, & de euphorbia, ana ʒ. i. pulu. sinapi, euphorbia, ana ʒ. i. aceti cochlear. i. cere quantum satis. Misce, fiat vnguentum.

Si praedictis remedijs non cesserit affectus, vesicatorium magnam vertici, & fincipiti erit applicandum.

Efficacius multo euadit vesicatorium, si euphorbium ei addatur, quod & profundioribus capitis partibus humoribus attrahat ad superficiem.

Nonnulli etiam, cum morbi vis maxima est, audent cauterium aculeis occipiti inter primam & secundam vertebrae applicare.

Zacutus Lusitanus plura eodem tempore applicuit, cum scilicet succellus; ut testatur *lib. 1. praxi admiranda, obseruat. 34. his verbis*. Vocatus vi inuenerim agrum, quo post dies triginta inextinguibili dormiendi necessitate correptus, cum febricula lenta, agere pollebras attollerere poterat, profundo somno immersus. Hic variis reuulentia, & vacuantiis erat expertus, quibus cum non leuaretur, ad cauterium accessi cum vtilitate summa. Quare candenti ferramento crucis in vertice capitis excutavi, in occipite unam, & circumcirca multas; ex quibus cum excitaretur ager, & robore efflueret, exper. cessante ad mentem rediit. Hoc auxilio praeter omnium spem, omnibus tematis membris caruolides persanasse. Hi cum ignes operisignata putata, & per multos dies, per os, & nares excreta commuere.

Alij, ex antiquorum praescripto, sartagine candentem capiti admovent ea distantia, ut pilos, non cutem capitis possit comburere.

Commode quoq. in huiusmodi affectibus, aliquid aquae caelestis, vel apoplecticae quoq. infunditur. Aque enim haec ob summam penetrandi vim, praestantissimum saepe aduocant auxilium, (& multos ab immoientia apoplexia, vel etiam iam praesente liberarunt) modo sanguis non valde abundet: quia aquatum illarum vsum potius fundi.

Aquarum autem apoplecticarum multa descriptiones habentur apud Langiam, VVeccherum, Quercetanum, Crollum & alios. Vnan tantum, exempli gratia, ex electiombus simplicibus a nobis compositam hic afferre lubet.

℞. Rad.

q. Radic. pponis. vici quercini. ana 3. j. calami. aromati-
galis. a. cyperis. ana 3. a. fol. beton. faluis. maiorana. ana M. l.
sem. pponis. anisi. feniculi. carni. ana 3. ij. flor. laeudula.
ftechados. & rosmarin. ana. P. i. nucis mofch. macis. caryo-
phyl. cubeb. granor. paradisi. cardamomi. ana 3. j. cin-
nami 3. ij. croci 3. j. f. Specierum diambra. & diamofeni.
ana 5. ij. Coniundantur & incendantur, vt artus efit, & repa-
nantur in alembico vitro defuper affundendo fpiritus vini
opime rectificati q. l. vt tribus digitis materia fupereminet.
Digerantur in B.M. per octo dierum fpatium. poftea
deffillentur, & aqua feruetur in vale vitreo bene claufa.

Si tandem morbus ad declinationem transierit effe vi-
deatur, fomafque ille profundus iam difcuttus fuerit,
omiffis praedictis remedijs, foli roboranti cerebri incum-
bendum eft. Quod fatis commodum fiet viii quotidiano
opiat: cephalica pro frigida intemperie cerebri defcripfit.
Vel fi potius agendum eft, aqua apoplectica vfurpari
poterit.

In primis vero callores vfus continetur, fi malum pro-
trahatur, & mane per aliquot dies eius grana ij. vel iv.
oxymenthe limplici, vel fci. exhibeantur, telligat Trallia-
nos, multis illo morbo victis, hoc foleo remedio mortem
eafiffe.

Exterius etiam vtiliter admoventur balafma apoplecti-
ca, quorum variae extant formulae apud Cyniaturos. Nos
vnicam e. g. hic tantum fubijcimus.

7. Olei nucis mofchat per expreffionem parati 3. f. Ambre
grifeae mofchi optimi & zuberana 3. a. ol. deffillati lae-
uendulae, fuccini, cinnamomi, rofmar. car. ophyana 3. f.
Mifce, fiat balafmum, quod naribus & auribus infillatur.
palatoque illatur fingulis diebus mane. Ad hanc rem-
edia valde commendatur oleum uicis mofchatze deffilla-
tum eodem modo vfurpatum.

Denique in horum affectuum generali curatione dili-
genter aduertendum eft, in ijs qui hunt a fanguine, minus
calefacientia mediermenta effe adhibenda, at phibito-
riam largiori manu celebrandam, poftea venam frontis
aperiendam tum etiam purgantibus phlegmagogis chola-
goga effe admifcenda.

Qui huius affectibus femel affecti, ab ifque liberati funt
in eos vltimurim folut recidere. Quod vt praecaveatur,
frigidior cerebri intemperies corrigenda eft, eademque il-
lius cura infittuenda, quae fupradicta propofita. Eademque
via & methodo imminet apoplexia, vel carus, vel lethargus,
vel coma praecavebitur. Et fi cerebri valde reftige-
ratum eft, poft vniuerfales vacuaciones aqua apoplectica
in viii frequenti effe poterit. Vel etiam vii poterit tabellis
in fequentis modum compofita.

7. Ambre grifeae 3. f. olei deffillat. anifi, cinnamomi,
nucis mofchat. ana guttulas ij. olei caryophyll. gutt. j. lac-
chari in aqua flor. aurantijs dilfoluti 3. v. Fiat tabella,
capiat 3. j. vel duas mane.

Pulule caput roborantes etiam vfurpari poterunt, in
hunc modum compofitae.

7. Cubeb mofchis, nucis mofchat. caryophylli ana 3. i.
ambre grifeae 3. f. mofchi gr. v. Cum fucco maioranae lor-
mentur pulule capiat 3. i. hora fomai bis in feptimana.

Comendantur etiam & apud multos in viii eft hic puluis.
7. Succini albi 3. f. pulu. electar. diarrhod abbat 3. ij.
radic. pponis 3. i. f. Fiat puluis de quo capiat 3. i. in aqua
conueniente effe noftimum.

Vtile quoque effe nucem mofchatam fape ore detinere,
& malfcare.

Tum etiam odoramenta fape naribus admoenda funt,
& in primis balafma apoplectica.

Arumata in cibis vfurpentur: poft pafius puluis dige-
ffimus in curatione frigide intemperie cerebri defcriptus.

Si a fanguinis copia affectus foporosis metuitur, illius
in primis quantitas imminuenda eft, dandaque fedulo o-
pera, vt hemorrhoides profluant, quo nihil vtilius effe
potest.

Hic etiam purgationes infittuendae funt, ex fenna & rhab-
baque remedia eligenda, quae minus calefaciunt.

Si denique ab humore melancholico metuitur apople-
xia, fluxus hemorrhoidum etiam vtiliffimus eft, purgatio

iterata humoris melancholici, & medicamenta propofita,
ad roborandum cerebrum praecipue vero puluis ex fucci-
no diarrhodone & pponis iupra defcriptus.

C A P V T III.

De comate vigili.

Licet coma 3. yvvr, feu vigil ad foporosis affectus re-
ferri foleat, quia tamen longi diuerfam a ceteris con-
uulfionem obtinet: adeo theoriam in hoc capite explican-
dum eft.

Est autem coma vigil affectus, in quo acri claufis ocu-
lis decumbunt. vt dormire videantur, cum tamen vigilent,
delirant: & eos tetters, itatim oculos aperiant, & torve
afpicunt, & iterum decumbunt in fonnum, qui varijs ima-
ginibus & deliramentis impeditur, ita vt vigilare cogantur.
Hunc affectum Gal. medium coftituit inter phreni-
tidem & lethargum, & typhonomiam appellat.

Caufa huius eff. ctus vulgatiffima, eft bilis cum pituita
permifta, a quibus humoribus cerebrum tantum irrigatur
vel tumorem atque inflammationem concipit, vnde ex if-
pelas ordematolum, vel oedema cryftallatolum exoritur.
Cum autem ea humorum mifcela varijs modis & propor-
tionibus fiti valeat, fic varij in duferis agitantibus illi
affectus apparent. Si enim bilis in mixtione praevalet, de-
larum maus eft, & acri, licet claufus habeant oculos, mi-
nus dormiunt: fi vero pituita predominetur: acri magis
dormiunt, minus delirant, & expreffius minus vocule-
rantur, ac defcipiunt.

Fit etiam come vigil per fymphathiam a vaporibus bi-
liofis, & pituitofis humis mixtis in cerebrum tranfatis
quod non raro folet contingere in febris ex humorum
mifcela oriunda, praecipue hemitritus ex tertiana & quo-
tidiana compofitis. Non eft tamen inconueniens afferere,
vapores fimpliter calidos & humidos in febris fatis in-
tenfis hunc affectum producere, quia ab humiditate fit
fonnus, a calore autem vigilia.

Diagnofis huius affectus ex ijs quae antea dicta funt fatis
glucet. In eo eni m laborantes claufis oculis permanent, &
fonnum capere videntur attamen dormire nequeunt, & fe-
varijs modis exagitant, fele fubito erigunt, & lecto furge-
re nituntur, & iterum in fonnum relabuntur. Caularum
vancas ex praedictis etiam facili dignofciunt.

Percutofus affectus maxime cenfendus eft. Siue enim
tumor & inflammatione cerebrum afficiatur, graue ma-
lum effe conftat, fci alio quouis modo a praedictis humo-
ribus obfideatur, fci a vaporibus ex febris maligna
rum materia oriundis afficiatur.

Deliria vehementiora in conate vigili conuulfionem effi-
ciunt: funt enim ab humore, vel vapore acerrimo, qui
partes neruofas ferendo, conuulfionem facili concitare
potest.

Curatio comatis vigilis idiopathici ifdem inftrumentis
perficitur, quibus phrenitis & lethargus curati confuevit:
quod fi magis ad phrenidem deffeat, illius remedia ma-
gis adhibeantur. Si vero magis ad lethargum inclinet, eia-
dem remedia magis vfurpantur. Sympathici vero comatis
curatio a febris malignae curatione dependet: a qua fumit
originem. Peculiariter tamen remedia vapores alios a
cerebro reuocantia, & repellentia vfurpanda funt in princi-
pio, vt phlebotomia ex brachio, & malleolo, & oxyrrho-
dina fronti & fincipiti admoa: quibus accedent q. fteres
frequenter inieci, cucurbitulae tum ficcae, tum humidae
fcapulis, dorfo, naribus & cruribus affixae: veficatoria
ceruici, brachij, & temporibus admoa: & fi quid
cerebro infuxum videatur, deriuatio per
apertionem vene frontis: aut luridi-
nes pone aures, & temporibus
atitax mofenda erit, fimulq;
refolutio procurandae
animalibus tenel-
lus calentibus
capiti ad-
mofis.

C A P Y T I V.

De Catoebe, seu cataplexi.

Q uædam apud auctores confusio reperitur circa catholici nomen: quod alijs pro ecclesiæ vigili, alijs pro catalepti vulgripet; alijs autem occasione dedit Paulus, qui *lib. 3. cap. 8.* de duplici catholice agit, et primum sub illius nomine de comate vigili tractat: in fine vero sub eodem nomine catalepti explicat. Vilius tamen inuoluit, et catholicos, et cæ. alijs pro vno & eodem morbo apud omnes præpositum auctores habebatur. Latini vulgo conglaciationem annectant.

[illegible]

Smiles huiusmodi videre est apud Schenkim, Marcellum Donatum, Rodericum, lacum, & alios. Ex quibus colligitur, in hoc affectu lenium internum & externum abolitorem cum membrorum rigiditate vt plurimum reperiri; internum tamen lenius non esse: prolixius abolito, ita vt aegri colloquentes audiant; internum etiam membra non esse rigida, sed ad aditantes foeti potius, & in varios situs moveri.

Causæ huius affectus variz assignari possunt. Galen. *de morb. cap. 3. f. 3.* a frigore & sicce cerebri intemperie calepulis generationem tribuit; quæ quidem intemperies partem cerebri posterioriorem præcipue occupat, eam confligit, & cunctas, & vnde nervi ab ea oriundi cuncti candelantur, & tenaci ac rigidi evadunt. Talis etiam intemperies totum nervorum genus occupare potest, ab externa vel interna causa producta. Hanc tamen causam nonnulli in dubium revocant, exsultantes tantam frigiditatem in vivente corpore reperiri non posse, quæ talem nervus congelationem inferat. Verum hoc tacite redarguit Galen. *lib. de diff. morb. cap. 5.* ratione ab experientia delumpta his verbis. *Nam in quo in itinere visque ad mortem frigus oppressit, talibus rigoribus contrahitur, quales Græci emproptetones, epistrotæ, & ceterasque appellant, nonnulli vero his afflictiore quas congelationes nominant, affliguntur.* Docet igitur Gal. a frigore externo calepulis generari posse. Et ratio hanc persequenda, in his qui in itinere ex itinero frigore rigescunt & intereunt, rigiditatem mortem præcedere, atque adeo minorem rigiditatem eam posse inducere, quam fit illa, quæ mortem inducit; sicque congelatio nervorum cum calepulis a frigida intemperie produci poterit, quæ citius talem affectum pariet, si licet inter comitem habu erit.

Frequentius tamen generatur his affectus ab intemperie frigida & sicca cum materia conjuncta. Illa autem materia est humor, aut vapor melancholicus, a quibus conflatio

partis cerebri posterioris, & nervorum tenſio, atque rigi-
ditas inducitur, non ſolum qualitate ſua frigida & ſicca
ſed etiam quantitate, quæ replendo diſtentionem facit.

[illegible]

Sennertus nouam excogitauit causam, quam dici esse spiritum quemdam congelantem, a quo spiritus animales figurantur, & immobiles redduntur: illam autem vim congelantiam, & fixatam ab intemperie frigida & sicca dependere negat: sed esse qualitate quadam occulta exornat asserit, huiusmodi spiritus congelantes in Macrocoloni reperiuntur, ut in liliis: a quo interdum homines rigidi, & veluti congelati redduntur: quoniammodum refert Celsus, non oīes meliores lux querit, quēdam, fulmine percussos fulsere, & eandem figuram corporis seruasse, ut vnius comedere videretur, alter inuicem poculo adinquare, alius bibere, licet omnes essent examinati. Vulgo etiam asseritur vinum in dolio a fulmine spiritui interdum congelari in terrisioribus, aliquando spiritus quosdā esse terra erumpere a quibus homines, & reliqua animalia repleti conflunt, & rigida fiunt. Addit Sennertus vim congelandi in nitro & pluribus alijs numeralibus infignem reperiri, Exemplo eorum non asserit, Nos vniu. propinquis ex plumbo desumpimus, cuius vapor mercurium ita figit, & congelat, ut malicibus eadē. Hoc Sennertus inuenit non esse propterea reijciendum, nisi ita hanc vnicam catalepticos causam statuens, reliquas omnes expungere, quæ cum a Gal. alijsq. præstantissimis Medicis stabilitæ sint, temerè non sunt reijciendæ. Neque vlla necessitas cogit ad causas occultas conijciendi quando manifestæ habentur, talem effectum producenti capere, ut in eorum enumeratione spiritus demonstratum est. Et cum Sennertus huiusmodi spiritum congelantem ab humore melancholico excitari docuit, illius sententia a communi parum distat, quæ humori, aut vaporis frigido, & sicco, atque adeo melancholico cataleptis generationem tribuit.

Diagnosis huius affectus satis manifesta est ex historiis supra ex Gal. & Fernel. propositis: malum enim subito hominem inuadit, cumque in eo statim detinet, in quo primò eum offendit. Sicque immoratur feruat, ac si congelatus esset. Diuersitas verò symptomatum in differentiis pronolis sensibus iosis discernitur.

Prognosis huius affectus eadem propemodum instituen-
da est, qualis in soporosis affectibus fuit propofis: nempe
affectum esse periculofum, & pro maiori, aut minori in-
tentione symptomatum, maius aut minus portendere pe-

Curatio autem duplex instituenda est: una in paroxysmo, altera extra paroxysmum. In paroxysmo ad egrum excitandum convenient ea remedia quae in sopore affectibus descripta sunt. Extra paroxysmum curatio melancholica morbi huius omnino convenient, si catochus ad humore, aut vapore melancholico generetur; quae quidem causa frequentissima est. Si autem frigida intemperies sola, a causa externa, vel interna producta, huius malo originem dederit, quod illam emendant remedia capite primo huius libri erunt deprementia. Ad ceteri, si copios sanguinis huius afflicto generet, vel foueat, illius unminutio per venesectionem erit consentanea.

Victus ratio calefaciens & humectans praescribenda
erit, sicut in affectibus ab humore melancholico oriun-
dis.

C A P V T V.

De Paralyfi.

Paralysis est privatio motus & sensus in quibusdam partibus ob impeditam influxum spirituum animalium.

Varie sunt illius differentie. Vel enim omnes quæ sub capite sunt, partes occupat, & *paralyfis* dicitur vel dimidiam tantum corporis partem, *hemiparalyfis* nominatur; vel vocant tantum particulam obfideat, & *paralyfis* particularis appellatur. Quamvis nonnulli auctores *paralyfis* hemiplegiam, paraplegiam, parefim, & resolutionem pro vna & eadem in motus, & sensus priuatione, quæ dimidiam corporis partem occupat, indiscriminatam vident.

Duplex iterum *paralyfis* constituitur. Vna perfecta, in qua motus & sensus omnino aboleretur. Altera imperfecta, in qua functiones illæ tantum immutuantur; & si levis sit earum immutatio, nondum *paralyfis*, sed torporis, vel stuporis nomen obtinet, quia vix est ad veram *paralyfis*, & quasi prodromus illius.

Alia etiam est species imperfectæ *paralyfis*, quando motus laeditur illo sensu, vel vice versa.

Causæ *paralyfis* in genere sunt illæ omnes, quæ spirituum animalium influxum in nervos & musculos impedire possunt.

Omniū frequentissima est humor pituitosus, qui nervos obducendo, comprimendo, densando, vel refrigerando, dictum spirituum animalium influxum prohibere solet.

Humor ille pituitosus influit a cerebro in nervos & medullam spinalem. Sic apoplexia levis degenerat in *paralyfis*, quia humor illam efficiens & cerebro excurrit in medullam & principium nervorum; sique vel in eorum substantiam sese infundat, meatuque insensibiles, per quos spiritus influunt, occidat; vel per cauteriatem vertebrarum, dorli densent, & spinalem medullam ac nervorum ductus sequens occludat & angustet, sique spirituum animalium commotum etiam impedit. Potest etiam idem humor frigida sua natura substantiam densare, vel deinceps spiritibus animalibus privia non sit. Ac denique simplici intemperie frigida torpidum spirituum influxum impedire potest, quandoquidem cum nativum nervi temperamentum, & calor illius infusus a nimia refrigeratione destruitur est; spiritus animalis officio suo fungi non potest; calor enim illius influens cum partes calorem intus contingit debet, ad propriam illius actionem abundam.

De alijs humoribus controvertitur, num *paralyfis* causæ esse possint. Attamen licet infrequentiores sint, non sunt omnino abdicandæ.

Trallianus lib. 1. cap. 6. refert, quemdam in *paralyfim* ex merore incidisse, deinde sumpta hieta adeo letalem, ut rotus in mobilis fieret, & propemodum interiret, nisi in contrarium mutatus fuisset, & humectantibus omnibus cum potibus, cum cibis, & alijs quæ temperatum ipsum reddere visus fuisset, maxime vero balneis compluribus, ventum ex hydreleo.

Paulus lib. 3. cap. 28. & 41. *paralyfim* proponit ex colica biliosa, cui refrigerantia maxime conferunt. Et nostro sæculo notissima est colica Pictorum, quæ in *paralyfim* vix plurimum degenerat, eamque ab humore bilioso produci apud omnes in confesso est, de qua fusius agitur in colici doloris theoria.

Eiusdem rei exemplum proponitur a Foreſto obs. 97. lib. 10. cuiusdam adolescentis, cum eandem partem extenuatione & atrophica; cumque calcificatione & exsiccatione medicamentorum viâ, ab alijs Medicis prescriptum, in peius continuo rueret; tandem solus humectantibus adsumptis, & admotis ab eo restitutus est.

Ratio ipsulum conuenit. Bilis enim, & melancholia, & quous alius humor & nervus influens, meatu eorum insensibiles occidere potest, si eorum interiora petat; vel eosdem comprimere, si extrinsecus ambiat.

Neque rationes Rondeletii contrarium sententis vilo modo conueniunt, dum air bilem & melancholiam siccare potius quam emollire nervos, bilem ad consensionem magis mordendo & vellicando, quam ad *paralyfim* efficiendam esse idoneam; siquidem emolliri non solum, ut in *paralyfi* a piruita concedi potest, in omni tamen *paralyfi* necessaria non est, licet vulgo *paralyfis*, nervorum resolutionem sequatur; cum illius essentia a sola priuatione influus

spirituum animalium dependeat; quæ dum à compressione nervorum aliisque causis produciuntur, eorumdem emolliu ad illius generationem minime concurrunt. Huius autem relaxationis & emolliationis nervorum opinio inde exorta est, quod partes *paralyticæ* tensione destituntur, emolliæ vidantur. Motus enim membrorum fit per tensionem musculorum & contractionem verius suam originem, quæ tensione cessante, resoluta dicuntur, licet nulla humectatio, aut emolliu extraordinaria illis accidat. Deinde cum bilis variæ sint species, varique gradus, non est necesse, ut omnis talem habeat acrimoniam, quæ consensionem efficiere valeat. Adde quod varia sit humorum permixtio, & pituita, aut serosus humor bili *paralyfim* producenti misceri potest, quæ illius acrimoniam temperet. Talis permixtio in febribus certissima notis præcipue contingit, quales esse credibile est eas, quas dicit Ferrius in *paralyfim* migrare.

Denique res manifesta eadem, ex *paralyfi* scorbuticæ, & quæ consensionem sæpe habet cernitur, ut docet Eugeleſius multis in locis, & Sennertus lib. de scorbut. cap. 5. Et licet verus scorbutus nostris regionibus penè ignotus sit, non ratio tamen scorbuticæ quædam affectionis nobis videre contingit, in quibus nonnulla huius morbi symptomatica elucebant. Vnde duo exemplum *paralyfis* scorbuticæ, cui consensionis frequenter superueniebant, recentissimus in observationibus nostris, nempe observat. 74. cent. 1. & observat. 98. cent. 2.

Aliæ causæ *paralyfis* minus frequentes, variæ esse possunt. Ac primum frigida & humida intemperies nudæ, & sine materia, tum spiritus congelando, eorum influxum impedire potest; tum nervi temperiem destruyendo, cum reddere potest ineptum ad spiritum animale recipiendum, eaque excitari potest ab ære ambiente frigido, & ciuius rei frigida contactu, quemadmodum docet Gal. 4. de locis aff. cap. 4. quemdam tempore frigido ac pluvioso, cum maduam psillum collo diutius obvoluisset, in manibus *paralyfim* incidisse, nervis qui a spinali medulla ad manus iterum, ut nervum refrigeratis & humectatis.

A vi etiam narcotica medicamentis, venenis, & ipsis interdum humoribus infusa, *paralyfim* generari posse, notetis nonnulli conueniunt; & ab hac causa produci *paralyfim* existunt, quæ ex contractu turpedinis exoritur, quamvis ab hoc animi stupor quidam potius, quam vera *paralyfis* excutari solet. Eiusdem generis est, quæ a contractu hydragry contingit auriatibus, & ijs artificialibus, qui specula parere solent, quod Veneris frequenter concipitur. Vnum etiam virtute narcotica confectum, Piascio stuporem & *paralyfim* inducere, licet alij aliter sentiant. Ferrius tamen huc sententiam laudare videtur, afferens loco supra citato; se vidisse aliquando vniuersam corporis cutem ex craspula & violentia, & stupore affictam fuisse. Et Petrus Fabius Ducretius in nota in Alismarum cap. 14. refert hiltoriam cuiusdam tonsoris, qui cum vino & guile nimium indulsisset, nocte media expergetibus incidit subito in *paralyfim* omnium corporis partium infra faciem exstentum: in qua adeo motus & sensus erant depediti, ut nec acu prosum de perforatus, nec gladiolo scarificatus quicquam sentiret. Hic tamen folia in totum exbreuiat & craspula, intra tertium diem omnino sanatus est, factis tantummodo nonnullis reuolutionibus, ac inunctionibus quibusdam resoluentibus ad spinam. Attamen hic author non virtutem narcoticæ, sed vaporibus crassis ex craspula oriandis, & nervos obducuntibus, *paralyfis* huius generationem adscribit. Quam causam supra propostis addere non est a ratione a iurum. In humoribus etiam corruptis, & malignis qualitatibus adeptis vim narcoticam retinere, in isopororum affectum expositione ostensum aliqui humores, si ad nervos deferantur, adhesionem eorum labellatæ possunt. Et cum humores scorbutici producentes malignam qualitatē adepti sunt, vis illius narcotica potest esse participes, quæ etiam ad *paralyfim* scorbuticam efficiendam concurrere potest, quamvis sola obstruat, vel compressio ad eam affectum produciendum sufficiat, ut antea monuimus.

Tumores etiam iuxta spinam aut nervos concreti, eos comprimendo, *paralyfim* sine dubio efficiere possunt.

E c a Sic

Sic etiam præcifo nervorum, & quæcumque continuitatis usque eundem effectum parit.
Luxatio vertebrae, aliorumque articulorum spinam & nervos comprimens idem præstat.

Ac de eoque condensatio nervorum spirituum influxum impedire potest, eaque fit, vel exsiccatione nimia; vel ab humore crassiori & terrefcentiori eorum substantiæ imbibito. Sic in elephantiasis perit sensus multarum partium, propter eorum densificationem nimiam, quæ inducitur ab alimento calido & terrefcenti, quo ille nutritur.

Causæ differentiarum huiusmodi hæbent. In perfecta paralyti, quæ integram motus & sensus privationem supponit, materiam morbificam copia maior est, quæ integram nervi obliuiscionem, vel alienationem produci in imperfecta vero minor, quæ spirituum animalium influxum penitus non impedit, sed aliquam eorum portunculam commicare sinit.

Motus læditur interdum ipso sensu, quia ad motum efficiendum maior virtus requiritur, quam ad sensum, quia sentire est quoddam pati; motus vero in actione omnino consistit. Sensus autem læditur illo motu, quia in aliquibus partibus nervi aut eorum ramuli sensui intercurrentes, motui non intercedunt, quemadmodum illi, qui ad cutem feruntur. Si igitur illi nervi tantum afficiantur, solus sensus læditur. Quod si tantum contingit in paralyti particulari, quæ vicinam particulam occupat: si enim afficiantur nervi insigniores, qui ad mûculos feruntur, non potest lædi sensus illius membra.

Tragnosis huius affectus ad tria dirigenda est, affectus speciei, partem affectam, & causam affectum producentem. Affectus speciei per se notissima est: cum motus impotentia, & sensus privatio, aut immutatio oculis ipsi præstat.

Partis affectæ dignotio difficilior est, ea tamen vniuersa ex anatomico dolumur, in qua nervorum origines, & interfectiones docemur.

Si enim pars faciei dextra, vel sinistra resoluitur, reliquis partibus illarum, cerebrum tantum afficitur secundum eam partem, qua nervi ad partes eas deferuntur. Si vero pars capiti subiecta: vna cum facie lædatur, & spina dorsalis & cerebrum afficiatur. Et per partes subiectæ lædatur facies illa, in sola spina vitium consistit. Et quidem in principio illius, si omnes simul lædantur. Si vero dimidia pars corporis paralytica fit, dimidia tantum spinae portio obidit. Cruribus resolvis affectus est circa hinc in spinæ medullæ, iuxta vertebrae ossis sacri. Sic in æteris inquirendus est locus, a quo nervi oriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur.

Aliquando etiam causæ externæ inquisitio ad loci affecti dignotionem plurimum confert: cuius rei exempla duo apud Galenum inveniuntur, quorum vnum supra propositum est, ex 4. de loc. affect. cap. 4. cuiusdam hominis, qui cum tempore frigido ac pluvioso madidum pallium collo diutius obuoluisse, in manus paralyticam incidit. Alterum habetur 1. de loc. affect. cap. 5. de Paulina Syro, qui in tribus digitis sensum amiserat, quem cum Galenus & vehiculum in dorsum prostratum cognosceret, coniecturam fecit in primo exortu nervi post septimam vertebrae prodeuntis, partem quandam ab ictu luisse laesam. Ideoque medicamentum digitis frustra admotum, huic parti apposuit, & curatio subsequuta est.

Causarum dignosis ex causis præcæteritis, morbis prægressis, & temperamenti egrotantis eruitur. Atque, adeo causæ externæ refrigerantes & humectantes prægressæ, & sensus, aut temperamenti pituitosum, tempus hyemale, vitæ frigidus & humidus, apoplexia præcedens, a frigida intemperie, & humore pituitoso morbum exortum significant.

Paralyticam vero a bilioso humore, aut melancholico exortit sentiant, febres prægressæ, & interdum prægentes temperamenti biliosum, aut melancholicum, tempus æstivum, vel autumnale, vias aromaticas, salis, aliorumque ciborum calidorum, animi perthematia graua, & diuturna, humorum biliosorum, aut melancholicorum, vel scilicet acidulæ acris excretio. Fluxiones acris in varias par-

tes decumbentes, & dolores in ipsis concitantes; ac denique cum motus & sensus immutatio adfit dolor, & consilii, & huiusmodi laborantes a calefactibus, & exsiccantibus remediis leduntur a frigidis & humidis iuantur. Tumor, luxationes, & solutiones continui paralyticam efficiunt, per se satis innotescunt.

Quod ad prognosin attinet: paralyticam ab humore pituitoso nervorum substantiæ impactu genita, curatu difficilis est, quia ægerime discitur, propter frigiditatem partis, cuius debilem expultricemque cum remediis cooperari debet; & situm ipse, nervorumque profundum, ita ut ad eas partes viis remediis integra pervenire non possit. Et cum diuturnus eorum vius necellarius sit, æger plurimum ipso affectu, curationi adeo protrahere se lubere nolunt.

Paralyticam apoplexiæ succedanea rarissime curatur, & plerumque in apoplexiæ iterum degenerat, ex nouo eundem materiam ad cerebrum affluxu, quod ex priori morbo debilitatum est.

Temperamentum paralyticam superueniens salutaris. Significat enim motus nervorum aliquo modo aperti, per quos aliquid spiritus animalis ad mûculos motum efficiendum transire incipit.

Si pars paralytica calore actuali prædita sit, sanatis spes est: si vero actu frigida continuo sentiat, difficillime curatur.

Atrophia, aut insignis extenuatio parti paralyticæ adueniens, & pallor ingenscurationis spem adimat. Non solum enim spiritus animalis defectum, sed & calorem naturalem propemodum extinctum arguit.

Si resolutio lateris oculi immutatur, exigua curationis spes est: summam enim spirituum penuriam in ea corporis parte significat.

Crurum & pedum resolutio facilius curatur, quam partium superiorum, quia illi nervi diores, ac robustiores sunt.

In senibus paralyticam incurabilis est, ob caloris nativi inopiam.

Hæc enim tempore paralyticam curari nequit, vix ea utem & glacie curatio obtineri potest, cetera consentiant.

Paralyticam febri valida superuenientem, bona: materiam enim morbosam absumere potest.

Paralyticam debili & recenti diarrhoea superuenientem, bona: dicit enim Rhafis 1. c. enim, se multos paralyticos ex diarrhoea superueniente curatos vidisse.

Curatio paralyticam iuxta varietatem causarum varianda est. Et cum vtriusque fiat a pituita, & frigida intemperie, huius causæ ablatione præcipue incumbendum est. Hæc autem ab vniuersali totius corporis evacuatione inchoanda est.

Et quidem vix sectionem quod attinet, vix ea conferre potest, cum languis non peccet, sed pituita; & plerumque hoc malum sensibus, pituitosis, ac natura frigida accideret solet. Si tamen dicitur languis copia humorem pituitosum producere videatur, sanguis quoque locare, venam in brachio partis sanæ aperire licet, & attamen parca manu, ne languis calor extingatur.

Prætermittenda igitur phlebotomia, aut parca manu, vtriusque est, celebrata, & tunc curatio inchoanda est a sublatione causæ antecedentis, quæ est frigida cerebri intemperie, cuius curatio eadem omnino inhienda est, quæ antea fuit proposita, per apozema, pilulas, dietam sudorificam, fucos, emplastra, errhina, sternutatoria, apophlegmatismos, vesicatoria, puluerem cephalicum, cucurbitulas, iulsum iustitiam, purpura magnificam, pilulas visuales, opacatam roborem, causticum, puluerem digitinum, & aquas thermales.

Dieta ad hunc affectum parari debet ex decocto guaiaci solus & corticis eundem. Post cuius hauritum admovent partibus paralyticis lateres igniti, extendi in decocto cephalico, facti in vino albo cum pauco aceto, & inuoluti linteo, vt partium calor languidus excutatur. Et quarto, aut quinto quoque die purgatio repetenda. Melius tamen erit, si decocto sudorifico purgans præmittatur ad xv. dies, vt tota humorum crudorum sabura melius educatur, ac post-

ac postmodum illorum reliquiæ per habitum corporis discutiantur. Illud autem ita parari poterit.

℞. Rasure ligni guaiaci ʒ. ii. cort. eiusdem ʒ. i. aque fontis ʒ. iij. Infundantur per xxiv. horas. Deinde bulliant ad medietatem consumptæ. addendo sub finem, fenæ mund. ʒ. i. urubith. hermodact. ana ʒ. ij. Colaturæ capiat ʒ. ii. si maior, sine sudore per xv. dies.

Cautum applicetur occipiti, vel brachio sano, si alterum sit affectum: utriusq. si ubi tantum laboretur.

Post dietam vitæ per potiorè diutius bochetto ex guaiaco, vel hydromelute, in quo tanillum rosarum. bullietur vino abstinendo, quod in hoc afflicto valde nocuum est. Si tamen agrum vini cupiditas teneat, betonica & salvia in eo infundantur. Et longe efficacius erit, si tempore viderintur prædictæ herbe in dolum vino recenti plenum concitantur.

Si affectus sit contumax, post dietæ usum, omisissis rupeo magistrali, & pilulis visibilibus prædictis, fortiores virescunt, in hunc modum compositæ.

℞. Massæ pilul. sepiat. maior. & cochiar. min. ana ʒ. ʒ. trochisc. albandal. gr. iv. Capiat semel in septimana.

Sed quia humor ante quamlibet purgationem præparatione indiget, ideo per biduum auriæ triduum, ante singulas doses pilul. capiat ʒ. iij. vel iv. aque sequentis mane duabus horæ ante passum.

℞. Rasure ligni guaiaci ʒ. iij. corticis eiusdem ʒ. i. rad. cal. fal. par. ʒ. i. ʒ. rad. chinæ ʒ. i. ligni salutaris ʒ. v. ligni aloes, galang. ana ʒ. ʒ. rad. angel. pœoniæ, feniculi, ana ʒ. ii. sem. pœoniæ ʒ. i. Infundantur per 4. horas in aque fontis ʒ. v. vini albi ʒ. iij. Postea adde fol. betonicæ, iuss. arth. salvia, ana ʒ. i. fol. rosar. primule versat. techados & anibos. ana. ʒ. i. j. laudula, ʒ. i. thieriac. vet. ʒ. ʒ. m. & cortic. citri, ana ʒ. i. ʒ. polypod. ʒ. ʒ. cinnamomi ʒ. v. Fiat secundum artem destillatio in B. M. Pro ʒ. iij. ʒ. liquoris destillati, adde manus Christi cum oleo cinnam. paratæ ʒ. iij. Vel loco illius aque opiata caput roborans, in frigida cerebri intemperie descripta, viuspari poterit. Sed multò efficacius, & cum maiori fructu opiata Montagnanæ, in epilepsia curatione descripta.

Ceteris purgantibus parum proficientibus, haud erit inutile ad vomitoria chymica transirende, si æger satis robustus sit, qualia in soporosis affectibus sæpe propolita. Illa enim humores contumaces ex alto trahunt, & morboz. interdum, qui vulgaribus remedijs extrahi nequeunt, curationem adiungunt.

Diebus vacuis ab usu aliorum remedium, vitæ opiata cephalica, descripta in curatione frigida intemperie cerebri, vel aqua apoplectica, vel tabellis pro soporosis affectibus propolitis.

Post universales evacuationes ad topica veniendum est, quæ & parti resolute applicanda, ad calorem & spiritus reuocandos; & spinali medullæ, ubi vitæ plurimum mali causæ hæret, ad eam excitandam & discutendam.

Pars ergo affecta pannis calentibus quodvis fricetur, sed leniter: ne quod de naturali calore, & spiritibus attractum efflueret dissipetur.

Cucurbitule æque applicentur capitibus musculorum partis affectæ, etque sine angustiori orificio, & cum multa flamma adhibeantur; ne tamen diu affixæ maneant, ne quod attractum efflueret. Postea emplastr. ex picæ & resina pini applicetur: ut quod attractum est, ibi conseruetur. Vel membrum resolutum vitæ viridis leniter percutiatur, aut ipsi sinapismi imponantur, donec pars tubercere incipiat: ea tamen non sunt tamdiu in parte relinquenda, ut vesicæ exsistent, sic enim spiritus & sanguis dissipantur: sed tam diu solum, donec pars rubicunda digito pressa non albescat, sed rubicunda permaneat.

Postea inunctiones fiant & parti affectæ, & spinali medullæ, oleis, vnguentis & balsamis, quorum descriptiones apud auctores numerosæ habentur. Ad hanc rem peculiari est efficacia balsamum Gaudonis, quod apud Pharmaceopos nostris perpetuò paratum inuenitur. Hoc vel solo vitetur, vel cum alio permixto in hunc modum.

℞. Oli vulpini, lumbicorum: & de calore, ana ʒ. i. balsam. Gaudonis ʒ. iij. aque vitæ ʒ. ʒ. olei rosarum. octill. ʒ. i.

ʒ. i. Misce, fiat linimentum, quo inungatur tota spina dorsæ, & partes resolute calidissime, superpetegendo lineis calidiusculis. Sequens etiam vnguentum a Valerio in observationibus plurimum laudatur.

℞. Fol. salvia, maiorana, betonica, lauri rosarum, & primule veris, ana. M. i. rad. acori veri, & ieros recentis, ana ʒ. i. olei vulpini, de uice Indica, & rosarum, ana ʒ. i. olei terebinthine ʒ. ʒ. vini potentissimi ʒ. i. 4. que vitæ ʒ. ʒ. Coquantur simul ad vini consumptionem, & colentur. Colaturæ adde terapii, opopanax. bdelli, ana ʒ. i. calforei ʒ. ʒ. m. cis, nucis mosch. Hyrcanis calamutæ Denoinis, ana ʒ. i. pipæris longi, pyrethri ana ʒ. i. xungue cati pinguis, xungue serpentis, & anferis, ana ʒ. i. medullæ cruris bouis ʒ. i. succorum ebulli, salvia, & melisse, ana ʒ. i. ceræ propolis ʒ. i. Misce, & cum cerâ ʒ. i. q. in prædictis oleis liquatur, reducantur omnia ad formam vnguenti medicorum consistentiæ, quo vniuersa dorsæ spina calidè inungatur, de super ad motus lanis molibus, vel lineis calidis.

Maiores etiam efficitur, & minoris operæ vnguentum parari potest in hunc modum.

℞. Succo scilicet ʒ. iij. succi cucumeris syluestris, succi rutæ, ana ʒ. i. euphorbii, calforei, sagapeni ammoniaci bdelli in aceto solutorum, ana ʒ. i. smyrnæ thuris, pyrethri, nitri, ana ʒ. i. olei sambuci, terebinthini, & de euphorbio, ana ʒ. ʒ. ceræ ʒ. ʒ. Fiat vnguentum secundum artem.

Huiusmodi linimenta præcipue vitendum est tempore dietæ, post deterrum sudorem, & in usu thermiarum, etiam post sudorem; quia tunc temporis pori cutis & partium reserati, vnguenti penetrationem facilius admittunt.

Linea post inunctiones applicanda suffumigetur, & incalcetant suffusæ sequenti.

℞. Succini silicis, myrrhæ, ana ʒ. i. thuris ʒ. i. j. caryophyll-nucis moschat. cinnam. macis, ana ʒ. ʒ. ligni aloes ʒ. ʒ. Pulueris fiat irroretur spiritu vini, postea exsiccentur; & iterum irroretur quinquies, & exsiccentur. Et fiat pulvis, qui inieciatur prunis pro suffumigio.

Si his malum non cedat, ceratæ & emplastræ supra spinam dorsæ erunt applicanda.

℞. Massæ empl. de betoni. de melilot. & de bacis lauri, ana ʒ. i. thuris ʒ. i. calforei, euphorbii, ana ʒ. i. sem. nigell. nasturtii, & sinapi, rad. pyrethri, falsi nitri, ana ʒ. ʒ. Cum oleo de lateribus redigantur in formam emplastræ, quod super alut am extendum applicetur. Longè maioris erit efficaciæ emplastrum in hunc modum compositum.

℞. Picis nualis, galbani, sagapeni, & gummi ammoniaci, ana ʒ. i. rad. pyrethri & sem. sinapi, ana ʒ. i. euphorbii ʒ. i. ceræ flauæ ʒ. iij. olei terebinth. ʒ. i. Fiat massæ emplastræ.

Sudores quoque in parte prouocare vitæ fuerit, per euaporationes ex decocto herbarum, & radicum cephalicarum cum vino albo, ita parato, ut baltus partem affectam attingat. Si nimium decoctum calens in vas aliquod infundatur, in quo æger iaceat, si sedat contentus: ne decoctum attingat, sed vaporem tantum excipiat. Vel in balneo sicco, quod stupham vulgo appellant, vapor ex decocto prædicto, silicibus candentibus in perlo excipiat.

Ad sudores huiusmodi mouendos valde commendatur decoctum ad bardanæ, seu lappæ maioris. Ad nostrates mulieres ad his affectus, & dolorem artuum diuturnos, vntur decocto ebulli, quo sudores copiosi eliciuntur. Vbi æger satis sudat, in lecto componatur, exhibita thieriacæ & cum aqua conueniente. Eiusmodi autem balneis bis aut ter in septimana vitendum est. Autumni quoque tempore, vinaceis effluenscentibus membra per horam vnam, aut longius spatium, immergere, & postea linimento conuenienti inungere, toto vindemiarum tempore, summè vitæ fuerit.

Denique thermæ sulphureæ, nitrosæ, & bituminosæ super rescentis maxime conueniunt, & reliquorum remedium vires plerumque superare solent, si ʒ. æger vitatur per aliquot dies in potu; balneo, & lotionè capitis, & post sudores vngatur linimentis prædictis.

Chymici commendant multa remedia ad huius morbi

Ec 3 cura.

curationem. Ex quibus non infimum locum obtinent elixir proprietatis, spiritus tartari & ballamum galbani.

Toto morbi decursu partes resolutæ probe muniuntur pelliculis vulpinis, leporinis, agninis, & similibus.

Paralysis verò, quæ à bilioso humore, aut melancholico produciuntur, eandem curationem postulat, quæ ad melancholicam hypochondriacam præscripta est, ita tamen, ut in affectu magis bilioso, remedia magis ad frigiditatem inclinantia eligantur.

C A P V T V I.

De Convulsione.

SPalms, seu convulsio est nervorum, musculorumque verius suam originem involuntaria & perpetua retractio.

Duplex autem est convulsio. Vna propriè dicta, cui iam propofita definitio competet. Altera impropria, quæ potius proprius convulsivus dici debet. Et ita distinguuntur, quod in vera convulsione retractio musculorum est perpetua, seu continua & indefinita: in motu vero convulsivo retractio est interpolata. Præterea in vera convulsione, membrum est immobile: in motu convulsivo variè agitur, ut in epilepsia, quæ inter motus convulsivos principem locum obtinet.

Differunt etiam inter se ratione causarum; vera enim convulsio fit à repletione, vel inanitione: motus vero convulsivus ab irritatione. Denique in eo distinguuntur, quod convulsio à solo morbo fit: motus vero convulsivus à sola facultate. Quæ ut recte à iunioribus intelligantur, sciendum est ex Galeno de sympt. caus. cap. 1. de præparat. motum symptomatam ita inter se distinguere, quod alia solius nature sint opera, quæ tamen à morbo quâpiam causa violenter moveri fit coacta; alia morbosos continent affectus, natura ad eorum generationem suppetias minime ferente; alia denique concurrente simul natura, & morbo fiunt. Naturæ autem nomine Galenus facultatem intelligit. Facultas ergo opera sua sternuendo, tussis, oestatio, pandicatio, & singultus. Vnius autem morbi opera sunt palpitatio, & convulsio. Vtriusque verò morbi scilicet & facultatis opera sunt tremor & imperfecta resolutio.

Ex Galeni dictis supra propofitis gravis difficultas emergit, cum ille singulum recenset inter opera quæ à facultate fiunt, sit enim perpetuè ab irritatione, & est motus convulsivus; convulsionem verò inter opera quæ à solo morbo fiunt, Gal. recenset. Attamen Hipp. Aphor. 39. sect. 6. convulsionem & singultum à repletione & inanitione fieri affirmat, cum tamen repletio & inanitio veram tantum convulsionem efficiant. Ad cuius difficultatis resolutionem dicendum est, repletionis nomen latè lumpsum irritationem etiam comprehendere, iuxta multorum auctorum sententiam; quia causæ irritantes materiales sunt, atque ad replent aliquo modo partes in quibus continentur. Sed hoc modo repletio non est causa proxima singultus, sed tantum mediata, quatenus partem in qua est, quantitate, vel qualitate sua irritat ad expulsiorem.

Denique sciendum est, & diligenter annotandum Hippocratem & Galenum motum convulsivum communi & generico convulsivis nomine simpliciter enuntiare; ita ut non nisi per supra propofitas differentias inuicem distinguere possint.

Vera autem convulsio rursus dividitur in universalem, quæ totum sit corpus contrahitur: & particularem, quæ partem alièquod membrum convellit.

Universalis, vel causam habet in cerebro, quando nimium cum vinctu corpore, musculi etiam faciei convelluntur: vel in exortu spinalis medullæ, cum musculi caput & spinam inuoluptes, vel anteriores, vel posteriores, vel utriusque convelluntur; unde tres exurgunt convulsivis differentie. Prima Encephalotonos dicitur, quando corpus cum cervicæ & capitis violentè ad anteriorem contrahitur, ut mentum pectori annectatur, & corpus carinam navis referre videatur; imò vero interdum in arcum contorqueatur,

& quandoque in orbem, ægrique caput genibus annexum habeat. In hac differentia duo musculi caput ad anteriora flectentes præcipue afficiuntur. Secunda Opisthotonos nominatur, quando corpus ad posteriora convellitur, & in ea musculi quoddecim caput extendentes, aut eorum nonnulli convelluntur. Tertia Tetanos dicitur, quando musculi & nervi, tam anteriores, quam posteriores contrahuntur æqualiter, partemque ab oppositis musculis attrahit, velut in æquilibrio posita, rigida & erecta permanent; in ille motus Tonicus appellatur, qui omnium musculorum contentione oritur.

Particularis convulsio fit ex contractione musculi partis alicuius à nervo illius motioni delinatio malè affecto, & interdum ab effectu, vel symptomate peculiare nomen sortitur. Sic convulsio musculorum oculorum moventium, strabismus nominatur: mandibularum & musculorum temporum spasmus dicitur: otis convulsio ex contractione lateri musculi ex vna tantum parte oriunda, ipsismus, cynismus, convulsio canina, & oris tortura nominatur; fit vero in utraque parte contractio fiat, risus sardonicus appellatur. Intermittit tamen otis tortura sine convulsione contingit, nempe ex paraly si alterius musculi, quo relaxato, eius antagonista os ad partem sanam contrahit, & distortio in ea apparet, quæ convulsio improprie nominatur. Musculorum penus convulsio latiusculi vel priusculi dicitur. Reliquæ verò convulsiones propriè nominibus designantur.

Causæ veræ convulsionis, immedatæ, iuxta Hippocratis, & Galeni placita, ac repletionem, & inanitionem, relictur, ut apta dictum est. Et confirmatur hac doctrina exemplo chordearum, quæ in lris & choris tendi consueverunt, quod læpè, & elegantissimè insculatur à Galeno, nempe lib. de tremore palpit. & convuls. cap. 8. tertio de locis affectis cap. 6. secundo de sympt. caus. cap. 2. & commentar. Aphor. 39. sect. 6. Dum enim chorde ab humore repletur, quod in austinis constitutionibus solet contingere, tenduntur & disrumpuntur. Si verò præter modum arefiant, ut in constitutione Aëquilonia, fit, contrahit, & disrumpit etiam contingit. Eodem modo lora præter ignem siccefactione tenduntur & contrahuntur. Idem nervus omnino solet contingere, qui vel ab humore repleti vel nimium arefacti, tenduntur & contrahuntur, & musculi simul ad quos inferuntur, retractant ad suum principium, unde totum membrum convellitur.

Causæ mediatæ convulsionis, quæ repletionem aut inanitionem efficere possunt, variæ sunt. Ac primum causa repletionis relictur à Galeno lib. de tremore cap. ult. ad humoris pituitosi affluxum, & inflammationem. Humor pituitosus ad nervos influens, eos distendere debetur secundum latitudinem, unde secundum longitudinem contrahi necesse est.

Verum hic gravissima sese offert difficultas, quæ à quamplurimis auctoribus propofita est, nondum tamen plenè & perfectè resoluta, quænam scilicet differentia sit constituenda inter causam paralyticam, & convulsionem, quando utraque fit ab humore pituitoso, in nervos influente, & cur materia paralytica efficiens, nervus ita repleto, ut omnes illius nervus occultantur, unde spirituum animalium transitus impeditur, non faciat nervi distensionem in latitudinem, atque adeo convulsionem? Et cur materia convulsionem efficiens, nervos repleto, meatus illorum non obstruat, ut paralytica efficiat, cum tamen in convulsione sensus integritas maneat, & pars affecta vi plurimum gravissimo dolore torqueatur? In hoc dubio resolvendo auctores variè se torqueant, & qui inter subtilissimos principem locum obtinent, ingenij sui capum superare latentur. Acutissimus Aëtios tertio colligit in hac verba erumpit. Vnam scirem cor distendunt in latum nervi, & non in longum. Mox subiicit. Scias Aëtioscum verba in hoc symptomaticè universa propria esse verba musciferorum seu sabellæ canentium quem demonstrat. Et subtilissimus Argentarius comment. Aphor. 36. sect. 2. sic loquitur. Non est facile profecto reddere omnium rationem præsertim cor pituita, quæ repletur in nervorum, & convulsionis causa dicitur, prout vnum prout aliud, ex 91

ex his malis inferat: cum enim eadem materia fit, & eadem pars affecta nempe nervus, cur idem non semper fit affectus? Hæc Argenterius. Summa rei difficultas in variis sententiis Auctores dilaxat, ita ut nonnulli ab Hipp. & Gal. doctrina omnino desituerint. inter quos recentiori possunt, Auerroes, Erasius, Platerus, Casalpinus, Sennertus alique, quorum variæ cogitationes, & prolissas hæc de re disputationes recentere, instatuti nostri ratio non patitur, qui summam brevitate in hoc opere affectamus, & omnes controversias ablegamus, ipsi tantum inherentes, quæ ad medicinam faciendam maximè necessaria sunt. Saniorum desitio à Galeni placitis recedere nolentium eo resoluitur, conuulsionem fieri ab humore crassiori, qui nervos secundum latitudinem extendit, & secundum longitudinem coarctat; paralyfim vero fieri ab humore tenui, qui per nervi subtilitatem decurrit, eamque emollit, poros autem illius non extendit. Hæc tamen animus veritatis ausum omnino non expleat. Si enim humor crassius nervum replendo, eum in latitudinem extendit, cur poros illius, & meatus interstices non implet, & spirituum animalium influxum non impedit, atque adeo paralyfim inducit? Et cur paralyfim faltem successu temporis non succedat conuulsio, cum humor tenuis in parte diu hærens, necessariò crassescat ita ut etiam leuola materia artum densum efficiens, longa moram in partibus, & opacem materiam acquirat. Alij dicunt in conuulsione partem tantum nervi exteriorem & membranosam ab humore obduri, in paralyfi vero medullarem. Sed hoc multo minus satisfact. Cum enim nervi maiores partes exiles admodum sint, non est facile concipere, quomodo humor partem tantum nervi exteriorem occupet, illa interiori, aut vice versa. Vel latem si hoc ita posset contingere, paralyfim vi plurimum conuulsio succederet, & conuulsioni paralyfim, multiplicata materia morbi, & quæ exteriorem partem solum, vel interiorem tantum ab initio occupabat, successu temporis totum nervum invaderet.

Non igitur licet in tanta difficultate nobis ipsius satisfaccere nequeamus, donec certiora ab alijs proponantur, exillimanus prædicas obediens diu posse, dicendo, conuulsionem, & paralyfim in eo differre, quod paralyfim ab humore pituitoso puro, & impermixto generetur, qui quidem humor remissionem non efficit in partibus, sed eas potius relaxat, ut in ordinem videre est, conuulsio vero ab eodem humore fiat, non quidem sincero, sed plurimus flatibus permixto, à quibus flatibus præsertim tenduntur nervi ac musculi, & versus suam originem contrahuntur. Nulla enim causa excogitari potest aprior ad tam vehementem contractionem efficiendam, quam spiritus flatuosus, quam etiam agnoscit Galenus 2. de sympt. caus. cap. 2. & docet experientia maximas distensiones à flatibus præsertim fieri, ut videre est in hydropo tympanite, & colico dolore. Adde quod in conuulsione ut plurimum grauissimi dolores reperiuntur, quos à flatibus distendentibus fieri credibile est. Hæc decisio diu possunt omnes obediens super præpositis. Si enim queratur, cur pituita conuulsionem efficiens paralyfim non afferat, (spiritus animalis influxum impediendo, dicere poterimus eam esse in periculi quantitate, ut metus nervi insensiles occidere non possit, & multis flatibus permixta ita attenuet, ut obtusitatem parere non valeat. Vel certe dicamus spiritum flatuosum præcipuum esse causam conuulsionis, quam Galenus agnoscit loco citato. Ex lib. 6. de loc. affect. cap. ult. præpositum quæ à membri virilis conuulsione fit,) causam vnicam propulsus spiritum flatuosum.

Aliqua causa conuulsions à repletione factæ, quam proponit Gal. loco citato, est inflammatio partium nervosarum, præcipue in nervorum principio, aut potius ipsam, quæ totum tenduntur, & coprahuntur. Ex excitate illa inflammatione, vel à causa interna sola, nempe à fluxu sanguinis in partem, vel à causis externis, ut vulnere, contusione, & punctura nervi.

Causæ conuulsioni ab inanitione sunt omnes immodice evacuationes per hæmorrhagiæ, vomitum, alui fluxum, sudores, tum etiam maxime humidæ primigeniæ consumptiones, quæ contingunt in febribus adulescentibus & collig-

quantibus, laboribus immodicis, vigiliis, sollicitudinibus, venire immodica fame, & siti, vbi duntaxat alimentorum, & medicamentorum calefactionem & cuscificationem.

Hæc etiam conuulsio ab inanitione à non paucis reijcitur, existimantibus tantam siccitatem in corpore videntur, reperi non posse, ut inde nervi contrahi valeant illa enim in febre hectica & marasmo præcipue continget, quibus tamen abunde satisfieri potest, dicendo non omnem inanitionem, aut siccitatem idoneam esse conuulsionem efficiere, sed eam tantum, quæ confertum & inequaliter fit, quandoquidem subitò interni humidis facta inanitione, partes conueniunt, & in eis concidunt, vacuum fugientes. Si vero æqualiter vndique, & sensim exhaustur humiditas, nulla fit contractio, quæ inanite partes ingressu aeris occupantur.

Motus conuulsivus fit à materia pungente, vellicante, & irritante pars est nervosæ, &que vltimum humor, vel vapor, acrimonia, aut alia qualis maligna qualitate prædita, qualis in febribus malignis læpissime contingit. Fiant autem isti motus conuulsivus plerumque cerebro, & nervis per sympathiam affectus, & conuulsio sympathica nominatur. Comparantur autem vel per modum condolentium, & generis, & hoc aut vicinæ quædam sunt, aut prava qualitate, vel aura venenata ad innum nervorum transmissa. Sæpius me autem fit per consensum foris ventriculi à bile æruginosa, vermibus, veneno, aut alia materia acris, & vellicante, tum etiam per consensum vteri, sicut in hysterics affectibus contingit.

Diagnos conuulsionis ex his quæ in principio huius capitis præposita sunt, facile elicitur. In vera enim conuulsione pars contrahitur, ac rigida & inmotæ manet, ut lecti, aut moueri pro arbitrio non valeat. In motu vero conuulsivo pars variè concutitur & agitur.

Quod ad prognosim attinet, conuulsio quæ multas, partes, & præsertim cerebrum vicinas occupat, periculosior est. Tum etiam quæ musculis thoracis obidet, metus enim, est, ob hoc difficilem respirationem æger suffocetur.

A copioso sanguinis fluxu, vel hypercatharsi conuulsio lethalis, ex Hipp. & Aphorismis, quæ, ut docet Galenus in commentariis, talis conuulsio ab inanitione fit, Attamen fieri potest, ut talis conuulsio interdum ab irritatione fiat, & commotis humoribus acris biliosis, & ad partes nervosas transiatis, vel à qualitate maligna venenata medicamentis, ut ex assumptione hellebori contingit.

A phrenitide conuulsio lethalis. Aeris affirmat se neminem ex his qui à conuulsione sunt, servatum, vidisse, neque qui vidisset, audivisse.

Febrem conuulsivam superuenientem, melius est, quam febri conuulsionem, Aph. 37. vel. 2. febrem enim conuulsivam superuenientem, illius causam absumit. Conuulsio autem febri superueniens à materia maligna oritur, quæ vite periculum minatur.

Quicunque tetano corripiuntur, in quatuor diebus pereunt, si vero hoc effugerint, sani sunt, Aph. 6. vel. 5. Maxima enim tensio omnium musculorum, respirationem impedit, ita ut ægri suffocati moriantur. Et notanda est causa interitus in conuulsione, quæ non videtur aliquo periculosa ratione causæ nervos obidentis, quemadmodum paralyfisi à simili fieri causa orunda, ad multos annos produciuntur. Sed lethalis eadem conuulsio, ex eo solum quod suffocationem inducit, conuulsivis musculis respirationis dicitur.

Curatio huius affectus varia est pro varietate causarum. Quæ ab inanitione fit, rarissime contingit, & incurabilis est, ideo illius therapie non immorandum. Auctores humectantia omnis generis præscribunt & inunctiones ex oleis chalcidicis. Ea vero quæ fit ab irritatione, ab alijs morbis dependet, & illorum curationi subiacet. Superest igitur ut conuulsioni à repletione curatio proponamus, quæ cum à pituita & flatu potissimum dependat, ad illorum sublationem dirigenda est. Equæ primum à venæ sectione auspicanda, si sanguis abundet, & vires sint valide. In qua tamen evacuatione facies est peccare in defectu, quam in excessum illa causæ principalis, quæ pituita est, contraria fit.

Possit venæ sectionem, aut ea omitti, si conueniens non sit, purgatio instituta est per pilulas, quæ istis potenter euacuant (habita tamen verum ratione), iuxta formulas in frigida cerebri interperie descriptas. His verò aduenda sunt calidiores gr. ij.

Si pilulas soliditas æger, potionis, pulueris aut alterius medicamenti forma viurpari poterit, prout dicto capite habentur.

Possit purgationem adiuuantur cucurbitule cum scarificatione, si sanguis non fuerit detractus, alioquin sicca; primo quidem partibus remotioribus, postea afflicta parti vicinis. At si crura sint conuulsa, natibus & lumbis applicentur, vel brachijs, collo & scapulis. Hoc in omnibus obiectuando, vt fluxus versus originem restitatur.

Vesicatorium etiam partibus afflictae oppositis vtiliter admoebitur.

Interim potest primam purgationem, materia præparanda est apozemate descripto in curatione interperiei frigide. Purgante quodamvis vires & reliqua consentiant, si minus, detractis purgantibus.

Finis apozemate iterum pilule exhibendæ, castoreum illius, & omnibus purgantibus adiungendo.

Si apozema tantum alterans viurpetur, per illius vsum, chylires, acres frequenter iniiciendi, quales in topotolis affectibus fuerunt proposti.

Fiant etiam inunctiones supra partem affectam linimen- to conuenienti.

¶ Vnguenti de altheæ 3. vj. ol. terebinth. & chamemel. ana 3. j. sol. laudensula 3. ij. ol. vulpi 3. j. fl. yracis liquidæ 3. ij. Fiat linimentum, quo inungatur pars affecta calide frequenter, & (spina dors.) Vel

¶ Ol. anethini & chamemel. ana 3. j. vnguenti martiati 3. fl. ol. petrolei & de spica, ana 3. j. spiritus vini 3. ij. Misce.

Maximè laudatur a xungia anatis, in sequentem modum parata.

¶ Anserem pinguem deplumatum, & exenteratum, quem reple materia sequenti.

¶ Fol. saluæ, maioranæ, & stœchados, ana M. j. gummi ammoniaci & bdellii, ana 3. j. calami aromati, nucis moschar, maxis, caryophylli, ana 3. j. Contundantur in mortario, & malecentur cum ol. lumbicorum, postea includantur ventri anseris, qui bene conficiatur, ne quid effluat, & in æru affletur. Purgando ex illius & exipitur vale æcto se- mplemo, & aque aluntur partes. ff. c. 2.

¶ Efficacius operabitur, & viurpetur in sequentem modum. ¶ Pinguetudinis prædictæ 3. vj. ol. ceræ, nucis, moschat. & saluæ aræ chynna extractorum, ana 3. ij. Misce, fiat linimen- tum.

Possit inunctionem partes conuulsæ contegantur pelle, anetis adhuc calentes, cum refrigerit, si nouarum non sit copios, recalcet oleo anethino, aut simili valde calente.

Vtiliter etiam parti conuulsæ abhibeantur puluiones veru- cini calentes, cum etiam pulli columbini, catulogalli gal- linæ per medium lictæ.

Partes etiam afflicta in intima bouis, aut veruecis, aut maioris alius animalis recens cæsum immittitur. Et ibi tam- diu detinetur, quando animal calet.

Balneæ ex decocto herbarum cephalicarum etiam con- ueniunt, addita olei tertia parte, vel inunctis mox a balneo partibus conuulsis.

Alii hoc emplastrum commendant.

¶ Colophonæ 3. ij. resinæ, piceis nauallis, ana 3. j. thuris, mastiches, acruellæ, ana 3. fl. sanguis draconis, salis communis salis ammoniaci, terebinth. ana 3. j. ceræ rosæ 3. ij. vniuersi albi 3. ij. matris perlarum 3. ij. lapidis magnetis 3. fl. succini flaut 3. fl. ol. ouor. rosæ ana 3. v. Fiat secundum ar- tem emplastrum, quod alute inductum imponatur.

Præstantissima verò sunt balneis sulphurea, in dentur- tis præcipue conuulsionibus. Conueniunt etiam balnea sicca seu vaporiosa ex decocto saluæ, roris maris, hydros, cha- maz, origani & simili cum vino albo, lapidibus ignitis, aut scoris lecti ignitis infuso.

Optimum etiam est fovere occiput & ceruicem aqua vi- te calente.

¶ Pæneque sequens linimentum mirè prædicat, ad conuul-

sionem breui tempore dissoluendam.

¶ Ol. terebinth. 3. fl. ol. caryoph. ill. gutt. vi. nucis aginis bryoniæ q. lad. consistantiam linimentum. Misce, inunge lo- cum affectum cum radice fl. nerui.

Alij oleum seu spiritum salis cum oleo terebinthinæ, ce- ra, chamemel & sinilium commixtum, membra conuul- sa citò restituisse arcent.

Linimentum sequens eximie est efficacia.

¶ Butyri tancidi & lardi veteris an quart. bdellii, am- moniaci, an. 3. j. myrrhæ, calidior. an. 3. ij. stor. stœchad. & anthis, an. P. i. nucis moschat. & garyophylli. 3. 4. car- tum paruum exenteratum exoriatum, & in frusta diui- sum. His intersciatur anser, & confusatur, ac torreatur in veru. Primus qui stillabit succus magis aqueus abiciat- ur; secundus vero pinguior, colligatur in vase æcto se- mplemo, coque liniantur partes conuulsæ, & tota dor- si spina.

Interdum verò dolor ira intolerabilis sentitur, vt ad eum prius cura dirigenda sit. Illi igitur conuenit sequens lini- mentum.

¶ Ol. violæ cæcilior & chamemeliana 3. j. fl. olei amy- galarum dulcium, mastiches, & rosæ, ana 3. j. Misce, inunge- tur pars affecta si potentius agendum sit, paretur sequens balneum.

¶ Rad. altheæ & liliorum, ana 3. fl. sol. maluæ, violariæ, origani, saluæ, absinthii ana M. i. sem. lini & spurg. ana 3. 4. Decoquantur pro balneo in quo diu non immoretur æger, sed dolore sedato confestim egrediat; sufficere autem partes conuulsas tantum immergere.

Alii parant balneum ex oleo puro, & si æger sit diues, in eo decoquant vitem viamur alteram.

Dum hæc sunt, cerebri expurgationis incumbendum est, apophlegmatibus & ethin. suis capibus descriptis.

Tum etiam eadem pars roboranda est opata cephalica, aqua apoplectica, theriacali, aut alia eardem vimin-

Rondetius de aqua sua hirundinum hæc habet. *Aqua ex hirundinibus & cast. res parata exhibita conuulsionem à repetitur subitò cessare facit.* Eius descriptio est in capite epilepsia apud Authorem dictum.

C A P V T V I I.

De Epilepsia.

Epilepsia est conuulsio totius corporis non perpetuè, sed interposita cum mentis & sensuum latione.

Conuulsio nonnisi hoc proprie, & ita est non sumitur pro vera conuulsione, sed inappropriè pro motu conuulsio. Est enim Epil. pili motus conuulsus, non vera conuulsio, sed conuulsio nisi nomen reticere volumus imitatione Ga- leni, qui eam p. sili conuulsionem appellat.

Hæc autem d. h. n. n. n. ex G. al. desumpta 3. de loc. aff. cap. 7. ff. lib. de diff. p. cap. 3. periclitam & integrum Epilepsiam proponamus, in qua totum corpus conuelli- tur, & omnes lenius tum internis tum externi abolentur. Dantur tamen imperitice Epil. pili, in quibus caput tantum, vel brachium, vel cuba & semivul dimidia corporis pars con- uellitur. Dantur etiam Epilepsia, in qua mens integra scema- net, & sensus etiam exterior vigent, nec non quarum- dam partium motus voluntarius. Vidi monalem, qui in pa- roxysmis Epilepticis contractiones varias patiebatur, nunc brachiorum, nunc cingulorum, nunc capitis, nunc trunci totius corporis, videbat tam n. alantes & loqu. batur; in- uero contra motum partium quæ conuelliuntur, motu voluntario obinebat urina vt motum inuoluntarium quodammodo impleat; in pa- roxysmo leuiori interdum quida- bat, & in cubiculo ambula- bat, sed motu admodum inordi- nato saltando scilicet, & motus prædictos eadeo in- stilar hylitionis quibus, reliquis Monialibus nium concita- bat, & ita cum illis etiam debebat, & pro arbitrio loque- batur.

Omnis motus conuulsus, vt superioris capite dictum est, fit ab irritatione. Irritatio autem fit a materie quanti- tate, vel qualitate, quantitas materie moribunda naturam grauius, eam irritat ad expulsiōem nisi quod fl. mole, asq.

stem est. Vnde stabilitur Galeni doctrina, & quamplurimis neotericis variè exagitata, quæ sanctum est, ob obstructione imperfecta ventriculorum cerebri Epilepsiam generari. Si enim humor obstruitur naturæ exclusionem, & quidam cerebrum inlurgere poterit ad illius exclusionem? Ite qualitate nulla est difficultas. Omnes enim in eo conveniunt, scilicet, tum expultricem singularum partium irritari ab acrimonia, & parva qualitate naturæ infensa.

Causæ irritantes vel in ipso cerebro continentur, & Epilepsiam idiopathicam efficiunt; vel alia, id est ab cerebrum transmittuntur, & sympathicam Epilepsiam generant.

Illa autem irritatio Epilepsiam facit, quandoquidem cerebrum, dum rem noxiam expellere conatur, in ipsum, concurrit, & consequenter nervos sibi adnexos.

Triplex est Galeno constituitur Epilepsie differentia, & ab omnibus propemodum authoribus recipitur. Prima, quia cerebrum afficitur, consistente in ipso affectu. Secunda, in qua cerebrum per ventriculi consensum afficitur. Tertia, cum ab alijs corporis partibus ad cerebrum affectus transmittitur. Et propria cum nonnulla apud nonnullos fortasse sunt istæ differentiæ. Prima enim tanquam præcipua generis nomine Epilepsia nominatur; secunda analaptesis, tertia catalepsia. Vtrum (pace Galeni, aliquemque diximus) superflua et inane, & frustra separatur Epilepsia a ventriculo generis, ab alijs que per aliatum partium, sympathiam oriuntur; cum omnia non sympathia & Epilepsie nomine comprehendi debeant. Neque lastat dicere Epilepsiam a ventriculo leviorem existit, tanquam frequenter, nullamque eandem ea que ex vteri, aut aliis consensu oriuntur, non minus frequentius aut certe frequentior esse consuevit.

Distinguitur ergo Epilepsia in idiopathicam, & sympathicam. Sympathica tursus iuxta varias partes a quibus vapores acres, aut maligni ad cerebrum transmittuntur. Nulla autem propemodum pars in toto corpore reperitur, a qua malignus vapor ad cerebrum transmitti nequeat. Harum historiarum dæ proponentur a Galieno *loc. citat.* Vna de puero decem annorum ætatis annum agente, in qua paroxysmi a riba intumum capiebat, motus hinc recta accendebat, per semper, & superflua illa, ac per labia ad ceruicem, donec ad caput perueniret, quod cum primum tangeret, plene huiusmodi sibi confabatur. Altera ex adolescentibus, qui inuadentes paroxysmi in toto vultu frigidi autem accendere sentiebant.

A ventriculo autem intellus, & materia verminosa, tum etiam ab vtero, alijsque partibus Epilepsiam præcipue generari notissimum est, & variorum authorum historiis confirmatur.

Constat igitur ex prædictis, quomodo defendi possit Galeni doctrina, ab imperfecta ventriculorum cerebri obstructione idiopathicam Epilepsiam generari afferentis, quam tamen causam perpetuam esse defendere non possumus, ut Galenus innuere videtur, nullam aliam proponens, quin potius cum cæteris infrequentior esse consueti conueniat.

Neque tamen argumenta aduersus Galenum proposita vilo modo conuincuntur præcipua hæc sunt.

Primo enim inquit Fernelius, si epilepsia ab humoris copia fieret, in fopore ea maxime contingeret, in quo magna humoris copia reperitur. Respondet, humorem a quo sopor excutitur, esse in substantia cerebri, non in ventriculis, & ideo facultatem expultricem non irritare, quæ in ventriculis magis residet.

Secundo, ex eodem Fernelio, cum Epilepsia citò soluitur, si fuerit in paralyfimi, ut apoplexia excusio in nervos humoris. Respondet, in apoplexia humores excuti ad partes vicinas, non propter debilitatem expultricis, a copia humoris oppressæ, quæ cum liberior sit in Epilepsia, ad vias naturales expurgationis dicatur humores amandare. Falsum tamen est quod aliter Fernelius, nunquam Epilepsiam, dissuere in paralyfimos enim paralyfimi Epilepsie succedaneam vidimus. Et non raro apoplexici in prima inuasionem consensibus Epilepticis corripiuntur, non dum perfecta obstructione ventriculorum cerebri; tum etiam multi Epileptici tandem apoplexia perirent, quando dimi-

diata obstructio in integram degenerat.

Tertio, contra Galenum nonnulli ita argumentantur. Sicut completa ventriculorum obstructio functiones penitus tollit in apoplexia, ita incompleta eas tantum immi- nueret, non deprauaret, neque motus illos consensibus eode- janus plerumque validiores. Et respondet, naturæ omnino oppressam ab integra obstructione non excitat ad expul- sionem dimidiata vero obstructione satis habere viam, ut cerebrum commoueat, & exagitet ad expulsiorem. Confirmatur hæc doctrina exemplo catarrhi in pulmonem delapsi, qui si totum pulmonem replet, summam spirandi diffi- cultatem efficit, si vltima tussis, ut in asthma contingit. Si vero nimis fluentis humoris copia existeret, pulmo irritatur ad expulsiorem, vnde tussis excitatur.

Signa Epilepsie diagnostica in tres ordines distribuenda sunt, quæ scilicet imminentem Epilepsiam significant; quæ præsentem demonstrant, & quæ illius differentias patetefaciunt.

Imminentem Epilepsie signa dupliciter considerari pos- sunt, vel prout primam morbi inuasionem præfigunt, vel prout imminentem paroxysmum significant. Eadem autem signa vtrique iudicio inferuntur, sed multo certius in his, qui ab Epilepsia actu possidentur, imminentem insolent, indicant. In istis enim qui nunquam hæctenus morbo affec- ti sunt, æquiuoca maioris ex parte sunt huiusmodi signa, & multos annos capitis affectus prænuunt, esse possunt, & integra tamen eorum congeries aliquam certitudinem asserere potest.

Omnia igitur imminentis Epilepsie signa proponenda sunt, hac præmissa admonitione, non omnia in omnibus Epilepticis concurrere, sed nonnulla in his alia in istis, pro- varia causarum & corporum dispositione. Vt autem ea de- bilito ordine proponantur, fontes signorum percurrendi sunt, qui ab actionibus animalibus, vicalibus & naturalibus, & incrementis, qualitatibus immutatis & proprijs accidentibus scaturiunt.

Ratione functionum animalium, epilepsiam minantur, animi & corporis inueta contrarietas capitis grauitas, cephalalgia, vertigo, rigilæ, aut plerumque somnus, & quo malum in locum emergit, in somnia turbulenta mentis tor- por, vel aut ex assiduo, in somnia pauca, formido, segrega- tio, æstus, grauitas, salus & tremores membrorum, sensum habitudines, obitus deflexus, fœtillæ oculi obuer- sa, & scilicet in nubeculis, aut marmaribus Aurium tinnit, fœtillæ odor perceptio, lingua inflexibilis, cuiusque inordinata motus, & citatio, & cetera.

Ratione functionum vitalium Epilepsiam minantur, cæ- terorum consuetudo, anhelitus mutatio, peccoris consuetudo, anhelitus mutatio.

Ratione functionum naturalium, Epilepsie prodromi sunt, cibi fastidium, aut appetitus immodicus, nauica mole- sta, cardiosmosis, oris ventriculi morbus.

Ratione excretorum Epilepsiam prodromum, salua per eos effluuium, vnde tenues & crudæ; pollutio nocturna fre- quentiore.

Ratione qualitatis mutaræ, & propriorum accidentium, Epilepsiam prodromum facit pallor, & præcordium in- flatio.

Præter signa etiam vulgo notissima est, si omnibus suis numeris absoluta sit, multas tamen habet differentias, quæ differentem interdum faciunt diagnosim, ut ex sequenti- bus videre est.

In paroxysmo epileptico integro & absoluto sensus omnes tum interni, tum externi interceptantur. Eger subitò in terram concidit, & totum corpus, aut partes tantum nonnullæ varijs motibus conuulsiuntur, ad præterit ocu- lorum prominentia, stridor dentium, respiratio suffocato- ria, velut in his qui laqueo strangulantur; semen, sterces & vrina inuoluntarie aliquando protruduntur; & circa finem accessionis spuma per os & nares effluit: quæ non nisi in vehementes Epilepsia contingunt, & finita accessione, rerum omnium quæ in paroxysmo actæ sunt, obliuio re- manet.

Antiquiorum nonnulli tres Epilepsie differentias faciunt, vnam quæ fortissimo simul altissimo videtur; aliam quæ

variæ

vatis motibus corpus exagitat tertiam denique ex vtriusque commixtione conflatur. Primam speciem recentiores quidam admittunt, dicentes illam coma potius, aut carum esse, quam Epilepsiam, & non alia ratione distinguunt inter se hos duos affectus, quam illi eo quod in comate est somnus profundus sine convulsione, convulsio verò est signum pathognomonicum Epilepsie. Verum alter docet Aueniensem, dicens ipse vtriusque Epilepsiam sine palmo lenitudo ad illam convulsione apparente. Et docet experientia multos epilepticos habere & paroxysmos comati periculosi. Eile autem Epilepsiam quoniam coma, vel carum, ex eo tantum cognoscitur, quod sopor ille per intervalla, & periodicè recurrit, cum coma lemel tantum inuadat, neque periodice recurrat obnoxium sit.

Idiopathica Epilepsia à lymphatica distinguitur, quod in idiopathica multa apparent: cerebri affecti indicia, Mens torpor, vel tarditas, memorie immutatio, insomnia, turbulenta sensuum habetudo, corporis grauius, & segnitas, capitis dolor, aliaque; præterea egger venientem paroxysmum non percipit, sed ab eo incautus subito opprimitur; cum paroxysmus in coram Solis, & Lunæ ut plurimum contingit. Hanc diagnosi confirmat bona parsium interiorum diathesis, & nullum vitium in ipsis apparet.

Dextram verò aut sinistram capitis partem magis affici, & mali minorem continere ex eo cognoscitur, quod visio alterius oculi obtusior est, vel auritus in altera aure hebetior, aut uniusque eam afficit, & si partes dextræ, vel sinistræ ad motum, aliaque actiones ignauiores fuerint.

Æ quo verò humore præsertim Epilepsia generetur, ex signis præstatur aut bilem, aut melancholicam in toto corpore, & capite præsertim redundantem, indicantibus discere poterimus.

Symphatica verò Epilepsia inde cognoscitur, quod nulla apparent cerebri affecti signa; æger venientem paroxysmum percipit, & interdum, veluti auram quandam à partibus inferioribus ad cerebrum ascendente censat pars aliqua inferior peculiari quodam vitio labefacta esse, aut tempore inuasionis graui aliquo symptoma affecta.

Sic à ventriculo communiter Epilepsie causam ostendunt, ubi salis humoris, istius in medio toxicantis, rancie, vomitus, ventriculi dolor, tædio, compunctio, vel distensio, vel etiam interdum cordis palpitatio, ventriculo cordi affectum communicante.

Ab hepate, vel bene malum oriri significat, statum frequentibus & copiosis excretis, ventris inuicem, orugitus, & borborygus, rudus acidus, præcordiorum molestia coarctatio, et quicunque dolor ad ducitur, vique interdum procedens. Quibus addere licet vitia peculiarem ventris interioris partem obnoxia.

Ab vtero affectum procedere indicat hysterica passio, convulsionibus epilepticis implicata, tum si menses aut seminis retentio præcesserit.

Si à parte aliqua externa Epilepsia oriunda sit, auræ quædam percipitur à parte illa eleuari, & misera morbi in ea deluascens, vellicat interdum aut titillat, quod imminente paroxysmo prænotant; & si pars illa contrahatur, vasculum impeditur paroxysmus.

Denique à lumbicis procedere affectum ostendunt signa lumbicos indicantia, vt anhelitus febris acidus, narium pruritus, ventris dolor, læces cineræ, lrisio dentium, & sopor, & similia: tum præcipue si lumbici per alium interdum excreantur.

Rarioræ verò causæ & extraordinariæ, vt abscessus, offis caries, vrinæ suppressio, anædromæ, & similia, ex proprijs signis mutuari poterunt.

Quod ad prognosim attinet, Epilepsia morbus est diuturnus, & contumacissimus, & in infansibus ut plurimum, lethalis.

Epilepsia hæreditaria incurabilis est; quæ verò à causis externis, & praua vitio ratione datur originem, curatio nem admittit.

Epilepsia ante pubertatem eueniens curabilis est, eandem verò post 25 annum curatorem non admittit, ex Hipp. *Aph. 7. sect. 5.* quidem in pubertate magna fit calor natus, eamplius, quæ causis moribuscis ducere poterit

valeat. Adde quod tunc temporis in feminis menstruumque incipiunt, per quæ impuritates corporis expurgari solent. Lacer autem post 35 annum incurabili dicitur Epilepsia ab Hipp. hoc tamē non est perpetua veritas? multos enim ætate prosectos ab hoc morbo liberatos fuisse plurimas obseruationes retulit illi; & quamvis tamen hoc raro contingat, sicque Aphorismum prædictum, ut plurimum, & fere semper verum esse statuendum est.

Vehemens Epilepsia sæpe in paroxysmo ægotantem abripit, & medio tollit, vel enim in apoplexiâ degenerat, vel propter præuentionem symptomaticam, & violentiam cerebri convulsionem, tota illius economia eueritur, vt interdum paruulus illius diffingatur; & contigerit aliquando prociuum mammillarum particulas de narce explolas fuisse.

Epilepsia à melancholico humore oriunda in melancholicam insaniam nonnumquam degenerat; quando videlicet ille humor à ventriculo cerebri in lubantiam eiusdem transmutatur. Idem etenim humor dum cerebrum afficit, vt partem instrumentalem, ventriculos alius obducendo, aut tunicas eorum diuellendo Epilepsiam efficit: dum verò ipsam cerebrum lubantiam, quæ functionum principum sedes est, vt similia, partem offendit, naturale ipsius temperamentum vitando, & animalis spiritus corruptionem, adeoque hoc enebrando, delirium melancholicum inducit. Vnde apud Hipp. *Capit. 2. Sect. 40.* melancholici plerique sunt epileptici; & epileptici sunt melancholici. Degenerant autem illi affectus in se inuicem dupliciter, vel per materiam morbosam transpositionem sede derelicta, & sic vno exoriente aliter definit; vel per materiam propagationem, & tum vterque affectus permanet.

Epilepsia putrefacta in apoplexiâ, vel paralytim degenerat.

Quartana febris Epilepsie superueniens, & diu perseuerans, sciam luit, quandoquidem à calore febrili materiam morbosam sensim absumitur, si putrefacta sit; vel si melancholica fuerit, a parte affecta transmutatur in locum ubi manere morbi relidet, vt nouis paroxysmis nascere suppetat.

Curatio Epilepsie duplex instruitur, alia in paroxysmo, alia extra paroxysmum.

Ad paroxysmi curationem rarò vocantur Medici, nisi ipse interdum longius protrahatur, quo in casu conueniunt eadem remedia, quæ pro torporis affectibus fuerint, propolita. Præsertim vero aqua apoplectica, cinamomi, aqua vitæ, & alie nullum spirituosæ, ad paroxysmi materiam dicitur eandem efficacissime.

Extra paroxysmum curatio varianda est pro varietate causarum. Ac primum Epilepsie idiopathice curatio proponenda est, quæ in totius corporis euacuatione, materiam morbosam diffusionem, prauæque illius qualitates, emendatione, & cerebri reboratione consistit. Cum autem materia peccans in idiopathica Epilepsia, ut plurimum putrefacta sit, nos ad illius oppugnationem curationem vniuerſam dirigemus, tyrones aliqui admovent, vt si humores biliōſi aut melancholici in vicio esse videantur, medicamenta illos præparanda & expurgantia lubillantur. Specifica vero remedia, quæ unicuique causa morbus oriat, eadem perpetuo usurpanda sunt. Ad integrum ergo curationem sequenti via procedendum est. Primo potio phlegmagoga erit propinanda, aut aliud medicamentum, ægrotantis naturæ accommodatum, ex ipso quæ infirmitati cerebri intemperie fuerint propolita, inuicem prius clyſtere, si alius non sit liber.

Postea si plenitudo notæ appareat, aut æger sit sanguine temperamento præditus, phlebotomia erit celebranda: si minus, omittenda.

Mox cura vniuersalis frigide intemperiei cerebri supra propolita sigillatim celebranda erit, hoc obseruando, vt de coctis apocrematis, diæte ludorificæ, & lyropo manifestum etiam malitioribus, & pulueribus cephalicis, addatur radix, & semini peronæ, & vitæ quercinus, quæ proprietate specifica epilepsiam curare tota credidit antiquitas.

In diæta verò ex ludorificis grauius perferatur; cuius visu se multos epilepticos cutale refert Iachinus. Continetur autem per triginta, vel quadraginta dies.

Singula

ſingulis doſibus decocti ſudorifici aliquot gutta ſpiritus vitrioli addantur, qui etiam ſpecificus creditur ad epilepſiam.

Notandum eſt purgantia viſualia, nimirum pilulas, aut ſyrupum magiſtralem, in frequenti via habenda, nempe ſemel, aut bis in ſeptimana, prout vires aggroant ſerri poterunt; & per plures menſes purgationes eſſe continuandas; imò ad fortiora interdum purgantia eſſe tranſeundum, juxta præceptum Maſtariae, qui hinc fieri dicit, quod epilepſia raro curretur, quod Medici ſemper in leuoribus hæreant.

Hæc ratione Chymici purgantia mineralia viſurare ſolent, quæ à remotioniſſis paribus humores attrahunt; at nõ ſine periculo, præſertim ſi a perſuſſimo artifice præparata non fuerint. Si tamen in hoc caſu ille euentus ex buiſmodi remedijs aliquando contingat, ille in primis ſpectandus eſt ex mercurio, per ſe, vel cum auro calcinato in furno arena; longo ignis regimine probe cauendo, ne qualilius portio cruda adhuc & volatilis maneat, quæ ſuauem vehementiam medicamento conciliaret, aliqui ſatis blandè purgant, iſi cum pilulis cochijs, aut quod melius erit, cum extracto aliquo phlegmæ gogo, vel panchy nugo, pondere gr. iij. vel iij. viſpantur.

Reccens autem Epilepſia ſale vitrioli aliquando curatur; quemadmodum reſert Angelus Sala, ex hoc remedio, quatuor quoque die exhibito, & epilepſiam tertio exhibitione curaffe. Poſterius verò *curat. 77. c. 11.* gloriatur ſe ſubito calcinato rer exhibito puellam vudocem auronem ab epilepſia hæreditaria liberalle.

Syrupus de peto Quercet. maximam vim habet ad curandam epilepſiam. Sed non niſi a prudenti Medico viſurandus, quæ vehementiſſimum eſt medicamentum.

Loco opiatæ dicto loco propoſita; ſequens, magis huic affectui ſpecifica, erit lubruganda.

1. Conſerue ſior. anthos. pœoniæ. bugloſſi, ana ʒ. ſi coctis citri ſaccharo conditi ʒ. iij. pulu. viſci querulaſem pœoniæ d. creſcente luna collectæ, & vngulæ alces, ana ʒ. ſi. cranij humani non humani, ad albedinem calcinati ʒ. ſi. coral præp. margarit. præp. cornu cerui præp. ana ʒ. iij. lapid. bezoar, veri ʒ. iij. diamochi dulcis, diatrachal. ana ʒ. iij. theſaur. vet. & conſect. & hyacynth. ana ʒ. iij. ſpiritus vitrioli gutt. x. Cum ſyrupo conditure corticis citrihuſi opiatæ, de qua capiatur ad magnitudinem auellane, ſuperoſeudo aque cinnamon. parum.

Sequens verò efficaciſſima eſt ad morbum radicibus tollendum, poſt diligenter corporis purgationem.

2. Conſerue ſior. betonicæ & roſinæ ana ʒ. iij. rad. erin. coditæ, & muthridati, ana ʒ. iij. pulu. ligni ſaltatras ʒ. vj. calioreſi ʒ. iij. cranij humani non humani vngulæ alces, ana ʒ. iij. rad. & ſem. pœoniæ, ſem. nigellæ, rute ſylueſtris, & rad. pyrethri, ana ʒ. iij. x. mel. q. ſ. fiat opiatæ, de qua capiatur ʒ. iij. Reliquas omnes efficaciſſimè ſuperat opiatæ Montagnæ, cuius beneficio multi epileptici liberantur. Illius deſcriptio talis eſt.

3. Rad. pœoniæ, maris, floechados, coſti. an. ʒ. x. agarici ʒ. v. pyrethri, caruiſem. anthu. ale. leicidæ, & ariſtolot. ana ʒ. iij. ſi. ſucci ſcillæ, & mellis eſſent. an. ʒ. iij. Scilla & mel ſimul coquantur lento igne vique ad bonam conſiſtentia; deinde ſuperadditis ſpecificis hæc electætarum, de qua capiatur ʒ. iij. vel ʒ. iij. pro ætatis ratione, continuando per 30. aut 30. dies.

Poſt viſum emplaſtri epipſiatici, veſicatorium etiam ſincipiti erit admouendum, & cauterium poſteriori parti cervicali.

At ſectacum multò efficaciſſimè humores extrahit à cerebro. Reſertque Fabricius Hildanus, ſeu inuenit quotidie Epilepſia laborantem, & cui fruſtra alia remedia adhibita fuerant, & puellam 18. annorum, ab ipſa infamia epileptici, ſolo ſectaceo reſtituit.

Si conjectura ſit vapores ad cerebrum exhalantes à partibus inferioribus, aſſectum producere, vel fouere; vtiliſſimam erit cauſticum ſincipiti admoouere, vitatis ſuturis: reſert enim Carolus Priſtydus Epilepticos hoc cauterio fuiſſe curatos. Tū etiam ſi à partibus inferioribus affectus producantur, aque acidiæ auribiles læpè effectus producant,

& morbum interdum radicibus tollunt, ſi prius euacuationes vniuerſales, & venarum inferiori ſectiõnes celebrætur. Peculiariter verò ab vtero procedens Epilepſia curatio nem ſocitior, pulvere granorum acetæ & Quercet. deſcripto in Pharmacop. reſtit per triduum exhibitò ad ʒ. iij. cum aqua quadam hyſterica.

Si cætera non profuerint, extremum remedium erit ſinciput cerebello perſecdere, vitatis ſuturis, vt hoc veluti ſpiraculo aura maligna exhalare poſſit. Hoc remedio aliquando deſperare epilepſia curatur ſunt; & ſine periculo celebrari poſſeſſi periti Chirurgi manus adhibeat.

Vtatur æger pro potu ordinario hydromelite, vel boche. tot ex guaiaco, & rad. pœoniæ.

Sacculus de collo ſuſpenſus continuò geſtabitur, in ſequentem modum paratus.

4. Rad. pœoniæ, viſci quer. ana ʒ. iij. vngulæ alces ʒ. iij. nuciſ molch caryophyll. macis, ana ʒ. iij. ſol. rute & hyſſopi, ana ʒ. iij. Pulueretur, & rubra ſindone excipiant. Fiat ſacculus, deſerat appentum collo, læpè illum odorando.

Poſt vniuerſales euacuationes, inter aliorum remediorum viſum ſpecificis præſertim morbus oppugnandus eſt, quorum inſinitut ſere numerus reperitur apud Autores. Nos ex ſelectioribus nonnulla proponemus, præter opiatas ſupra deſcriptas, quæ ad hunc morbum expugnandum non inſimul locum obtinet.

Rondeletus maximè commendat aquam hirundinum, quam etiã ab eo mutuauit eſt Quercetanus in Pharmacopœa. Non minoris eſt pretij aqua theriacalis cephalica, & ſyrupus antepilepticus, ab eodem Quercetano dicto loco deſcriptus.

Radix valeriane ſylueſtris à Fabio Columna tantopere celebratur, ſe ſemel aut bis exhibitam ab epilepſia liberare aſſerit. Reſertque hæc multas amicis dono dediſſe, qui deinde diuino prius numine & ſupatore gloriſicatio, pul. ure huius radicis ſibi reſtitutam ſanitatem aſſerunt. Doſis autem eſt cochlear ſemis cum vino, aqualiſſe, aut quouis liquore appropriato. Pucriſ verò in minori doſi cum lacte datur.

Chymici valdè commendat mixturam ſpiritualem, quæ in epilepſia nullum medicamentum præſtantius exoptari poſſe aiſerunt illius autem compoſitio talis eſt.

5. Spiritus vitrioli partem vnam, ſpiritus tartari partes tres, aquæ theriacalis camphorata partes quatuor. Miſceatur, & vitro bene clauſo, per tres, aut quatuor ſeptimanas digerantur. Doſis eſt ʒ. iij. in conuenienti vehiculo.

Rulandus oleum ligni heraclei (quod corylinum eſſe aſſerunt Chymiaſtri) in frequenti viu habebat; & nonnullas hitorias reſert in ſecularijs, eorum qui huius medicamenti viâ ab eo morbo liberati ſunt. Doſis autem eſt triam vel quatuor guttarum, cum liquore idoneo, per quinque dies.

Huius nullo modo accedit, aut fortè multò præſtantius eſt oleum (lucini) albi, à perito artifice extractum, quod nullum empyreuma redolet, imò verò fragrantiffimum expirat odorem. Doſis à ʒ. iij. ad ʒ. ʒ.

Oleum buxi ad gutt. iij. cum pari quantitate ſpiritus ſulphuris, & aquæ ſior. thæz arboris ʒ. iij. per aliquot dies exhibitum, inſignis eſt efficaciæ, & à multis creditur verum ligni heraclei oleum; & per deſcenſum elicitur.

Crato cinnabarum natium epilepſia magnetem vocat, ex caque talem puluerem parat.

6. Cinnabris natuæ pelliculæ limatæ, & in tenuiſſimum puluerem trite ʒ. iij. coralli rubri & margarit. præparata ana ʒ. iij. croci orientalis ʒ. iij. ſol. aur. n. xv. Terantur omnia ſubtiliſſimè ſuper lapidem. Doſis in ipſa accceſſione a granis vj. ac ʒ. iij. in aqua appropriata.

At non minor virtutis cenſetur à non paucis Chymiaſtris cinnabar ſanionij, quæ poſt mercurij, vite extracctionem elicitur. Si enim aquali pondere inungatur cum magiſterijs pelarum corallorum, & cranij humani, ſpecificum eſſe aiunt in epilepſia etiam inueterata. Doſis à granis x. ad xv. in liquore idoneo.

Symplicia Epilepſia curatio ad partem primariò aſſectam dirigenda eſt. Eaque remedijs conuenientiſſimè proprijs capibus deſumendis euacuanda, & roboranda eſt.

non

Non omittis specificis, & antiepilepticis, quæ in omni epilepsia perperuo viurpanda sunt. Attamen si d. parte aliqua externa concutitur epilepsia, præter curationem vniuersalem, ad eam particularem respiciendum est, & materia maligna in ea contenta educenda cucurbitulis scarificatis, vesicatoriis, & cauteriis admodum. Et si maium persequeretur, supra cauterium post elichæz calam cucurbitula frequenter admoventur tandem virgine necessitate, ad cauterium actuale coniungendum est. Si a cranij carie malum oritur, trepano & vilione illa auferenda est.

CAPVT VIII.

De Epilepsia puerorum.

Quis iste morbus pueris familiaris est in ijsque plerumque acutus & valde periculosus esse consuevit; ideo peculiaris illius curatio hic seorsim subiectenda est, vt potest ad altiorum curatione valde diuersa.

Primo igitur suppositorio vel clystere alijs solutis est. Postea, & ferè eodem tempore, purgans medicamentum exhibendum satis validum pro ætatis robore, ita vt non dubitemus in puerulis vnius anni elocatum diacharthami ad 3.℥. exhibere, si fiat ex lacte corrupto.

℥. Hieræ pocræ 3.℥. vel 3.℥. pulv. de gutt. 3.℥. Cum liquore specifico, vel cum melle soluto dentur.

Cucurbitula scapulis & lumbis admoventur, & cum sacraficatione, si puer fit grandior.

Vesicatorium applicetur posteriori parti ceruicis. Si purgatio non rectè processerit, aut parum profecerit, vomitus prouocandus est vitriolo albo preparato vel etiâ sale vitrioli. Quod buster, & quater exhiberi poterit, si affectus protrahatur. Pulsus epilepticus de pueris vulgò nominatus, frequenter exhibeatur cum lacte, iulculo, & panatellis ad 3.℥. ad 3.℥.

Ille autem pulsus de gutteta in vulgaribus Pharmacopæis descriptus non habetur, sed in Monipensibus officinis vulgò componitur ex tradita descriptione, quæ talis est.

℥. Rad. pœoniz sem. enalidem, distammi albi, visci querc. ana 3.℥. sem. atriplicis 3.℥. crani humani 3.℥. corall. rubr. preparati, hyacinthorum prepar. ana 3.℥. 6. vngulæ alces prepar. 2.℥. moschi 3.℥. foliauri 3.℥. Mille, fiat pulvis.

Exhibeatur etiam aquæ aliquas antiepileptice cochlear exiguum, vel earum declecta aquæ cinam. vel imperialis, vel gurgule aliquot mixturæ spiritibus cum liquore idonea.

Occipiti admoventur emplatrum de ammoniaco, de radio capillitio: fluxionem enim impedit à capite in spinam, puentem per partes exteriores.

Sinciput vero sequenti puluere fusa pisetur.

℥. Nucis mosch. 3.℥. graior. pœoniz 5.℥. 6. flor. laeuendul. Pul. succini 3.℥. Fiat pulvis.

Vel roborans emplatrum applicetur in curatione frigide interperie cerebri descriptum.

Olei succini guttæ 4.℥. vel 4.℥. cum par quantitate spiritus vitrioli, aquæ betonice exhibita; puerulis à paroxysmo epileptico statim plerumque liberant. Idem oleum naribus illitum multum confert. Loco olei succini, oleum buxi per decensum paratum vultus exhibetur: tum etiam aqua stillicis arboris; aqua betonice vitlor in hoc casu censetur.

Fumus tabaci pueros ab insultu epileptico liberat, si misceatur cum tabulo attractum in os pueri apertum frequenter insufflauerit.

Spina dorsii & membra quæ contrahuntur, inungantur frequenti linimento.

℥. Ol. rutacæ, lumbicorum, ana 3.℥. 6. ol. de castoreo 3.℥. 6. aquæ viæ parum. Fiat linimentum.

℥. Theriacæ vet. 3.℥. confect. alkermes, & de hyacintho, ana 3.℥. laugarum betonice, saluiz, maioranæ, & cinam. ana 3.℥. 6. Mille, ioueantur nares, tempora, & aures.

Eiusdem aquæ cochlear. 4.℥. per os poterit exhiberi. Maiori tamen efficacia inunguntur nares, tempora, & vertex capitis balsamo apoplectico; ad soporosos affectus descripto.

Interim etiam os, & palatum, urgente necessitate, eodem balsamo inungi poterit.

Skenisus exoteriæ coram experientorum cent. 5. nu. 89. ex Georgio Kuinoer hæc habet. *De epilepsia puerorum experientum medicamentum. Detur de moscho fino, ana mero subtili, bis vultus in dos parum, & sic perfecta curatur.*

Dum hæc omnia huius clysteres semel aut bis in die iniiciendi sunt, hunc modum compositi.

℥. Rad. arilol. rotundæ, poly podii quercini, femicarthamianæ 3.℥. sem. pœoniz, cumini, ana 3.℥. 6. flor. chamomil. & anthosana Pa. Coquantur ad 1.℥. De colat. cape 1℥. 6. hieræ pocræ 3.℥. mellis anthosani 3.℥. olei rutacæ & liliorum, ana 3.℥. 6. Fiat clyster.

Inter specificis duo sunt maximè laudata, quæ ideo merentur ad experimentum reuocari.

Vnum est radix valerianæ lyulicis, supra à Columna commendata; quam ipse assenti in puluerem redactam, & cum lacte exhibuit, multis puerulis liberasse.

Alterum est (si catelli lactentes, quod ab Vntzero huius verbis prædicatur. *Sume catellum paruum nigrum ad hoc sugetem (pro famella vera epileptica sume catellum) equum stragula ac interfice. Ex interfecto, & per scissuram aperta corpore extrahat totam cystam felleam, quæ 1℥. vel 1℥. guttas puerulis in se habentem. Item bulsum succum ononem puerulis paroxysmo epileptico cum paulullo aqua storacis propina, & murtacis instil. ad videris solum ab hoc morbo vassigio sanari, & curari.*

Si puer epilepticus adhuc lac fugat, habenda est cura matricis, illaque iac diligenter examinandum, ne vitio aliquo laboret. Vultu nihilominus attenuare vitatur, & laudabil. Vmo interdicitur bibere aquam, vel hydromel, vel bochetum salisparille.

Pueri denique nonnulli ita huic morbo obnoxii sunt, vt semel curati, tamen soletur recidere. Imò verò in quibusdā familiis omnes liberos hoc morbo folente interfici. Ideo tum is qui nuper in lucem editi sunt, tum qui à morbo conualescent, debentur præcipue.

Frailo igitur recens natus, antequam lactari incipiat, detur pulvis de gutteta 3.℥. cum paulo lacte, eademque dos ter repetatur intra duos dies.

Isdem vero post aliquot dies à partu, tum etiam is qui semel epilepsia correpti sunt, causticum occipito iungere, vtilissimum est. Aut multo vtilius cauterium actuale, quod apud nos fratres nuncquam viurpatur, & vehementioribus remediis aut terrore aliquem incohibentibus, abhorret. Rondeletus tamen huiusmodi cauterium actuale Florentiæ ita vitatum esse affirmat, vt ipse mulieres illud, vt torem ignitum, plerumque applicat soletur. Idipsum testatur A-quapendens in operationibus chirurgicis, & modum applicandi docet cap. proprio de exanthone occipiti in infantibus & puerulis.

Purgetur puer bis in mense, cum manna, syrupo rosaceo aut de cichorio cum rhabarbato.

Singulis interitus capiat dosim pulueris epileptici de gutteta dicti.

Paretur cucufa cerebri roborans, & suffumigium pro tegumentis capitis, iuxta descriptiones in curatione frigide interperie cerebri propositas. Tum etiam poterit instergi capillis pulu. ad curationem huius affectus supra descriptus.

Nonnulli denique ad præseruationem hoc remedium commendant.

℥. Spiritus vini 1℥. 6. castorei 3.℥. 6. rad. pœoniz 1℥. 6. Maccetur, & colatur. Colatura totum corpus infantili ablatur cadulculæ.

CAPVT IX.

De Vertigine.

Vertigine falsâ imaginatio, in qua omnia objecta & caput ipsum rotari ac circumagi videntur, vt æger sæpe in terram decidat, nisi propinquas adminiculat nitatur.

Obijci potest, in vertigine non esse lesam imaginationem, quia

Quia si hoc effet, vertiginosi putarent obiecta verè in gyrum verti, quædammodò phrenitici, & melancholici verè putant illud esse quod imaginantur. Respondemus, in vertigine rationem manere integram, quæ cognoscit imaginatiōis errorem; in phrenesi verò & melancholia rationem cum imaginatiōe efficitur.

Due illius proponunt differentie. Una vertigo simpliciter, *ſine* Græcis nominatur, in qua viſio illa perma-
net. Altera *transiens*, ſeu *transitoria*, & tenebricoſa, vertigo nominatur, in qua oculi ſimul obtenebrantur, ipſi-
que veluti ſomni, aut nubes quando obſcurantur.

In utraque vertiginis ſpecie viſio aliquantulum laeditur, quia ſpiritus qui ad oculos tendere recta ſolent, per ſeruos vilorios tranſuerſim mouentur, unde oculus illis non ita commodè ſuſcipit. Sed in vertigine tenebricoſa vehementior eſt ſpiritus cum motu, ita vt minus ad oculos ſeruantur, unde viſio obtenebratur.

Cauſa proxima vertiginis eſt circumuolutio ſpiritus, producta à materia vaporoſa, vel ſtillamentis, quæ in cerebri ventriculis, & plexum choroidem irruens, ſpiritus animales agit, & in gyrum commouet, unde ſpecies obiectorum per ſpiritus illos delatæ parti motu cidentur; atque ita obiecta ipſa eodem motu cietæ videntur.

Verum hic dubitare licet, cum vertigo fit ſymptoma, actiōis læſæ, & omnis actiō læſa ab aliquo morbo immediatè dependeat, quomodo circumuolutio ſpiritus poteſt eſſe cauſa proxima vertiginis, cum illa ad uitium morbi genus reſolui valeat. Qui dubitationi reſpondendum eſt, circumuolutionem ſpiritus eſſe morbum in ſe; tunc enim ſpiritus non ſeruat eum ſitum quem naturaliter debent obſeruari, ſed perperam, & præternaturaliter motuantur.

Hæc tamen reſponſio grauem patitur inſtantiam. Morbus enim eſt affectus vtriusque partis, ſpiritus autem non ſunt vtræque partes. Reſpondemus, à vtriusque illi vtrum eſſe vltimum non, non autem perperam. Et vt conſistere poſſit Gal. doctrina, quæ ſancitum eſt, illud quod primo, & per ſe actiōnem lædit, eſſe vtrum morbum i dicendum eſt nomen partis latius paulo vitari præ debere, vt ea omnia comprehendat, quæ ad corporis conſtitutionem concurrunt; & quæcumque aliusque partis actiōnem lædunt, morbi nomine eſſe attendenda. Sic color ſlauus in oculo viſionem lædit immediatè, & ideo dicitur eſſe morbus in numero. Sic ſapor amarus in lingua, & ſonitus aurium ſunt morbi in numero excedente quatenus in ſiſ partibus eſt aliquid præter illa, ex quibus naturaliter conſtituuntur, quod actiōnis officiatur. Eodem modo circumuolutio ſpiritus in ventriculis cerebri eſt morbus in ſe propter rationem dictam.

Vapores autem illi ex prius humoribus eleuantur, non continentur à ſtillidibus, ſed per circuitus & interualla, quoties à cauſa aliqua externa excitantur. Illi autem humores ſunt quicunque vapores vel ſtatus emittere nati ſunt, ſanguis nimirum, bilis pituita, melancholia, & humor ſeroſus: cum tam calidus, quam frigida vapor vertiginem excitare poſſit, vt docet Gal. 3. de loc. affect. cap. 8. & comm. Aph. 23. ſect. 3.

Humores illi præui vel continentur in cerebro, vel in partibus inferioribus; hinc duplex emerge vertiginis differentia, idiopathica ſcilicet, & ſymphatica.

Humores æqui & pæſiti in cerebro cumuſati, ſtatis & vapores emittunt ad ventriculos euſdem, qui in ſiſ continentur, & vertiginem excitant. Atque adeo vertigo idiopathica plenius eſt epilepſia, aut apopleſia præſentia.

In partibus vero inferioribus, ventriculo præſenti, & hinc humores contenti facile ad cerebrum vapores tranſmittunt, qui vt ventriculos & arterias imperant, vertiginem efficiunt.

Cauſæ externæ ſunt quæcumque humores ſubito fundere, & in vapores diſſoluere, vel ſtibus illis, & ſpiritus motum inordinatum conciliare poſſunt; inter illas reſcribitur ab Hip. Aph. 17. ſect. 3. aſtrina conſtitutio, & ſubita æris mutatio. His adduntur Solis ardor, cui vaporoſi & ſtillantes, alium, ſinapi, raphanus, legumina, tum etiam ebrietas, ingluſies, exercitia immodica, & interperſina, euacuatio ſolita ſuppreſſio, ira, balneum, inedia ma-

xime in microcholia, frequens ac diuturna corporis circumgyratio, diuturnus rotarum, & rerum in circulum motarum intentus, & aquarum præcipiti curſu libentium, proſpectus ex loco altiffimo in profundum, culus, icus, & percuſſio capitis vehemens, fractura, vel deceptio cranii cerebri compreſſione inducens.

Diagnos ſiſ huius affectus in genere nulla proponenda eſt quandoquidem affectus ipſe per ſe patet. Attamen in ſpecie ſigna partem affectum, & morbi muneram continentem, tum etiam humorem peccantem indicantia proponenda ſunt.

Idiopathicam vertiginem ex cerebri affectiōe ortam, offendunt capitis dolor, & grauitas & alcius ſenſus obſeſio; vt viſus caligo, ſeu hebetudo, aurium tinnus, vel grauis audiſus, oſtendunt, guliſusque imminuit. Arteriarum capitis pulſatio, & aliarum partium incolumitas.

Materiam peccantem ſigna indicantia hæc ſunt. Pituitam exuberantem ſignificant ſenſum interiorum, & exteriorum hebetudo, capitis grauitas, ad motum pigrities, ſomnolentia, ſpuitio multa, inappetentia, ſitis carentia, vrina alba, & cruda, & reliqua prius redandantia indicant.

Bilioſam vero materiam peccare offendunt vigilie, iracundia, actiōnum promptitudo, ſitis, oris amator, pulſus celeritas, vrina tenuis & ſluis & ſimilia.

Arteriarum humorem ſignificant timor, meſticia, cognationes turbulente, vigilie importune, inſomnia horrenda, ructus acida, & ſimilia.

Sanguinem vero redundare offendunt, venarum tñſio & tumor, faciei rubor & calor, pulſatio temporum, capitis grauitas ac tenſio, ſomni longiores, inſomnia rerum rubrarum, aſtutudo pandiculatio, vrina rubra & craſſa aliquando tenuis & perſpicua ex translatione ſanguinis ad caput.

Vertigo ſymphatica dignoſcitur ex abſentia ſympmatum à capite manantium, & quod nullum vitium in cerebro appareat, potius quin aliaque pars inferior ſenſibilem noxam patiatur.

A ventriculo procedere vertiginem offendunt, inappetentia, nauſea, ructus acidi, vel iudorofi, dolor ventriculi, aut inſtatio.

litoris, lenis aut vtri conſenſu fieri vertiginem offendunt eadem ſigna, quæ pro epilepſia ſymphatica, ab iſdem partibus oriunda, ſuperiore capite iure propoſita.

Pronoſis huius morbi in hunc modum inſtituitur eſt. Vertigo recens, & raro inuadens, & quæ non niſi à cauſis externis excitatur, leuior eſt ac curati facilior, contra vero quæ grauior eſt, frequentior, & antiqua: in epilepſiam, aut in apopleſiam plerumque degenerat.

Vertigo in ſenibus magis periculosa, quia ipſorum cerebrum frigida ac debiliſ eſt, pituita vero abundans.

Vertigo in qua non ſolum res externæ, ſed etiam caput, & totum corpus circumagi videntur, & quæ cum viſus leſione acciſit, periculosa, maiorem enim cauſam vehementiam ſignificat. Et ſi ager in terram concidat, imminet epilepſiam aut apopleſiam præſentia.

Vertigo à calidis humoribus oriunda citius ſoluitur, quæ quæ à frigida, quia humores calidi citius diſſoluntur.

Curatio vertiginis cum epilepſia curatione multum conuenit, cum ab iſdem propemodum cauſis vtræque affectus oriatur, unde ſi vt vertigo ſepe in epilepſiam degeneret. Attamen cum vertigo ſiſ leuior affectus, non tamen indiget remediorum apparatu, vt epilepſia; ſed ea ſufficiunt quæ nos hic ſummam indicabimus, quæque hic morbus peculiariter deſideret, breuiter exponemus.

Primo itaque ſi ſanguis in toto corpore, vel in capite abundet, phlebotomia celebranda eſt, & ſanguis per interualla educendus, clyſter præmiſſo aliquantulum acciſori.

Deinde purgatio ſolemniſ inſtituitur apozemate propoſito in curatione frigide intemperie cerebri.

Poſte à particulæ cerebri euacuationes veniendum eſt, per erſina, ſternutatoria, & apoplegiatiſmum dicto loco propoſitos.

Cucurbitula ſum ſicca, cum ſcarificata, frictiōes partium extremitatum, & apertio hæmorrhoidum celebrantur euſionis gratia.

Veficatoria & cauteria ad deriuatiōnem applicantur; Ff tan-

eademque adhibenda, quæ cerebrum roborant, vapores & humores difcutiunt: tam interna, quam externa, ut opiatæ pilulæ & cucula, fecundum formulas dicto loco descriptas.

Næque omittatur pulvis digestibus, quia ventriculi impeditas ad huius morbi generationē fæpiffimè concurrat.

Ac denique viſiſſimæ ea remedia, quæ propætæ: ſpecifica vertiginem curare agitantur; qualiæ ſunt ea, quæ pro epilepfia curanda fuerunt propætæ: nimirum, aquæ antiepileptiæ, balſamum pro inſuptione narium, temporum, & verticis capitis oleum ſuccini, pulvis ex cinabari, & alia permulta.

Laudatur etiam à Querſetano in pharmacopœa cap. 30. remedium ex ſtercore pavonis, cuius præparationem, & utendi modum apud Autorem videtur eſſe.

Si morbus pertinaciter obſiſtat remediis propoſitis, ad dietam ex guſaco veniendum eſt.

Conſuetas ſorum calendulæ à nonnullis, tanquam ſpecificum vertiginis maxime commendatur.

Cauterium ſincipiti adnotum maxime laudatur à Zacuto Luſitano lib. 1. *Præxiæ adminand.* obſ. 28. his verbis, *Vix quidam remediaſe vertigine adeo vexabantur, ut illi cerebrum ſerè continuo in ſyrum ageretur: cumque pluraque experiri eſſet auxilia, & de futura apopleſia timor eſſe nullo alio præſidio præter cautætionem viderentur, & particulari, celebrata: que in varijs partibus ſentientibus, ſeremonique nucha affixum* (quam cautætionem brevisſimè impoſui, potui perſuadere.) *Quo ſolo pluriſimè cerebri morbi extirpabatur correptis, præter Medicorum votum, ad ſanctam, videretur deſinſum perſistentibus perducitur.*

C A P V T X.

De Tremore.

Tremor Græci *τρίπυς* dictus eſt, motus voluntarius depravatius quo membrum viciffim elevatur & deprimitur, ex motus ſacultatis, & grauitatis membri contentione.

Dicitur motus depravatus à Gal. 2. de *ſympt. cauſ.* cap. 1. idemque repetit lib. de *ſympt. differet.* c. 3. ſibi tamen videtur contradicere dum lib. de tremore c. 4. tremorem recentem inter motus diminutos Verum conciliari poteſt illa contradicção, dicendo motum dupliciter conſiderari poſſe, vel ſecundum ſeipſum, vel ratione ſacultatis. Si conſideretur ſecundum ſeipſum, eſt depravatus, quia non fit eo pacto quo debet. Si ſecundum ſacultatem, eſt motus diminutus, quia fit à ſacultate debili quæ ſatis fortes motus edere nō poteſt. Inſiſtat aliquis à ſacultate debili ſemper inminuatam, actionem fieri, non autem depravatam. Reſpondeo, id verum eſſe ſi tota actio à ſola ſacultate dependeat. Sed tremor fit partim à ſacultate, partim à grauitate partis, ideo eſt motus depravatus.

Facultas motrix membrum attollere, & in eo ſitu continere nititur; grauitas verò membri illud deorſum deprimit, unde motus ille tremulus contingit.

Cauſa proxima tremoris imbecillitas, ſacultatis motricis, feu potius inſtrumti ſuſcepti proximi ſicis, nempe ſpiritus animalis, qui non ſufficit ad motum voluntarium perfectè exercendum.

Debiliores ſunt ſpiritus, vel ob vitium proprium ipſorum, vel ob neruorum deſectum, qui ſunt canales, per quos illi deſcendunt, & actiones ſuas exercent.

In ſpiribus vitium reſidet, vel quando ſufficienti copia non generantur, vel generi diſſipantur.

Non generantur in ſufficienti copia, vel ob frigida cerebrum intemperiem, vel ſenſibus plerumque contingit, vel ob inopiam vitalium ſpiruum, qui ſunt materia animalium.

Diſſipantur verò ſpiritus à multis cauſis extremis, vel immodicis euacuationibus, venere immoderata, & intemperſima, dolore magno, & diuturno, icterico, mepore, & morbis vehementioribus diuturnis.

Neruum deſectū vitantur ſpiritus, ac debiliores ſunt, cum illi vel frigida intemperie laborant; vel maligna quadam qualitate inſiciantur, vel obſtruantur, vel contumantur.

Frigida intemperie afficiuntur ab aere valde frigido, vñ alimentorum irigidorum & largo frigida potu, mutatione frequentis, in aqua frigida, & alijs huiusmodi.

Magna qualitate afficiuntur ab viſu opii, hyoſcyami, pauiperi, vel ab hydrargyri vapore, ut in auricularibus contigit, & luc venerit affectus, qui per cinababac ſuſcitum curati ſunt. Sic in febribus malignis tremores ab eadem cauſa ſepe contingunt: qui tamen ad motus conuulſiuos potius referendi, & ab irritatione partium neruoſarum frequenter oriuntur.

Obſtruantur non totaliter, ut in paralyſi, ſed multo leuius, ab eadem tamen cauſa, humore nempe pituitioſo neruos leuiter irritante, quia à crapula, vinoſcentia, alijsque cauſis produci ſolet.

Denique à neruorum compreſſione poteſt interdum fieri tremor, quando humores excrementitii in toto habita redundantes neruos compungunt, & liberam ſpiritus animalium inſuſum impediunt.

Hercules Saxonia præter cauſas propoſitas, à Gal. mutatas, alium tremorem agnoſcit à ſtagnata excitatum, & Cardan alium qui à velleitatione partium neruoſarum ſtat. Verum in eo decipiantur, quod motus ab illis cauſis oriundus ad palpitacionem, aut motum conuulſiuum referri debeat.

Diagnos ſiſtens huic affectui nulla alia neceſſaria eſt, ſiquidem tremor per ſe ipſum patet. Cauſæ verò illam producentes ex propria ſignis diſtinguende ſunt, tum cauſæ externæ quæ præceſſerunt diligenter inueſtigande.

Quod ad prognofim attinet; tremor per ſe periculofus non eſt, ſed incitante atate adueniens, ad mortem viſque ægram comitatur. Per accidens tamen lethalis eſſe poteſt quatenus paralyſim; aut apopleſiam ſepe præcedere ſolet.

Curatio tremoris eadem inſtituenda eſt quæ pro paralyſi curatione ſuit propoſita, ut cum hac fruſtra repetere non opus fit.

C A P V T XI.

De Phrenitide.

Phrenitis eſt inflammatio cerebri, & membranarum eius cum delirio perpetuo, & febre acuta continua.

Inflammationis nomine verum nomen intelligimus, qui vulgò (ſyſtophica inflammatio nominatur, ex ſanguine extraxato, & in partem ſubſtantiam effuſus oriunda. Ille autem ſanguis calidus, atque bilioſus eſt, & io cerebri membranis; ipſaque ſubſtantia ipſaſeſ & equiſum, vel eryſipelas phlegmonodes, vel phlegmonem eryſipelatodem inducit.

Per delirium autem ratiocinationis errorem præcipue intelligimus; nam imaginationis ſolius errorem ſine vito ratiocinationis in phrenitidem contingere non poſſe aſſerimus, quodquid aſſerunt Galeni autoritate perſuaſi, qui lib. de *ſympt. differ.* cap. 3. exemplum proponit Theophili medici, qui tibicines quoddam angulum domus vbi decubebat, occupaffe, aliſque ſonare putabat, atque illos ſe iſtueri rebatur partem itantes partem verò ſedentes; & continuo exclamabat ut foras eucerentur. In eoque dicit Galenus imaginationem fuiſſe laſam, illaſa ratiocinatione. Primo enim dicere poſſemus. Theophilum illum phrenitide non fuiſſe affectum. Galenus enim hunc morbum ipſi nō aſcribit, cuius verba hæc ſunt, de delirio verba ſaciens, *quod genus Theophilus medicus præſæci conſegit*; ſed cum potius melancholia morbo affectum fuiſſe, quandoquidem melancholici non raro errant tanquam errant vnum obiectum; & in reliquis conſtant & bene habent. Sic de Theophilo dicit Galenus, quod in reliquis illi prudentia ſuperaret, & diſputandi, & præſentes evadere noſcendi. Verum viterius dicimus in Theophilo non ſolum imaginationem, ſed etiam ratiocinationem fuiſſe laſam. Quia verò putaba tibicines adeſſe, coſque enici cupiebat. Nam quando ſola imago loquatur, ratio illaſa illam imaginationis errorem agnoſcit, ut in vertigine contingit, in qua ægra videntur omnia circumſpecta. At tamen ratio cognoviſſet, non reſuſa iſtæ ſieri, ſed in eo imaginationem errare.

Neque tamen recipienda est in hoc casu Eustachij Rudij sententia, qui statuit nunquam fieri posse, ut imaginatio ledatur, ratiocinatio illa: Quia ratiocinatio circa phantasmata operatur ab imaginatione recepta. Atque adeo si ratiocinatio absurda phantasmata offerantur, necesse esse putat, ut intellectus prava illa phantasmata speculando, prave quoque, & absurde speculetur. Et hinc colligit Eustachius Rudius, in vertigine non esse imaginationem depravatam, sed meram fieri & simplicem visionis hallucinationem. Dicitur enim intellectum de vno ad aliud discurre, & circa species memoria recentas etiam occupari. Atque adeo licet phantasia aliquid absurdi menti offerat, attamen si species antea præcepta in memoria, adhuc retineantur, & rationi offerantur, ideo errorem illum phantasia cognoscere, & corrigere potest: si nempe iudicet absurda illa phantasmata, quæ illi ab imaginatione depravata offerantur, neque loco, neque tempore, neque alijs circumstantiis, quæ adhuc in memoria habentur, & vera esse fici, concurre. Sic in vertigine ratio bene se habens rerum omnium externarum, quæ visui offeruntur, ut parietum, lagænarum, & pavimentorum circumvolutionem impossibilem esse indicat, atque adeo falso imaginationi representari. Sic Philocephus ille, qui à cane rabido demorsus fuerat, dum illi imaginatio ledi incipiebat, balneum ingrederetur, saltem canis imaginem in balneo percipiebat, quem tamen imaginatio errorem ratio adhuc integra redarguens, hac illi verba suppediavit, quod cum canis balneo sit statim in balneum se coniecit, cuius ope à morbi imminenti, nempe hydrophobiæ periculo liber tus est.

Phrenitidis species duæ sunt præcipuæ. Vera nempe, & legitima, quæ propostia definitione exprimitur. Alia non vera, & spuria, quæ paraphrenitis appellatur. Vera phrenitis alia est in dispositione, quæ frequentissima est; alia vero in habitu, quæ hæctica nominatur, in qua biliosi humores altius in cerebro figuntur, & plures illius partes occupant, ac tincturæ instar adherent. Paraphrenitis vero fit dum calida intemperies cerebri communicatur, vel à toto corpore, ut in febribus ardentibus contingit; vel ex cuiusdam partis inflammatione, ventriculi, v.g. hepatis, pulmonis, & portissimum diaphragmatis, quod inflammatione affectum delirium veræ phrenitidis æmulum, scilicet perpetuū excitare solet. Quod fit ex magno consensu qui inter cerebrum & diaphragma intercedit, propter nervos insignes qui ad illud feruntur, & ex motu perpetuo diaphragmatis, cuius ratione perpetuus vapores ad cerebrum transmittit.

Causa veræ phrenitidis ex sanguis biliosus, cui etiam bilis excrementa ut plurimum admixta est; & pro varijs illius gradibus, maiori scilicet, vel minori feruore, aut adustione, grauiorem aut leuiorem phrenitidem producit: sic bilis pallida omnium mirissimam, adusta vero feruam, excitat phrenitidem.

Vt vero fiat inflammatio cerebri, & membranarum, oportet sanguinem illum biliosum extravasari, & in diætaram partem substantiam effundi, quod duobus præcipue modis fieri consuevit, vel cerebro primario affecto, vel secundario.

Primario afficitur cerebrum, quando immediate à causa aliqua extera incalecit, ut radius solaribus, meri potu, ira, & similibus, ut sanguis in vene cerebri communis extra vasa feratur; quod etiam à valente, percussione, contusione capitis fieri potest. Et phrenitis hoc modo genita primaria phrenitis dici potest.

Secundaria vero phrenitis, illa est, quæ febribus ardentibus, vel malignis succedit, quando humoris morbosici portio ad cerebrum detrahitur.

Fit enim plerumque in humilioribus febribus, ut natura, à causæ morbificæ malicia perturbata, illius portionem ad viscus aliquod deponat: unde videmus pleuritides, peripneumonias, anginas, hepatitides, aliarumque partium inflammationes illis febribus superuenire. Ita fit humores illi ad cerebrum transmittantur, veram phrenitidem efficiunt; & tunc febres delirium præcedit: in primatis vero delirium ab initio cum febre apparet.

Signa phrenitidem imminuentem indicantia sunt, vigilie formæ turbulenti, sermo inopidicus, vrina primum crassa,

mox tenuis, & diaphana; calor capitis. Hæc enim indicant materiam calidam ad caput ferri. Oculi immutantur, quia latio cerebri spiritus animalis delinuntur. Dolor circa occiput perferitur, quia venæ iugulares ad eam partem feruntur, & sanguinem biliosum refundunt.

Præsentem vero phrenitidem indicant, delirium affiduum, quia cerebrum indefinenter afficitur: vigilie turbulenti, ab intemperie calida cerebri productæ, respiratio magna & rara, quia phrenitici respirare obliuiscuntur. Cum enim per obliuionem, aut maximam mentis occupationem ab infusus phantasmatis, quæ in imaginatione delira representantur, & spiritibus animales evocant, rara fiat respiratio, magnitudine raritas compensatur. In phrenitis præsentem etiam sententia scis causa, quia mens ægrotat, & quia animales spiritus ob laticum cerebrum non mittunt radios sufficientes ad os ventriculi superiores, ad quod scis pertinet. Pulvis parvus est, quia ceteri compariuntur: durus, ob membranam inflammatam; celer & frequens, propter magnam necessitatem; nonnulli vndulos, quia cerebrum afficitur. Febris etiam est continua, quia inflammatio cerebri necessario febrem accersit. Lingua quædam aspera, & admodum nigra, vel citrina, propter vapores biliosos alius humiditates abluentes.

Hæctica phrenitis ex eo dignoscitur, iuxta Hippoc. præceptum 1. *præter-text.* 33. quod in ea delirium fit mixte, & obcurum, ægri non loquuntur, & quieti maneant, atque dormire videantur.

Phrenitis veræ à paraphrenitide distinguitur, ex eo quod affectus qui hanc producit, multo citius manifestatur, quam delirium, & eo ingrauescente, vel mitescente delirium interdum, vel minuitur; immo per vices intermitte, & non est continuū. At vero paraphrenitis ex lepi transiit inflammatione orta, in qua delirium est continuū, alius signis distinguitur. Quod nimirum in veræ phrenitis respiratio est magna, & rara; in ista vero parua & frequens. Parua quidem, propterea quod diaphragma inflammatione obelsum, non potest facile extendi & dilatari; frequens vero propter necessitatem, ut frequentia paruitas compendatur. Deinde in veræ phrenitis vox est grauis, & in ea ægrotantes admodum vociferantur; in hac vero vox acuta, quia respiratio organum est impeditum. Ac denique in lepi transiit inflammatione hypochondria sunt sursum reuulsa, secundum Hippoc. in *Causis*. Et ratio est, quia diaphragma inferiori parte tegitur membrana, à peritoneo mutata, atque ita dum inflammatur, peritoneum trahit, & cum peritoneo hypochondria.

Canarum denique signa ex humoris in toto corpore prædominio, tum etiam ex modo deliri mutuari poterint. Pallida etiam bilis phrenitidem efficit rariorem, flaua ferociorem, adusta ferocissima. Sanguis vero biliosus, omnium mitissimus & cum visu coniungitur.

Prognosis huius affectus, vt plurimum lethalis est; pauci enim euadunt, quia pars nobilis grauissime afficitur.

Maximam tamen solutionis spem præbent delirium cum riso omnium symptomatum vehementia minor, virum constantia, tum si potius sanum morbi vigorem insignis aliqua euacuatio contingat, per sudores, hæmorrhagiam, aut alui fluxum.

Lethali vero affectum ostendunt, lingua, & manus tremula, litridor dentium, consilios, rigor in principio morbi apparet, & quando ægri floccos, & larcinas colligunt, & felleas carpunt. Eiusdem efficaciz sunt ad prognosim lethalem efficiendam, stilla sanguinis nigri è naribus emanans, alba deiectiones, vrina alba & pellucida. Hæc enim omnia significant magnam cerebri oppressionem, vel bilis à toto corpore in partem affectam translationem.

Ad huius affectus curationem sanguis ad caput affusus euacuandus, reuulsiones, deriuandus, repellendus, intercipiendus, qui iam affluxit euacuandus, & discutendus est. Partis intemperies corrigenda, robur illius, & totius corporis conservandum.

Hæc omnia præstat potest sequentibus remediis. Ante omnia tunc ab initio, & quacunque diei hora quia morbus est acutissimus, venæ sectio infundenda est, præmissa

Item hepatis & lumborum regio inungatur sequenti linimento.

℞. Vnguenti rosar. ʒ. i. ʒ. cerati santali. ʒ. i. feci lactuc. & olei rosar. ana ʒ. ʒ. Fiat linimentum.

Pectus etiam oleis relaxantibus, vt violaceo, inungatur. Telles limetis oxycrato madidis insolvantur, vel quod erit prestans aqua tolarum cum tantulo aceti usurpetur.

Lotio pedum ex decocto refrigerante aqua calido commendatur; nam calore humido eas partes relaxat, & humorum motum ad inferiora promouet. Frigiditas vero illius potentialis per nervos toti corpori, & cerebro in primis communicatur, somnūque conciliatur. Illius autem formula talis est.

℞. Fol. violar. malax. falicis, vitis, nymphaez, ana. m. ii. flor nymphaez, rosar. ana m. i. cap. papaueris n. ʒ. Fiat decocto ad vsum dictum.

Aqua pura ad lotiones pedum sufficere potest, in qua subingidi si pedes agrotantis mergantur per tres aut quatuor botas, a delirio liberatur, somnūque conciliatur.

Sinapiem effectum prestat sedum manus contulū inflat cataplasmas, & plantas pedum admotum, tum etiam cucurbita contusa, & eodem modo apposita.

Odoramenta etiam naribus frequenter admota cerebrum refrigerant, in sequenti modum parata.

℞. Florum violarum, nymphaez, ana p. i. rosar. p. ii. santali citrini ʒ. i. Ligentur in nodulo turo, qui aqua rosar. adspersus naribus offeratur. Vel.

℞. Santali citrini ʒ. i. flor. rosar. nymphaez, ana ʒ. i. camph. ʒ. ii. Includentur in vase angust orificio cum aqua rosar. & supra ignem ebulliant, vapores naribus excipiantur.

Quia vero in hoc affectu vigilie maxime vrgent, omni nocte iocunus conciliandus est, ab ipso morbi initio. Cui vlti non parum conferunt repellentia medicamenta antea proposita. Præsertim si ante oxyrhodini admotionem, caput oleo violaceo frigido perfundatur; quod in vigilis maxime precium est, tum etiam consilioribus ex hoc morbo oriundis. Idipsum tamen efficacius sequentia præstare poterunt.

℞. Capit. papau. albi cum sem. n. vi. florum nymphaez p. ii. Contendantur omnia, & cum aqua rosar. & lactuce q. f. fiat infus cataplasmaticus, quod fronti applicetur duabus linteis inclusum.

Nota, in medicamentis somnum conciliantibus acerrum non esse permiscendum, nisi quantitate paucissima, quia vigilas excitat. Vel.

℞. Flor. lactu. m. ʒ. rosar. m. ʒ. sem. papau. albi ʒ. ʒ. Coquantur in aqua ad mollitiem. Contulsis adde farinæ hordei, lactis mulieris, ana ʒ. ʒ. ol. violac. q. f. Milceantur pro frontali. Vel.

℞. Ol. violac. nymphaez, vnguenti popul. recent. ana ʒ. iii. opii, olei nuc. mosch. ana gr. iiii. Milce, fiat linimentum, quo itrons & tempora inungantur.

Sedum maius contul. & cum lacte muliebri mixtum, fincipiti admotum mirè fedat phrenitidem, & somnum conciliat. Sed statim ac dormire coepit æger, detrahendum, ne in coma præcipietur. Ramenta cucurbitæ recentis idem præstant, & minori periculo.

Penotus sequens epichema maris laudibus effert, quod sic habet.

℞. Moschi gr. xii. camphoræ gr. xx. aquæ ros. rubr. cum tindura santalorum rubror. imprægnant ʒ. xv. Milce. Capite deorsum madefiant linteæ duplicata in hoc liquore, & tepida per omnes capituli fuitas applicentur. Vbi refecitæ fuerint iterum imbibe, & per 24. horas applicationem continua, & somno conciliato, cerebroque confirmato, ægrum mimbic conualecentem propiciis, nisi ipsamet cerebri substantia fuerit corrupta.

Interius vero cum iulepis, aut emulsionibus interdum exhiberi poterit syrup. de papau. ʒ.

Vel ladanū opiatū gr. iiii. aut v. exhiberi poterunt, quod etiam num in clysteribus usurpatum, satis potenter, & tutius somnum conciliat.

Attamen in narcoticorum vii cautus esse debet Medicus. Exhiberi enim non debent, si vires sint valde debiles, ne spiritus & calor ab his extinguantur.

Celeberris sufficienter prædictis materiæ fluentis euacuationibus, resulsionibus; deriuationibus; & intercepotionibus; ad materiam fluxu educationem vacuandum est. Ac primum vena frontis aperienda, si manifesta sit, & secari possit, fascia collum non alstringendo, vt vulgo solet fieri; sic enim sanguis fursim impellitur.

Vtilissime etiam aperientur venæ narium, & si villo modo morbus est fanabilis, hoc præcipue curabitur: fanguis fati copiose per eas emittendus, idque satis mature, & statim post vniuersales euacuationes faciendum est. Aperitur autem huiusmodi venæ, nares interius fetis aliisque aperis frequenter pungendo atque lancinando. Vel achibitis post aures, nartibus, fronti, podici, huiusmodi sanguis effundendus est.

Capiti vero applicentur resoluentia simul cum repellentibus, ea proportionem, vt primo parum addatur de resoluentibus; quo vero morbus magis ad declinationem vergit, eorum quantitas augeatur, vt tandem sola resoluentia usurpentur, ad materiam moribicis reliquis discutendis. In hunc finem usurpari poterit oleum chamemel. vel anethanum, cum oleo rosar. permixtum.

Sed inter resoluentia primas obtinent animalia tenella mactata, capiti statim admota, vel eorum partes; vt pulli columbini, gallinacei, catelli per spinam lecti, & pulmo veruecinus: quo enim calore naturali partem roborant, humorem discutunt stiluque acrimoniam contemperant.

Quibus vno aut altero die tentatis, si nihil commodi conquiratur, docet Mercanus lummo capiti cucurbitulam affigere, vt per futuras aliquid expiret euoceturque ad cutem: ac si rubor compareat ac tumor subitus cucurbitulam ipsam scarificare. Quo auxilio affert Medicum consequi posse, quod reliquis omnibus non valuerit, maxime si mox adhibeatur lauacrum, aquæ dulcis; in quo aliquid effuscentibus coctum sit. Hoc tamen monet in ea solum inflammatione faciendum esse, quæ per se inceperit, non autem aliis febribus superuenient.

Hoc remedium confirmat Zacutus Lusitanus, referens se desperatam phrenidem curasse admota fincipiti cucurbitula cum scarificatione.

Quidam maiori audacia vesicatorium fincipiti admouent, quod aliquando successisse aiunt, sed maxima indiget præmeditatione.

Pro potu vtiatur æger decocto hordei, vel rad acetosæ, cum syrupo granatorum berberis, aut limonum. Vel si, quæns insulam propinetur.

℞. Aquæ fontis ʒ. ii. fol acetosæ & papau. rhæados ana m. ʒ. flor. borrag. nymphaez, violar. ana p. ʒ. spiritus vitrioli ʒ. i. santali rubi limitati ʒ. ii. Stent in infusione per aliquot horas frigide. Colentur per chartam emporiticam, addendo sacchari albi q. f. ad laporis gratiam.

Veniain hoc morbo vti plurimum suppeditur, quia ægri eam emittere negligunt, vnde partes illæ distendantur, ac tandem inflammationem concipiunt, quæ vel sola ægro interitum afferre potest. Itaque ægri ad vrinam reddendam sæpius incitandi sunt. Mox vesicæ regio lauenda aqua tepida. Dein manu comprimendo vrina prelopenda, aut ea elicienda penem contrahendo. Et si leuioribus huiusmodi symptoma non cedat, ad sequentia veniendum erit.

℞. Fol. parietariæ m. ii. petrosel. cum rad. m. ʒ. Fiat decocto. In colatura dissolue olei scorpionum ʒ. iiii. Fiat fustus supra pedinem.

Honus decocti residua frigatur in sartagine cum oleo scorpionum, & post lotum applicetur.

Si decoctum efficacius desideretur, adde sem. apii, petroselinii, milii, solis, celestis, ana ʒ. ii.

Vtiliter etiam post lotum vnguentum potest applicari.

℞. Pinguetinis cuniculi, olei scorpionum, ana ʒ. ʒ. sem. apii, petrosel. alari, & celestis subtilissimi. puluerat, ana ʒ. ʒ. Fiat vnguentum.

C A P V T XII.

De cerebri abcessu, & Episthele.

Cerebri abcessus, & Episthele a paucissimis Autoribus descriptæ, licet ab Hippocrate annotatus fuerit ʒ. 46.

Et 3 mor.

verifimile est, peculiare quoddam venenum in corpore humano genitum maniae causam esse precipuum; cum etiam febres malignae, quae non raro nascuntur sunt, ut in illis polius ac vixinae sanis similitudine apparent, deliria producere solent potius quam febres ardentis malignitatis expertes. Et docet et experientia, maniam contingere frequenter, non tantum atterabulario temperamento praeditis, sed etiam omnibus naturis & aetribus, praesertim si hereditaria iure contingit; & ad demque illam calidioribus medicamentis, specificis virtute praeditis non raro curatur. Et si diffiteri minime oporteat in melancholicis, & atterabularis hunc morbum frequentius & ut plurimum produci, quia ille humor tali veneno fuscipiendo magis idoneus est. Et Galenus ipse malignitatem istam humori atterabulario aduenientem agnoscere videtur *comment. Aphor. 36. lib. 6* vbi dicit maniae causam esse melancholicum humorem, non semper, sed cum supra modum exultus aut putrefactus malignum inducat acriminam.

Sed manet adhuc difficultas ex eo dehempta, quod maniaci frigus externum etiam hyemis tempore nudato corpore innoxie patiuntur, & praeterea ad tactum calidi sentiantur, quod indicat calorem intentionis in ipsis vigere.

Verum respondemus hoc in omnibus inaniacis minime contingere, & multos hybernum frigus auctari, velibusque plurimum gaudere. Alios vero ab aere externo non alibi propter conluctationem quam ab allectu in se fit passio. Sic viciemus pollicis delicatulas habemus tempore praesentis denudatum habere, quod tactu calidum sentitur, quoniam ex Hippocrate frigus fit pectore vnde inuenitur.

Materia hunc affectum produciens in venis & arteriis continetur, vel totius corpora, vel cerebro propriis, & vel ipsi cerebri vasibus, & ex loco ut varietate varia innotat, et quae grauiora vel leuiore emergunt. Non raro etiam in veteri vasis ex sanguine vel semine corrupto, materia morbifica conluctatur, ex qua furor veniens generatur.

Si materia peccans est in omnibus venis, aut cerebro vicinis, infania fit perpetua & indelens. Si vero in parte tantum aliqua concludatur, delirium tunc temporis quidam habet intermissiones, & per intervalla recurrit.

Signa diagnostica alia imminuentem, alia praesentem malitiam significant.

Ad imminuentem vel futuram maniam dignoscendam primo consideranda est agrotantis natura diffusiva, quae licet ad bilisum fuit atterabularium temperiem accedit. Sic apud Hippoc. 3. *epid. 5. Cui vena in cubito pulsatur, furibundus est* & ad iracundiam per cepit. *vera sensum moritur, & terrens ac stupida.* Arterias nomine venarum Hippocrates afficit. Non autem simplicem pulsationem intelligit, sed vehementem, cui opponit illud quando sensum moritur, ut sensus huius sententiae ita se habeat. Qui habent pulsum magnam velocem & vehementem a natura constitutione ad iram & furorem maxime proclives sunt; qui vero tardum habent pulsum torpidi sunt & stupidi.

Secundo, si us ratio habenda est. Viri enim frequentius furor exagitantur quam mulieres. Quod intelligendum est de affectu praesentibus; ex vero etiam mulieres non raro in furorem aguntur.

Tertio, aetas consideranda est. Iuuenibus enim frequentius mania contingit, quam pueris & senibus.

Quarto anni tempus aduertendum. Saepé enim verno tempore contingit hic affectus, saepius aestate, saepissime autumno, ex Hip. & Gal. *sententia Aphor. 30. 21. & 22. lib. 3.* Vnde humores alij temporibus geniti, & per hyemem alferuati ac quiescentes commouentur & exagitantur, moribusque analogos pariunt. Aestate multa bilis, non solum flammula etiam atra in dispositis gignitur, quae maniam efficit eodem tempore, vel ad autumnum usque maiori copia conuulsa, motum tunc temporis producit.

Haec signa temeraria sunt, & in genere tantum dispositionem ad hunc morbum significant. Proxime vero imminuentem affectum ostendunt, dolor capitis affiduis, vigilie turbantes, somni leuissimi atque breuissimi, insomnium turbulenta, & sollicitudines moleste, terrores ex leui causa praecipit & frequens iracundia ex minima vel nulla occasione, pleurodes oculis obuer, aures, aurium sonitus,

proclivitas ad venerem infueta, pollutio nocturna frequentior, nilius praeter assuetudinem & rationem, loquacitas infueta, & fere affidua, & interdum taciturnitas debet abunda. Posteriora haec incipientem maniam significant.

Factum vero & praesentem maniam ostendunt ea quae in definitione prolata sunt, nempe delirium sine febre, cum calore & audacia. Varia tamen sunt humidorum deliria in variis agrotantibus, tum etiam in illis, diuersis temporibus, pro maiori vel minori cause vehementia. Alij enim leuiter iracundia rapiuntur, & obuios quosque inuadunt, proprias vestes proferunt, & si inuadunt violentas manus incurrunt, ubique vitem eripere conantur. Alij vero mitiores & pecciores sunt, nullamque alantibus noxam inferunt, sed tantum varios sermones & ridiculos proferunt; interdum canunt & ridunt, & variis deliramentis assuuntur, ac symptomata pariuntur in aliquo modo similia, quae in melancholia & hysteria solent contingere.

Ex illa autem varietate symptomatum, causarum varietas dignoscitur. Riles enim inmodicus, hilaritas & cantilatio materiam peccantem multo sanguine dilui significant iracundia vero inquietudo, clamor, percussio, palidus & flauescens facies color bilem flauum in vultu esse ostendunt. Infania vero ad inordinatam iracundiam, & agri obuios impetant, & aliquando interitum ad suam bile exultat, quae atra bilis dicitur, ducit originem, vero atra bilis non ex flaua bile, sed a melancholia exorta & praesulata generatur, agri truculentum vultu praesati sunt, innotant interdum in diuturno silentio, quod nunquam in sermonem importunum erumpit, inimites sunt, pertinaces, ingenti more ore interdum ac luctibus abluuntur.

Prognosis huius affectus in hunc modum influenda est.

Mania grauiissima est effectus & non solum per menses, sed per annos aliquando & vigat mortem perueniat, praesertim si hereditaria sit. Cum omnes morbi ab atra bile sint curati diffiniuntur praeter ceteris difficilior est, quod agri medicis non obtemperant, & necessaria remedia viurpare minime vident.

Facilis curatur mania quae cum risu, & mitioribus symptomatibus copulata est, quam quae cum illud ac furore.

Breui incescurant morbi curationem ostendunt quicunque euacuationes ex motu naturae contingentes, per sudores, alij fluxum, haemorrhagiam per nares, aut haemorrhoides aut per varices superuenient. vide Hipp. *Aphor. 3. lib. 6. Si infania varietas, aut haemorrhoides contingant, morbi iulatio fit.*

De lenitate, aut hydrops, aut febris tertiana, vel quarta maniae superueniens, nonnulli solent: fit enim metallis humorum a cerebro ad partes inferiores, in quibus novum morbum producit.

Ad huius morbi curationem materia peccans euacuanda, reuellienda & repellenda est; calida interemptis corrigenda, cerebrum aliaque partes principes roboranda. Quae omnia sequentibus praesidijs adimpleri poterunt.

Primo sanguinis radiao celebranda est, praemulso clistere, ex vena brachij insigni, polidrie vnde iracundia ex altero brachio, idemque remedium frequenter viupandum. Aliter etiam Platenus innumeros hac ratione curatos fuisse a Chirurgis & alijs, qui ex proleto hinc morbis curandos operam dabant, qui vigiles, imo licet vigiles venas aperiebant. Non solum enim vena brachij vntique, sed etiam malloco, frontis, narium, haemorrhoidum, etiam varices vi apparent, & aliaque: idque per intervalla, interiectis clisteribus, & medicamentis purgantibus infra deferendibus. Cuiusmodi etiam scalpulis & dorso cum scarificatione admodum polt multas venae sectiones, tum etiam hirudines temporibus, & poné aures, vtilissime sunt.

At frequentibus illis plebromiis materia peccans praeparationes & purgationes intercedere sunt eque diu multumque continuande. Cui vici consentit ea omnia, quae ad bilis & melancholiae praeparationem & expurgationem viurpant solent, quibus & sequentia, vt pote selectiora, adiacere possumus.

§. Lapid. lazuli 3. gr. diagryd 38. rubyth. 3. i. fenae 3. i. epithyma.

thymistremor, tartari, ana ʒij. cinam. & cort. citri, ana ʒj. & oci ʒij. fiat pulvis, cuius dosis erit ʒj. vel ʒiij. cum iulculo vel liquore appropriato.
 ꝑ. ʒ. Rament helic. nigri ʒj. Infundantur per triduum in aqua pluuiæ ʒij. Decoquantur lento igne ad tertias. Colaturæ addde mellis optimi desumpti ʒij. Misce, & capiat cochlear ʒi. cum iulculo pingui. Vel
 ꝑ. Extrachi helicbori nigri ʒij. ʒ. rupi violac. ʒj. Misce pro vna di. fi.

Quonia medicamenta ex helleboro confecta, vt vinum, syrupus & oxymel, ad huius eff. ʒus curationem plurimum conueniunt. Vnde olim feruic. Curacionem Amythionis Medici filium, vino helleborato Præti Arguorum regis filius, quæ le bores ex infirmabant, liberaſſe.

Antimonium in hoc morbo non solum à Chymistis, sed etiam Galenicis omnibus commendatur, tum quod humorem atrabilarium è toto corpore euacuat: tum quia eo ægrotantes commodè talia possunt, remedia alioquin infusa tenentes. Dosis vna est pro variis illius preparationibus.

Balnea aque tepide frequenter & post singulas purgationes vsurpanda sunt.

Ordo medicamentorum purgantium in hoc morbo talis est, vt primò apyrena alterantia & purgans per tres aut quatuor dies exhibeatur, post vna lectionem in vtroque brachio celebrata. Deinde purgantia mediocria & potioribus, poliueribus, aut syrupo magistrali bis in septimana exhibeantur. Vehementia vero bis in mense, interiectis continuo vna lectionibus, vt antea dictum est.

Diebus verò intermedijs balnea, iulepi preparantes, aut iulcula alterantia, tum etiam opiate roborantes exhibeantur.

Præter iulepos vulgares, sequens ex fœccis paratus erit vtilissimus.

ꝑ. Succorum borrag. bugli. & pomor. redol. an. ʒiij. aquar. fumarie & cichor. ana ʒij. sacchari albi ʒj. Coquantur deperantur, & aromatizentur sacculo citrino. Capiat ʒij. matut. & sero.

Opiata etiam in sequentem modum concinnari poterit.

ꝑ. Confusæ rosar. violar. & buglossar. ʒj. confusæ flor. tanaricæ & car. ophylli hortensis, caulium iacur. condit. & cort. citri condit. ana ʒj. m. robal. emblic. condit. n. j. confecti alburni, & de h. acinuti ana ʒij. pul. elect. diuarg. frig. & larif Galana ʒj. corat. prepar. & margar. prepar. ana ʒj. Cum syrupo de pomis redol. fiat opiat. de qua capiatur ad magnitudinem castan. æ. superbibendo parum iulepi aque cuiusdam appropriatæ.

Tabellæ etiam vsurpari poterunt, in hunc modum compositæ.

ꝑ. Confect. ʒj. term. ʒij. pul. electar. de gemmis, & diuarg. frig. ana ʒj. sacchari in succo pomorum dissoluti ʒij. Fiat tabellæ pond. ʒj. Capiat vnam pro dosi.

Interdum etiam tentari poterunt specifica & amuleta, quorum non exiguum numerum collegit Sennertus. Nos verò vniq. adiciemus, quod in illustri, quadam familia Moslemi, pro secreto gentilium, & hereditario habetur, illicque descripto talis est.

ꝑ. Fol. melilæ Mj. Incendantur minutim, & infundantur in spiritus vini ʒ. iij. Deinde addde margarit. præp. ʒj. Misco. Desit est cochlear. ʒj.

Interim dum hæc sunt, somnus omni arte conciliandus est, & somnifera per intervalla vsurpanda. Quæ non alia debent, quin quæ in phrenitidis curatione propostia sunt, tam interna, quin & externa.

Ac præter somnifera externa, admoenda quoque capiuntur topica medicamenta, quæ ætiam ac furorem vehementem temperant ac demulcent. Illa verò non solum refrigerantia, sed multò magis humedantia sint, & in principio morbi nonnihil repellentia.

Ileo in principio morbi oleum rosæ conueniet, cum violacanthino & chamæmelino: postea verò eadem olea de trado rosæ. Vbi verò magis retrigendum est, olea æ. semine cucurbitæ & papau. addenda erunt. Ac denique vt in formam linimenti rediit, quæant, mucilagines sem. lini,

fenugr. & butyrum addi poterunt.

Plurimum etiam confecti epithema, in sequentem modum compositum.

ꝑ. Aquæ nymphaeæ th. ʒj. salis prunellæ ʒj. nymphaeæ ʒj. Misce, & cum linteis complicatis admo. aut tepide suscipi.

Epithema ex sale Saturni, & aqua rosarum vtilissimum est.

Vtilissimum quoque erit epithema ex aqua rosarum, sacculi rubri rinctura unpergnata cum molli & camphora Composita, quæ superiori capite dicta ripta est.

Chymici vero balsamum Saturni palmarum tribuunt, eoque caput mungunt instar lumentum.

Maximè etiam conueniunt in summo furorè animalia tenella per medium sedâ, vel eorum partes, ac præsertim pulmo veruicinus, qui vbi femel reitratæ, iterum potest caleſcere in aqua feruente.

In declinatione nonnulli discutiuntia validiora adhibent. Imo vero in ipso vigore morbi, post euacuationes sufficientes, lomentum sequens admirandè creditur efficax.

ꝑ. Herbarum cephalicarum cum floribus ʒij. Decoquantur in aqua fontana. Deinde ʒ. baccharum lauri & rad. hellebori nigri veri, ana ʒj. Comendantur crassificulæ, & infundantur sacculo oblongo interballato. Sacculus parum bulliat in prædicto decocto.

Tandem per nouem dies continuos ʒ. illius decocti th. ʒj. Eoque calefacto hœcat caput raum per integram horam, cum linteis duplicatis. Postea sacculum illum applica futuræ coronali cum bona ligatura, linteis calidis inuolucendo. Paterens decumbat in lecto, & si fieri potest, quiescat. Tum mitè ex purgatur per omnia capris emunctoria, & alius simul aliquantulum suat. Sic enim fuligines inherentes cranio & cerebro nubiliter dissoluntur, quod vix alia remedia præstare poterunt.

Denique cauterium futuræ coronali applicatum maximè præbatur à Goronio, eoque vtilitatem confirmat historia cuiusdam maniaci, ut cum esset vultus infirmum capiti cum crani fractura, quando fuit vultus apertum, tandem habuit, vultore sanato reuerſa est mania.

Quoniam autem cerebrum in hoc affectu præcipue laboret, tamen alia partes alteranda, præcipue cor & hepatis epithematis & lumentis in phrenitidis curatione propostis.

CAPVT XIV.

De Melancholia.

Melancholia est delirium sine febre cum timore & mœstia.

A phrenitide distinguitur, per carentiam febriſ, & a mania per timorem & mœstiam, quia hæc est cum furore & audacia.

Dicimus autem febrem abesse ab hoc affectu, quod intelligendum est ex propria natura, & per se; tamen ex accidenti f. ʒ. cum illa copulati potest. Nihil cum impedit, quin febris contineat, vel intermittens in melancholia laborante contingat sed illa f. ʒ. cum non erit de essentia melancholice, quæ admodum in phrenitide febris est esse de essentia illius.

Dubitare licet quomodo timor & mœstia dicantur esse de essentia melancholice, cum in multis melancholicis gaudium & letitia maxime vigere videantur. Alii enim continuo tident, alii canunt, alii se distissimos, alii Reges & Monarchas esse putant.

Respondemus varios esse melancholicos gradus, & varias humoris melancholici cum aliis humoribus permutationes, indeque maximam deliriorum varietatem emergere. Ita vt qui multum sanguinis, aut putat cum humore melancholico permixtum habent, gaudium & letitia affici possint. Alii ille affectus eorum temporis non est vera, & legitima melancholia; sed potius ad stultitiam & fatiuram accedat.

Ex variis autem humoris melancholici dispositione ma-

xima

ma deliriorum varietas emergit: unde alij se Reges, Principes, vases, alij vitreos, tellus fragiles, granaticos à gallinis deuoranda; alij ceram igne liquabilem; alij se canes, felles, uos, cuculos, iulcinas, galios esse putant, horumque aut aliorum animalium voces imitantur. Alii se mortuos esse nec quisquam edendum, aut bibendum esse, imaginantur. Alii se capite vel membris truncatos esse, vel orbem digito fulsuisse, vel passeres in capite, serpentes, ranas, mures, aliaque animalia in ventre habere arbitrantur.

Causa melancholicæ proxima & immediata est spiritus tenebrosus, & (vt Galeni verbis utar,) nigro colore infectus. Cum enim spiritus animalis, natura sua purus, tenues & periculi esse debeant ad actiones cerebri alacriter exercendas, & alacritatem ac iocunditatem inducendam, si ab ea constitutione deiciantur, & opaci ac tenebrosi euadant, incertitiam & timorem inducunt. Vnde Galenus. 2. de symptom. caus. cap. 6. à tenebris & tenebrosus mutato exemplo rem explicat. *Eorum autem quæ extra corpus sunt, nihil videmus, quod nos perinde terreat, ac tenebræ: ergo cum tenebris rationalis anima partem suam circumspicit, necesse est hominem timere, quæ semper una cum corpore, sua timoris causam extrinsecus ferat.*

Causa vero prauæ huius spiritum dispositionis est humor melancholicus, qui crassior, opacior & colore nigro præditus, spiritus animales inficit, & tenebrosos reddit. Et cum humor melancholicus frigida & sicca temperie donatus sit, ad frigidos & densandos spiritus maxime conducit, quæ quidem densatio & fixatio spirituum ad hypochondria & tristitiam necessaria est. Si enim humor tenuis sit & calidus, qualis est atrabilis, à qua materia productur, turorem potius & audaciam excitat. Ergo causa proxima melancholicæ est opacitas, & tenebrositas spirituum animalium. Conditio vero necessaria, & sine qua non est frigida & sicca intemperies.

Si quis vero mutauerit in melancholia hypochondriacæ, ex Galeno 3. de loc. affect. cap. 7. esse inflammationem in hypochondrijs, atque adeo calidam intemperiem præulere.

Respondemus illam inflammationem, seu potius phlogiston hypochondriacum fieri ex eo quod sanguis melancholicus in hunc & venis mearis diutius retinetur propter obstructiones inaleficis, vnde multi vapores eleuantur ad cerebrum, qui licet calidi sint, vincuntur tamen à frigiditate cerebri, & facili ad temperiem humoris melancholicæ propriam, nempe frigidam & siccam, redeunt. Si vero tantus sit illorum vaporum calor, vt cerebri temperiem inuertat, & in calidam & siccam permittat, tunc mania & melancholia generantur. Ita vt mania & melancholia in eo præsertim differant, quod in illa est calida & sicca intemperies, hac vero frigida & sicca.

Prædicta spirituum tenebrositas à Galeno lancitare iecturæ ab Auerroes, ex eo quod tenebræ spiritibus animalibus inductæ, & calot niger humoris melancholicus non possint alibi esse sensus internus, iuxta vulgatum illud à ioma. *Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu*; atque adeo cum color ille niger, aut tenebræ interiores oculis non offerantur, sensibus externis percipi non possint.

Respondemus colorem nigrum humoris melancholicæ, aut spirituum tenebrositatem non afficere sensus internus sub ratione coloris; sed quatenus aliquid præter naturam existens in cerebro, quo actiones illius lædant. Quia nimirum spiritus animales ad actiones cerebri perfecte obeundas debent esse puritatem & periculi. Si contra impuri, crassi & tenebrosi ex tuerent actiones cerebri vitiant; quatenus species à sensoris transmissas inficiunt veluti, & inquinant sicut vitrum coloratum, aut alter infectum species obiectum eodem modo infectis oculis representat.

Frigida etiam & sicca intemperies, quæ tanquam conditio necessaria proposita est ad melancholiam efficiendam, hoc argumento impugnari potest ab Auenaræ auctoritate desumpto, qui sen. 1. lib. 3. art. 7. cap. 18. Balbi inquit, *inquit, ut phlegma ad melancholiam. Sed balbi sunt valde humido temperamento donati, quod probatur ex Gal. comen. Aphor. 32. sec. 6. ubi Hippocrates sic habet. Balbi diu in præ-*

statio maxime capiuntur. Galenus verò dicit balbos habere humidiorum temperaturam, quemadmodum & pueros, ratione cuius prolusio sunt maxime obnoxii.

Respondemus contrarium Auenaræ non de verè balbis esse intelligendum, qui literam R. pronuntiare non possunt de quibus loquuti sunt Hip. & Galenus. *Aphor. prædicti*, & illi quidem humidiori temperie præditi sunt; sed de illis qui trali nominantur, qui scilicet eandem syllabam sapius repetunt, antequam verbum integrum pronuntiare valeat. Quod fit ex precipitatione mentis cum celeritas loqui contendunt; tunc enim lingua sese implicat, & in verborum prolatione hæsitare cogitur. Et illi trali sunt melancholico temperamento donati.

Denique dubitare licet, quomodo tenebrositas spirituum sit causa immediata delirii melancholici, cum omnis actio læsa dependeat immediate ab aliquo morbo; hæc autem tenebrositas ad nullum morbi genus referri valeat.

Respondemus tenebrositatem illam esse morbum in numero, quatenus illius accessu augeatur numerus eorum quæ necessaria sunt in cerebro ad actiones animales obeundas. Infantia verò quæ contra hanc responsum afferri potest quod scilicet morbus sit affectus vtræ partis, in virtutis explicatione resoluta est.

Signa melancholicæ pathognomica in decisione proposita sunt, timor nempe & tristitia sine causa manifesta, quæ in omni melancholicæ specie reperitur. At verò singula melancholicæ species proprijs signis innotescunt. Siquæ primariam in solo capite resistentem melancholiam significat, cerebri vitiosa constitutio, aut morbi calidi prægressus, quibus sanguis in venis illius contentus, exulsi & torridus est, tandemque in humorem melancholicum coarctus, omni breues & interrupti somnia turbulenta, vertigines, aurium tinnitus, & symptomaticum in reliquo corpore ac præsertim ventre inferiori absentia.

A toto corpore proveniunt hunc affectum ostendunt, habitus totius corporis melancholicus, vel naturalis qui ex colore nigro, hirsutie, macilentia, alijsque dignoscitur; vel acutius ex curis, laboribus, vigilijs, victu crasso & similibus contractus.

Ab hypochondrijs procedere hunc affectum testantur, æstus in præcordijs sine siti, putatio frequens, rudis acidus flatus per superiora vel inferiora frequentiter emissus, ventris rugitus, compressio interdum diaphragmatis, anxietas, nausea, appetitus interdum insatiabilis, cordis palpitatio, tumor aliquando & retentio in hypochondrijs. Ex reliqua quæ fusi in affectione hypochondriacæ exponuntur.

Ab vtero affectum procedere indicant ea signa quæ hysterics affectiones prodere in loco dicuntur.

Prognosis huius affectus in hunc modum insinuanda est. Chronicus est iste morbus, & consummatus, si semel altas in corpore radices egerit. Humor enim melancholicus, præcipue qui per adulationem genitus est, & ad atra bilis naturam accedit, vim remediorum eludit, mitiore contentum, & à fortioribus effugatur. Vnde humor melancholicus flagellum Medicorum crux esse approbium Medicorum vulgò nominari conueit.

Recens tamen melancholia, & à causis proceratitias oriunda facile curatur. Refert enim Gal. 3. de loc. affect. cap. 7. se melancholiam incipientem solo aquæ dulcis balneo frequenter curasse.

Melancholicis hamorrhoides, aut varices superuenientes, curationem interdum afferunt, si critique à natura humores ad illas partes inferiores detrahantur. Interdum enim lymphomaticæ contingunt, & per epigenicam multiplicata, materia morbosus, indeque ad plures partes diffusa.

Soluitur etiam interdum melancholia per fluxum hamorrhoidum, & per scabiem alioque cutaneous affectus.

Quod ad curationem spectat, vnde cum morbus primam traxerit originem, duo perperam aduertenda sunt. Primum, vt totum corpus ab humore melancholico omnique aliorum humorum illic liberetur. Rarissime enim contingit, vt vnica pars hoc humore obducatur. Secundum,

ut ab hypochondria curatio præcipua semper dirigatur; quandoquidem in hepate & liene prima humoris melancholici generatio, & in istis partibus totaque hypochondriaca regione illius collectio fieri consuevit: ideo curatio pro affectione hypochondriaca propoliata ad reliqua: ut melancholia specierum curationem sufficere poterit. Vix enim hypochondria ab illis humoris redundantia, & noua eiusdem generatione liberari possunt, quin totæ in corporis consequenter ab eodem immune fiant.

Pro omnium igitur melancholiae specierum curatione sufficiunt ea remedia, quæ in affectionibus hypochondriacæ curatione propoliata sunt.

CAPVT XV.

De Catarrhis.

Catarrhus est humoris excrementi & capite in subiectas partes præternaturalis effluxus.

Est ergo symptoma tertij generis, nempe vitium in excrementis.

Cerebri substantia eximia mole prædita multo indiget alimento, ex quo necessarium copiosius generatur excrementa, concurrente potissimum frigida humidaque partis temperie: quæ fit naturalem & medicam quantitatem seruauerint, in prioribus cerebri ventriculis excipiuntur, & per choanam seu infundibulum ad glandem pituitariam transferuntur, ac per palatum quotidie excernuntur. Si vero paulo vberius redundauerint, in statu tamen naturali constituta, circa cerebrum & meninges disperguntur; commode tamen non solum per palatum, sed etiam per nares expurgantur.

Cum vero cerebrum intemperie atque imbecillitate affectum est, vel alimentum copiosius & improporcionatum recipere cogitur, quod sufficienter concoquere nequeat, magis fit excrementorum proventus. Ad hoc cerebrum (ut inquit Hipp.) tanquam cucurbitula corpori imposita, humores & vapores a partibus inferioribus attrahere non desinit: hinc non parum adaugetur excrementorum stimulus, quæ quantitate & qualitate sua facultatem expultricem stimulantia & retentricem superantia, quæ data potest, riuunt immodice & inordinat: per vias & loca non consentanea magna cum corporis afflictione.

Cum igitur fluxus fit notus materiam ab vna parte in aliam in ea perpetuo, ut in omni motu, quinque consideranda sunt. Terminus à quo, terminus ad quem mouens, mobile & via per quas ipsa mouetur. Terminus à quo, est cerebrum; terminus ad quem, partes cerebri subiectas; mouens est facultas expultrix irritata, vel retentrix debilitata; mobile est humor & excrementitius; via per quas mouetur sunt ductus partium, nempe palatum, nares, oculi, aures & meatus infensiles, solum etiam vena, arteria & nervi.

In termino à quo, seu parte mandante duo causas generari consideranda sunt: vnum est earum, quæ humoris pituitosi copiam in corpore gignunt, & cumulant; alterum earum, quæ fluxum eiusdem excitant & promouent, illæ generantes consistunt frustratione facultatis concoctricis, quæ contingit vel vitio ipsius facultatis, vel vitio alimentum.

Concoctrix cerebri facultas laeditur potissimum ab intemperie, eaque frigida vel calida.

Frigida intemperies efficit, ut alimentum ad cerebrum delatum male concoquatur, & in pituitam commutetur: cum etiam ut vapores à partibus inferioribus translati sufficiens non discutiantur, sed in aequum humorem condecuntur.

Calida vero intemperies copiosius alimentum & copiosioris vapores allicit, ut non possint à natura sufficienter diflicari ac resolui.

Vitio alimentum concoctrix cerebri frustratur, cum illud vel nimia copia cerebro lappeditur, vel alienis qualitatibus infectum difficultus concoquatur. Sic frigida, crassa, & velicida alimenta immoderatus ingesta periclitè concoqui nequeunt, & crudum alimentum cerebro lappeditur. Sic

alimenta acra & vaporosa multos vapores ad cerebrum transmittunt.

His adiungenda sunt causa externa, quæ superflua humiditate caput repleat, ut autista confusio locum longus, præcipue meridianus; vitia deies & otiosa & alia huiusmodi.

Licet autem cerebrum pars mandans præcipue dici solet, non est tamen perpetuo causa fluxionis præcipua, sed plerumque fluxionis materia aliunde ad cerebrum transmittitur. Possunt enim vitiosi humores vel in aliqua parte peculiari, ventriculo nimirum hepatis, lienis, intestino, vtero aliqui collecti sunt, non solum ab ipsis ad caput vapores multi ascendunt, sed etiam ipsi humores vitiosi ad caput feruntur, & inde rursum ab subiectas partes descendunt; istorum autem viscerum vitia præcipua ad catarrhos generando idonea sunt, intemperies variae & obstructions.

Calida viscerum intemperies copiosam facit anathymia, sine qua velut in alembico destillationis generatur; frigida vero, propter concoctionis defectum, humores crudos generat, quæ data occasione ad caput transferuntur.

Obstructions vero partium infimi ventris liberam excrementorum expurgationem impediunt, unde fit illa sensim cumula, cum liberum exitum non inueniant per vias naturales & ordinarias ad superiora relinunt, & ad cerebrum transferantur. Ad hoc autem opus eo modo periciendum concurrere necessarium debet cerebri imbecillitas, horum excrementorum receptioni idonea, quandoquidem, ut antea dictum est, partes robustiores ad debiliores sese exonerant: infrequentissime autem contingit, ut cerebrum sit debilius reliquis partibus, propter substantiam suam molliorem & lauiam, quæ compactis & solidioribus minorem habet resistitiam.

Causæ suspicientes sunt nimia cerebri caliditas, vel refrigeratio, aut alia quævis humorum commotio. Nimia cerebri caliditas humores in eo concretos attenuat & fundit, aëneatque refert, per quos illi fluere consuevit: talis est capitis caliditas à sole, igne, nimio capitis tegmento, olfactu aromatico calidiorum vniuersa; alioqui animi pathemate excedente.

Refrigeratio vero cerebrum comprimit & humores in eo contentos, primit, ut in spongia aqua repleta & manu compressa constricta alteratio huiusmodi frequens est, sed præcipue contingit in lubris acris natiuissimis, quando scilicet constitutio autista calida & humida, in aequilam frigidam & siccam conuertitur, vel quando aliquis loco calido egrediens aëri frigido lubro se exponit. His annumeranda est pedum refrigeratio, quæ sympathice per nervos cerebro communicatur.

Prædictam cerebri compressionem à frigore factam multi negant, quia frigus humores densat & incrassat, minusque fluidos reddit. Neque quadrate videtur exemplum spongiae aqua replete, quæ aëri expocita nullo modo comprimitur.

Verum hæc sententia ab Hippocrate dicitur lib. de locis in homine, veritatem consentanea est; Fluxiones inquit, propter frigus sunt cum caro in capite & vena tunc. fuerunt enim horum carne & ad angustia permeantes, adstrictioneque excludentes humiditatem expriment. Et simul carnes ipsæ contrahuntur ad angustia permeantes, & capilli foris erecti sunt, vapores simul undiqueque foriter compressi: quod quod igitur unde exprisum fuerit, ad ipsum quocumque contigerit, sunt.

Ex quibus constat rationem & compressionem partium à frigore fieri, in deque humorum exprimi manifestum est.

Neque oblat densatio humorum & incrassatio à frigore facta (supra propoliata; siquidem hæc locum habere potest quando totum corpus sensim & æqualiter refrigeratur. At cum à frigore lubro irrumpente partes externæ offendantur, tunc ille lubro coarctantur, & humores intus coercitos expriment.

Multo minoris est efficacia, quod de spongia dicebatur; eam nimirum à frigore acris non exprimi. Alia enim est ratio partium viuientium, quarum calor & spiritus ad frigoris sensum refugiant, & partes ipsæ delinunt consequenter coarctantur, quod in spongia aqua repleti non potest.

Attamen conficere oportet non hunc vocem esse modum, quo fluxus a frigore excitatur. Et enim refrigeratio pedum catarrhum inducit, intemperie frigida cerebri communicata per nervos miffus, qui ab eo ad pedes deferuntur per spinas medullam; alia autem refrigeratio intimas cerebri partes petit, non vero externas ut frigidas aeris, caput immediate afficiens, facere consuevit. Ideo potius exultantiam est in hoc casu retententem cerebri facultatem debilitari, eo refrigerato ut non possit humores superfluos in eo contentos, (si quidem illi copia luxuriant,) amplius retinere, sed eisdem effluere patiatur.

Est & alius modus admodum efficax & frequens, quo catarrhus a frigore generari consuevit, nempe pororum externorum conspicio, eo praeteritum tempore facta, quo maxima fieri solet per corporis habitum diaphoresis, unde fit ut ex calefactis, frigida aeris subito incurrentes, catarrhus maxime afficiantur. Sic in primis autumni frigoris catarrhi maxime fiunt, quia per aestus decursum habitu corporis rarefacto, & poris valde aperti, multa fit per transpirationem infensilem excrementorum dissipatio, quae si derепente, consilictio corporis habitu, habeatur, vapores & humores in centrum cerebri & corporis repercussu fluxionibus materiam suppeditant; ita ut circa autum initia non solum catarrhi contingant, sed etiam copiosa fiat in omnibus fere hominibus icterica materia per urinas excretio, & in nonnullis per alium, unde alii fluxus dictis temporibus frequentes esse consueverunt.

Si quis vero quaesierit, cur per totum hyemis decursum catarrhi non persequerent, cum perpetua fiat a frigore ambiens pororum & exteriorum consilictio, respondebimus naturam per alias vias superfluitates expurgare hyemis tempore magis quam per diaphoresim, nempe per alium, urinas & supra.

Quam copiosa autem fit evacuatio illa quae per infensilem transpirationem fieri consuevit, luculenter docetur a Sancto, in libro de Stase medica, ubi dicit, perpirationem infensilem esse longa pleniorum, quam omnes curationes sensiles simul viuas, ita ut si cibis & potus viuis diei fit ponderis octo librarum, transpiratio infensilis ad quinque circiter libras addendat. Curiosa & laboriosa sit hae circa transpirationis mensuram speculatio, quantum lucem in morborum causis inspiciendis, eorumque curationibus insinuandis, afferre valeat, perioribus & solertioribus quibusque iudicandum relinquo.

In parte recipiente consideranda est imbecillitas, vel alia quaecumque dispositio fluxioni recipiende, vel attrahende idonea. Ratione imbecillitatis vulgarissimum est Medicorum axioma partes robustiores in debiliores perpetuo onus superfluum deponere, sicut in Republ. Magnates & potentiores in debiliores piebem grauius onera deponunt.

Imbecillitas vero partium, vel insita est & natura, vel adventitia. Insita imbecillitas pendet a molitie & laxitate partium, unde glandulae & pulmo fluxiones facili recipiunt. Adventitia vero imbecillitas fit ab intemperie vel solutione continui.

Frigida intemperies calorem natium debilitando facit, ut pars minorem habeat resistentiam, siquae facilius humorem influentem recipiat.

Solutio continui partem etiam debilitando eam fluxioni recipiende magis reddit idoneam. Hinc ortus est cautiorum vius, quia parte vicere debilitata humores ab aliis partibus eo decurrunt. Sic etiam pulmo in phthisi viceratus humores a cerebro & toto corpore influentes recipit.

Inter alias vero dispositiones, fluxioni attrahende idoneas, calor praecipue annumerandus est, unde videmus partes inflammatas copiosius humores attrahere. Sic etiam in phthisi non solum propter vicus, sed etiam propter calidam pulmonis intemperiem humores copiosi a capite proficiuntur. Vnde Hip. de morbis agens de phthisi fit loquitur: Pulmo a calore ad se trahit puritatem ex toto corpore, & maxime ex capite. Caput vero calefactum ex corpore, hanc praesentem substantiam exprimit.

Vis, per quam humores feruntur a capite in partes subiectas, duplices (ita utrumque interius, & externe. Interne sunt, cum e partibus sub caluaria contentis, potissimum & vena-

trialis cerebri humor defluit per vias interiores, & pro natura partium; ad quas deferuntur, vario morbo variaque symptomatica producit, quorum nonnulla propria nomina sortita sunt, iuxta vulgares illos verficulos Scholae Salernitanae.

Si fluxus ad pedes dicatur rheuma, catarrhus, si ad faciem, & brachia, si ad nates, esse corporis.

In pedus delinente humore, afflicti generis nomen retinet, ad facies vero & alperam arteriam brachii, seu ratiocinatio generatur, fit vero ad nates defluit, non solum coramulata etiam os, namque & polyum efficit, si humor infignior est.

In aliis etiam partibus varios producit afflicti: in natis torporem, paralysin, convulsionem, tremorem, in auribus surditatem, tumorem, in oculis ophthalmiam, lacrymas, cecitatem, in vasa tumorem, laxitatem, vicus, in gutture anginam, in pectore & pulmone pleuritidem, peripneumoniam, tussim, asthma, hemoptoen, phthisim, in ventriculo vomitum, inappetentiam; in testibus diarrhoeam & dysenteriam, ita ut maxima morborum corpus humanum infestantium pars a capite ortum ducere iure merito censetur.

In venas etiam cum sanguine humor a cerebro defluit, unde febris catarrhalis generatur, quando scilicet natura ad humoris superflui expulsionem acris commouetur, unde commoti vehementer spiritus accenduntur, & febrem Ephemeram efficiunt, hinc catarrhus inter febres Ephemerarum causas reuocatur. Sic autem inflammationes arthritides, aut Erysipelas eruptionem, tales febres sepius contingunt.

Externae autem vias, per quas humor a capite defluit, sunt illae, quae caluariae adiacent, & sub cute continentur; unde censuit Celsus, inter carnem & cutem humores ut plurimum deferri, quamvis etiam per continuitatem multorum membrorum & nervorum, tum etiam per venas & arterias defluere soleant in oculos, dentes, maxillas, ceruicem, scapulas, brachia, articulos & alias partes externas.

Differentiae catarrhi nonnullae ab authoribus proponuntur, quarum praecipuae sunt, quod alius dicatur serinus, alius suffocans, alius epidemicus.

Catarrhus serinus ille est, qui sua acrimonia pulmonem exulcerat, & tamen inducit, siquae ab humore acri & salso in hepate seruido genito, & in cerebrum translato, unde in pulmones propellitur. Suffocans vero catarrhus fit, quando fluxus in bronchia pulmonis confertim irritat, & subinde renouatur, unde suffocatio impendit periculum. Catarrhus denique epidemicus maligna qualitate praeditus est, & populariter grassatur, a viro aeris dependens.

Diagnosim huius affectus ad tria dirigitur, subiectum, morbum, & causam.

Subiectum vel corpus catarrhis obnoxium indicant ratione corporis & capitis textura, faciem aeri frigido, vel calido penetrationem praebens. Tum etiam eadem textura nimis densa, liberam transpirationem impediens: cerebrum frigidum & debiles vapores ad se transmissi discutere non valens vel proprium alimentum sufficienter non concoquens, cerebrum item calidum vapores copiosos attrahens ventriculi & hepatis & vasa, ut vnum sit calidum, alterum vero frigidum.

Signa morbum indiciant, vel imminentem praenuntiant, vel praeteritum offendunt.

Imminentem catarrhum praenuntiant causae praedictae, sed magis praecise capitis grauitas, sensum haecetudo & torpor, somni longioris, stertatio frequens, emunctio narum, & exputio solito copiosior, alij legitime & illatum copia.

Praeteritum vero catarrhi indicia manifesta sunt. Humor enim a cerebro delinens vel manifeste percipitur, vel tormentibus ac doloribus in partibus quas inuadit, satis manifestatur.

Signa causarum satis etiam conspicua sunt. Si enim ab humore frigido catarrhus excitetur, aderit sensus frigoris, facies pallor, sapor puritatis dulcis, ructus acidus, materia viscosa vel aquosa, & in vniuersum temperamentum corporis peruersum.

Calidum verò humorem diffillantem offendant rubor faciei, sinus, lallemus, vel acrimonia lenius in ore, inflammationes dolores & vicia in parvis affectis & temperamentum totius corporis biliosum.

Fluxio verò externa ab interna dignoscitur, quod in illa dolor magis externus fit, impetum sub cute verticis, ubi interit tumor mollis percipitur, si prius vero pilorum insertio dolorificata est, sæpe etiam agri humorum descensum per partes exteriores cum dolore, calore aut frigore perleniunt.

Prognosis huius affectus à Cornelio Celso eleganter proponitur his verbis: *Si ex capite in naves diffillat humor, leve est, si in faciem, perius, si vero in pulmonem, pressimum est.* Hippocrates vero in valde senibus catarrhum difficillimè concoqui senerat.

Vbi magna humorum copia redundat, siue ea à plethora sit, siue à cacochymia, peticulofus inducitur catarrhus; metuendum enim est, ne afflatum irritum copiosus humor suffocationem, aut graue aliquid aliud malum inducat.

Huius affectus curatio duplex insititenda est, una quæ frigidum catarrhum, alia quæ calidum respiciat.

Tota catarrhi frigidi curatio in eo consistit, vt materia peccans præparetur & euacuetur, & si ad præstus aliamque partem insiliat, reuellatur, aliisq; motus inhibeat; tandemque interperies cerebri corrigatur.

Primo itaque si materia copiosa sit, aut nimio impetu ruat, & metus sit ne à reliquo etiam corpore affluat, præsertim si hepar sit calidum, (contingit enim non raro, vt catarrhus obnoxii habeant cerebrum frigidum, & hepar calidum) sanguis mittendus est alid parci manu. Si verò materia sit pauca, & lentè moueatur, ætas vero senilis, aut temperamentum hepatis minuat calidum, vnde nulla an sit suspicio humorem aliunde cerebrum luppeditari, vna sectio omittenda est.

Materia verò peccans primum impedienda est potione aut pilulis, vel alio quouis medicamento purgante, ex his, quæ in frigida cerebri interperie fuerunt propostæ.

Mox reliquæ humoris præparandæ apozemate dicto loco descripto; aut si nimia humoris exagitatio non metatur, apozemata purga poterit insiliri.

Ac tandem pilulis fortioribus, aut alio cathartico integra purgatio erit abolenda.

Si catarrhus admodum contumax fuerit, ad vomitoria consurgendum est, quæ illius materiam poterit eradicare.

Colocynthis ad cerebrum potenter expurgandum est, quæcillima est, sed in nimio amatore insensibilis est, chemenique alius effoproatio Corrigitur verumque infusio in vrina, sic enim amaritudinem deponit, & terè insipidum remedium euadit, tum vehementia illius, ira infringitur, vt ad 3. iuror exhiberi valeat; siq; excellens ad omnes capitis morbos à causa frigida oriundos remedium.

Interdum verò contingit, vt humores excrementii à partibus inferioribus ad cerebrum subleui, catarrhum efficiant. Motum autem illum præternaturalem nascuntur, obstruunt meatibus ordinariis, per quos humores illi expurgari solebant. Et tunc temporis opportunissimè curatur catarrhus apertione viarum, tum etiam blanda, mati, & continua purgatione; quia humores à vasis ad partes inferiores decutuntur, siq; motus contrarius sensum conglaciatur.

Huiusmodi autem purgationes blande fieri possunt, per decocta, vel insula, ad multos dies vsurpata. Interim tamen torborantia medicamenta non erunt omittenda.

Ad reuersionem verò admoventur cucurbitule, & vesicatoria scapulis & ceruici, tum etiam cauteria occipiti, vel brachio. Zaccutus Lusitanus lib. 3. *Præcis admirandis* p. 160. cauterium turo aëris, tanquam præstantissimum, ab omnes destillationes à capite manantes, remedium plurimum commendat. Et nos in fluxionibus, oculorum præsertim, à vabiles effectus vidimus. Errhina, sternutatoria, & masticatoria, & masticatoria erunt vsurpanda; ea tamen adhibita cautione; vt quando catarrhus in fauces, pulmones, aut ventriculum decumbit, errhina & sternutatoria tantum vsurpentur; quando verò in oculos & nates insiliit, masticatoria & apophlegmatismi.

Horum omnium formulae capite predicto inseruntur præ-

posita. In his tamen aduertendum, quando materia tenuitatis cuiusdam particeps est, non fortius reuelentia vsurpentur: his enim humoris impetus ad petrus & pulmonem, aliaque partes adaugeri potest; sed nonnulla intransigentia, aut humoris impetum cohærentia erunt admittenda, vt rosæ rubræ, mastiche conandum, nux molicata, aliaque in catarrho calido silius proponenda. In hunc sensum errhinum in sequentem modum componi poterit.

℞. Aquæ maioranae ℥i. succi betonicæ 3. sem. nigellæ puluerat. 36. nuc. molicæ 3. Fiat errhinum. Pro ditioribus addi poterit molicæ & ambre grisea ana gr. ij. Vel

℞. Ligni guaiacini limati 3. aquæ purg. lb. Infundantur per noctem supra cineres calidos deinde coquantur ad medietatem usque, columpæ addendo sub finem maiorana & rosarum rubræ ana P. ij.

Sic etiam masticatorium, subtenui existente materia, vel fiet ex mastiche sola, vel in hunc modum.

℞. Nucis molicæ 3. mastiche, gummi arabici, ana 36. Redigantur in puluerem, & cum aqua rosar. fiat trochiscus masticatorij.

Præstans itembutatorij componitur ex hellebori nigro, & sacchari partibus æqualibus, quod cerebrum poterit expurgat.

Extractum nicotianæ cum aqua vite paratum, lingue impotens ad pili magnitudinem, magnam pituitæ copiam insilut apophlegmatismum per os educit. Venam si nimia copia vsurpetur, aut si in ventriculum effluere sinatur, vomitum excitat etiam vehementer.

Supra dictum est cauteria brachij, occipiti, & ponè atres insilut plurimum conferre; quod etiam efficaciter præstant posteriori parti ceruicis & inter scapulas admodum, quæ hodie in maximo vsu sunt, & à præstis nostris passim vsuantur. Nouus etiam locus à quibusdam inuentus est, nempe in ceruice prope venas ingulares, in muscularum interstitio; & huius cauterij beneficio catarrhus inueteratus tandem efficiens in duobus curatus est.

Tandem poli conuenientes euacuationes, cerebrum roborantia & e' succantia tunc interna, quàm externa, erunt vtilissima, vt opiatæ, pulueres, cucurbitæ, iussinus: prout in curatione frigide interperies cerebri descripta fuerunt.

Notandum autem est, opiatæ prædictæ, aut alijs similibus, in catarrhi curatione consensum rosarum, nucem molicatam, & thus alibi, vtiliter admisceri.

Decoctum ligni lenifici, in modum decocti sudorifici vsurpatum, cerebrum exsiccat, & fluxionem cohibet.

Præterea sequentes moruli ad hunc vni vtilissimi sunt.

℞. Sem. coriandri preparati 3. nucis molicæ. thuris, ana 3. iij. glycyrrhizæ, mastiche, ana 3. ii. cubebar. 3. i. conferuæ rosar. rubræ 3. i. sacchari albi in aqua rosar. dissoluti 5. x. Fiat confectio in rotulis, pond. 3. iij. Capiat vnam mane & vespere.

Trochisci sequentes valde commendantur à Solenandro conf. 10. feci. 4. quos ab antiquis, tum Græcis, tum Arabibus inuenerunt.

℞. Thuris masculi, succi liquoris ana 3. opii. croci, myrrhæ, ana 3. i. cum syrupo papau. forma trochiscos, vel pilulas virgine catarrho exhibendas per interualla. Dosis erit 3. ii. vel 36.

Tabellæ etiamnum sequentes vni esse poterunt.

℞. Puluer. electar. diambrae, & diamolli dulcis, ana 3. i. succini albi 3. i. ol. anisi gutt. iij. sacchari in aqua laudulæ dissoluti 3. iij. Fiat tabellæ pond. 3. iij. Capiat vnam mane & sero.

Inter remedia interna, capite de interperie frigida cerebri descripta, summæ est efficacie ad catarrhi inueteratæ curationem, balsamum cephalicum ibidem poli nptatum descriptum, quod insu assuui poterit, & in narium canicinis inuinit.

Lac sulphuris, & flores eiusdem ad catarrhum exsicandum maxime laudantur à Chymicis, cum etiam Galienus in tabellis flores sepiissime vsurpat.

In recenti catarrho aqua nucum cum hy dromelicæ exhibitæ hora somni per triduum, cum valde inuinit.

Ad colupendum catarrhum vtiliter admoventur sincipiti talia

falo cataplasmata ex fermentis 3.ij. & carabes 3.ij. compoſitum. Si verò ager caput radere noluerit ſupra ipſum capitulum aliqua ex parte detoniſum, facculus ex chamæpit. & carabe conſectus apponi poterit.

Præter ſuſcitum prædicatum, qui ex gummi Tacamahaca ſit, lumme eſt efficacia: catarrhum enim exſecat, cuiusque motum cohibet, neque vehementer eſt illius odor, ita ut conſeque ægrotantis eo ſine moriella per ſeundi valeat.

Commodiſſimum etiam eſt caput exſicare facculus ex ſurture, mulio, ſale ſolis ſalutis, betonica, ſtechedas; ſem. feniculi, aniſi & ſimilibus.

Denique ſi affectus ſit continuus, omnia coueniens remedia, quæ pro frigide cerebri intemperie curatione fuerant propoſita.

Caldus catarrhus curatur remedijs materiam peccantem euacuantibus, inſcrallantibus & reuellentibus; tum etiam partium mandantium & recipientium intemperiem corrigentibus.

In hunc finem primò phlebotomia inſtimenda eſt: cætera conſentiant, qua humor fluens reuellitur, cuiusque acrimonia temperatur.

Deinde humoris eiſdem portio educenda eſt blando cathartico, quod humores nullo modo commoueat, in hunc aut ſimilem modum.

℞. Rhab. electi 3.ij. myrobala citrini 3.ij. amygdal. dulc. conſecti 3.ij. ſantalii citrini 3.ij. Inſiſtantur in aqua lactuæ & portulacæ. In expreſſione diſſolve manne granat. & ſyrup. roſar. ſolut. ana 3.ij. Fiat potio.

Vel loco aquarum prædictarum poteſt fieri decoctio ex herbis refrigerantibus, & tamarindis, cui purgantia prædicta permixcantur.

Deinde humor alterandus & inſcrallandus eſt iulepis conuenientibus.

℞. Fol. lactucæ, portulacæ & plantag. ana M. j. ſem. quatuor frag. mai. & papaueris albi ana 3.ij. ſol. violar. nymphaeæ & papaueris rheodas. ana P. j. Coquantur ad 1/2. In colat. diſſolve ſyrup. violacæ, & roſar. ſecar. ana 3.ij. Fiat iulep. pro tribus doſibus, in die ſumendis.

Vel loco decocti, aquæ ſtillicitiæ prædictarum herbarum, vel emulſiones quatuor ſem. frig. idorum mai. ſubſtitui poterunt.

Deinde purgatio paulò fortior viſurpanda, addendo purgantibus prædictis ſennam catholice diaphanum, & ſimilia.

Leue ac blândum remedium inſcrallans, humorisque acrimonia demulcens, delinuntur ex vitellis ouorum recentium, quorum duo in vncijs quique vel ſex aquæ fontis diſſoluantur addendo ſacchari albi 3.ij. Coquantur parum, ſine ebullitione ſemper mouendo, & capiat calidè quantum ferre poterit, manè & ſerò per triduum.

Ac tandem maiori humorum inſcrallationi & fluxus cohibitioni incumbendum eſt, quod fiet ſyrupo ſequenti.

℞. Syrupi violacæ & de roſ. ſiccis, ana 3.ij. ſyrupi de papaueri 3.ij. Deur ex cochleari 3.ij. hora ſomni.

In eundem finem viſurpari poterit opiata ſequens.

℞. Conſerue roſar. antiquæ 3.ij. pulueris electar. diatr. frig. 3.ij. boli armeni loti in aqua roſar. 3.ij. Cum ſyrupo roſar. ſecarum, fiat opiata: capiat ad magnitudinem anellane hora ſomni.

Hordeatum ſequens vtiſſimum etiam eſt.

℞. Hord. mundat. q. ſ. Maceretur per horas vj. poſtea coquantur perfectè & traiciatur. Deinde accipe amygd. dulc. excoct. 3.ij. ſem. cucub. mundat. 3.ij. ſem. melon. 3.ij. papau. albi lactucæ. ana 3.ij. Contuſis omnibus cum aqua hord. electat. lac. quod cum ſibi pulpe hord. permixtum coquantur parum, addendo ſacchari portionem. Bibat 3. x. aliquot matutinis ſuper dormiendo, & nonnunquam in introitu lecti. Tum etiam trochiſci ſequentes in ore frequenter erunt detinendi.

℞. Gummi tragachanthi & arabici, ana 3.ij. boli armen. terzæ ſigillat. lotor. in aqua roſar. ana 3.ij. ſem. papau. albi, ſucci liquiritiæ. ana 3.ij. ſacchari penidiat. 3.ij. Cum mucilagin. cydon. extractæ cum aqua roſar. ſanar. orbiculi parui, quos diu noſcule in ore detinet.

Spiritus ſulphuris & ytrioli ad gutt. xl. vel iv. exhibitus

manè, & ſerò cum liquore idoneo, contra omnes fluxiones magnas vires habet, præſertim verò eas quæ à calida viſcerum intemperie ducunt originem. Poteſt etiam in minori doſi potui permixti, quia cum eo venas omnes peruadit, & motum humorum cohibet.

Cryſtallum etiam minerale ad eundem vſum iulepis, aliſque remedijs admixci poteſt.

Hæ nihil proſcientibus neceſſitas cogit vti narcoticis. Inter quæ principatum obtinet laudanum opiatum, ad gr. iv. vel v. hora ſomni exhibendum. Vel 7 ſrupi de papau. 3.ij. vel 3.ij. exhiberi poterit. Hæc ab initio morbi viſurpata miranda præſtant. Eandem habet vim theriaca recens ad 3.ij. vel 3.ij. noſcule exhibitæ.

Benedictus Fauentinus ſequentiſ pilulis vſus eſt in catarrho ſallo, ſchicſſimo cum ſuccellu.

℞. Succ. glycyrrhiæ 3.ij. aloes lotæ 3.ij. pilul. de cynogloſ. 3.ij. Cum ſyrup. violacæ. fiat maſſa pilularum, de qua capiat 3.ij. hora ſomni Trochiſci Solenandri ſuprà deſcripti erunt etiam vtiſſimi.

Huius vſui etiam maximè contere poteſt diacodium aromaticum, in curatione phrenit. deſcriptum.

Interim reuellenda eſt materia fluens per clyſteres, cucurbit. ſectiones & ligaturas extremorum, omniumque potentiffimè per veficatoria, poſteriori crurici parti admotæ: denique cauterium occipitio vel brachio, ſi catarrhus ſit diuturnus.

Ad caput etiam roborandum, fluxionem retinendam, & cuiusque reliquis abſumendis conueniant pulueres, cucurbit. & emplatra.

℞. Succini albi, ſandarac. Arab. maſtiche, benioini, nucis molchatæ. ana 3.ij. thuris, gran. kermes, & roſar. rubrar. ana 3.ij. ſantalor. omnium, myrtilli & balauſi ana 3.ij. Fiat puluis, qui inſpergatur capiti hora ſomni, manè pedine decutiendus.

℞. Gummi iuniperi 3.ij. roſar. rubrar. P. ij. myrtilli 3.ij. mæcis, nucis molchatæ. ana 3.ij. thuris, ſem. pæoniæ, cortic. papau. ana 3.ij. nuc. cuprelli 3.ij. Pulueriſentur, & cum ſucco panis cocticiæ ſindone rubra, fiat cucula interperunda, perpetuò geſtenda.

℞. Malliche, cortic. thuris, ana 3.ij. ſandaracæ, coralli rubri, roſar. rubrar. myrtilli baluſi cortic. granat. ana 3.ij. adani 3.ij. ceræ & olei roſacæ q. l. Fiat emplatrum, applic. ſuturæ coronali.

Quia verò huiusmodi catarrhus à calida pierumque hepatis intemperie ducit originem, idè remedia quæ illius intemperiem emendant, erunt etiam viſurpanda.

Denique hoc in primis notari digniſſimum eſt, quod etiamnum ſuprà in catarrhi frigidi curatione propoſitum eſt, quod nimirum non raro humores excrementi, & partibus inferioribus ad cerebrum ſublatis, catarrhus efficiat, & motum acquirat præternaturalem obſtructis meatibus ordinarijs, per quos expurgari ſolebant. Et tunc temporis opportunè curatur catarrhus aperture viarum, ſimulque blanda & continua purgatione per ſiſcula, aut alia decocta, ad multos dies inſiſtenda.

CAPVT XVI.

De Doloris capitis.

Cephalagiæ nomen per omni dolore capitis generaliter viſurpatur in ſpecie, & magis ſtrictè recentem capitis dolorem ſignificat: cephalæa verò mucteratum, & hemicrania eam, qui dimidiam tantum capitis partem occupat.

Sunt & aliæ doloris capitis differentie, quibus diuiditur in internum & externum, ſympathicum & idiopathicum; & ex his denotat alius pungitius, alius tenſiuſ, alius grauatiſ, alius pulſatoriſ.

Dolor capitis internus in meningibus locum habet qui profundus eſt, & ad radices oculorum pertingit; externus verò in pericranio ſitus pilorum radices inuerti non ſinit, & ad capitis compreſſionem exacerbat. Hæc eſt Galeni doctrina, quam proponit 3. de loc. aff. cap. 1. & lib. 4. de comp. med. ſecundum locos cap. 3. vbi diſcrete aſſerit, dolorem capitis

G g inter.

internum hoc peculiari signo distinguat: externo, quod in interno dolor ad radices oculorum pertingat, in externo vero minime. Et rationem reddit, quia tunica oculorum a ceteris meningibus prodeunt, unde fit, ut dolor eo vique facile propagetur.

Autem Fernelius huic doctrinae contradicit lib. 5. *de Febribus* cap. 1. asserit, quod externi etiam dolores ad radices oculorum pertingant, quod pericranium, cui insident, oculorum causam pertingat.

Huic respondit Rondeletius lib. 3. *meth. med. cap. 5*. ad dolorem pericranii oculi causam non dicit, licet illud eo vique pertingat, propterea quod pericranium dolor a frigore externo vixitum uniatur, quia pars frigida a simili facilitate patitur, nulla ratione. Illud autem frigus ad oculi causam non potest peruenire, quia a calore oculorum, i. spiritibus & sanguine consumitur. Si vero interdum ab alio, aut simili causa dolor capitis externus excutitur, tunc eadem capitis tantum affici astat, non autem pericranium in prolongatione loco situm.

Verum haec Rondeletii doctrina non omnem omnino tollit difficultatem. Licet enim omnia, quae ille adduxit, ipsi concederetur, tamen si dolor excutitur ab aliquo tempore iuxta pericranium collecto, aut ab alia causa communis solentis, nulla ratio erit, cur dolor ad oculi causam non feratur.

Dicere possumus ad Galeni defensionem, duplici ratione hoc signum fuisse a Galeno propositum. Primum, quia membrana, quae a pericranio ad oculi causam fertur, est hebetioris sensus, atque ita non comparatur dolori pericranii, nisi admodum obusit, tunc vero oculi, quae prodeunt a meningibus sunt, exquississimi sensus, atque ad id infingit docuit. Deinde membrana illa, quae a pericranio oritur, non ita intrinsece & profundè attingit oculum, verus nec, ut praefatus sum, tunc, quae a meningibus procedunt. Unde fit, ut dolor ille externus non possit facile extendere ad fundamēta oculorum, vixque pericranium.

Idem pathus est dolor flabulis cuti & permanenti, nec aliarum partium sequitur affectus: Sympathicus vero ab alterius partis affluu exprodeat, ut, dum affectus ille in caput intrinsecus, capitis interiorumque videri temeretur, conquisit, ille autem sympathicus dolor fit vel ex cunctis totius corporis, sicut in febribus contingit, vel determinate partis, puta ventriculi, hepatis, licet vel vteri.

Quoniam vero fit illa pars, quae dolorem capitis communiceat, ex cuiusque partis affectu proptius indicis facile innotescit.

Dolor pungitius ab acris & bilioso humore, vel vapore membranas feriente excitatur. Granatius a copioso humore, crasso, litigido, putrida scilicet, vel melancholica, partes sensiles comprimentis. Tensius fit a flatibus aut humoribus nutrioribus intra membranas seles infinuantiibus, easque distendentibus. Pulsatorius denique fit a tenui biliosoque sanguine, vel spiritu redundante; quo turgentes ac distenta arteriae vehementius pullant, membranarumque concutunt, sique partes vicinas percutiendo sensum pulsationis in ipsis efficiunt, ut Iulius docetur a Galeno 2. *de loc. aff. cap. 3*.

Fit etiam a supradictis causis principium doloris capitis satis declaratur, quae in vniuersum ad solutionem continuam, tanquam ad causam proximam & immediatam, referuntur. Quaeque igitur continuam solutionem manifestant, vel occultam insere pollunt, ea capitis dolorem etiam inducere apta nata sunt.

Signa etiam diagnostica tum specierum doloris capitis, tum causarum eas prodeuntium, quae superioribus octum possunt, ut prognostica tantum exponenda supersint.

Dolor capitis externus perpetuo minus periculosus & curatu facilius est interno.

Dolor capitis in febre acuta cum urina tenui & alba, periculosus significat enim raptum materiam biliosam ad cerebrum unde phrenitidis periculum impendit.

Dolor capitis fortis, sub quo delirium, nulla subsequente euacuatione, aut morbi immutatio, lethalis. Significat enim facultates animales abolutionem, quae obiectum doctificum amplius non leniat.

In vehementi capitis dolore extrema frigiditas malum;

ex doloris enim vehementia magna fit caloris retractio ad partem affectam unde periculum imminet inflammationis, Quibus ex morbo partium inferiorum consuecentibus dolor capitis vehemens superuenit, si non praecedat excretio manifesta, in cerebro futurus est abiectionis; materia enim morbifica translocationem ad cerebrum significat.

Qui in doloribus capitis eruginosa vomunt, & cum farditate vigilant, i. cito vehementer insunt. 1. *Perith*. Significat enim bilis adfluxum in cerebro collectionem, quae ventriculum in consensum trahit.

Capitis dolores & sonitus aurium sine febre, aut vertigo, aut furditas, aut manuum torpor, imminet enim apoplexiam, aut epilepsiam significat. *Hipp. in Coelis*. Eunt enim illa symptoma, quae praeiungit crassa copia in cerebro cumulat;

Vtero gerentibus capitis dolores soporosi cum grauitate hinc, malis. 1. *Perith*. Significant enim humorum transfluxum ad cerebrum, qui cum multi & copiosi sint in muliere grauida ob purgationis mensurae defectum, hinc grauius malum mensurandum est.

Dolor capitis, qui a morbi principio non apparet, agitato & perturbato corpore obotus, imminet enim crasum per huiusmodi agitatam vomitum significat.

Cum igitur capitis dolor tum a frigida causa, tum a calida dependat, ad vtriusque ablationem curatio dirigenda est.

Ad priores curacionem materiae pituitosa primum euacuanda est conuenienter praeparatione adhibita, ut superioris capitis dictum est. Deinde intemperies cerebri frigida corrigenda, ac reliqua humoris distudentis sacculus superioris eadem capite propoliis, vel iis, qui in frigida cerebri intemperie viciis sunt. Quibus calentibus conficitur caput deratum manu, per se, quod horam singulis diebus datur. Doloris causa si sit in hauria.

Potest insensio capitis per facculos, inpergatur pulvis sequens, utone lana superposita.

1. Nucum, chat, capophylli piperis, pyrethri, ana 3. ss. fol. saluaz, bacc. charum lauri, ana 3. ss. sem. anapim, naturi, consulant. 3. v. Fiat pulvis, caput inpergatur, ut dictum est, & mane percat, ante vsum lacuclorum, ut pulvis parat inpergatur exeat.

Urina etiam cruet erithina, lemmatoria & apoplexia, multum quorum descriptiones supra fuerunt propositae.

Urina etiam erit, i. nupus magistralis, in hunc modum componitur.

1. Rad. ligni guaiaci, & rad. chin. in taleis diuisae, ana 3. ss. Intundantur per horas xii. in th. v. aquae fontis. Bulliat ad medietatem consumptionem, addendo sub hac fol. verbena, M. j. rosmarini, & maior ana P. j. In colatura, distille sacchari albi lb. ss. Coquantur in syrumpum, & antequam sit perfectus coctus, in eum conijce in nodulo, semine mundat. 3. ii. agarici recentis trochiscati 3. ii. hab. opt. 3. ii. Capiat 3. ij. vel 1. ss. semel in septimana.

Conferunt etiam plurimum pulvis sequentes, quae in Italia olim magno in pretio habita sunt tempore Eustachij Rudij, in Academia Patanae professoris Praedice primarii, quae rum autor praedicabatur, & pro magno secreto habebatur, adeoque vni diuinitat Pharmacopoei conficienda dederat, ne ab imitatore eorum delirio, quam tamen mutuas fuisse a VV. Cechero, qui eam proponit ex Adermaceo. Illa autem talis est.

1. Colocynthis 3. v. agarici troch. di. j. bell. bor. nigri, turbit. ana 3. ss. aloes 3. ss. species, diarrhoe. abati 3. ss. Condundant purgantia & ponantur in vase vitro cum spiritu vini, ut octo digitos supereminet, & digerantur per octo dies in loco calido, postea adiciatur pulvis diarrhoe. in insundantur adhuc per quatuor dies. Mox coqueatur omnia, & forte exsperantur. Liquor expressus distille in balneo, donec in fundo alembici extractum reodeat ad eam crassitudinem, quae pilulis efformandis idonea sit, quarum dosis est 3. j.

Sequentes vero pilulae Fernelio tribuuntur, quarum tantum vni experiendo cognoscere astringit, vni nullam, cephalalgiam aut hemiparesin ostendit, quam non curant.

1. Aloes opt. 3. ss. pulv. ciclar. de gemmis, trium fantal. rosae.

tolar. ruber. ana gr. iij. Cum syrupo abſinthij, & violar. fiat maſſa. Detur 3. ybis in hebdomada hora; vel ij ante cenā.

Ac deniq; conſumaci doloze & inueterato omnia conuenientia remedia, quæ pro curatione frigide intemperiei cerebri fuerunt propoſita. Inter quæ non infimum locum obuenit emplaſtra epipſatica. Quibus etiam non conſentientibus, nonnulli aſui ſunt capiti admoouere & emplaſtrum de Virgo cum mercurio, quo nullius pueriſſis humoribus per ſputa euacuat; inueteratos capitis dolores interdum citoſe allevare.

Theriac ſulphureus, ac bituminofus in hoc caſu efficaciſſimus eſt, tum balneo, tum lotione capitis.

Plurimum etiam conſerunt in dolore inueterato, decocta ſcorſonica, quibus multos fuiſſe liberatos, apud celeberrimos Authores legere eſt.

Quibus non contentibus, Mercatus ad ſtibi yſum auct conſulere, eumque cum elogio commendat. *1. de intern. morb. curatione cap. 14.* In dolore autem diuturno plus præſtat capiti frequenter roborare, quam pertinaciter vacuati onibus inſiſtere. Ideo conſerunt pulueres & cucuriz, aliæque topica, in frigide intemperiei cerebri curatione propoſita.

Magis tamen probantur pulueres, quia virtus pilei non ita cerebri communicatur, & ex eiusdem fonte dolor excitari poteſt.

Præterea fieri poterit inuſitatio ex ol. amygd. in quo ſerpilium lauri ſola, maſtiche, ſpica, mentha, maiorana, thymus, pulegium, nux moſchata, caryophylli, & cinamomū, aut horum nonnulla bullierint, addendo, dum fit ebullitio, vini rubri parū.

Vel ſequens oleum arte chymica paratum componi poterit.

℞. Terrebith. ꝑ. maſtiche, nucis moſchata, cinamomi, ana 3. j. caryophylli zedoari. galange, ſadani, ana 3. j. ꝑ. ſucci ebulli, & cucumer. agreſt. ana 3. j. ol. chamom. & liliorum, ana ꝑ. & vini rubri ꝑ. j. ꝑ. ſerpilli variū. M. ꝑ. Pulueranda pulueretur, & conſpiciatur in retortam vitream, extrahaturque oleum, quo deſuper caput illinatur.

Oleum ſuccini ad idem eſt efficaciſſimum, eoque tempora inuenerge ſufficiunt.

Dum prædicta remedia adminiſtrantur, ab ipſo etiam curationis initio ſpecifica remedia viſurpari poterunt, quæ eſt hoc epithema.

℞. Pulv. zedoari. 3. j. aquæ betonice, verbenæ, ſambuci, ana 3. j. Millec, applicetur calide parti dolenti cum panis ſcatariis.

Inter ſpecifica doloze capitis, à quacunque cauſa oriatur, principem locum obtinet verberna, cuius aqua deſtillata, & capiti admouetur, & intus aſſumitur ad ʒ. iij. cum ſpiritus ſalis gutt. ij. Imò verò ipſa verberna viridis, de collo tantum ſuſpenſa, duos agros lanauit apud Foreſtium, cum multa remedia fruſtra viſurpata fuſſent.

Zacutus Luſitanus lib. 1. *Præxi Med. mirab. obſeru. 7. 8. 9. & 10.* quatuor proponit remedia, experimentis ibidem enarratis confirmata: oempe fonticulum in ſumma manu, hirudines temporibus affixas, apertionem venæ frontis, & iuxta canthum oculi, quorum hiſtorias diſtis locis videre eſt.

Circa illa obſervationes hæc notanda. Primò, quòd fonticulus inter pollicem & indicem admoſus, alijs elperimētis comprobatus eſt, & rebellem capitis dolorem curauit.

Secundò, in curatione quæ per hirudines fit, Zacutum non eſſe contentum duas vel tres admoouere, vt vulgò ſolet fieri, ſed decem aut duodecim circulariter temporibus affigere, vnde maxima ſequitur languinis atraſio, quæ totam materiam morbiſicam exhaurire poteſt.

Tercio, in curatione quæ fit ſecta vena frontis, notandum eſt eam veſiam biſ ſectam fuiſſe, vnde innuitur priſquam ſectionem ſatis non proſiſſet, ſed tamen præſtiti no-

ſtri raro eam operationem repetant, ſi prima vice non ſucceſſerit.

Cauſa calida doloze capitis primarium & eſſentialē efficiens, eſt languis, aut bilis. Eademque virique conueniunt remedia, ſed magis minuiſe potentia, pro maiori vel minori cauſe efficacia.

Primò igitur à phlebotomia incipiendum eſt, præmiſſo elyſtere. Maior tamen languis copia educenda eſt, cum dolor fit à ſanguine minor, bile redundante.

Deinde medicamentum purgans bilem exhibendum, eſt non ſolum quando bilis cauſe principiaſis rationem obtinet, ſed etiam quando languis luxuriat, cuius portio tenuior facile in bilem vertitur.

Si vna euacuatio materia peccans ſufficiente eduſta non videatur, repetenda erit purgatio per debita interna.

Poſtea admoventur capiti repellentia, & oxymyrrhodina, qualia in curatione premitiſis fuerunt propoſita, mitiora eligendo.

Ac conſequenter animalia recentia maſſata, aut eorum partes, ad materie morbiſicæ reliquias diſſoluendas, & doloze demulcendum, erunt viſiſſima.

In doloze capitis quæ per febres continas aſſigit, pulmo veruſcinus, & recentia maſſata animalia extracta, & calidè admoſus, doloze potentem demulcet.

Ad idem valet cataplaſma ex cucurbita coctula, vel ſemperviuo maiore plantis pedum admoſum.

Apertio ſaphene, præmiſſa ſufficienti phlebotomia in brachio, capitis doloze in febribus, ſæpe in momento fugat.

Interim reſuſſiones per cucurbitulas, tam ficcas, quam ſcarificatas, & friſtiones extremorum erunt celebrande.

Ac toto morbi decurſu, ſi alius non fit fluida, elyſteres emolientes, refrigerantes, & leniter purgantes alternis diebus erunt inſiciendi.

Tum etiam deriuatio reſtè & vtiliter celebratur poſt generales euacuationes & reſuſſiones, ſecta vena frontis, aut eadem admoſus hirtuſinus, & veficatorijs ceruici applicitis.

Dum hæc ſiunt, tota humorum maſſa erit temperanda, ialepiſ, emulſiones & uſculas, in curatione phrenitidis propoſita.

Si denique dolor valdè vrgeat, ad narcotica veniendum eſt, tam externa, quam interna prout in diſta curatione phrenitidis viſurpata ſunt.

Apertio venarum frontis, & hirudines temporibus, ex Zacuto Luſitano ſuprà commendatæ, hic etiam conſerre poterunt.

Parvus lib. 16. cap. 4. hemicaniam deſperatam arteriotomia in temporibus celebrata curatam eſſe reſert: nullamque in ea periculum eſſe teſtatur. Apertur arteria vt in phlebotomia, & languinis impetu ac ſaltu proſiliens 3. vi. detrahenda. Mox appoſitis, vt decet, plagulis deligatis facienda, & per quæ triduum detrahenda.

Eandem dicit Sotalius in vetuliſ capitis doloribus, quæ ſi miraculo conſerre. Nos etiam illius viſu atrociffimam hemicaniam curauimus, & nullum in ea arteriarum apertione periculum eſſe aduertimus.

Vulneri emplaſtrum admouendum eſt, ex thure, maſtiche, bolo armeno & pilis leporinis albumine oui ſubactis. Deinde ſalcia admouenda, qualis in vulneribus capitis conſuari ſolet.

In omni doloze capitis, à quacunque cauſa fiat, ſi alijs remedijs non ceſſerit, & doloze atrocitas ad extrema conſurgere cogat, veficatorium toti capiti admoſum, deſalo capillitio, curationem aboluerit poterit.

Cauterium ſuture coronali admoſum doloze capitis contumacem aliquando radicis abſtulit.

Multò maioris eſt efficaciz, ſi temporibus admoventur, de qua vide Poterium *obſervationum centur. 3. cap. 8.* & obſervationes noſtras publico communicatas.

males ad oculos amplius influere nequeant.

Dignoscitur hic affectus, quod oculi in statu naturali constituti videntur, nullumque vitium in ijs conspicitur, nisi quod pupilla nigrior & amplior appareat. Verum in oculorum differentijs distinguendis maxima difficultas est. Licet enim a sanguine aut pure genitus affectus, ex inflammatione, abscissa aut vulnere progreffu dignoscatur, nullum tamen signum certum dari potest, per quod impressionem ab humore pituitoso factam, ab obstruktionem distinguere possimus. Coniectura tamen id quodammodo alibi possumus, quandoquidem in obstruktionem solam, nervi optici folles oculi afficiunt. Si vero eundem nervi compressio fiat ab humoribus pituitosis circa oculorum radices & processus mammillares collectis, vel illa materia alias eam cerebri partes occupat; tunc reliqui sensus laeduntur, aut eorum nonnulli. Si vero nervos tantum opticos obstruat, materia pituitosa solito copiosior per naves excremitas, & grauitas sensus in anteriori capitis parte praesertim circa luperilia percipitur.

Quod ad prognosin spectat, hic affectus si absolutus sit, id est, si integra sit visus abolitio, ab obstruktionem nervi optici praesertim oriunda, periculum incurabilis est: quemadmodum etiam videmus obstruktionem aliorum nervorum, a quibus generetur paralysis, vix aut nunquam curari, praecipue in ijs, qui aetate proceffi sunt. Si vero imperfecta tantum sit obstruktionem, quae visus tantum immutationem non autem caecitatem efficiat, maior salus spes est, licet ea non nisi magno labore & longissimo remediorum vi obtineri possit.

Si vero hic affectus fiat ab humoribus in anteriore cerebri parte collectis, & nervos comprimentibus, facilius curari potest. Sic refert Fabricius Hildanus *obser. 19. cent. 5.* virum quendam, ex assumpto vomitorio vehementer visum amisisse, eoque eundem medicamentum beneficio recuperasse: quandoquidem vehementer vomitorij, ut humores nimium exagitati, & versus nervos opticos propulsi, eisdem comprimentes, ipsiusque ad oculos committuntur impediebant. Idem vero eodem medicamento euacuatis, nervos solutus est. Similis fere historia refertur a Sennerto de quodam ludioso, cui cum medicamentum purgans fortiter exhibitum fuisset, subito obcaecatus est. Idem etiam testatur foeminas quasdam, cum in vtero conciperent, ex nervorum opticoorum angustia obcaecatas fuisse, malumque hoc post quatuor aut quinque menses, vel tempore partus omnino desisse. Nos etiam nonnullis vidimus, qui subito in maiorem visus immutationem inciderant, vacuationibus vniuersalibus & reuolutionibus quibusdam intra quindecim dies fuisse restitutos. Ex facillime curationis coniecimus humorem non intra nervi substantiam, impadum, sed in cerebro tantum circa eisdem nervos congestum fuisse.

Ad huius morbi curationem, materia nervis impadum, vel adherens, quae obstruktionem vel adstrictionem efficit, euacuanda est. Quod fieri non potest, nisi prius vniuersum corpus euacuatur, quemadmodum docet Galen 4. meth. oculum non esse lanandum ante totum caput; neque Caput ante totum corpus.

Atque ut remedia convenienti methodo describantur, victus ratio huic morbo conveniens primum instituitur, quae quidem attenuans & moderate ficans esse debet. Ac primum aer ad calidum & sicum inclinare debet, ac sius vero frigidus nebulosus ac pluviosus, omnino vitandus. Cibi laudabiles ac boni succi viuentur, vitando eos qui crassum succum generant, tales sunt caro porcina, anserina, pilices, legumina, caseus & similia, tum etiam ea, quae vaporosa cum sint, caput replent, vel lacticia & aromata calidiora, piper minimum zinzibet &c. Panis conficiatur cum aqua tenuius aut eundem fermen perstruatur, ledulo cavendo, ne tixico, ex quo panis conficitur, solium admittit, sicque visus maxime obesse tota credidit antiquitas. Vnde apud Cominum, quae alteri visus defectum exprobrabat, illi (inquit) *verro vultus est it.* In ciborum condimentis & iusculis, viatur ijs quae extendendi vim habent, ut hyssopo, feniculo, masoana, betonica, salvia, euphrasia, ac praesertim nucis moliata, quae cerebrum robo-

rat, visumque clarificat. Raparum visus frequens esse debet, quia oculos acutiores reddere creduntur. Idem etiam praesent praedictes & columbae frequenter elicitae. Vtandae herbae frigidiore, ac in primis lactuca, quae oculis infensa est.

Ciborum quantitas moderata sit, neque nunquam aeger ijs se immodec repleat. Cena sit parior prandio, & semel aut bis in septimanam, a coma abstinere vultissimum est. In paulo loco lalis conferret vti pulvere sequenti.

℞. Salis communis 3.ij. euphrasiae sic. 3.ij. nuc. moli. 3.ij. cinam. 3.ij. M. fiat pulvis. Post singulos passus capiat aeger pulvis sequenti cochli.

℞. Sem. coriand. preparati 3.β. fem. anisi, feniculi, ana 3.ij. cinam. nuc. moli. ana 3.ij. euphrasiae sic. 3.ij. sacchari rosae duplum pondus omnium, fiat pulvis.

Vinum in hoc affectu non convenit, quia vaporosum est, & caput replet, fluxionibusque proeniendis maxime idoneum. Ideo decoctum lalae parilla, liquoricia dulcoratum & coriando aromatizatum erit vtilissimum. Sed quia diuturnus admodum est affectus, & omnes tam longam vini abstinentionem ferre nequeunt, si illius visus concedendus sit, eligatur oligophorum, quod quae minus generosum, minusque potens est. Multoque vtilius erit, si euphrasia sicca in eo ante maderit. Atque ut ad longum visum pareat vinum euphrasiale, in dolio multo repleto, viodiemarium tempore, euphrasia demittatur; eoque vino vtatur aeger pro potu ordinario.

Somnus consueto brevior sit, & decubitus supinus quantum fieri potest, idemque fugatur ut meridians, tanquam maxime noxius. Exercitia moderata sint, eorumque loco frictiones anteriorum partium celebrentur. Alius laxa perpetuo servetur, & graui animi pathemata fugiantur.

Instituta in hunc modum victus ratione, curatio ab vniuersali euacuatione incipienda est. Ac primum purgatio instituenda est sequenti medicamento.

℞. Sennae nu. 3.β. fem. feniculi 3.β. folior. beton. euphras. & verben. ana M. liquoricia 3.ij. Coquantur ad 3.ij. In colatura diluole diaphorici 3.ij. syr. rosae 3.ij. Fiat potio, quae derur mane cum regimine.

Pot primum illam purgationem, ferio apud se cogitare debet Medicus, an phlebotomia viurpanda sit: Quandoquidem ea ab omnibus ferè practicus in hoc calu rejicit, cum affectus sit chronicus a frigida intemperie & materia pituitosa oriendus. Vnde mitem, ne per sanguinis euacuationem cerebrum magis refrigeretur, sique maiorem pituitae copiam generet, & causa morbi communis magis incutatur, atque ita difficilius dislocuti ac dissipari valeat. Verum, ut eorum sententia in sensibus & pituitoso temperamento praedictis locum habere debet: in ijs tamen, qui aut in iuuenili aetate constituti, aut calido temperamento praediti sunt, ad mitemda non est praesertim si sanguis redundantis nocte manifeste appareat: tunc dubium non est, quin plebotomia mature viurpata plurimum conferre valeat. Ius vero vbi sanguinis mittendi indicationes praedictae reperiuntur, vtile erit ex Pauli & Aetij sententia, post venae sectionem in brachio celebratam, venas capitis particulares & oculis vicinas aperire, nempe venas frontis, temporum & eas, quae sunt in angulis oculorum iuxta nasi radicem. Temporibus venae commodius hirudines applicabuntur, quae etiam post aures admittent, non parum conferre poterunt. Reuerit practici nonnulli, ob frontis vulnera, nonnullis a coecitate fuisse liberatos. In quibus coecitas causam verisimilem fuisse nervorum opticoorum compressionem a venis & arterijs vicinis sanguine turgentibus, quas dicta vulnera depulerunt. Vnde Spigelius, referente Plempio in *ophthalmographia*, in gutta serena non fuisse fructu medium frontis venam pertundere solent, sanguinemque tandem euacuare, donec sua sponte, & tempore desineret.

Si vero mensium suppressio hunc affectum praecesserit, ex venis inferioribus sanguis detrahendus est, aut hirudines haemorrhoidibus attingende, si aeger coram fluxum, antea passus fuerit, qui tunc temporis suppressio sit, vel si praeparat calidiori, aut melancholico temperamento donatus sit.

potest, neque illius dispositio interofciscogunturque partem medicam exercentes, cum nullum vitium in oculis appareat, cum cum gutta serena conspiciunt, idque sine vilo agrotantium damno; cum humores extranei in vitreum effusus, iisdem remedijs discutiantur, quibus gutta serena curari consuevit.

Sinus vero vitrei vitiatas ex eo cognosci potest, quod sub pupilla albuminis instar appareat. A lussione tamen non facile distinguitur, nisi causae antecedentes & provocantes diligenter advertantur. Fit enim lussio a simplici humoris influxu: hoc vero vitrei humoris transpositio ab ictu, & vulnere solet generari.

Incurabilis ille iste affectus, neque artis opera vitreus humor ad primum locum reduci potest. Id tamen a natura fieri contingit, atque adeo operam negotium illi est committendum.

CAPVT III.

De humoris crystallini affectibus.

CrySTALLINUS humor precipuum visionis instrumentum, praeter ceteros oculi humoribus suam puritatem & perspicuitatem retinere debet, vilius perfecte exerceri valeat. Et si ab ea puritate delectat, visio plurimum laeditur.

Præcipuus autem crystallini affectus, quo illius puritas turbatur, est glaucoma, seu humoris crystallini in glaucum colorem mutatio. Hinc hic affectus, quando humor crystallinus condensatur per ejectionem, quæ in senectute contingit, concurrente tamen causa aliqua exsiccante & condensante.

Cognoscitur hic affectus, quod circa pupillam insignis & profunda appareat albedo, & omnia tanquam per fumum & nubulam videantur. Difficile tamen a lussione distinguitur, quæ talem albedinem in pupilla repræsentat: unde luctum est, ut auctores quamplurimi glaucoma cum lussione confundant. Verum diligenter introspicientibus ex eo distingui possunt illi duo affectus, quod in lussione albedo in ipsa pupilla, sere iuxta cornem, in glaucoma vero profundius appareat.

Incurabilis hic affectus, præcipue in senibus, in quibus siccas partium emendari non potest: Si tamen non satis consistet in crystallino affectum residere, sed lussionis quædam coniectura spissius remedia in vitium reuocari poterunt.

Præterea laborare potest humor crystallinus situ vitiatos, cum nimirum lateri sua parte, quæ lentis instar compressa est, pupillæ foramini non recta opponitur, sed vel sursum declinat, vel eorsum; cumque res gemine solent apparere, si vnus tantum oculus hoc vitium patitur; quia amittitur parallelus qui in utroque oculo idem esse debet, ut res a duobus oculis percepta eadem appareat. Et si in eadem planitie constituti non sunt, res gemine apparent, quod latus experitur quicunque alterum oculum digito deprimit, vel attollit: tunc enim amissio parallelus res duplices apparent. Hæc tamen visio depreuata, quia obiecta duplicia apparent, non solum ex causa propolita exoritur, sed etiam a vaporibus aut tenui purita crystallinum inficientibus, a quibus ipse visus discinduntur: unde fit, ut eiusdem rei species in duobus locis recipiatur; quod etiam in ebrijs sæpe solet contingere.

Secundò situs crystallini vitiatos, quando versus anteriorem partem posteriora inclinat. Si versus anteriora & pupillam, tunc res propinque non recte percipiuntur, melius vero distat, quod in senibus plerumque contingit. Si vero versus posteriora & neruum opticum magis situs fit, propinqua recte videntur, distata vero minime, & tunc fit Myopia, quæ in prælatione explicata est, dumque est idem humor affectus, solis specillis esse reparabilis.

Tertiò situs crystallini vitiatos, quando ad dextra vel ad sinistra nimum inclinat; qui affectus Strabismus nominatur, cum pupilla rebus visendis non directè, sed oblique opponitur, neque ipsa in medio oculi apparet, sed ab eo

declinat, ita vt in vna oculi parte plus albi appareat, quam in alia.

Fit tamen hic affectus non solum a crystallini situ vitiatos, sed etiam ex praua musculorum oculos mouentium dispositione, quæ vel naturalis est, vel a dactorum musculorum paralyti aut conuulsione oriundus.

Verum a quacunque causa producat, si conaturaliter est, incurabilis censendus. Si vero a prædictorum musculorum paralyti aut conuulsione fiat, eorum morborum curatio capitis affectuum curationibus delendum est.

Denique ex maiori vel minori iniectione crystallini, alie vias deprauationes possunt contingere; quando nimirum quæ recta sunt, curua apparent, vel quando obiecta quasi iuxta videntur; quod contingit Medico cuidam, vt refert Senertus, qui cum icalem librum aliquem è foras petiturus ascendere, & oculos fortius sursum conuerteret, accidit ut omnia ei posita inuerta apparent, & homines in platea capite ambulare viderentur, quod ex situ crystallini mutato contingit: siquidem post anni quadrantem, cum forte iterum oculos sursum conuerteret, naturalis visio rediit, & poma in testis suis vidit. Vnde patet violento oculi motu crystallinum & sua sede deuectum, si noli postmodum motu ad eundem iterum transilum, si fuisse. Eam autem crystallini inuersionem ita contingit exiluisse, vt crystallini humor fit fuerit inuertus, vt pars illius anterior, quæ reliquis depressior est, pupillæ directè opposita non fuerit, sed potius pars illius lateralis, quæ cum gibbior & magis conuexa sit, species obiectorum inuertas repræsentare possit, quemadmodum vitænum in speculis rotundis obiecta inuerta apparent. Idque ea ratione contingere ex Opticæ præceptis docetur, quod in medio conuexo, & densiori radij speciem visum inuerti refranguntur, vt lese cruciatim intersecent, & qui a parte obiecti superiori feruntur, eam tanquam inferiorem repræsentent, & vice versa.

Si vero minor fuerit humoris crystallini inuertio, ita vt, tum pars crystallini depressior, tum eadem conuexa pupillæ aliquatenus opponatur, obiecta incurua apparent possunt. Quamuis etiam alia ratione fieri possit illa vias deprauatio, quia obiecta incurua apparent: nempe si portio humoris crystallini pituitolo humore sustandatur. Tunc enim propter diuersam crystallini tenuitatem, & crassitatem, diuerse sunt refractiones, quæ causæ sunt illius vias deprauationes, quia obiecta incurua apparent. Hoc dilucido exemplo demonstrari potest, si cuius baculi, cuius modus pars in aquam densiora sit: tunc enim incuruus apparet, ex eo quod portiones in aquam densiora species, quid ex in aqua aeris deierit, vt pote a medio densiori ad tenuius, refrangitur a perpendiculari: portio vero quæ est in aere, non refrangitur, quia non transit per diuersa media, quemadmodum ea, quæ est in aqua, inde fit vt baculus incuruus appareat. Eodem modo species obiecti, quæ feruntur in portione crystallini densiore, magis refrangitur, quam dum feruntur ad portione illius tenuiorem, quæ scilicet in statu naturali constituta est, a pituitolo humore minime suffulata, quæ ita, propter varias refractiones obiecti incurua apparent.

Cum autem in horum affectuum curationibus remedia non consistant in is inquirendis, frustra laborandum non est.

CAPVT IV.

De humoris aquei affectibus, & præcipue de lussione.

Humor aqueus a sua naturali constitutione deicitur, cum quantitate vel qualitate peccat. Dum quantitate peccat, augeatur, vel imminuat, præter modum & pupillæ dilatationem, aut contractionem efficit, quæ affectus sui loco erunt exponendi. Dum vero qualitate peccat, crassior euadit, quod fit ab humore extraneo in eum effuso, & lussio nominatur, quæ hic explicanda est. Licet enim Galenus de sympt. caus. cap. 1. ab ipsius humoris aquei condensatione fieri interdum lussionem, non docet, si in humoris

moria excrementitij affluxu: tamen quia rarissime id contingit, & imaginatione potius, quam arte vix dignoscitur; & si talis affectio detur, periculis incurabilis est illa omnia, de ea, quæ fit ab humoris excrementitij affluxu tantum, agemus. Hæc autem dicitur Græcis, Latinis Atabibis aqua, vulgo *catarracta* nominatur. Androtes quidam hæc nomina inter se distinguenda esse volunt, ut varios huius morbi gradus significet. Insuper enim affectus, in quo levis quædam vis obtenebratio contingit, suffusio ab illis nominatur. Cum vero viterius progredias est morbus, & aliquid in pupilla colloquatur, aquæ insit apparet, aquam peculiariter nominant. Cum denique materia in pupilla omnimodè concretæ est, visionemque proflus avertit, catarracta ab illis nominatur. Fit igitur suffusio, ex serosis vel pituitosis humoris, in illud spatium quod inter corneam & crystallinum est, affusione. Cum autem in illo spatio humor aqueus contineatur, iure merito inter aquei humoris affectus recensetur.

Hæc quidem vera suffusionis causa est. Alia tamen datur suffusio spuria, quæ fit a vaporibus, a ventriculo alijque partibus in oculos translatis. A capite etiam vapores ad oculos transmitti, & suffusionem spuriam efficere posse docuit Galen. 4. de loc. aff. cap. 2. Quamvis autem dicit suffusionis differentie inter se distingi ab Auctoribus proponantur, vtriptimum tamen complicatae sunt, saltem legitime suffusionis spuria complicari solet; quia vapores a partibus inferioribus ad cerebrum translati, faciliè deferuntur ad eas capitis partes, quæ a morbo aliquo debilitatæ sunt. Id quidem ex eo docetur, quod omnes suffusionem laborantes, nimis leduntur ac peripicacius vident matutinis horis, quam meridianis & vespertinis; quia, nimirum a prandio & cena multi vapores a ventriculo ad oculos eleuantur & visum turbant. Imò docet experientia, in dictis laborantibus visum esse hebetiorem & caliginosorem statim a pastu, quam paucis post horis ab ipso. Præterea omnes suffusionem laborantes reterunt, sibi videri in aere corporula quædam volitantia, velut culices, muscas, pilos, telas aranearum & similia, quæ non sunt, nisi a vaporibus crassis & visum turbant. Imò docet experientia, in dictis laborantibus visum esse hebetiorem & caliginosorem statim a pastu, quam paucis post horis ab ipso. Præterea omnes suffusionem laborantes reterunt, sibi videri in aere corporula quædam volitantia, velut culices, muscas, pilos, telas aranearum & similia, quæ non sunt, nisi a vaporibus crassis & visum turbant. Imò docet experientia, in dictis laborantibus visum esse hebetiorem & caliginosorem statim a pastu, quam paucis post horis ab ipso. Præterea omnes suffusionem laborantes reterunt, sibi videri in aere corporula quædam volitantia, velut culices, muscas, pilos, telas aranearum & similia, quæ non sunt, nisi a vaporibus crassis & visum turbant.

Humor quidem pituitosus, præcipua est, ac magis ordinaria suffusionis causa; alij tamen humores exigua saltem portione, et commisceri possunt; et si bilis miscetur, catarracta; si melancholia, nigrescens suffusio apparet.

Humores autem isti ad oculos confluere solent, quando aliqua debilitate affecti sunt, sed naturalis seu alicuius.

Ad naturam debilitatem pertinet oculorum prominen tia; quæ enim tales oculos habent, suffusions obnoxij sunt; oculi siquidem prominentes magni esse solent, atque adeo virtus visiva in ipsi debitor est; tum etiam magni & prominentes oculi, humores & vapores faciliè succipiunt. Debilitatem verò afficiam faciunt causa externa, ut ictus, contusio, balneum, austrius & pluviosa constitutio, in solatio, fumus, lectio assidua, præterea ad lucernam, & alia huiusmodi. Quæ etiam causæ humorum fluxionem ad oculos commovere possunt.

Fluunt autem humores a cerebro ad oculos per venas, totam tunicam, & nervum opticum. Venæ per quas humores deferri possunt ad eas partes, multiplices sunt quæ scilicet vel feruntur a petriano, et ad communem tunicam, inde ad corneam & vucam; vel a meningibus cerebri, a quibus rami ad oculi membranas derivantur. A quibus membranis, præcipuè vel vucæ tunica, ad humorem aqueum sibi contiguam excrementitij humores faciliè intrant possunt.

Denique per nervos opticos faciliè deferri possunt hu-

mores a cerebro, per tunicam retiformem & araneam humorem crystallinum; tumque materia suffusionis crystallini superficiem adheret. Lcet autem vtriptimum suffusio per fluxionem fiat, potest tamen aliquando per congelationem fieri quoniam nimirum oculi nutrimentum probe non immutatur, & facultas expulsiu debilis, illius residua excrementa sufficienter non expurgat, ita ut lenim congeste circa pupillam ea excrementa suffusionem efficiant. In quo casu alij etiam humores picramque labactantur, & distillillimi affectus producantur.

Suffusions differentie desumuntur ex humoris esse efficiens crassitie, quantitate & loco, in quomodo illi residet.

Ratione crassitie maioris vel minoris, maior vel minor visionis læsio efficitur. Si enim tenuis & serosus humor existet a quo suffusionem fieri, & punctione evacuari docuit Gal. 14. meth. cap. ultimum, visio patum immutatur, & suffusio incipiens nominatur. Si crassior paulo fuerit, visionis obscuritas maior. Si vero crassissima, cæcitas omnimoda emergit.

Ratione quantitatis & loci, vel humor totam pupillam occupat, & tunc visio æqualiter læditur, quocunque modo ad abiecta dirigatur; vel vnam partem pupille magis, quam aliam occupat, & obiecta directo intuitu integra non cernuntur, nec vno tempore incita. Si vero humor perexiguus sit, & in oculum pupillæ superficiem obiecta temerata apparet. Si vero materia diuisa fuerit, & in varia corporcula, varias pupillæ partes occupantia distincta, culicum species ante oculos veritari videbuntur: quæ omnes differentie exactè distinguuntur a Gal. 1. de sympt. causis cap. 2.

Ratione loci etiam, vel situs materie, alie possunt desummi diff. tene quod scilicet aliquando materia in ipso vucæ foramine iuxta corneam tunicam loca est; aliquando iuxta vucam, & inter hæc & humorem aqueum; aliquando ipsi humoris aqueo permixta ac deniq; interdum inter crystallinum & aqueum.

Possunt & quædam differentie a figura materie desumi, quas recenset. Gal. 1. de sympt. causis cap. 2. & vide loc. aff. cap. 2. Prout enim varia est humoris pupillæ a diacentis figura, agnus representantur in aere volitantes culices, puli, telæ aranearum, circuli circa caudam, & alia quamplurima.

Diagnosis huius affectus primò dirigenda est ad legitima suffusionem a spuria distinguendam; politica vero varie legitime suffusionis differentie internotandæ sunt.

Vera suffusio alterum tantum oculum plerumque occupare soletur; si vtrumque, non tamen simul, nec similiter, quod in spuria accidit.

Secundo in legitima suffusione tenebrosior quiddam in pupilla apparet, quod in spuria non contingit. Hoc tamen signum perpetuum non est. Si enim a tenui & seroso humore suffusio generetur, cum ille humor aqueo kræ crassior sua sit, nulla in oculo immutatio apparet. Qui decepti plerumque Medici, eam suffusionem non agnoscunt, quæ tamen serenam esse exultant, cum nempe nulla in pupilla mutationem percipiunt. Sed faciliè distinguatur hæc suffusio a gutta serena. Primò, quod in gutta serena visio vel abolita, aut valde immutata est; nulla in oculo læsione appareat. Contra verò in suffusione: quæ sensui non patet, est levis tantum visus immutatio; quia humor serosus, a quo illa producit, tenuis est & diaphanus: ita ut a specibus obiectorum, vixi milar, penetrari possit. Secundo, ex eo, quod vtriptimum in suffusione visio in omnibus pupillæ partibus æqualiter non læditur, sed obiecta aliquando directè oculis opposita, aliquando versus angulum collocata, melius videntur; quia nimirum maior est vtriptimum humoris crassities vel lenitas in vucæ pupillæ parte, quam in alia.

Tertio, in vera suffusione symptota sunt continua, nec vlla habent intervalia in ipsa verò, per intervalia augentur, & remittuntur, proptè vaporem anathymatis maior vel minor ad cerebrum efflatur. Sequæ, seu nothomacho, multò minora sunt, quoniam eo cibis repleto, præcipuè paulo post pastum tunc enim maior vaporum copia sursum attollitur. Qui vapore ad oculos translati, muscas, culices, araneæ, nectantur.

nearum relas, & alia huiusmodi corpuscula, visui quidem representantur non continuè, sed tantum per intervalla quædam. Quæ quidem exigua corpuscula in aere representata, à vaporibus dependent, ut antea dictum est: at tamen, quia dum oculi a vera suffusione debilitati sunt, continua ferè sit ad eos vaporum transmissio, ideo continua est prope modum huiusmodi corpusculorum in aere voluntarium apparitio. Præterea in vera suffusione, visus obtenebratur, quia omnia objecta, veluti per nebulam aut vitrum densum conspiciuntur. (quod est proprium symptomata & pathognomonicon huius affectus) continua est & semper eodem modo se habet. In ipsa vero suffusione tunc maior, nunc minor, & aliquando ferè nulla est visus obscuritas, propter vapores, vel maiori copia, vel minori, vel nullo modo transferuntur ad oculos.

Dumque vera suffusio brevi tempore incrementum suscipit, & plerumque intra sex menses confirmata euadit. Interdum etiam paucis diebus crescit; & refert Hermelius 3. parthol. cap. 5. consummatam suffusionem vno die subortam: quod nobis etiam non semel videre contigit. Spuria autem per multos annos sine incremento persuevit.

Vera autem suffusionis differentia sequentibus signis eruit distinguere idè.

In suffusione incipiente corpuscula quædam, ut piluli, culices, muscæ, volitantes, lana, aut araneorum fragmenta, oculis obstruantur.

Dum vero incrementum fumit, aer nebulosus apparet, & objecta veluti per vitrum densius conspiciuntur; color pupillæ immutatus est, æque v. l. turbida, vel nebulosa, aut vitreo contaminato similis. aut calore cereuleo infecta apparet. Quando suffusio per se facta est, visio omnino perit, pupillæ calor albus apparet, aut alio colore infectus.

Ex colore etiam quædam signa desumuntur, color enim marginis similis, putatam adhuc fluidam & diaphanam signifi. At si gygæus crassus & compactus, citrinus putatam cum bile mixtam; niger cum humore melancholico.

Locus suffusionis dignoscitur ex eo quod si materia inter vitæam & corneam sita sit, pupilla magis obtenebrata conspiciatur, quia materia oculis inuentus propinquior est. Deinde pupilla dilatata apparet; si humore enim in ea contento dilateatur. Et in affectu confirmato albe & virides fibrae aut striz, supra istud portæ conspiciuntur, aut puncta quædam albicantia circa pupillam apparent.

Si materia inter chrysellum, & vitæam continetur, contraria prædictis apparebit symptomata: tum etiam, pupilla angusta apparebit, si profundior materia sit: amplior vero si minus profunda.

Prognosis huius affectus, pro variis illius temporibus, variè statuenda est. Incipiens enim suffusio, in qua ægri objecta possunt discernere, eaque per nebulam conspicere videntur, curabilis est iuxta Gal. sententiam 14. meth. vlt. & Celsi lib. 6. cap. 6. Quæ tamen sententia resolutione indiget, modo licet æger in ætate florenti sit constitutus: in senibus enim hi affectus incurabiles sunt; & si oculi ex nativa constitutio debiles non fuerint. Nos enim nonnullos in suffusionis principio, etiam quinquagesimum annum prætergressos, loca euacuatione vinctu, dieta sudorifica, & vesicatorio, sine vlla topicorum applicatione, intra quindécim dies curatos vidimus.

Curatio autem felix succedit in aere calido, & tempore æstivo: quia pori aperitur, materia morbifica mobilior & obsequenter redditur, ita vt sponte sua sepe ad aluum deteratur. Quia motus, quantum momenti habeat ad huius morbi solutionem, docuit Hipp. Aph. 17. sect. 6. his verbis, *hæpente alio profuso corripit a humoribus.*

Si ex ista cura, peripneumonia, phrenitide, aut dolore capitis intentio suffusio proeuenit, diffucillime curatur.

Suffusio confirmata, in qua materia iam concreta est, dicitur medicamentis non potest, & sola conspunctione, curabilis est.

Hæc tamen operatio, quæ punctione perficitur, & acu in oculum immittit ad inferiores oculi partes (suffusio depumitur, tuta non est, & sæpè male succedit. Vel enim, vna tunica laceratur, vel ex dolore, inflammatione nova, luxio in oculum iamdudum delictum influit, & alia contin-

gunt incommoda, quibus visionis perpetuum aufertur. Cum tamen aliquando succedat hæc operatio, tentari potest ab iis, quibus nulla alia curatio nisi pes superest: (sanus enim est, vt docet Celsus, anceps experiri reocidium, quam nullum).

In confirmata suffusione, si altero oculo clauso, pupilla dilatetur, curatio per acus immisionem (perabilis est: si verò non dilatatur, visus nunquam recipitur, docente Gal. 1. de sympt. caus. 4. a qua nervus opticus obstruitur, & spiritus ad pupillam, licet aperta foret, peruenire nequit.

Licet autem altero oculo clauso pupilla dilatetur, æger acu immittit visum non recipit, si lumen non percipiat: quia spiritus visus turbidus & obcurus redditus est, atque adeo visioni inueps.

Suffusio nigra, & omni splendore orbata, neque medicamentis, neque chirurgia curari potest, quia (spiritus visus) destructi sunt. Pellucida verò, & splendorem aliquem obtinens, curabilis est.

Curatio enim etiam plerumque non admittit viridit, obsecra & multum citrina, dura & quæ hydrargyrum colore & mobilitate representat.

Suffusio, quæ objecta sordiditate representant tentanda, non est: cum enim materia in centro pupillæ consistat, periculo vti est, a u. immittit, ita pupilla implebitur, & integra visionis iactura fiat.

Operatio, quæ per acus immisionem fit, felicius succedit in oculis plenioribus, & naturalium magnitudinem seruante: si vero oculi minores & uarietatis euaserit, succedere non potest.

In senili ætate prædicta operatio tentanda non est, neque in pueris, in illa morbus est incurabilis, in hac verò humor maior est, & non ita maturus. Curationi aptissima ætas est iuuenilis, & consensit.

Si operatio exerceatur quando oculo digito compresso suffusio nonnulli diluitur, & latior aliquantulum apparet, postmodum verò ad pristinum magnitudinem & figuram reuertitur, non succedit: quia suffusio nondum matura est, sed adhuc reotis & cruda. Si vero digito compressa nullam patitur figuræ mutationem, matura est, & acu decuti potest.

Notandum tamen istam suffusionem, quam vocant, maturatam leuæ concretione, moderatam esse debere, vt deponi facile possit. Debet enim esse instar pelliculæ, quæ citumoluitur, & ad inferiora oculi deponitur. Si enim crassior & laudior sit, decati non potest, quod inde dignoscitur, quod gyphi aut grandinis speciem colore præ se fert. Contra verò quæ modicior maturitatem nacta est, colorem cæli aut maris, ferri aut plumbi non admodum nigri representare solet.

Suffusionis curatio non solum ad causam coniunctam, sed etiam antecedentem dirigenda est. Atque ita, primò totum corpus, & præcipuè cerebrum exacte euacuandum est. Mox humor pupillam obstruens discutendus, aut alio quouis modo amolendus est.

Quæ indicationes cum eadem ferè sint, quæ ad guttæ serena curantem fuerint propositæ, eadem remedia, quæ victus rationem, totius corporis euacuationem, humoris peccantis resolutionem, & capitis acque oculorum roborationem respiciunt, hic etiam aptari poterunt, vt non opus sit eadem hic frustra repetere.

Præmissa igitur ut ita curatio, quæ pro guttâ serena instituta est, ad ea remedia veniendum est, quæ oculi materiam iuxta pupillam continere euacuationem respiciunt. Et quoniam topica remedia non multum conferre existimantur, iuxta Gal. sententiam 1. de diff. 1. vlt. quæ dicit ea, plus promittere, quam præstare: actamen legitimum eorum vltus recipiendus non est: & docuit experientia, & probabilissimum auditorum hæc confirmata, suffusionis incipientes præmissis vniuersalibus, vltu topicorum fuisse dissipatas.

Primò igitur a maioribus resoluendis incipiendum est, quæ non valde efflucent, ne materia suffusionis induretur, & resolutionis inepta euadat: tum resoluendis emolumentis adsciscenda sunt, vt prædicta indurata emolumenta, & resolutio facilius perficiatur. In hac finem sicut sequens ab initio viisurari poterit.

γ. Fol. rutæ, ianac. euphrat. cholidon maior ana. M. i. sem. fenugt.

ſmogr. j. i. flor. chamom. & mellid. ana. p. i. Coquantur in robis partibus aque lort & vna vini albi ſub finem additi. Colatura foueatur oculi mané & ſerò cum ſpongia molli. Ex eodem decocto ſuffuſus parari poterit, ſumum illius excipiendo oculis, vndeque capite contecto.

In ipſo n. orbi principio, dum fluxio fieri incipit, dumque reuelentia remedia viſurpantur, vtile eſt fouere oculos ſimpliciter vino rubro aultero, quod attritione ſua fluxionem impedit, parte verò ſpirituola diſcutit ac reſoluit.

In progreſſu morbi, ſortus ex vino albo, in quo crocus metallorum inſuſus fuerit, vtiliſſimus eſt.

Non parum etiam vtilis eſt pueri ſemen ſeniculi maſtica- perit.

Neque minus conducibile eſt oculis lingere per longum tempus, marucinis horis, lingua pueri aut catelli.

Ad luſtrum etiam reſerri poteſt panis cum ſemine ſeniculi conſulo ſubactis, & dum calens eſt furno extrahitur, per medium ſectus, ſi eius vapor oculis recipiatur; panem ſcilicet ita oculis admoouendo, vt fixo intuitu in panem, oculis vaporem illius maſticator.

Remedia prædicta matutinis horis præcipue viſurpanda ſunt. Noſtu vero ſequens cataplaſma admooueri poterit.

℞. Farinæ ſpurgæ j. i. aloes 3. ß. croci 3. i. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, excipitur vino albo in quo crocus metallorum inſuſus fuerit, & fiat cataplaſma applicandum calidè hora ſomni.

Multi laudant ſanguinem columbinum, in oculum calidè inſillatum eo enim calore natio animalis, reſecta pars valde corroboratur, & materia excrementitia diſſoluitur. Sed quia in illo ſanguine calor cito euaneſcit, multò conducibilior foret pulum columbinum iuniorum, & nondum plenum conſectum, per ſpinam ſectum, oculo applicare.

Prædictis remedijs, præteritis materiæ coniunctæ diſſipatio obtineri poteſt, ſi illa ſperabilis eſt. Topica enim varia, quæ oculis inſillantur, collyria vulgo dicta, ex iugis ſunt efficacia, & illa ſunt de quibus dixit Gal. ea plus promittere, quam præſtare; tota enim eorum virtus in comed tunicâ ſerè abluuntur, neque poteſt ad interiores partes penetrare, niſi ea inſigni acrimonia prædita ſint, quæ dolores illi oculis excitant, & fluxio ad illos magis promouetur: vnde non pauci immoſco eorum viſum, ex leuiori affectu in tenuiſſimam cæcitatem perduci ſunt. Quia tamen multa reperiuntur apud autores collyriorum deſcriptiones, in quibus præſtantiſſimi effectus ab iſtribuntur, ne hic aliquod deſicere videatur, non ſeleſtiſſimas nonnullis proponemus, vt vniuiſque eorum effectus explorare valeat.

℞. Mellis optimi lb. j. rad. ſenic. ariſtoloch. long. & rotund. ana. lb. i. iol. ruta, euphrat. chelidon. maior. & ſummit. ſenic. ana. M. vj. contrai. min. M. iij. roſar. reſor. p. v. vime. pueri impubia lb. i. Miſceantur omnia ſimul in vale vitreo, & deſtillantur in balneo Mariæ. Hac aqua inſilleſcit in oculos frequenter.

Vel parari poteſt panis ex tota farina, cum ruta, chelidon, euphrat. betonica & ſenic. pulueribus, addito melle, qui recenter ex furno extractus in partem diſſectus, intra vala duo lianæ vel argenteæ concluditur, iode aqua, quædam colligitur, quam guttatim in oculos inſillatam mirabilè eſt conducere Zechius affirmat. Sequens etiam collyrium ab eodem auctore multis eſt ſcriptum laudibus.

℞. Iol. viol. alb. ſeu leuconi M. i. Mem. raphani hortendiſ 3. i. ammoniaci 3. ß. Miſceantur, & puluerata macerentur per horas 24. in aqua ſenic. lb. i. Deinde bulliant vena ebulliant ſeu leu. Polatæ colaturæ adde ſucci ſeniculi depurati 3. i. balſami Peruvian 3. i. p. Fiat collyrium, quod mané & velperi inſillatam (inquit Zechius) corpore (vt docet) prius euacuato, antiquas oculorum aggrauationes ita deterget ac diſſipat, vt cataractam etiam citra ſcrum mirabiliter auſerat.

Holierus aquam deſcribit, quædam dicit reſtituiſſe viſum cæco nouem annorum, quæ talis eſt.

℞. Succo apij ſenic. verbenæ chamæd. pimpinellæ, caryophyllaræ, aliar. chelidon. ruta, centioid. moriſus gallinæ, caryophyllorum, farinæ volatilis ana. 3. i. piperis craſſiſculi reſ. nucis molchat ligni aloes, ana. 3. iij. Omnia immergantur in vime pueri inſortuque, & ſexta parte vini mal-

vatici. Bulliant breui tempore. Tu exprime, percola, & reſone in vale vitreo obturato: hora ſomni ſingulas guttas ſingulis oculis inſilla.

Succus anagallidis aquaticæ ſolus in oculos per aliquot dies inſillat ſurſum aliquando ſuſſuſionem incipientem, cui tamen plurimum adiuuenti attulit cauterium ſuæ coramali noſum.

Non minoris ſunt efficaciæ ſucci chelidonis & calcitræ ſimul mixti.

Quæ cetanus in Pharmacopæa aquam ex inſuſione croci metallorum paratam valde commendat, quæ in hunc modum componitur.

℞. Aquar. ci elidon maij 3. vj. croci metallor 3. i. Inſundantur ſimul. Ex huius aque tepide guttas tres vel quatuor inſunde intra oculos ter aut quater in die per longum tempus. Hanc aquam ſe expertum eſſe dicit Fonſeca viſionem reſtituiſſe cuida, qui eam offuſcatam habebat per plures nentes. Haber autem hoc egregij, vt ſine morſu valdiſſimè abſtergat, quod vix in alio medicamento reperitur.

Iſdem Fonſeca aquam ſequentem tanquam mirabilem prædicat.

℞. Plures hirundines. Contendantur integræ cum ſuis pennis in mortario, illatum cuiuslibet libræ adde medullæ panis 3. iij. vini albi naturi lb. iij. Inſundantur per ſex dies, & deſtillantur per balneum vique ad ſiccitatem. Deinde exponit illam aquam in vale vitreo ad ſolem per dies viginti, & inſilla in oculos mané & ſerò.

Ex flor. roſmar. liquor elicitur nebulis diſſecandis admodum idoneus, qui in hunc modum paratur.

℞. Flor. roſmar. q. d. Impletur ampulla vitrea, quæ probe obturetur, & ſoli meridiano exponatur ad parietem. Inde liqueſcit oleoſus quidam humor, quo oculi penitus ſilantur.

Auctores ſella animalium commendat, quod potentiſſimè abſtergat & diſſecat. Sed acrimonia ſua dolorem excitat, ideo raro in viſum reuocatur.

Foreſtus *ſcher. 35 lib. i.* piſculum quemdam patriæ ſug familiarum commendat, ex cuius iecore ſuccus quidam elicitur, quo ſuſſuſiones quaſi momento & miraculo curari teſtatur: eius hiſtoriam & vtiendi modum vide loco citato. Quilidius Zoellus ſe plures curat ſe reſeruiſſe, nulla ſicis viſura ſuentes, aqua ſequenti, poſt vniuerſalia remedia, viſurpata.

℞. Hepatis hirci ſani & recentis lb. iij. calami aromat. & mellis ana. 3. ß. ſucci ruta 3. iij. aque chelidonis, verbenæ, ſeniculi, euphratiæ, ana. 3. iij. piperis longis, nucis molchat, caryophyllor. ana. 3. iij. croci 3. i. iol. roſmar. aliquantum contritus. M. ſi. ſarcocollæ, aloes hepaticæ, ana. 3. iij. ſellis auium rapacium, vel caponum, aut perdurum 3. i. Incidenda inciduntur, terenda terantur, cum omnia ſimul miſceantur, addendo ſacchari albi 3. iij. mellis roſ. 5. v. ponantur in alambico vitreo. Deſtillantur in B. M. igne lento. Hac aqua ſeruetur in vale vitreo bene obturato, tanquam pretioſa, quæ in oculum laborentem inſilleſcit bis aut ter in die.

Zacutus Luſitanus aquam ſequentem maxime commendat. ſus verbus. *Operamini, diſturbare nolite, quæ caloram affluunt, & quæ ex nimia humiditate craſſique humoribus, & caligine ſuſcitantur, vt denſitatis, albuginis, vnguiſ, & ſuſſuſionis.* Et hanc aquam principatim obtinere duxi experimento comperto haberi, ſi corpore exquiliſſe vacuare, noſtu ſolum tribus horis poſt prandium intra oculum ſex guttas eius inſuſillas alia frigida, poſt illas horis, tanquam eſſent perempti, manebant ſcories in coga multa.

℞. Aloes 3. iij. ruta, ſeniculi, betonicæ, ana. M. iij. verbenæ, orontidis, an. M. i. iol. 3. iij. ſpumæ niri 2. ß. ſacchari candij 3. iij. ſyrupi roſar. 3. iij. vime pueri impubis lb. ß. ſtercoris lacerti 3. iij. niarubi. M. iij. euphratiæ M. i. i. zinzib. ſpicæ nardi piperis longi, caryophyll. tuchæ, ana. 3. i. i. balliani 3. i. i. mellis roſati 3. i. viridis æris 3. i. iol. raphani M. i. Pulueranda puluerentur, miſceantur omnia, & inſuadantur in vino albo generoſo, in vale deſtillatorio, addita quarta parte mellis optimi, decem diurnum (pario, dummodo quoties agnuerit, & deinde deſtillantur, & aqua quæ exortit, reſeruetur.

Iſdem Zacutus ſequens vnguentum maxime commendat

his verbis. *Ad sufficcandam humiditatem ad oculos a capite confusentem, simulque valentissimam per canthos expurgandas, vnguentum sit magistrale nulli secundum appleturum est totius corporis capiti & oculorum vacationem universalem. Et his in die, mani & nocte tribus horis post equam; palpebra superiores leviter allinantur. Post horum humores ferri rursus per argum per iterum maiorem effluent, ubi erunt.*

¶ Ol. tolic. 3. ii. aquae rosae 3. ii. camphorae 3. ii. aloes 3. ii. mellis 3. ii. iellis hirci 3. ii. fatiae lupinorum 3. ii. altheae locustinae 3. ii. sacchari candi 3. ii. succi marubii leniculi, rutae, an. 3. ii. myrrhae 3. ii. ammoniaci 3. ii. lacoc. 3. ii. Pulveratis pulverandis, misce, & lento igne coq; modice; & cum pinguedine hircina & aristina, & momento cetera, fiat secundum artem vnguentum.

Denique reliquis remedijs non confertentibus, morbo propemodum ad desperationem verso, ad experimentum reduci meretur munctio ex hydragry, quam a se excogitavit aut Foulca, non tamen in vium reuocatum, consultatione enim 19. feb. sic loquitur. *Aliquando certum munctionem argenti vni, & ratione quae adducitur in morbo Gallico, magna efficacia posse extirpare cataractas incipientes & incipientes, quod vni est in ophthimo gallico, ubi humorum residua visum impediunt sed etiam in non gallico. Iste remedio caput ita expurgari poterit, ut dissoluantur vestigia cataractae, & aliquando exparsi decurrat. Huc lue cogitationi maxime appropinquat Foulca, si skenckij observacionem 309. lib. i. vidisset, quae ex Alex. ndr. Traiani Petrozi lib. 5. de morbo Gallico cap. 1. desumpta est. Quidam, inquit, qui antequam morbo Gallico affectus, altero oculo cataractam, fissione per se ipsa (vulgo cataractam vocat) oculum occuparet hydragry inuentione morbo Gallico, & a fissione, quod maxime mirum est, evasit. Neque & ratum alienum est munctionem istam cataractae per se dissolvere, non frequens experientia docet, praeclarum tunc ex iuxta a crassa & concreta genio, illius hydragry per se iterum dissolvi.*

Cum nullis medicamentis oculus possit curari, vltimum remedium est Chirurgica operatio, quae acui in oculum iuncta, materia praeputa suffusione, hinc condensata, & in pelliculam conuersa ad interiora oculi partes decussat, & aperta veluti fessura visus recuperatur. Quae operatio aliquando succedat, saepe, pluries in vero felicitate ita vix ea non pauci vident in perpetuum amiserint. Quando tamen res eo decuit, ut in la. a. la. superius visum recuperaret Ipeslarus est iuxta Celsi mentem prius laudatam, operis experti remedium, quam nullum. Hec autem operatio propter incertum eueniunt a Chirurgis ordinariis, non solet exerceri sed a operatoribus vulgo dictis, qui per varias vires vagantes, in quibus se in operationibus exerceri atque ita operandi tempus & modus illis prout commutendos est. Quia tamen a Medico ignorari non debent, apud Praeficos non paucos exacte descripta inveniri poterunt.

Curata suffusione, siue resoluendis medicamentis, siue operatione Chirurgica, prophylaxi per longum tempus incumbendum est, quia reciduae maximum est periculum i oculum cum longo assidu debilitati admodum dispositi sunt ad fluxiones & cerebri denovo excipiendo. Idcirco purgationibus viualibus incumbendum est, fonticuli ad fluxiones auresionem continuo gestandi & oculis roborantia frequenter usurpanda, quibus in gutte serene curatione propolita sunt. Quibus addi potest ablutio oculorum, quae singulis diebus mane usurpanda est in hunc modum. Ab exitu lecti masticetur semen feniculi aliquandiu deinde os vino repleatur, & quo vino tantillum in ore calefacto ablutantur oculi, donec acrimonia sua eos vellet, & dolorem aliquem inferat, qui cessante ablutione statim etiam cessare consuevit.

Præter visus conseruationem plurimum conferunt specilla, quae obiecta, prout naturaliter se habent, nempe, neque maiore neque maiora representant. Nec non visus elipser vices speculis viridibus aut caruleis vilius recreare.

Ac denique ea omnia vitanda, quae visui nocent, & usurpanda quae ipsi conferunt, prout in victus ratione, pro gutte serene curatione insituta, annotata sunt.

CAPVT V.

De dilatatione pupillae.

Vvea tunica, ex Gal. 1. de sympt. causis cap. 3. varijs morbis obnoxia est, ac praecipue rupitionem, distorsionem, dilatationem & constrictionem pati consuevit.

Rupitio fieri potest, tum a causa externa, vt percussione & contusione, tum ab interna, humore scilicet copioso tunicae vuae distendente & rumpe. Cum autem ea arte reparabilis non sit, medicam tractationem non postulat.

Distortio vuae tunicae non potest contingere, nisi a prima conformatione, cum illa cornea tunicae vndique adherat. Ideo Galen. ipse loco citato, nudam illius enumerationem facit, inter differentias symptomatum vuae tunicae in ea autem explicanda non immoratur, quia nullius est vbi in praxi medica. Nos enim prioribus duabus differentijs praetermissis, dilatationis & constrictionis pupillae explanationi tantum incumbemus.

Dilatatio igitur pupillae, quae est vuae tunicae foramen, per quod species obiectorum oculum ingreditur, Mydriasis Graecis appellata, visum ledit, quod lumen nimia copia oculum ingreditur: unde fit, vt ea laborantes in obscuriori loco magis videant, quam in lucidiori. Quod ostendunt naturales & ordinariae pupillae mutationes, quae in locis splendidi & obscuri contingunt; dum enim visio fit in loco splendidi, & multum illuminato, pupilla contrahitur, vt minori copia lumen oculum ingreditur, & ne maior copia visum ledat, fit ut discipulo ac disgregando. Et hinc fit, vt qui a loco valde lucido in obscurum ingreditur, primo ingressu nihil se videant; quandoquidem pupilla contracta in loco obscuri, non satis luminis recipit ad visum integrè percipiendum. Postea vero cum aliquandiu in loco obscuri morari fuerint pupilla, sensim dilatatur, vt maiorem luminis copiam recipiat, quae fit sufficiens ad visum efficiendum; & tunc res, quae primo ingressu non videbantur, clare percipiuntur. Contra vero, qui a loco obscuri in valde lucidum transeunt, lumen se non possunt ab initio, & eorum oculi grauiter pertrungunt. Quia cum pupilla magis dilatata fuerit in loco obscuri, vt sufficiens luminis copia oculum ingreditur, fit hoc modo dilatata subito magno luminis obicitur, nimia copia lumen oculum ingreditur, eoque perstrigit ac visum turbat. Vnde patet, lumen visum necessarium copia ined oculi oculos ingredi debere, & ad illius receptionem, pupillae latitudinem moderatam esse necessariam.

Fit autem dilatatio pupillae praeternaturalis, vel a primo ortu, quae immediabilis est; vel post ortum a causis praeternaturalibus & aduentitijs, quae vel interne sunt vel externe.

Internarum proxima est & immediata, tensio vuae tunicae; illa autem tensio, vel a siccitate fit, vel a repletionem.

Siccitas vuae tendit, & foramen pupillae amplius efficit; quae admodum coria perforata, cum excidantur, potenteriora foramina efficiunt. Fit autem sicca illa interperies a vigilijs diuturnis, febribus, alijsque causis efficitibus.

Repletio vuae tenet, dum eam omni ex parte distendit, ampliore pupillam efficit, eaque productur, vel a flatibus & vaporibus in oculum transmissis, vel ab humoribus in eundem confluxis, vel ab aequo humore supra modum aucto, vel denique a tunicae ipsius vuae tumore. His causis addere possumus, consulsionem vuae tunicae, quae in paroxysmis epilepticis praecipue apparet. Cum enim tunc omnes partes pernotae & membranae distendantur, vuae etiam tunica vuae distensionem patitur. Et hae praecipue ac manifeste apparet in paroxysmo consulsionibus epilepticis, in quibus tanta fit pupillae dilatatio, vt totum seire iude occupet, & illius ratione visio prorsus aboleatur.

Causae externae sunt percussio vel calus ab alto, vel spiritus retentio, vt in parturientibus & tibiicibus. Percussio & calus fluxionem ad oculos promouent, unde distensio pupillae, spiritus retentio status & humores ad oculos impellit, quibus etiam distensio producit.

Diagnosis huius effectus difficilis non est, siquidem pupillae

pupillae dilatatio oculis est conspicua, praesertim si ante morbosam constitutionem pupillae amplitudo naturalis Medicorum innotuerit: tum etiam si cum latitudine pupillae medicorum excedente, visionis laeso adfuerit. Praeterea naturalis amplitudo pupillae dignoscitur ex eo, quod clauso vno oculo; alterius pupilla magis dilatatur: quod non fit in dilatatione morboſa, quia tunica vasa a causa prae naturalis differentia amplius defendi nequit.

Si denique dilatatio pupillae in vno tantum oculo appareat & praeternaturalis est: & vnicuique tantum oculum aethi significat.

Quod ad prognosin spectat, pupillae dilatatio ab ortu contraria incurabilis est: quae vero post ortum accidit, difficile curatur, maxime vero quae a siccitate productur. Quae vero ab alijs causis fit, si adhuc recens fuerit, curabilis est: cum affectus oculorum recentes iuxta Galdoctrinam, curationem recipiant: inueterati vero nunquam, aut saltem difficillime tollantur.

Curatio pro varietate causarum varianda est. Si a siccitate fiat, cum vix illud valeat contingere a causa interna, quin totum etiam corpus eadem intemperie afficiatur: Ideo remedia atque alimentis humectantibus & analeptici totum corpus reficiendum est, qualia in febre hectica, usurpata conueſuerunt. Peculiariter vero corpus humectandum est balneo aquae tepidae & lactis recenter mulcti, quod etiam in oculis frequenter instillabitur, praesertim muliebres.

Si fiat ab humore oculum replente, cum ille a capite defluat, etiam caput & totum corpus erit euacuandum, mox humor oculis impactus discutendus. Quae quidem, cum sufficienter perfici valeat remedijs pro suffusionis curationi propofitis, ea hic frustra repetenda non sunt, sed a curatione praedicta desumenda. Quae etiam ea remedia suppeditant, quae humori in oculo contento discutendo ac dissolvendo idonea sunt. Is tamen succedere possunt quaedam alitergentia, quae pupillam nimis dilatatam angustiorum efficiant. In hunc finem collyrij sequens usurpanda poterit.

℞. Rosar. rubr. sicc. ʒ. iij. croci. pice. nardi corticis thuris ana ʒ. i. tuthiae preparatae, podagraciae ana ʒ. i. iij. luterem redacta includantur panno lineo raro, & fiat nodulus, qui infundatur in aqua rosar. ʒ. iij. & illa aqua instilletur in oculum frequenter, toties nodulum exprimendo, quoties aqua usurpabitur.

Si fiat a flatibus, post vniuersales evacuationes, ea medicamenta erunt usurpanda, quae flatus discutunt in toto corpore & ipsi oculis. Atque ita illi focuri potuerunt decocto feniculi, rutae, aneth. rosar. rubr. myrtulorum, facto in aqua peculi rosarum, cum quarta parte vini albi.

Si denique a percussione fiat, pro contusionis magnitudine varianda curatio est: & si adfit inflammatio, instat ophthalmia curanda est. Si vero inflammatio non sit, admouebitur in principio cataplasma ex farina labarum, folijs plantaginis & rolis rubris, cum aqua rosarum paratum. Postea vero sanguis columbinus frequenter instillabitur, quod in omnibus oculorum vulneribus ac contusionibus excellens est remedium.

C A P V T VI.

De Pupillae angustia.

Pupillae angustia visui etiam officit, quemadmodum dilatatio, ut dictum est capite superiori: quandoquidem moderata pupillae amplitudo necessaria est ad species visibiles pericite recipiendas. Sic quando in statu naturali, oculo in loco splendidiore posito, pupilla constituitur, ne lunum nimum recipiat: si subito in obscurorem locum, transferatur, res in eo contentae primo ingressu vix aut parum videntur, propter dictam angustiam. Postea vero quando pupilla dilatata est, omnia res percipiuntur. Igitur in loco mediocri lumine affecto, pupillae latitudo mediocriter esse debet, ut mediocre lumen recipiat, ad visionem recte efficiendam. Si vero pupilla debito angustior sit, sufficiens lumen non recipit, adeo in ipsis, qui hoc vizio laborant, visio imminuta est. Illa tamen in loco valde lucido recte videtur.

tionem exercent, quia sufficiens lumen tunc temporis per angustum foramen ingreditur, nisi alij oculorum morbi cum hoc affectu coniungantur.

Fit autem pupillae angustia, vel ab ortu & prima conformatione, & tunc parum nocet: si enim ea affectu minus videntur in loco obscuro, aut mediocriter lucido, quam mediocri pupillae latitudine praediti: in loco tamen lucido melius & pericacius videntur. Vnde dicit Gal. de sympt. causis, cap. 2. eos, qui a natiuitate pupillam angustam habent, acutius videre.

Vel fit angustia pupillae a causis praeternaturalibus, nemine nimia humiditate, siccitate, defectu humoris aquei, & spirituum inopia.

Ab humiditate fit angustia pupillae, quando ab eadem tunica vasa relaxantur, & relaxata foramen angustius efficit. Licet enim ab eadem humiditate fiat pupillae dilatatio, non tamen contrarij effectus ab eadem causa sunt; quia ut causa eadem dici possit, debet eodem modo se habere ad suum effectum: at non eodem modo se habet humiditas, quando facit dilationem; eam siquidem efficit replendo & distendendo membranam, angustiam vero efficit relaxando: distendit, quando in illius capacitate continetur; & relaxat, quando subleuantur illius imbutur.

De siccitate eadem est difficultas, quandoquidem illa inter causas dilatationis pupillae recessiva est. Haec autem est differentia. Quando vasa tunica exciscentur humoribus in debita quantitate permixtis, tunc facit pupillae dilatationem: quandoquidem tensionem suam, quam antea habebant, non amittit, quemadmodum, (ut superiori capite dictum est) coria tensa quae exciscentur, foramina sua ampliora reddunt. Si vero vasa tunica dum exciscentur corrumpantur & condisant, tensionemque priorem amittant, propter defectum aut imminutionem humorum oculi, tunc pupillae foramen angustius efficitur.

Et sic contractio pupillae a siccitate eadem ferme erit, quae a defectu humoris aquei contingit, quamvis etiam possit fieri sine exciscentione, dum humore aqueo effuso tunica vasa condit.

Denique ex spiritu defectu vel paucitate fit angustia pupillae, quando propter obstructionem nervi optici, aut aliam causam, spiritus visus non potest confluere ad oculum, qui eo repletus tunicarum suarum tensionem conferuat, eoque deficiente illae laxantur & condisunt; unde pupillae contractio euenire solet. Hoc apparet in valde senibus, in quibus pupilla angustior efficitur propter spirituum defectum.

Hoc autem et ex se facile dignoscitur, & sensui patet. Si enim vnus tantum oculis afficiatur, alius: vnus comparatione angustia pupillae dignoscitur. Si vero vterque oculus laboret, aliorum hominum recte se habentium oculos inspicendo laborantes pupillae angustiores comperiuntur.

Quo ad prognosin spectat, pupillae angustia, quae ab humoris aquei iactura procedit, incurabilis est: quandoquidem ille semel effusus regenerari nequit: praecipue in grandioribus. In pueris tamen aliquando per vulnus effusus humor aqueus reparatur atque regeneratur est. A siccitate, etiam, producta pupillae contractio, vix aut difficillime saltem curari potest. Illa vero quae ab humiditate fit, in suo principio, & adhuc recens: facile curari potest, inueterata vero difficillime.

Curatio huius affectus a praecedente variat, quandoquidem ab istis causis productur, nimirum siccitate vel humiditate: quae interperes, quamvis contrarij effectus pariant, modo ante explicato, istis tamen remedijs auferenda sunt.

C A P V T VII.

De Albugine, seu macula, & alijs corneae coloribus mutatis.

Naturalis corneae constitutio euenit, quando perspicuitatem suam amittit, vel colore alieno inficitur. Perpicuitatem suam amittit, quando craffior euadit. Crafficit autem cornea tunica per exciscentionem, ut in senibus, quae affectio irreparabilis est, vel ab humoribus craffis in

lis in eam impactis, quod contingit frequenter in ophthalmia, quando vel a humore resolucentium medicamentorum viu tenuiores humores partes discutiuntur, crassæ verò remanent; vel cum importuno refrigerantium viū humores incassantur; & non solum crassior euadit corneatunica, in ea partes, cui humor ille impactus est, sed etiam album colorem contrahit, vnde Leucoma, seu Albigo nominatur. Fit etiam talis affectus a cicatrice ex vicere relicta, in qua cornea densior redditur, & diaphaneitatem suam amittit.

Varie sunt illius differentie, propterea alia magis, alia minus crassa est, alia corneæ luperficem tantum occupat, alia in profundum consilit, & totam corneam penetrat; alia maior est, & totam pupillam obsidet, vel maximam illius partem; alia minor & exiguum pupillæ spatium comprehendit, tuncque propriè niacula nominatur.

Colore etiam alieno inficitur cornea, quando sanguis in eam effunditur, qui affectus Suggillatio nominatur, & tunc omnia obiecta rubra apparent, vel quando bilis se in eam infusat, quod in icterico contingit, & tunc obiecta flaua apparere solent iuxta Gal. doctrinam. Quod tamen intelligendum est de magna bilis effusione corneam. Si enim leuiter tantum tincta fuerit cornea, quod plerumque contingit, (maior enim bilis receptio in tunica adnata sit quam in cornea,) tunc obiecta colore flauo minime infestata, sed propterea naturaliter se habent conspiciuntur.

Hi affectus speculatiui non indigent diagnosi, quia sensibus conspiciuntur, speciatim verò albugo, quæ crassior est, magis albacit, & magis visum offendit; fit etiam quæ magis superficiali est, magis albacit; quæ autem profundior, ad nigredinem declinat, vt potest vix tunice propior, quæ cum nigra sit, aliquid lūi coloris illi communicat. Causæ eam producentes ex ijs quæ præcesserunt faciliè dignoscuntur, si nempe ophthalmia, vulnus, aut vix præcesserit.

Quod ad prognosin spectat, albugo quæ a pituita fit, humoreque crasso ex ophthalmia relicto, satis faciliè curatur, præsertim si inueterata non sit. Quæ verò a cicatrice relicta, difficilior: quandoquidem in parte exquisita sensu donata remedia acriter atterenda cicatrici idonea vix tolerari possunt.

Curatio albuginis ab humore pituitoso in cornea concreto productæ, emollientibus, attenuantibus & discutientibus rebus perficitur, præmissis tamen vniuersalibus, quæ causæ antecedentes subleuant respiciunt; & nouum humorum influxum ad oculos prohibent, qui faciliè priuari possent à topicis remedijs, præcipuè ijs quæ acrimonia quadammodo calefaciendi vi prædita sunt, nisi illius materia prius submoueretur.

Itaque primum vniuersales euacuationes vsurpandæ sunt, tum etiam reuulsiones & deriuationes, quæ in cura suffusionis & guttæ serena traditæ sunt.

Postmodum verò ad materiam concretam emolliendam, totus admouendus est, cum spongij mollioribus ex decocto semetacris, meliloti, chelidonie, & feniculi paratus.

Vel eiusdem decocti vapor oculis excipiatur, & in hunc finem sequens etiam decoctum parari poterit.

℞. Rad. alrh. ʒ. i. fol. malvæ, euphras. chelid. mai. ana. M. j. semin. lini & fenugr. ana. ʒ. i. i. flor. melilot. P. i. Fiat decoctio in aqua fontis, cuius vapor recipiatur in oculum mane & sero.

Mox discrucientia remedia vsurpanda sunt, qualia in suffusionis curatione descripta fuerunt; illa enim hic etiam plurimum conferre poterunt, atque ita colliria attenuantia, & humorem oculi inæquum resoluentia, inde erunt declamanda, & præcipue ea quæ ex melle cum oxydorcici remedijs distillata componuntur. Aqua enim mellis distillata, etiam sola vsurpata, multum præstat ad omnes oculorum maculas extergendas, si illius vsus diu continuetur.

Ad idem præstat laccharum candum, aqua euphrasie, chelidonie, aut feniculi distillatum.

Tum etiam valde cōferet, si oculis lingua pueri vel puellæ, quæ feniculum matricauerit, frequenter lambatur.

Amatus Lusitanus nubes albas crassas in puella duodecim annos nata, sic cursile refert, post decocto salis papillæ exhi-

bitionem per viginti dies, sequenti collirio.

℞. Mellis in ipso sauo ʒ. ii. fumuturatum feniculi, flor. sambuci, euphrasie ana. P. ii. lacchari candi ʒ. i. v. Distillentur in B. M. & aqua infusetur.

Semen hominis oculum impositum hora somni, purgat oculum a fordibus, etiamque abstergit, si quæ albuginis curationi conducit.

Potenter etiam albuginem discutit succus feniculi recte extractus, cui balsami Perusiiani gutta vna admissa sit.

Idem præstat oleum ex linteis combustis, cum salina pueri mixtum, & penna illitum. Elicuit hoc oleum, linteo accedendo, & inter duas patinas suffocando, materia refrigerata, guttæ illius olei patinæ adherentes inueniuntur.

Albugo verò seu macula a cicatrice producta, curatur iis remedijs, quæ cicatricem emolliere, attenuare ac dissoluere possunt, cum autem ea quæ cicatricem conterunt, acrimonia non careant, maiori cura vniuersales euacuationes ac reuulsiones præmittendæ sunt, ne fluxio humorum attrahatur ad partem, illis igitur, vt supra dictum est, vsurpatis; primum sicut emollientes, aut lissimigia adhibere conuenit, quæ supra propolita sunt. Deinde abstergentia & discutientia remedia admoenda sunt. Primò leniora, qualia sunt supra propolita, præsertim aqua mellis composita. Postea verò ad fortiora veniendum est, qualia sunt sella picium, vt vranocopi, pallinacæ, luccium etiam aliorum animalium vt perdis, galli anseris, bouis & aliorum. Eodem modo vsurpari poterunt succi chelidon. mai. centaure. minor. anagallis & similium, quæ melli permiscenda sunt, tum quod mel absterget, & discutiet vi præditum est; tum etiam quia liquores in oculum infusuli, dissoluant ad canthos, nec in pupilla morantur, in qua eorum actio desideratur, sed cum melle infusati, facile pupillæ adhaerent. Si tamen eorum mordacitas tolerari nequeat, ducti succi aut sella infusari poterunt mucilage gummi tragacanthi, psylli aut cydoniorum, extracta cum aqua feniculi, euphras. aut alia ophthalmica. Formula collirii ex succis talis esse poterit.

℞. Succ. feniculi, chelidon. & anagallis, & ʒ. i. i. succi centaure. min. ʒ. i. mellis albi ʒ. i. Mustar. liniment. Si cum albugine adsit oculorum rubor, vtile erit collirium ex vino albo, sale & tritico paratum in ophthalmia descriptum. Vel sequens.

℞. Aloes & agarici, ana. ʒ. i. Puluerentur, & includantur nodulo, qui maceretur in aqua euphrasie, vel feniculi, & confricentur oculi mane & sero. Aloes abstergit, roborat & fluxionem sistit, agaricus potenter abstergit.

Suggillatio, seu color oculi ruber, ex sanguine in eum effuso productus, si recens adhuc fuerit, optime curatur sanguine columbino in oculum infusato. In illius verò defectu ac muliebri instillari poterit cum pauco thure & croco, vel oui vitellus cum vino admouebitur, quod remedium a Galeno laudatur. *q. de comp. med. sec. loc. cap. 8.* Si vero contumax fuerit affectus, fouendus erit oculus decocto fenugr. althææ, feniculi, turæ, chelidon. vel illius decocti humore oculo excipiendus est. Ac denique ea omnia, quæ pro suffusionis descripta sunt, ad huius affectus curationem poterunt esse idonea. Speciatim verò, in malo inueterato, quando rubor ad nigredinem declinat, a Gal. commendatur hyssopi comaria, linteo in clusa, in aquam feruentem demersa, & oculo admoda. Et docet experientia, hoc remedium tante esse efficacis, vt cruor sensibiliter attrahatur, & linteo adhaereat.

Ac denique color flauus ictericorum, qui in oculis maxime apparet, curato morbo sponte discutitur. Si tamen illius dissipationem accelerare libeat, suffusio acetii oculis excepto id præstari poterit.

CAPVT VIII

De Ophthalmia.

Tunica adnata ita corneæ coniuncta est, vt quamplurimi affectus vtramque tonicam occupent. Si quæ oculum inflammatio licet tunicæ adnatæ propria fit, ad corneam tamen non raro extenditur, in eaque varios affectus

Hh

producit, vlcera nimirum hypopyon, albuginem & alia. Sic etiam palpebre aliquæ tumores, vulnera & vlcera, vtriusque generis communia sunt. Ita vt omnes harum tumorum afflicti, conuulsi tractari nequeant. Ideo nos adnate tunicæ affectus aggruere cogimur, priusquam cornæ morbo vlcere pericquamur.

Ab Ophthalmia igitur incipientes, dicimus, illam quæ, vt verbum ionat, nihil aliud est, quam oculi inflammatio, ab omnibus authoribus pro tunice adnate seu coniunctiue inflammatione viurpata. Lippitudo à Latinis post Corneum Celsum nominatur.

Hæc autem inflammatio, penur maior vel minor est, triplicem differentiam sortita est. Prima *ῥαίε* Græcè Lari- nis conturbatio dicitur, que iuxta Pauli Iouentium, à causa extrinseca oritur, nempe sole, fumo, puluere, oleo & similibus. Sed nihil impedit herietiam à causa interna, vixio scilicet ventriculi post vini potationem, vel alios errores, si tunc levis inflammatio seu phlogosis, cum exiguo rubore & dolore mixta, que tamen in veram ophthalmiam non raro degenerat, & est illius principium.

Verà autem ophthalmia à causa interna perpetuò producit, & sicque verà inflammatio cum tumore, rubore & dolore, lippitudo à Celso nominatur, quia in ea crallum extementum, quod lippa vocatur, oculis adhaeret.

Tertia *ῥαίε* Græcè, Latine etiam chemosis appellata; est quoniam inflammatio ita ingrauescit, vt magna sit cum dolore vehementi, & vtrique palpebra inuersa sit, vt vix ab eis oculi contègantur, & albugo oculi sublimis euaserit, rubrumque magna ex parte inde occupet. In pueris oculis propteruentis habentibus sæpius conigit, & sitque à magna plachura & pituitosis humoribus.

Alia desumpta differentia ophthalmiæ ex Hipp. *Ἀφ. 14. fecit*, quæ nimirum ophthalmia diuiditur in humidam, & siccam. Humida ita est quæ iam fuit proposita, & lacrymarum effusione secum habet coniunctam. Sicca verò, quæ ex eodem Hipp. *ἡ ἁρῆ* nominatur, & in fictioni exalta & auctiore consistit: hî à bile aut melancholia exaltata cuius pars humida & aquosa absumpta est, idcirco nullas humiditates aut lacrymas emittit. Alias etiam patitur subdiuersione ab adiunctis, si enim fit cum pruritu. *ἡ ἁρῆ* dicitur, si cum duritie palpebræ, *ἡ ἁρῆ* dicitur, si cum duritie.

Alia etiam desumpta potest differentia ophthalmiæ ex Gal. *1. de diff. febrium cap. 11.* vbi quandam dicit ophthalmiam esse periodicam, quæ scilicet per intervalla repetit in ijs, qui illi valde obnoxii sunt, & qui caput habent calidum & humidum, oculoque debiles fluxioni recipiendi idoneos. In ijs autem postquam frequenter per multos annos ophthalmia affecti sunt, oculi tandem contabescunt, & visus proliis amittitur, vnde tabida ophthalmia nominatur: vel potius ophthalmia in oculi tabem degenerat.

Alia denique desumpta differentia à causa proxima & immediata, quæ est fluxio, vel congestio. Per fluxionem vt plerumque fieri solet ophthalmia. Aliquando tamen per congestionem generatur, si nimirum aliqua interperies seu imbecillitas coniunctiue acciderit, ex qua *ῥαίε* in parte recte non exercetur, sed multa excrementa in ea congeriuntur, à quibus pars sefe eximere sufficienter non potest, vnde inflammatio succedit.

Causa ophthalmiæ coniuncta est sanguis biliosus, pituitosus aut melancolicus, in oculis deliens, vel in ijs per congestionem cumulatius.

Fluxionis causæ sunt multiplices, tum externæ, tum internæ, etiam vulgò notissimæ.

Congestionis verò causæ sunt illæ omnes, quæ oculos in temperie aut imbecillitate afficiunt: ita vt, quæ à sola fluxione initium duxerat, successu temporis partem debilitans, illius conditionem viciet, & ophthalmia partim à fluxione, partim à congestione fiat, quod in chronica ophthalmia plerumque solet contingere.

Cum autem ophthalmia per viam fluxionis generatur, à capite, vt plerumque fluxionem, eam demum certum est, & omnes propemodum auctores hanc viam fluxionis originem agnoscunt. Verum docet experientia contumaces ophthalmias ab hepate non raro exoriri, & humocibus

ab eo in oculos confluentibus: ita vt tunc temporis causæ ita occipito adnota, morbum foueant, quæ aliquot fluxioni à capite oriundæ maximè conducunt: tunc enim humorum motum ad partes superiores magis promouent. Et vidimus sæpe veteres ophthalmias, nullisque cedentes remedijs, clauso fonticulo, qui diu in occipito gelatus fuerat, breui & sponte defluisse, cessante nimirum humorum motu à partibus inferioribus, tum ad superiores, qui à cauterio continuo fouebatur, natura humores amandante ad illud emissarium, quorum portio ad oculos, tanquam partes vicinas, & à longo affectu debilitatas secebat.

Quæ à capite sit fluxio, vel à partibus interioribus ad oculos deferatur, per venas scilicet quæ sub cranio exsunt, vel per partes externas, quod frequenter est: per venas scilicet & arterias, quæ à petricano per frontem & tempora ad coniunctiuam deferuntur.

Diagnosis ophthalmiæ scillam est, quando quidem sanguis in coniunctiuam effusus, oculos obijciat. Et si rubor sine tumore appareat, atque ab externa causa genitus fuerit, *ῥαίε* seu conturbatio dicitur. Si vero præter ruborem tumor & calor cum lacrymis adfuerit, vera erit ophthalmia. Ac tandem si adeo ingrauescat, vt nigrum oculi occupet, & palpebræ inuersæ sint, *ῥαίε* erit appellanda.

Signa calorem inde repeti debent erunt: quod si fiat à pethora & sanguine proprie dicto, non solum in adnata tunica, sed etiam in tota facie rubor apparebit, rum etiam venaarum latitudo, sensum grauitatis & totius corporis, ac tumor erit insignis.

Si à sanguine bilioso oriatur, aderit lacrymarum acrimonia, vt non solum oculorum anguli, sed etiam genæ ipsæ erodantur, dolor aderit pungitius & intolerabilis; tumor parvus cum rubore ad cutrimentum vergente: excretionis inmodice, insolens, ita & acrum eius præcedent, temperamentum erit biliosum, ætas florens & tempus æstiuum.

Si fiat à pituita, aderit dolor grauius, calor exiguus, non interia rubedo, dolor paruus, lacrymæ non acutæ sed cum multa lippitudine & viscositate.

Si fiat à melancholia, tumor erit exiguus, rubor ad fulcum vergens, lacrymæ pauca, pauca viscositas, sed densa; temperamentum melancholicum, & alia melancholiam indicantia.

Si ab interioribus capitis partibus fluxio oriatur, dolor, capitis apparet, sique magis internus, & ad radices oculorum peruenit. Si vero per vasa exteriora fluxio in oculos irruat, dolor capitis magis externus est; frontis vena distenditur, & pulsatio in temporibus peruenit.

Prognosis respicit ophthalmiam imminuentem, vel præsentem.

Imminens lippitudo cognoscitur ex eo, quod pruritus quidam aut punditæ in oculis cum calore percipiuntur illiusque præfagium augeat dispositio oculorum ad fluxiones recipiendas; sic qui oculos prominentes habent, huic affectui sunt magis dispositi. Malo etiam huic generando maxime conducit constitutio temporum, quæ inmodum docet Hipp. *Ἀφ. 11. fecit*, 3. Si hyems fuerit, sicca & æquale, verò vero pluuosum & australe, affatè lippitudines fieri consueverunt, præcipue in mulieribus, & versus aëra humidioribus.

Alii fluxus ophthalmiæ superueniens, bonus, ex eodem Hipp. *Ἀφ. 17. fecit*, 6. quia humorum abundantia euacuat, & ad inferiora retrahitur.

Dolor oculorum valde diuturnus malus est, causæ enim contumaciæ arguit, & periculum est, ne suppuratio aut exulceratio succedat.

Ophthalmia in vno oculo incipiens, ad alterum vt plurimū transire consuevit.

Ad ophthalmiam curationem causæ externæ primum submouende sunt, tum ante cedens euacuanda, reuellenda ac repellenda, coniuncta demum ad discutienda, & pars affecta roboranda. Quibus adimpletis indicationibus tria medica instrumenta de more aptanda sunt.

Videtur itaque fit refrigerans & humectans, ex alimentis enchymsis, elixis potius quæ affis, foridibus potius quam solidis, quia mordendo oculi exagitantur, Viter actia, *Alia*

falla & piperata; tum etiam vaporosa, quæ caput replent; tum qui in bilem facili conuertuntur, vt lac, saccharum, mel & omnia dulcia. Vinum in principio non conuenit, cuius loco pitana ex hordio & liquorita, aut alia refrigerans viurpanda est.

Somnus valde vitis est, quia oculus quiescit à motu, qui dolorem & fluxionem irritat, tum fomno oculo sedatur, & materia morbifica concoquitur; æger dormiat eleuato capite, & in latius magis laui.

Motus omnis corporis vitandus est, & quies imperanda; quæ tantopere vitis est, vt Celsus primo die à sermone quoque assensere iubeat, ne motu illo materia ad caput attrahatur.

Alui fluida seruanda est, lippientem enim (ait Hip.) alui profusio corripit bonum.

Vitetur animi pathemata, & præ cæteris ira.

Ac sit temperatus ac purus, expers fumi, pulueris & ventorum; obiciatur etiam & tembecoliosus: lux enim fluxiones commouet, spiritus agitando. Linetolum nigrum, vnde, aut ceruleum oculo obducatur, habeatque æger non solum oculum ægrum, sed etiam sanum clausum, vel tectum, quia sanus oculus, dum ad obiecta moeuer, ægrum etiam commouet, vnde dolores incrementum. Et hæc ratio est, cur vno oculo tantum inflammato, maiores fiant dolores, quam vtroque affecto.

Victus ratio hoc modo instituta, Taraxis curatio primæ exponenda est. Et cum ea à causis externis plerumque oritur, illæ statim submouenda sunt, nec morbum foueant, & in ophthalmiam conuertant. Mox collarium parietur, ex aqua rosarum, plantaginis, albuginis oui, & lacte muliebri, idque insillatur in oculum pluries in die, tum pannus lineus in eo malefactus applicetur. Eodem tempore æger fomno indulget quantum poterit; plurimum enim valet fomnus ad materiam morbosam concoquendam & discutendam. Si his non sedatur affectus, ad vere ophthalmiæ remedia confluendum est, quæ hæc ferè viurpanda sunt.

Statim ab initio morbi vene secanda est, præmissio clystere; eaque de directo parti afflicte aperienda. sæpe que iteranda phlebotomia, donec sufficiens enacuatio, & reuulsio facta fuerit, docetque Auicenna in vera ophthalmia sanguinem mittendum esse vique ad lipothymiam. Galeno verò lib. de curatione per sanguinem, myst. cap. 17. refert historiam cuiusdam æconomi, qui à grandissima ophthalmia liberatus est, sanguine detracto, primum ad 12. di. deinde de post quatuor horas ad 12. & cap. 16. eiusdem libri, testatur ophthalmiam sæpe sola phlebotomia intra vsam horam fuisse curatas; quod non potuit contingere, nisi magna sanguinis copia detracta fuerit, quemadmodum eo tempore passim fieri consueuerat. Moderata tamen est illa sanguinis missio, iuxta temperamenti ætatis, sexus, virum, & speciei ophthalmiæ rationem. Maior enim quantitas sanguinis detrahenda est in ophthalmia, quæ fit à sanguine & in corpore plethorico, minor verò in ophthalmia biliosa, melancholica, aut pituitosa, & aliis circumstantiis magnam sanguinis detractionem dehortantibus. Si sanguis in toto corpore redundet, primum basica, vel mediana aperienda est postea verò cephalica. Si verò minori copia sanguinis mittendus esse videatur, sitim cephalica erit aperienda.

In iis autem, in quibus aliqua sanguis euacuatio confecta suppressa fuerit per menses, aut hæmorrhoides, vene inferiores aperiende sunt, aut huiusmodi hæmorrhoidibus assigendæ.

Postquam verò sufficiens sanguinis copia per venæ sectionem detracta est, vitæ molienda reuulsio per cucurbitulas scapulis, dorso affixis, tum ficcas tum scarificatas.

Ad eandem reuulsionem non parum etiam conferent frictions & ligature in partibus inferioribus celebrata.

Reuulsionibus prædictis deriuationes quoque adiungende sunt, quæ hanc per apertionem venarum frontis & temporum, quibus addunt nonnulli apertiones venarum quæ sunt in angulo oculi, alii hirudines temporibus admovent, alii ponunt aure. Quæ omnia deriuationum genera post sufficiens euacuationem vitissima sunt.

Galenus 12. meth. cap. 22. arteriotomiam laudat in arto-

rijs temporum celebratam, quando ophthalmia fit à sanguine valde calido & feruente. Et quoniam hoc remedi genus nostris temporibus ferè obliuiscit sit præstantissimum tamen atque vitissimum est, omnis expers periculi. Sola enim ligatura impedit sanguinis arteriosi effluxum in, minoribus illis arteriis. Neque necessarium est emplastrum à Galeno propositum huc citato, & ex bolo armeno, thure, masticæ & pilis leporinis, cum albugine oui compositum, quod tamen ad maiorem cautelam, qui hæc arteriam apertionem reformant, in vium teuocare poterunt. Quæ de hac arteriarum apertione à nobis sunt dicta, in doloris capitis curatione videri poterunt.

Veficatoria quoque in hoc affectu vitissima sunt, tum posteriori parti ceruicis, tum ponè aures adnota.

Sanguine sufficienter detracto, purgatio etiam celebranda est, vt biliosi humores, præsertim qui languini feruorem & impetum conciliant, euacuetur. Eam autem maxime conuenire docuit Hip. Aphor. 17. sect. 6 vbi ait, Lippientem alui profusio corripit bonum. Galenus 13. meth. cap. 11. Ex igitur, inquit, quibus oculi tentari phlegmone caperant, nonnulli sola purgatione per alium vno die sanatos vidimus. Debet autem fieri purgatio ex medicamentis blandioribus, ac sanguini feruorem cohibentibus vitatis diagrydiatis quæ in sequentem aut consimilem formulam reduci poterunt.

℞. Thamarindor. 3. ss. lenis mund. 3. ss. sem. anisi 56. folior. endiu. cichor. sumat ana M. ss. Coquantur ad 3. vi. In colatura infunde rhubarb. electi & myrobalanor. citrin. oleo amygdalar. dulcium conficaturatum ana 3i. Santali citrini 3. ss. In expressione dissolue manne syrupi rosacei ana 3. i. M. Fiat potio. Vel in forma boli.

℞. Cassiæ recentis extractæ 3. vi. cathol. dupl. 3. iiii. rhubarb. puluerati 3. i. Cum saccharo fiat bolus.

In ophthalmia pituitosa pilula non raro præstabuntur, nempe lucis maiores, de agarico, & aliæ huiusmodi: quæ quidem, licet in statu morbi commodissime sint, satius tamen est in principio ab iis abstinere, ne vehementi medicamento humores commoti magis in partem irruant.

Neque vnicuique purgatio sufficit, sed ea per intervalla repetenda, si morbus in longitudinem abeat; præmissis præparationibus conuenientibus per apozemata, vel iulepos humori peccanti appropriatis. In primis verò ab initio morbi humorum feruor temperandus est iulepis refrigerantibus & incrassantibus, vel emulsionibus seminis quatuor frig. maior. lactuce & papau. et alii in decocto refrigerante, adita aqua rosacea.

Præmissis vniuersalibus euacuationibus & reuulsionibus, ad topica veniendum est, quæ quidem ab initio repellentia esse debent. Monent tamen maiores Prædici, ne primis istis diebus colliria repellentia oculis admoventur, quia plerumque humorem in oculis impetu irruentem in parte retinent, & dolorem atque inflammationem augent. Galenus enim comment. Aph. 3. i. sect. 6. Ocularium quendam reprehendit, qui hisce remedijs ab initio inflammationis vti proposuerat. Suspecti enim esse ait ab initio, quod vehementes fluxiones non reprimant, sed ne excernantur prohibeant: Vnde, si acres humores extiterint, corneam eruerunt accidit; si verò multi, diffidendi & irritari vehementer, & interdum diffumi. Auicenna verò sen. 3. lib. tertio, tract. 1. cap. 9. sic loquitur: Et oportet quantum possibile est, vt retardetur in ophthalmia colliriorum administratio vsque ad tres dies. Et paulo post Oportet, inquit, vt in principio non adhibeantur insipientia fortia, & quæ sint vehementer, si ipsa quoniam insipientia inuicem & prohibent resolutionem, & augent dolorem. Non tamen ita exacte determinat numerum præsternendus est, cum morborum temporum in quibusdam breuiora, in alijs longiora esse soleant. Vtiliter tamen alitringencia fronti & temporibus statim à principio admovent poterunt; illis enim vene, per quas humores delinunt ad oculos, comprimuntur, humorque influens repellitur. Horum formula talis esse poterit.

℞. Boli armenæ, sanguinis dracon. thuris, masticæ, ana 3j. rosar. rubr. balsam. stor. & farinæ lentium, ana 3. ii. Excipiantur albugine oui & aceto rosaceo. Fiat cataplasma fronti & temporibus applicandum.

Ad fluxionem etiam cohibendam, plurimum valere creditur cataplasma ex succo vitricæ & farina tritici, & propter temporibus applicatum, quandoquidem vitricæ succus specificus vi omnem sanguinem suum cohibet, & nativum hæmorrhagiam uldem partem admodum potenter sistit: tum ore sumptus eadem hæmorrhagiam, aliaque sanguinis profluvia efficaciter cohibet.

Interim tamen oculi magis vireat, qui fluxionem ad oculos magis ac magis promovere consequuntur anodyna medicamenta ipsi oculi admoventia sunt; inter que lac recens præsertim mulieribus bene sanæ priusquam locum obtinet idque ex ipso vberis in oculis emulgendum & sepe mutando oculo enim accedit, sicque oculum infensus est in eius locum suffici poterit calcaus oculis recens, qui etiam sepe mutandus est ne putrefcat, sicque oculum inflammaret.

Oui albumen dui agitur, & in aquam conuersum, maxime commendatur a Galeno, quia dolorem lenit, & fluxionem leniter cohibet.

Ponum sub cineribus coctum dolorem oculorum etiam valde temperat.

Mucilag. nes feminum psyllii, cydoniorum, fenugr. extractæ cum aqua rosar. dolori valde leniunt. I.æ tamen bi-duo quoque renouandæ, quia diutius seruatz, acorem contrahunt.

Ex his variæ formulæ in rem præsentem concinnari poterunt V.g.

¶ Medullæ pomi dulcis sub cineribus cocti ʒ i. mucilag. femin. psyllii & cydoniorum extractæ in aqua rosar. an. ʒ iij. liquoris albuminis oui recentis, & lactis mulieris an. ʒ i. Fiat cataplasma oculo applicandum Vel

¶ Pulpe pomi cocti ʒ i. mizæ panis albi ʒ i. fl. ouum n. i. Cum lacte ouilebri fiat cataplasma.

Lanæ carus recens, hordium, vitulina, aut veruecinæ oculis sit quænter adnotæ, dolorem potenter demulcent. Simplicius cataplasma parari potest ex medulla panis, in lacte muliebri, & aqua rosarum macerata.

Si dolor vehementissimus sit atque intolerabilis, ad narcotica confugiendum est; quibus tamen parce & cum religione vtendum, quia spiritus vitioris condensant humores & tunicae incrassant, sicque vium hebetant. Inter narcotica ocularia primas tenent trochisci albi Rhasis cum opio, qui in hunc modum præscribi possunt.

¶ Aquæ rosar. ii. liquoris albuminis oui fortiter agitati ʒ i. trochiscor. alb. Rhasis cum opio ʒ i. Fiat collyrium in oculis infundendum.

Sedato aliquantulum dolore, ad repellentia veniendum est, quæ tamen mitiora esse debent & us anodyna quadam perpetuo admoventia, & in hunc finem collyrium sequens præscribi solet.

¶ Aquar. Plantag. rosar. (vel ad magis repellendum) peculi rosar. an. ʒ i. ʒ i. liquoris albuminis oui ʒ i. trochisc. alb. Rhasis sine opio ʒ i. Fiat collyrium, in oculos frequenter stillandum.

Si dolor sit acerbior, possunt addi collyrio lac muliebri, & mucilagines prædictæ.

Remedium sequens inflammationem potenter sedat, & fluxionem cohibet.

¶ Albumen oui vnius. Agitur cum frusto aluminis satis magno in patina stannea, & tandem moueatur, donec vnguenti consistentiæ adeptum sit, quod extendatur super lientem & oculis tepide applicetur. Post duas aut tres horas auferendum est remedium: ne longiori mora & alitragendi vi satis insigni, quam ex alumine habet, humores in oculo retineat.

Aqua etiam aluminis destillata in alembico supra cineres & oculum cum linte is ea madidis admotæ, inflammationem efficaciter temperat.

Sal Saturni in aqua rosarum vel oxycrato dissoluitur, vel cum pomata permixtum, oculorum inflammationes potenter extinguit.

In augmento morbi, digerentia cum repellentibus miscenda sunt, atque ita collyris prædictis addi poterunt aquæ euphrasie, galliculæ, chedonizæ & mucilagines feminum limalthæ, fenugræci Gal. ʒ i. mizæ decoctum fenugræci præcipue commendat, quod digerit, concoquit &

modicè repellit. Debet autem fenugræcum antequam decoquatur, vel ex eo mucilago extrahatur, excutit per cribrum, ut puluis quo abundat auferatur, postmodum verò aqua frequenter abluat. Collyrium formula talis esset poterit.

¶ Mucilagin. femin. fenugr. & cydoniorum extractæ in aqua rosarum & euphras. an. ʒ i. trochiscor. alb. Rhasis sine opio ʒ i. tuthiæ præparatæ ʒ i. Fiat collyrium.

Quando morbus ad laticum magis vergit, farcocolla etiâ, collyris additur, quæ paulo potenter digerit. Sed cum siccitate sua & acrimonia quadam oculis lædere possit, prius lacte nutrienda est, macerando sicut in lacte per dies aliquot, lacte frequenter mutato. Et parua illius quantitas vna vice præparanda est, dum enim assueta accedit, & oculi infensa est. Illius vius talis esse poterit.

¶ Florum chamomillæ, neli rosar. rubr. an. P. i. sem. fenugr. opem. mundati ʒ i. Coquantur in aqua plantagin. In colaturæ ʒ i. dissolue farcocollæ nutritæ ʒ i. tuthiæ præparatæ & trochiscor. alb. Rhasis sine opio, an. ʒ i. Fiat collyrium.

Aquæ etiam nonnullæ ab æthoribus commendantur tanquam efficacissimæ.

Quæretantus in Pharmacopæa laudat infusionem croci metallorum in aqua euphrasie & fœniculicæ quæ satis efficax est, & nullo morbo oculi afflicto, quemadmodum reliquæ ferè omnes.

Crolius & reliqui chymici miris lapidibus effertur sal Saturni in aqua rosarum dissoluitur, cui etiam salis ampu-niaci grana aliquot addit. Huius formulæ talis esse poterit.

¶ Salis Saturni gr. x. salis ammoniaci gr. iij. aquæ rosar. ʒ i. M. infunditur in oculum mane & sero.

Ex pluribus etiam calcinatis, vel lythargy. ro, aut minio in aceto infuso paratur aqua, quæ cum panis leue oculi ad-mota, eorum inflammationibus citissime medetur.

In vulgari vii habetur aqua ex vitriolo albo in aqua rosar. aut plantag. dissoluta; quæ inflammationes temperat, dicitur & fluxionem arceat. Eorum proportio talis est.

¶ Vitrioli albi ʒ i. aquæ rosar. vel plantag. ʒ i. Vitriolum pulueratum in aqua ad ignem dissoluitur. Coletur aqua per linteum, & in oculis infunditur; si acrimonia sua nimium eos vellicet, additione aquæ rosar. vel plantag. ad libitum temperabitur. Sequens minoris acrimoniæ partici-pe est, & magis resoluat.

¶ Radic. iros. Flor. & rosar. rubr. an. ʒ i. aquæ rosar. & plantagin. an. ʒ iij. Bulliant lente igne ad tert. as. Colaturæ adde vitrioli albi puluerati gr. vii. Fiat collyrium.

Vnguenta etiam quamprimum ad ophthalmicæ curatio-nem viurpant solent, ex quibus tria sequentia cetera longè superant, & mirabiles non rarò effectus producent. Pri-mum describitur à Renodo in Pharmacopæa, titulo vn-guenti ophthalmicæ in hunc modum.

¶ Boli armenæ in aqua rosar. lotæ ʒ i. lapidis calaminaris in aqua euphrasie rubri, tuthiæ præparatæ an. ʒ i. margari-tarum tenuissime leuigatarum ʒ i. camphoræ ʒ i. opii gr. v. buryri q. l. Fiat vnguentum secundum artem, ad oculorum angulos & palpebrarum cras adhibendum.

Secundum est Ioannis Cratonis, quod proponitur in consiliis Medicis à Laurentio Scholzio collectis, consilio 6, in hunc modum.

Accipitur buryrum, si haberi potest, mense Maio factum aut aliud recensissimum diligenter elotum, vel loco illius medulla bouina & cruribus, vel ceruinatque huic ad-misceatur lapidis calaminaris in tenuissimum puluerem triu quantum excipere poterit. Fiat vnguentum.

Tertium habetur apud Penotum in denario, in hunc mo-dum compositum.

¶ Tuthiæ præparatæ ʒ i. camphoræ ʒ i. viridis æris gr. ʒ i. Tuthium cum camphora simul concutere in mortario, æs ferream, omnia verò ad pulueris impalpabilis consisten-tiam. Tum ʒ Buryri recentis ʒ i. aquæ rosar. ʒ i. Bulliant leniter simul, & ab igne remotis, primum tuthium cum camphora, deinde æris viridis sensim immisce, agitato opti-mè, & in vase vitro recoode. Fiat vnguent. m. quod per sericum transeat. Inunge interiores palpebras, præsertim circa angulos & breuidius sanabitur. Probantissi-mum est ad oculorum inflammationes tam materiales, quæ

ficat, & palpebrarum pruritus, & lachrymas singulare remedium.

Aliud vnguentum habetur magnæ efficaciz in cilla medica, quod tamen acrimoniæ valde pariceps est, idcirco palpebris tantum admoventur, illius descriptio talis est. Ceteris omnibus nihil conferentibus hoc remedium profuit in rebelli ophthalmia. Quod fit ex lucco nicotianæ & butyro marali simul coctis ad vnguenti consistentiam, quod clausis palpebris admoventur, in loco obducitur, quamprimum patiens oculos aperit, statim modicare incipit, & feliciter curat.

In statu resolutientia remedia tepellentibus prævalere debent. Ideo eadem remedia, quæ pro augmento descripta fuerunt, in statu etiam convenient, si resolutientium quantitas augeatur, tepellentium vero minuat. Præcipue verò vnguenta duo posteriora, non solum in statu, sed etiam in ipsa declinatione, & vique ad perfectam curationem viutari poterunt.

Fotus in primis ad discutiendam materiam morbosam in statu idonei sunt, qui in hunc modum parari possunt.

℞. Florum chamomilæ, meliloti & rosar. ana ꝑ. j. semin. semugr. vj. suprà dictum est præparati. 3j. Fiat decoctio, quæ foveatur oculi cum panis lincis tenuibus quadruplicatis. Hic fotus in fine augmenti, & principio status conveniet, & calide applicabitur hyeme; æstate verò tepide, aut subfrigide.

In fine status & declinatione, magis resoluens fotus efficitur, si prædictis simplicibus addantur folia euphrasiz, maioranzæ, beconice, & tanillum vini albi.

Præclarissimum etiam, & paucis notum ad discutiendas ophthalmias remedium paratur ex oleo, seu liquore, qui ex linteis accensis, & inter duas patinas suffocatis elicitur; cuius liquoris gutta una cum salua pueri permiscetur, & pennæ apice oculis admoventur.

In declinatione non solum remedia prædicta, sed etiam collyria magis resolutientia viutari poterunt, in hunc modum.

℞. Thuris & aloes ana 3j. sacrocolle nutritæ in lacte muliebri ʒ. ss. croci ʒ. ss. mucilag. semugr. j. & aquæ feniculi & euphrasiz ana ʒ. j. ʒ. fiat collyrium. Vel si magis ficandum & simul dirigendum est.

℞. Sacrocolle nutritæ ʒ. j. tuthie præpar. ʒ. aloes ʒ. j. myrris ʒ. ss. mucilag. sem. semugr. ʒ. aqua verbene & chelidoniz ana ʒ. j. ʒ. fiat collyrium.

In fluxione pituitosa, potenter resolutientia non solum in declinatione, sed etiam in statu & augmento audacius viutari possunt.

Præterea in declinatione vnde insignia remedia ab auctoribus proponuntur, nempe balneum & vini ususque primū ab Hippocratâ sunt. *Apb. 31. scilicet, his verbis, Dolores oculorum vni potius, aut balneum, aut fomentum, aut veni scilicet, aut medicamentum optatum soluit.* Gal. in commentario huius *Apb.* distinguit casus & tempora, in quibus prædicta remedia conferunt, quæ etiam à nobis exposita sunt, quoad venæ sectionem, purgationem & fomentum spectat. Balneum verò docet Gal. *de loc. aff. c. 23. lib. 13. meth.* tunc temporis convenit, quando ophthalmiam fit ab humoribus acerbis; & corpus suffulcent per phlebotomiam & purgationem evacuatum est. Quandoquidem humorum acrimoniæ temperat, eorumque motum, atque fluxionem sistit, maxima eorum parte per insensibilem transpirationem excreta, & quod superest humoris biliosi contemperatum, facilius vincitur à natura. Convenit etiam balneum ex Galeno in ophthalmia pituitosa, præmissis perpetuo evacuationibus idoneis, quandoquidem humoribus crassius oculis impacti per baln. cum attenuantur, sique facili discutuntur.

Vini autem meracioris potio, ex eodem Gal. cum prædictis, utilis est in quibus sanguinis copia crassioris in oculorum venulis coarctatur, sine plethorica in toto corpore dispositione, quia sanguinem illum crassiores liquat, fundit ac discutit, tum etiam obstructions aperit.

Ad ruboris & inflammationis reliquias auferendas, fotus sequens parari poterit.

℞. Folior. euphrasiz, polegij, ana M. j. flor. chamomilæ, meliloti, rosar. rubræ & palce auzæ, ana ꝑ. j. semin. semugr. ʒ. j. sem.

feniculi ʒ. j. Fiat decoctio, addendo sub finem parum vini albi, quæ foveatur oculi, cum panis lincis, vel sacculus prædictis simplicibus semiplenus.

Aqua feniculi ocula cum vino astringente permixta vtiliter admoventur pro fotu, ad reliquias discutiendas, & oculum roborandum.

Quam ad duritiem coctum detracta testa, & per mediū sectum, calide oculo admotum, ruboris reliquias ablumit.

Fotus ex decocto hyssopi soli ruboris reliquias etiam efficitur discutit.

Ophthalmia inueterata, & quæ per multos sæpè annos periculis duertur, aliquantulum, & longiore curanda rationem postulat, & illa non raro magnum Medico curantifacessit negotium, cum difficillime impedire possit, quominus pars nobilissima & delicatissima, à longo tempore debilitata fluxionem recipiat. Adde quod non solum per fluxionem sœpè hic affectus, sed etiam sæpè numero per congelationem ex intemperie in parte contracta, quæ difficillime corrigi potest.

Ad illius curationem primò aduertendum est, num à calidiori hepatis intemperie, quod non raro fit, affectus iste foveatur; & tunc remedia calida illam intemperiem corrigentia primū admittenda sunt. Et in primis post phlebotomiam & purgationes convenientes, maxima conferunt balnea, scilicet lactis, & aquæ minerales, vtiolæ, statim etiam hirudines hemorrhoidibus afflicte.

Si verò ophthalmia materia à flos cerebri intemperie oriatur, cuius ratione humores pituitosi ad oculos de fluxant cum aliqua sanguinis portione permixti: tunc temporis cerebri expurgationis incumbendum est per pilulas vtiuales, (post evacuationes vniuersales, per apozemata, aut à lia humiliori remedia), bis, ter, aut quater, in menſe viutatas, quæ simile effe poterunt, quæ pro frigida cerebri intemperie præscriptæ sunt.

Si purgationes prædictæ cum alijs remedijs infra descriptis ad curationem non sufficiant; ad purgationes mercuriales per intervalla repetitas, tanquam ad sacram anchoram coniungendum est.

Tum etiam, ad humoris influentis diversionem, cauterium occipit admotum erit vtilissimum. Cuius loco setaceum postteriori cerebri infirmum multo felicius operabitur, in iis qui hoc remedijs genus ferre poterunt. Vescicatorium sinepiti admotum mirifice proliit in vetula quodam vtiitudine contumaci laborante, vt testet Forstius *de bl. l. lib. 11.*

Rondeletius vero cauterium, futura coronali affixum magis prodesse asserit, quàm in alijs partibus.

Malticioria etiam ad fluxionis derivationem proficua futura sunt minime vero errhina, quæ propter partium viciniam, humores ad partem affectam attrahere possunt.

Si autem cerebrum maiori exsiccatione indigere videatur, ad dietam sudorificam coniungendum est, ex china, salis parilla, & alijs etiam sudorificis consuetam.

His accedent topica resolutientia & oculis roborantia, quæ sunt in primis fotus & vnguenta, pro statu & declinatione ophthalmiæ supra propostia; quæ etiam inueteratas ophthalmias discutere plurimum valent.

Neque omittenda est ablutio oculorum suprà memorata, ex aqua feniculi & vino rubro, ruboris reliquias discutiendas, & oculos roborandos, quæ singulis diebus mane iteranda est. Ad humilioris etiam ophthalmias inueteratas aqua sequens magnæ est efficaciz.

℞. Aloes opt. & tuthie præparatæ, ana ʒ. vi. sacchari albisimi ʒ. i. aquæ rosar. & vini albi non acidi, ana ʒ. vi. Infundantur in ampulla vitrea bene clausa ad solem per 40. dies. Huius aquæ non colata infundatur guttæ aliquotæ in oculum.

Vel ʒ. vini albi ʒ. ii. aquæ ros. ʒ. ii. tuthie præparatæ, ʒ. iii. garyophyl. puluer. ʒ. i. camphoræ ʒ. ʒ. Misceantur omnia in vase vitreo bene clauso, & agitentur per duas horas, ac soli exponantur per mensem integrum, ea cautione vt singulis diebus ante solis occasum ab aere remoueantur, nec illi vnguentum, nisi à sole illuminato, exponantur. Huius aquæ per filtrum tractæ guttæ duæ, vel tres in oculum infundantur hora summi, vel etiam hora vna aut altera ante exitum electio vel cubiculo. Ruborem

oculorum etiam inoperatum tollit; lachrymantes oculos, & fistulosos fixatos: omnes superfluum humiditatem circa membranas exterritas abluuntivum acuit.

Sequitur etiam præstantissima ell. g. Trinit. M. g. salis tri-
M. i. Pomatur in vale cupreo, & affundatur vinum album
vt mactur; superneget alt. uide duorum digitorum trans-
fueriorum. Tegatur vas, simul flet in vmbra per 6. aut 7.
dies, donec liquor colore n. videlicet acquirere incipiat,
mouendo plura in die cum spatula lignea. Liquor tandem
effundatur per inclinatoriem, & coletur; si opus fuerit, per
chartam empetreticam. Eius gutta vna instilletur in oculum.
Ruborem differt, fluxionem ardet, oculos abstergit &
maculas omnibusque foridibus, & visum acuit.

Solenander plurimum laudat decoctum foliorum cito-
niorum, quæ primo vere citra & illæsa colligenda sunt,
& diligenter allicuanda, ut sita, puluere alitque inquinam-
entis obliantur, & vias tempore, eorum manipulus in-
coquatur aqua purillâ tempore læpenti nerò oculi abluantur;
Mirum, inquit, quam oculis præferant, ruborem
difficiunt, & influentem humorem arcent.

Aliquando cum ophthalmia pertinet, fordes quamplu-
rimæ, puris instat, in oculis colligitur, quæ vix collyriis
aliquis remeius curari possunt. Attamen hoc casu maxi-
me confert gossipium optimè carpum, aut digitis dicer-
ptum, & ad prunas diligeat effricatum, cuius pauca qua-
litate instat plurimode oculi contigantur, fascia superia-
ducta. Manè gossipium aurescitur dicitis foridibus inobitum;
hocque remedio per plures noctes continuato, morbus cu-
ratur, qui al. is remeius non cedit. Et præcipue succedit
in poëris & in aëtiis tali morbo laborantibus.

Pro huius capitis coronide, non erit abs re Zacuti Lusitani experientiam proponere, qui ophthalmiam despera-
tam, & omnibus remediis per annum integrum pertina-
ci obliante u. vnguento mercuriale curauit. Quamuis
enim nulla his venerat apparet indicia; Mercurialis
admonitione perflatus, qui lib. de Morbo Gallico, Cum va-
deret, inquit, morbum q. vnguentum communibus remediis non
curaretur, esse merbum Gallicum cognominatum, & gro-
tantem interrogauit, n. qui esset passus aliquando lumen ve-
nerem, aut ad prunas diligeat effricatum, cuius pauca qua-
litate instat plurimode oculi contigantur, fascia superia-
ducta. Manè gossipium aurescitur dicitis foridibus inobitum;
hocque remedio per plures noctes continuato, morbus cu-
ratur, qui al. is remeius non cedit. Et præcipue succedit
in poëris & in aëtiis tali morbo laborantibus.

Idem Zacutus Lusitanus in præxi ad historias, ad oph-
thalmiam inueteratam, & admodum consummatam, valde
commendat aquam & vnguentum, quæ a nobis descripta
sunt e. de suffusione.

CAPVT IX.

De Hypophymæ puris sub cornæ.

Oculorum inflammationes, quando insignes sunt, & in
magnum tumorem eluata, aliquando per resolutionem
terminari nequeunt; sed in suppuratorem abeunt,
quod maxime metendum est, & omni ratione auertend-
um, ne enim vlcera succedunt, & aliquando pus sub cor-
næ colligitur, qui affectus dicitur hypophyma. Confusionibus
etiam oculorum non raro succedit & suffusionibus inde
ortis. Interdum tota in pupillam contigit, & visum im-
petit. Interdum verò in iridis circuitum amplectitur, & vng-
uis relecta figuram refert, quæ ratione vng. seu vnguis
nominatur.

Cognoscitur hic affectus non solum ex colore albicante
puris naturam referente, sed etiam ex præcedente inflam-
matione, aut suffusione. Commoto etiam oculo, pus sub
cornæ commoueri videtur: affectu color rubescit in oculo; &
dolor pullans aut saltem præcæsit.

Ad curationem, præmissis vniuersalibus remediis, si in-
flammationis reliquæ superint, auferende sunt remediis
in ophthalmia descriptis. Postmodum leuiter discutientia
ad mouenda sunt emollientibus permittenda tenuiori par-
te resoluta, crassior materia fiat, & resolutioni minime in-
dolea. Fiant igitur fomenta ex decocto lotorum chamomili,
meliloti, feniculi, phylli, & fenugr. cum panis lineis, vel fac-
culis applicanda. In progressu verò addi poterunt decocto
folia euphras. chelidon. & semin. feniculi, vel frequens colly-
rium viurpari poterit.

¶ A. quæ verbenæ, rutæ, chelidon. rosar. & feniculi, ana
ss. aloes optuthie præparata, ana ss. sacchari candi ss.
Pulueriscent & misceantur, addendo lactis muliebri tan-
tulum, & fiat collyrium; de quo bus tenet in die guttæ ali-
quot oculis instillantur.

Sequens erit valde efficax.

¶ Croch. aloes, myrrhæ ana 3. l. vini ss. mellis 3. vi. Dif-
soluantur crocus in vino. Deinde cum aloes & myrrhâ misce-
antur. Tandem nil addatur. Hoc remeius oculi instillantur.

Denique ea remeius, quæ in declinatione ophthalmiæ,
in oculorum maculis, & suffusione præscripta sunt hic
etiam conueniunt.

Si resoluentibus medicamentis materia discuti nequeat,
ad alia remeius confugiendum est. Gal. 14. facchari candi ss.
Ocularium quemdam ius temporis Medicum, cui solus nomen
erat, concussione capitis multos hypophymas auisit. Collo-
cans enim eos in sella rectos, ac caput eorum vtrinque
latius apprehendens, mor quælibet, adeo vt manifeste
descenderet pus ipsi videretur.

Si neque hac ratione, pus vsum impediens dimoueri va-
leat, Gal. 14. curato ad chirurgum confugi, quem sequitur
Aetius & alii quamplurimi, quæ oculi punctura perfici-
tur, qualis in suffusione fieri consuevit. Quæ quidem opera-
tio, vt parum nostris temporibus vsitata est, sic peritissimè
chirurgi manu desiderat, & verendum maxime est, ne
aperta cornæ, cum pure humor aqueus effluat.

CAPVT X.

De Phlyctenæ.

IN cornæ & adnata tunica, quemadmodum in reliquis
corporis partibus, generari solent vesicæ parvæ, aqua
repleta, bullis seu vesiculis similes, quæ a combustionis quæ
serueus excitatur, quæ Curatæ Græcis, Arabibus *Bether*
nominantur: suntque tumores quidam parui instar grano-
rum milijab acri quodam aut seroso humore oriendi.

Harum pustularum cognitio facilissima est, cum sensibus
patent. Quæ in adnata oriuntur, rubrum colorem referunt
quæ autem in cornæ, subnigrum, si in illius superficie
consistant, album verò, si in parte cornæ profundiore sitæ sint.

Quod ad prognosin spectat, phlyctenæ in adnata minus
periculose sunt, quàm in cornæ. Superficienæ pustulæ mi-
nus periculose profundiores vero magis metendum enim
est, ne tota cornæ densitas erodatur, vel humor aqueus ef-
fluat, vel vix præcedentia contingat.

Curatio in materiæ coniunctæ resolutione tota versatur,
& causæ antecedentis auctione. Est omni modo pustularum
suppuratio prohibenda, quæ in viciu degenerat.

Vniuersales igitur euacuantes, resoules, & ac deri-
uationes, quæ in ophthalmia curatione propofice fuerunt, hic
etiam celebranda sunt.

Postmodum topica ad ministranda, quæ leuiter repellant
in principio, tum etiam deficiant: qualia in ophthalmia
augmento propofice sunt, quæ magis conueniunt, quod
plerumque fieri consuevit.

In progressu verò, magis exsiccantia & resoluencia erunt
viurpanda, qualia io statu & declinatione ophthalmiæ de-
scriptæ sunt, ac præsertim vnguenta ibidem propofice, quæ
pustulis illis discutendis & exsiccandis apullissima sint.

C. A.

Ophthalmiæ succedere solent vlcera in cornæ tunica, & adnatæ, quando in suppurationem versa est. Succedunt etiam phlyctænis seu pustulis, in cornæ oriundis, ique disruptis. Fieri etiam solent ab humoribus acerbis, & erodentibus in oculis conulentibus.

Varie eorum differentie ab auctoribus proponuntur, ex variis circumstantiis desumptæ; prout scilicet vel superficialia sunt, vel profunda: lata, vel angusta; varias figuras habentia, & alia huiusmodi. Sic vlcus cauum, angustum, & durum *hidrops*, i. l. tollula vocatur. Latum, & minus profundum *ulcerum* dicitur. Quod in indies circulo situm est, *hypopyum* appellatur, & a nonnullis *vlcus centrale*. Quod de aique profundum, solidius, asperum, & quasi crustosum est, *Pharyngæ* & *typhlopharynx* vocatur.

Cognitio vlcis non est difficilis, cum per se oculis pateant. Si vlcus sit in cornæ, vlciculum albu in apparet in nigro oculi; si in tunica adnatæ, punctum veluti rubicundum in albo oculi conspiciatur, quod illius tunice venas sanguine refertur.

Vlcera oculorum curatio difficilis, & periculosa sunt multo magis tamen in cornæ. In adnatæ. Vlcus quod e regione pupille sit, vlcus est, magis periculosum; quia in eo facile resinaque cicatrix, que cornæ diaphaneitatem auert, sicque visus temereditur, & si rotunda erodatur, fit effusus humoris aquei, & ruz præcedentia.

Curatio huius affectus, que n. 1. nodi n. & reliquorum vlcis, detergentibus, & exsiccatibus pertinetur, que tamen mitissima esse debent, propter partem molliorem, & exquiritur sensum. Preterea tamen ea, que fluxione ab oculis reuolunt eamque primis in oculis in ophthalmia, tum recentem, tum antiqua fuere propoliis: Et si inflammatio vlcis coniuncta sit, remedia ista respicienda cum prædictis erant permiscenda. Quibus etiam dolorem lenientiam addere conuenit, quousque illi partem inflauit.

Detergentia, & exsiccatia moderata sunt, saccharum, mel, crocus, myrrha, suis aloes, laccocolla, cuthia, & cerussa, ex quibus formula sequente componi poterunt.

℞. Decocti hordei & fenugr. ʒ. iv. mellis optimi ʒ. ʒ. vel frusi de tosis sic ʒ. i. Fiat collyrium, quo oculi sæpe abluantur. Vel

℞. Aquæ verbæ, & plantag. ana ʒ. ij. sacchari candi ʒ. ʒ. Mide pro collyrio. Vel

℞. Aquæ mellis in B.M. destillatæ, & aquæ rosar. ana partes æquales. Vel

℞. Ouum coctioe induratum, & a putamine mundatum. Diuidatur in duas partes, & detractio vitello repleatur fovea saccharo cando puluerato. Optimè ligetur & ponatur in cella vinaria, Evulsiabit liquor, qui detergendus vlcis, sine morbo valde idoneus est. Et si potentius remedium desideres, myrrha puluerata cum saccharo cando administranda est.

Montanus puluerem sequentem valde commendat.

℞. Albumina ouorum recentium num. xx. Ponantur in vase itameo ad solem, donec exsiccantur, postea puluerentur subtilissime cum æquali pondere sacchari, & pulvis immittatur in oculos, quousque erodione plurimum adiuuat. In progressu morbi si potentius detergendum sit & exsicandum, i. adde collyriis prædictis trochiscos albos Rhafis, thuris, aloes, myrrhæ, laccocollæ & alia huiusmodi, in parua rami doli, ne oculo erascent, & ita etiam lac, albumen oui, mucilagines, aliæque anodyna addi poterunt.

Tuthia præ cæteris valet, quia minime dolorifica est, & sine morbo licet, ac cicatricem inducit, ideo collyria, & vnguentia ex ea parata vtilissima sunt. Et præ cæteris vnguentum in ophthalmiæ curatione descriptum, quod marginem tuthie quantitate recipit, erit vtilissimum.

Collyrii valde detergentes & exsiccatius, ac cicatricem inducentis formula talis esse poterit.

℞. Sarcocollæ nutritæ in aqua rosar. cerullæ & aloes lotæ myrrhæ, tuthie præparatæ, ana ʒ. ʒ. sacchari candi ʒ. i. cum mucilagine gummi tragacanthi extracta aqua rosar. Fiat collyrium, quo palpebre diluantur.

VT singulis corporis partibus cancer solet accidere, sic etiam in oculis aliquando contingit. Et cum ea que communem cancri theoriam & praxim respiciunt, & morborum externorum tractatibus delumenda sint; nos hic tantum ea, que ad oculum peculiariter tali morbo affectum pertinent, paucis attingemus.

Cancer vel occultus est, vel vlcis. Occultus ad tumorum genera refertur, & in oculi tumor cancris, seu cancer oculi nominatur. Vlcis vero, vlcis canceris oculi dicitur.

In vitroque tamen ædest dardies inæqualis, & resistentis color plumbeus, & luescentis, dolor intensus & pungitius, caput & tempora præsertim occupans; venæ luteæ & varicose in tumore, & partibus vicinis apparent. Sanguis acerrimus & aditus a parte affecta non raro effluit, quando cancer vlcis est. Ac denique ad medicamentis tantum calacientibus dolor admodum exasperatur.

Incurabilis est affectus, in oculi, quemadmodum in reliquis corporis partibus, quando iam radices egit nisi operatione chirurgica radicitus extirpetur.

Curatio duplex ab auctoribus proponitur, vera scilicet, & palliatio. Vera, ut dictum est, in cancro iam genito, & parti valde radicato, non potest obdici nisi chirurgia. Recens tamen cancer ac iere incipiens, curari potest frequentibus euacuationibus humoris atrabilarii, præmissa venæ sectione conuenienti, vt dicit Gal. ad Glauconem. 6. 10. ubi gloriatur se hunc morbum per initia sæpe sanasse, adiungendo remediis prædictis optimam victus rationem. Curatio palliatioque ad symptomatum mitigationem dicitur, non solum per dictas euacuationes, fed etiam topica conuenientia periclitur.

Primum igitur victus ratio refrigerans, & humectans, qualis humoris atrabilarii debetur, instituenda est.

Postea (anguis detrahatur e directo oculi affectu, hirudines pone autem eiusdem lateris applicentur: tum etiam hemorroidibus, si aliquantulum tument. Cucurbitule scapulis admodumous & resiliunt genera elucantur.

Purgationes & præparationes humoris atrabilarii, sicut per potiones apozemata, iulcula medicata, (tyrpos magistrales, & alia huiusmodi. Sed præ cæteris multum conferat ad humorem atrabilarium euacuandum, helleborus ruger nte præparatus: cuiusque extracto bis aut ter exhibito, cancer incipiens aliquando a nobis sanatur est.

Hæc remedia humores altitum ad oculos, dolores, & reliqua symptomata vehementia valde imminuunt. Ad id tamen non parum etiam conferunt topica remedia: qualia sunt in ophthalmia, ad dolorem leniendum descripta sunt; præcipue autem collyria eo mucilaginibus, trochiscis albos Rhafis, & ruthia præparata, cum aqua rosarum solani & plantaginis.

Aqua sequens pro collyrio, & oculi ablutione erit præstantissima.

℞. Radic. cephalarie mai. & geranii Robertiani, ana m. ii. amoglossæ & solani, borragin. buglos. portul. euphras. beton. ana m. ʒ. ranarum viridum & albuminum ouorum, ana num. xij. fenugr. & cydonior. ana ʒ. i. radices, & & femina contendantur, & sola incendantur. Deinde affunde aquæ rosar. & euphras. ana lb. ʒ. Miscetur omnia, & distillentur in alembico plumbeo.

Pullorum caro ad dolores fedationem plurimum potest, & morbum ipsum aliquando hoc solo remedio curatum fuisse a nonnullis creditur. Sic Mauritius Cordus. 1. 1. in lib. 3. Hipp. de morbo mulier. refert historiam nobilis cuiusdam femine, cui tota pars dextra faciei cancro, eoque vlcero obiecta fuit distumta, que cum variis auxiliis, a Medicis Italæ, Gallæ, Germaniæ, Hispaniæ, petris via effect, tandem vulgari hoc barbarioris remedio sanata est. Pullos lappinacos in partes tenues, & latas concidebat, quas lappinacule commutatum interdum ad mouent parti affectæ. Alij ad mouent carnes pullorum columbinorum, scilicet & adhuc tepidus.

cus euadat, & in fistulam abeat, curatio sequens illi adhibenda est.

Ac primum vacuatio vniuersalis per phlebotomiam, & purgationem repetenda est. Fluxio à capite auertenda per cucurbitulas, vesicatoria, & causifica idoneis locis appolita, quibus succedere poterit decoctum chinæ, vel salte parillas per plures dies exhibitum. Eodemque tempore cerebrum excusandum iustissimum, pulueribus cephalicis, & alijs in catarrhi curatione propolitis.

Cauterij loco scitatum ceruici vultuiter admovebitur, eo enim loco curatum fuisse fistulam lachrymalem testet Fabr. Hildanus *obf. 41. cent. 1.*

Si iecoris intemperies fluxionis causa antecedens (vt sæpe fit) esse videatur, illi peculiariter est providendum remedijs idoneis.

Ad topica veniendo, viceris orificium aperiendum, & dilatandum est lentè & paulatim, eum pencillo ex medulla lambicis, spongia preparata, vel radice gentiane confectio. Eoque satis aperto, sequens medicamentum à Foresto commendatum, *obf. 17. lib. 11.* apponatur.

℞. Mellis communis ʒ. ii. vitæ ænis ʒ. i. aquæ rutæ ʒ. iv. Acs viride pulueritur, & cum alio leni igne decoquatur ad tertie partis partem consumptionem. & colatura per syringam tepide ac suaviter imponatur. Si acrius medicamentum videatur, aqua rutæ vltus abluatur quotidie, & post lotionem exiguam vnguentum apollolorum admoveatur. Hæc remedia vacillari per tres septimas continuandas, supponendo emplastrum conueniens & oculum aqua rosaceâ defendendo.

Vice è satis repurgato, ad incarnandum, & cicatrizandum sequens collarium vtriusque.

℞. Ther. sac. col. aloes, sanguin. dracon. balaustior. alumin. antimonijs, ana ʒ. i. vtrius ænis ʒ. v. Subtiliter pulueritur, & cum aqua rutæ fiat collarium, satis liquidum, instillandum leuiter cum stipite rutæ, ter in die, & rursum in eo made facta immittatur, superimposito emplastro diapalma. Turunda paulatim minuitur, & cura finem omnino aueratur, abluendo tantum partem collary prædicto & diapalma imponendo. Hæc methode plures recentes curatus fuisse testet Forestus *loci citati*, ab insigni quodam sui temporis chirurgo.

Si os carie affectum manifestè appareat, solo cauterio actuali curari potest, cuius adhibendi modus exactè describitur à Paræo, Fallopio, & Aquapendente, *et in operibus chirurgicis*. Fabric. tamen Hildanus *obf. 22. cent. 5.* le fistulam lachrymalem cum ossis carie, à quatuor annis incipientem, & pro deplorata habitam, in puero tredecim annorum, sola medicamentis, feliciter curasse gloriatur; eam dilatando cum spongijs preparatis vsque ad ipsum os, poltea euphorbiam per le fistule inpergendo, & quidem in copia; deinde emplastrum ex solo gummi elemi applicando. His ea, qua fieri potuit, diligentia per septimas aliquot adhibitis remedijs, squamula ossis le obtulit, que extracta est; & postquam per paucos dies seraguttulam balsami Toulani, semel in die, cum filamentis viceri impoluisset, fistula breui plenissime consolidata est.

C A P V T XVI.

De Rhyade, & Encanthide.

Fistulis lachrymalibus vtpurimum succedat alius affectus, qui Rhyas nominatur, & est caruncula anguli maioris absumptio, vel immutatio, à qua & angulus laetior euadit. Fit tamen ab alijs causis, nempe ab humoribus acris, & erodentibus in eam partem decumbentibus, vel à medicamentis cathetericis, pro fistulæ curatione adhibitis.

Rhyadæ opponitur Encanthis, que est ipsius caruncule improba excretio & eminentia; eaque generatur à sanguine redundante ad partem translati, & viceri eiusdem partis non satis mature exsiccatæ.

Rhyadæ curatio sarcoticis, & consolidantibus medicamentis per se fit, quia sunt que sequuntur.

℞. Rosar. rubr. p. i. nucum cupress. & myrtillor. ana ʒ. ii. aloes ʒ. i. & vni aulteri ʒ. i. Coquantur ad quartæ partis co;

fumptionem. Hoc decocto abluatur pars frequenter. Vel ℞. Aloes, thuris, ana ʒ. i. sanguin. dracon. ʒ. ii. rosar. rubr. & granor. sumach. ana ʒ. i. aquæ rosat. ʒ. ii. Bulliant ad quartæ partis consumptionem. Fiat infusor collyti.

Encanthis curatur ablatione carnis superflue in oculi angulo adnatæ, quod perficitur excedentibus medicamentis, à micribus ad potentiora progrediendo. Igitur alumen vitum prius admoendum est, quod si non sufficit ad vnguentum Apollolorum, vel ægyptiacum, vel vitriolum vnguentum progrediendum. Quod si ne hæc quidem sufficiant, ferro abscondenda est caruncula, vel cauterio actuali abluenda.

Antequam autem hæc fiant, corpus prius preparandum est euacuationibus conuenientibus, ne noua luxio ad partem attrahatur.

In excisione autem, & cauterij administratione, vel etiam in absumptione caruncule, que medicamentis fit, hoc diligenter obseruandum, ne tota caruncula absumatur, sed illud tantum quod superfluum est, auferatur; alioquin in contrarium affectum, rhyadem puta, deducetur.

C A P V T XVII.

De Epiphora.

Epiphora nomen humoris fluxum generatim significat, in quancumque partem irruat. Vius tamen obinuit, vt pro tenuis humoris per oculos effluxum spectatum accipiat, unde lachrymæ inuoluntarie etiam nominantur, quæ per oculorum angulos assidue defluere consueverunt.

Ad harum autem lachrymarum præternaturalem effluentium generationem, concurrunt prauæ partis mandantis & recipientis dispositiones. Pars mandans est cerebrum, quod frigidiori, aut calidiori intemperie prædictum serofos humores congerit, eosque ad partes inferiores, & fluxioni recedende idoneas transmittit. Pars recipiens est glandula iuxta oculi angulum maiorem constituta, & caruncula eidem angulo superposita; quarum partium raritas, aut densitas, aut alia quævis imbecillitas efficit, vt humorum influentium decubatum facile recipiant. Ideo sæpe solet contingere epiphora in æglope, fistula lachrymali, rhyade, & encanthide; quod nimirum humores superflui ad partes laborantes facile transmitti soleant.

Fertur huiusmodi humor à cerebro in oculorum angulos, interdum per venas internas, & interdum per externas, vt proprijs signis paulo inferius distinguemus.

Ille autem humor epiphoræ efficiens, aliquando frigus est, & nullum alium incommodum ægrotanti adfert, præter fluxionis molestiam; aliquando vero acrimonie & sal sedinis particeps dolore in ardorem & ruborem etiam emigrationem palpebris asserre solet.

Signa præsentium lachrymarum nulla sunt, cum ipsæ satis per se pateant. Apparet etiam ex prædictis, non lachrymæ frigiditatem, ac caliditatem, & acrimoniam sint particeps. Saperet tantum distinguere, an per interna vasa, an per externa efferantur. Cum per internas venas humores defluant, dolores in intimo capitis perferuntur, & acres sternutationes nonnunquam excitantur. Si vero per venas externas, que extra caluariam posite sunt, humores defluant, vasa in fronte, & temporibus distenta apparent, & caput veluti reuincum sentitur, & ab astringentibus remedijs exteriori applicitis inuatur.

Quod ad prognosin spectat, recentes epiphoræ, & à causis & vicijs præcipue oriundæ, facile curantur, maxime verò in iuuenili ætate. Antiquæ & in senibus difficillimè curationem recipiunt. Quæ verò ex alijs morbis procedunt, vt æglope, fistula lachrymali & milibus, ab aliorum affectuum curationibus omnino dependent.

Curatio huius affectus in fluxionibus ablatione, & partis recipientis roboratione consistit.

Fluxio auertenda est humoris peccantis euacuatione, & quassatione, & partis mandantis roboratione.

Humor peccans, seu serofus humor in cerebro redundans euacuabitur venæ sectione & purgatione.

Vicæ sectio in frigida cerebri intemperie non consenti-

niti

nisi manifesta plethoræ signa adfuerint. In calida verò in-
temperie, quando humores acrimonia præditi sunt, maxi-
mè conueniunt, eaque bis, aut ter, si opus videatur iterari.

Purgatio fieri potest per potiones, apozemata, pilulas,
& alia huiusmodi, quæ agrotantis naturæ aptari poterunt.
Reuulsio humoris effluens fiet per cucurbitulas, scapulis
frequenter admodum, vesicatoria posteriori parti ceruicis
apposita, & cauteria occipiti, aut brachijs inusta.

In consummatis aff. cū vesicatorium simplici admotum,
mirificè prodell. vt narrat Forstius, *obs. 11. lib. 11. de vetula*
quidam, quæ cum oculis habere lippientes, lachryman-
tes, & sanioles, cum intenso dolore, & pruriginè & nullis
remedijs curari posset; admoto capitulo emplastro, ex
puluerè cathartid. fermento & melle, perfecte curata est.

Rondeletius verò cauterium supra commissuram ad-
motum magis conferte afflicti, quam si alijs partibus ap-
plicetur.

Ad deriuationem conferunt hirudines pone aures ad-
motæ, & mallicatoria horis matutinis vsurpata.

Ne verò humores semel euacuant de nouo generentur,
cerebrum robotandum, atque fixandum est. Et quidem
si frigida fuerit illius in temperie, omnia remedia, quæ pro
interperei frigide cerebri curatione a nobis propofita sunt,
vsurpari poterunt. In calidiori verò, ea quæ in calidi catar-
hi curatione præscripta sunt, præcipue cerebrum respici-
entia, hic etiam conueniunt.

Dum prædicta remedia vsurpantur, parti recipienti pro-
videndum est topicis remedijs. Ac primum si humor fluat
per venas externas, astringentia fronti & temporibus ad-
mouenda sunt, & si fluuij fiat ab humore calido, & acri,
sequens cataplasma admouendum est.

℞. Boli armæ. sanguinis dracon. balaustior. & mirtili ana
3. i. acaciæ & hypocistidos ana 3. i. thur. mallich. ana 3. i.
rosar. rubr. p. i. Puluerentur & excipiantur albumine oui,
& pauco aceto. Fiat cataplasma, quod lineto incutunt,
dictis partibus applicetur, & quoties exsiccatum fuerit,
renouetur.

Si fiat ab humore frigido, ceratum sequens admouetur.
℞. Thur. mallich. ana 3. i. gummi anime, tamahacæ
& lapidis hæmaritis ana 3. i. gummi iussiperi 3. ii. terebin-
thine, & ceræ q. s. Fiat ceratum.

Ipsi verò parti affectæ collyria astringentia & e-
siccantia admouenda sunt, in sequentem modum composita.

℞. Tuthia præparata 5. i. farcocollæ nutritæ 3. ii. thur.
mallich. ana 3. ii. spicæ nardi gr. vi. Fiant trochisci qui oui
albumine, vel succo c) donorum excepti, cancho oculi ap-
plicantur.

Vel tuthia præparata lineto raro excipiantur, & filo alii-
getur, in vino aultero immergatur, eoque oculis sepe
abluatur. Vel

℞. Tuthia præparata cortic ovorum puluerifactor. aloes
optime ana 3. i. inuoluantur in panno lineo, & fiat pila,
quæ infundatur in aqua femiculi suspensa cum filo, posita
sape in die exprimitur pila in oculo.

Sola aloes puluerata, & in pilam, vt dictum est, concin-
nata, & in aqua rosol. posita non parum conducibilis est. Vel

℞. Aloes, nucis cupress. thur. mallich. myrrhæ, ana 3. ii.
tuthia præparata farcocollæ nutritæ, ana 3. ii. sangu. dra-
con. berberis, sumach. rosar. rubrar. ana 3. i. Puluerentur
tenuissime, & excipiantur aqua femiculi, siq. collyrium.

In calida fluxione sequens præcipue conuenit.

℞. Trochiscorum albor. Rhafis sine opio, farcocollæ
nutritæ, lycij, acaciæ olibani ana 3. i. offium mirobolanor.
adulcorum; coralii albi & rubri ana 3. ii. m. rgaritar. 3. ii.
succu mali panici ad medietatis absumptionem cocti, quan-
tum satis. Fiat collyrium.

Si rubor oculorum epiphora coniunctus sit, sequens erit
utile.

℞. Granor. sumach. confusor 3. i. aqua plantag. calidæ
3. i. Macerentur aliquandiu, deinde fortiter exprimentur, ad-
dendo aquæ rosar. euphras. aquæ albumin. oui diu concusi-
fi ana 3. ii. facchari candi subtilissime triti, & cum pauca
aqua colati 3. i. Fiat collyrium.

Denique ea collyria, quæ pro ophthalmia inueterata
præscripta sunt, hic etiam aptari poterunt.

Vnguis oculi est membrana dura & neruosa, quæ ex
angulo oculi maiore prodierit; aboni oculi primum
congit, mox & iussellæ temporis ad nigrum extenditur,
& pupillam tegendo visionem impedit.

Aliquando tenuis est hic tunica, calore albicante prædi-
ta; inter dum verò carnea euadit, venis multis cruentis
contexta, diciturque *panniculus*, & *cheil* ab Auisenna. Quam-
uis nonnulli panniculum ab vngula distinguant, quod scilicet
vngula sit ceruæ quædam tunica, sine venarum reple-
tione, & tunica tantum adnata contingat; Sebel verò,
scu pannicul totum oculum cooperiat, & rubro colore,
præditus sit, ac venulis in textibus.

Oritur hic affectus ab exulceratione carnis, quæ est in
angulo oculi, aut tunica adnata, vnde (cabrities parti, &
inæqualitas emegit, quomodo dum facialis nutrens adque-
re & complanare nititur, copiosiore sanguinem affundit
eique incrementum præternaturale producit, aut quod-
dam veluti tegumentum ei ingenerat. Cuius tamen in ocu-
lum male affectum quantumplurimum excrementa conflunt,
ideo non ex sanguine puro, sed pluribus excrementis præ-
mixto vnguis generatur. Vnde varij illius differentiz exur-
gunt, quod alius durus, alius mollis; alius albus, alius citri-
nus; alius ruber, alius fusco colore præditus sit; Alius facilè
separabilis ab adnata & cornea, alius tenaciter adherens.
Alius simpliciter & præse qualitates expers; alius putridus, &
cancerosus.

Huius affectus diagnosi ex dictis facile intelligitur.
Tum causæ illum producentes, humores (scilicet, ex quibus
generatur, ex colore intermole poterunt; rubra enim vngula
fit à sanguine puro, citrina à bile, alba à pituita, fusca
acnigricana melanchoia.

Quod ad prognosim attinet, malum hoc difficile curatur
& non nisi longissimo tempore; siquidem remedia acris
vngule conterenda necessaria, non nisi sensim, & paulatim
vsurpari possunt, propter exquisitum oculorum sensum.

Si oculi affectus minor euaserit, malum est figurum,
partis enim debilitatem arguit.

Recens vngula & magnitudine mediocri, pharmaceu-
ticis remedijs curari potest. Quæ verò aucta est, ad ni-
grum oculi se ex- tendit & iam inueterata, non nisi ma-
nuali operatione curari potest.

Vngula, quæ crassa est, euersa, eueniens, indurata, & ni-
gricans curari non potest, cancerolam enim naturâ obtinet.

Curatio ad causam morbi antecedentem & coniunctam
dirigenda est.

Ratione antecedentis, primum victus ratio idonea præ-
scribenda est; qualis in aliis oculorum affectibus à fluxione
oriundis supra præcipiatur est.

Seruique euacuationes, ac reuulsiones in dictorum affec-
tum curationibus præscripæ, etiam hic vsurpari pote-
runt: nempe purgationes, phlebotomia, cucurbitulæ, ve-
sicatoria, & alia huiusmodi.

Ac si sufficienter corpore repurgato, ad topica veniendum
est, quæ vngulam absumere valeant, à minoribus incipien-
do; qualia sunt ea omnia, quæ pro macularum curatione
supra propofita sunt. Quæ si non sufficiant, ad fortiora
veniendum est, quæ auctoribus passim de scriptam inue-
niuntur. Forstius collyrium sequens maxime commendat.

℞. Succu femiculi 3. i. v. succu chelidon 3. ii. succu rutæ 3. ii.
succu maluz 3. ii. aloes 3. i. vitrioli 3. ii. zurginis 2. ii. 3.
zinzibers & cinnamon ana 3. ii. fellis angullæ 3. ii. fellis
tauri, bubuli, aut porci 3. ii. facchari candi 3. ii. bulliant
succu addendo reliqua, & depurentur. Fiat collyrium.

Sequens etiam ab eodem commendatur.

℞. lapid. hæmatitis Drach. ii. vitrioli albi, viridis græ
vitorum ana 3. ii. myrrhæ & croci ana Drach. i. piperis lon-
gi Drach. 6. facchari candi 3. ii. puluerentur tubulissime
in alcohol. & huius pulueris 3. i. misceatur. Drach. ii. aque
raphanu. & applicetur bis terque in die, prout egger tolerare
poterit.

Ante usum horum remediorum, pars fouenda est de-
cocto

eodem emolliente, quod etiam post eorum applicationem iterandam est, ad dolorem leniendam.

Inter remedia minus vehemens, sequens fructu vti-
pari poterit.

℞. Oſſis lapiez 3. i. sacchari candi Drach. i. vitrioli 3. ℥. i.
ruthe p. parate Drach. 3. M. Fiat pulvis subtilissimus,
vngula impingendus.

Si topicis hinc remedijs vngula absumi nequeat, ad chi-
rurgicam operationem veniendum est; que fit hamulo
perforato vngulam ad basim, deinde filum lineum dupli-

catum, acu traiciendo, utrinque ad basim arcte deligendo,
atque sic apprehensam incisionis instrumentum abscidendo,
propt' silius docetur a Celso, Paulo, Actio. Hieronymo
ab Aquapendente, in operationibus chirurgicis, alijsque
quamplurimis.

Facta incisione, linteum aqua rosea & albumine oui
imbutum, est apponendum, ad dolorem sedandum, & in-
flammationem prohibendam. Ac denique: siccantibus medi-
camentis: colliris: est tuthia, thure alio, trochiscis albis Ra-
fis, alijsq; siccantibus medicamentis cicatrix inducenda est.

P R A X E O S M E D I C A E

LIBER TERTIVS.

D E A F F E C T I B V S A U R I V M.

P R A E F A T I O.



*RES pluribus morbis consistit solent, similiter, organica, & communis, ut docet Gab. i. de sympt. caus. c. 2. qui com-
no nisi per symptomata cognoscitur, ad
negligentiam seriem est reducere est au-
mus. Symptomata vero quae in auribus con-
sistunt, sunt: laesa, aut vitiata exortum referuntur.
A. la. laesa, vel est auri propria, vel communis omnibus sensu-
bus. A. la. auri propria, minorum auditus, ladatur obolit,
immunit & depravat. A. la. in surditate, immunit in
gravi auditu, depravat in sonitu aurium. A. la. communis
omnibus sensibus est sensus tactus, cuius ratione doloribus ob-
noxia sunt. Vitiata denique in excretis, ea omnia continent
qua ab auribus praeternaturaliter egrediuntur. Sicque totius
huius tractatus quatuor concluditur capitula. Primum est de
surditate, & graui auditu. Secundum de sonitu aurium.
Tertium de dolore aurium. Quartum de excrementis prae-
ternaturalibus ex auribus emittentibus.*

C A P V T P R I M V M.

De surditate, & graui auditu.

Surditatem & grauem auditum eodem capite comple-
ctimur, quia sunt ab iisdem causis, secundis magis &
minus tantum differantibus: ita ut valde excedentes audi-
tum procius auri ant. remissiores vero cum tantum immi-
nuant. Immo vero uterque affectus vulgo surditas nomi-
natur; qui enim alios audire nequeant, nisi alta voce lo-
quentes, surdi esse dicuntur.

Surditas autem proprie dicta *surditas* Graecis nomen
tur, cum nempe auditus omnino abicitur, adeo ut a affe-
cti, vel nullum penitus sonum audiant; vel si sonum ali-
que auribus excipiant, illius tamen differentias percipere
nequeant. Hi etiam saepe muti sunt, si nimirum ab ortu
surdj nascantur; non solum ex eo quod per auditum homi-
nes loquendi formulas adducunt; sed etiam propter ma-
ximum consensum, qui est inter auditus & loquelae instru-
menta, per neruum quintae coniugationis, cuius rami pre-
cipui ad aures quidem feruntur, nonnulli tamen ad lingua
& laryngem pro. enduntur, unde fit, ut auri interiorē veli-
cando, tussis ex. cretur. Et ratio euidens est. Siquidem surdi
a natiuitate; si loquelae instrumenta non habent vitiata,
aliquam vocem articulatam ex naturali instinctu ederent;
quemadmodum reliqua animalia, etiam si a natiuitate ab
alij eiusdem speciei animalibus legregentur, connaturalem
proferunt. At surdi a natiuitate nullam vocem articulatam
edunt, sed sonum tantum consilium, qui partium loquelae
inferuentium lesione manifestum arguit. Laeso autem,
illarum partium potissimum est ab humiditate, quae cum
neruum illum afficiat, qui ad aures, linguam & laryngem
prostat, auditum & loquelam simul affici necesse est.

Grauius auditus *deafness* Graecis appellatur, eoque affectu
egre sonum percipiunt, nec loquentes intelligunt, nisi alta
voce clamantes. Alij vero, ne sic quidem audire satis pos-
sunt, nec nisi colloquentes ad aures ipsi loquantur, ac vo-
ciferentur.

Uterque affectus a cerebri, vel auri vicio exoritur.
Cerebri intemperies frigida, aut repletio, aut imbecilli-
tas, aut alia quaelibet lesio, in ea praecipue parte, quae ner-
ui auditorij exortum, aut progressum occupat, surditatem
aut grauem auditum potest efficere.

Auris affectus, vel in exteriori, vel in interiori auri
parte versantur.

In exteriori cauitate auditus defectum efficit obturatio
perfecta, vel imperfecta, a tumore, abcessu, sanguine, pure,
pituita, alijsque rebus, tum intrinsecis, tum extrinsecis ob-
tinentibus. Aduertendum tamen est, meatus exterioris ob-
turationem, integram & absolutam surditatem non posse
efficere, sed tantum grauem auditum; quandoquid non per
os etiam audi ad aures deseri possunt. Etenim meatus putens
est ab auri interna cauitate ad palatum, per quem soni fa-
cile ingrediuntur & ad aures sele insinuant, qui etiam meatus
aurium expurgationi dicantur est. Et sonum per os aper-
tum excipi multa ostendunt experimenta. Videmus enim
surditatos, vt melius loquentes audiant, aperto ore sermo-
nes eorum excipere. Et si utraq; aures diligenter obturata,
musica instrumenta baculo contingas, quem denotus ap-
prehenders, exquisitis audiuntur. Et in via, nobis alius
procul adueniens strepitum captamus, & e longinquo
magis audimus; si baculi, aut ensis alterum extremum ter-
re affigamus, alterum vero denotus apprehendamus.

In parte auri interiore surditatem, aut grauem auditum
efficiunt humores in cauitate interiori collecti, & a capite
praefertim defluentes: qui plerumque pituitosi sunt, non-
numquam tamen biliosi, vt patet *Aph. 28. sect. 4. vbi Hippo.*
bilioas deiectiones surdis prodesse asserit; interduum etiam
sanguine, siquidem surditatem, quae crism conuocatur, ex
sanguinis illu vi per aures fieri conpertum est. Illi autem
humores a roto corpore interdum ad aures transmittuntur
vt in febribus continuis, & praecipue malignis. Eundem af-
fectum producit mala additis organorum conformatio;
qualis est, si tympanum nimis laxum euaserit a sono vio-
lento, vel humectatione. Ea ratione fundalti quamplurimi
in constitutione aultra grauiorem habent auditum, quia
membrana ab aeri humiditate relaxatur, aut nimis ten-
sum, exsiccatumque post morbos acutos, vigilias aut ieiun-
ium, aut disrumpit ab isidra morbus ingentibus aut ero-
sum a pure. Igredietur tamen aliquando pus ex suppurata
aure, & sanguis in magnis conuulsionibus sine lesione au-
ditus; quando exitus est inter os & mem brans, sic enim
septum illius permanset. Vel si reliqua auri particula
ab ortu, aut aliqua causa externa, vt ictu, casu, alijsque
a debito naturali statu deiecta sit. Intemperies denique
frigida ab aere frigidiore, vel aqua frigidissima in aurem,
umida, vel narcoticorum, aliorumque medicamentorum

gum vii nimio, hunc affectum producere solita est.

Has omnes causas per propria signa diagnostica sigillatim diffingere difficultissimum est. Arte tamen & coniectura in hunc modum elucidiari possunt.

Si à cerebri vitio surditas contingat, aut alij etiam sensus læduntur, aut aliquis affectus peculiaris in cerebro apparuit, aut dolor capitis, aut grauitas, apoplexia, lethargus, aut alij huiusmodi.

Obtutatio externæ aurium cauitatis oculis ipsis dignoscitur, si ad Solem cauitatem illam introspicias: tumque apparebit, num tumor, aut materia crassa, aut alia, quarum substantia heterogenea cauitatem illam replet. Tum etiam, si aliquid extrinsecus in aurem illam ipsum sit, ex relatu ægrotantis dignoscitur.

Si verò cauitas interior aliquo humore repleatur, pituitatem esse iudicabimus, si fluxio pituitosa ægrotantem prius infestauerit; aut si ille huiusmodi fluxionibus frequenter fuerit obnoxius.

Biliosum verò humorem hunc affectum producere indicabit febris biliosa prægressa, aut iam ægrotantem detinens, & acutissimi doloris presentia. A sanguine verò fieri ostendit dolor grauius, & sanguinis redundantiæ in toto corpore. Et hæc in perturbationibus criticis præcipue cõtingit.

Tympani laxitas, & humectatio dignoscitur ex causis prægressis humectantibus, & humida intemperie aliquam aliam partem affligente: vix enim fieri potest vt causæ humectantes hanc vnicam particulam afficerint.

Eiusdem tympani tensio, & exsiccatio nimia, ex totius corporis siccitate, & causis exsiccantibus prægressis erit dignoscenda.

Tympani etiam disrutionem aut erosionem coniecere poterimus: si causæ vehementes rumpentique, aut erodentes enumeratæ præcesserint.

Prognosis huius affectus in hunc modum insinuenda est. Surditas à nativitate, & quæ longo tempore contracta est, eaque integra & absoluta, incurabilis est. Quæ verò non absoluta, sed diuturna, difficultillime, & vtiplurimum, nunquam curatur.

Surditas à bile, aut sanguine oriunda, cum in febribus continuis, & acutis tantum solet contingere, cum earum febribus continuis, & acutis tantum solet contingere, cum earum febrium curatione solui consuevit.

Grauis auditus, si breui tempore non curetur, in omnimodum fuditatem degenerat; teste Gal. 3. de compos. med. sic. loc. cap. 3.

Membrana tympani rupta, vel cicatrix in ea relicta incurabilem fuditatem efficit.

Surditas per internalla crescens, & decrefcens curabilis est: ab humore enim mobili, qui interdum minuitur, & augetur, eam produci significat.

Surditas quæ à vitio cerebri excitatur, facilius curatur, quam quæ à proprio auri affectu produciatur.

Curationem quod attinet; illa surditas quæ ab aliquo cerebri affectu dependet, non aliam curationem requirit, quam quæ dictis affectibus destinata est, à proprijs capitibus repetenda. Quæ à timore exoritur, si ille durus sit, & inueteratus, curationem non recipit: si verò calidus & inflammatorius, illius curatio in aurium doloris curatione proponetur. Si verò à pure in aure collecto producat, ex capite vitio huius tractatus curatio erit desumenda, vbi de his agitur quæ præternaturaliter ex aure egrediuntur.

Si à siccitate hic affectus oriatur, curandus est, iuxta Rhafis præceptum, victu humectante, somno longiori, & capitis perfusione cum aqua tepida: quibus addi possunt humectantia in aurem immissa, vt oleum amygdal. dulc. & similia. Si ab aliqua re extrinsecus in aurem illam surditas vel grauis auditus oritur, ex protinus auferenda est eluendo, aut excutendo, aut extrahendo: & si ani malcula quedam sint, quæ auris cauitatem subierint, alliciendo, aut euacando. Eliuantur, infundendo quæ viam hanc lubricam reddunt, & humectant, dilatantque, vt lac, oleum amygd. dulc. vel decoctum aliquod emolliens & relaxans. Excutionis impetu quodam, vt emutatione mota; sic enim spiritus impulsus, commotis illis partibus, quod in meatu auris latet, læpè excluditur, idque citius, si prius via, vt di-

ctum est, dilatata & lambica facta fuerit. Prodest etiam, inclinata aure affecta, supra pedem illius lateris saltare; quæ tatione pueri post natationem aquam auribus insillunt excutunt. Si hæc non succedat, extrachio mollienda est auriscalpio, cauendo tamen ne diti intromittatur, illud quod inhæret viterius propellatur. Ideo auriscalpio cochleare aliquod tenue sit, vt facilius in aure contentis positi possint. Vel forcipe ad it accommodata, vtriq; acuta & aspera, illa apprehendi & eximi debet. Vel si neque hoc succedat, cum corpora dura sint, vt nucleus, vel lapus, alio instrumento apprehensa confringenda sunt, & dein, vt idem, humore infuso eluenda. Si auriscalpio intromitti nequeat, specillum cotone inuoluatur in extrema fui parte, deinde immergatur in terebinthinam, aut in aliquod aliud viscidum, post unumtatur in aurem, vt agglutinet id quod obstruit. Idem fit ex candela cerea, extrema sui parte visco indurata. Quod si aliquid visci, aut glutinis post extractionem inuis inhæserit, id auriscalpio extrahendum. Sunt qui calamus aperient in extremis eius partibus vnam eius partem in aurem immittunt, alteram ore comprehendunt; vt inde frequenti luctu, quod vni conditum est, attrahant.

Animacula ex aure allicuntur, admoitis quibusdam, quæ illis grata sunt, vt extoritur repant: vt si lac cum saccharo, in spongiola auri adhibeatur, vel leuiter introdatur, vt siccup, muerla, vel pulpa pomi dulcis, vel lardum, quo vermicalitius eliciuntur; idque præsertim, si aures soli obuertantur, dum hæc continent. Peculiariter vero hirudines calu ingresse allicuntur sanguine immiso in aures. Pulices vero pilis caninis in aurem intus odulatus. Si autem vna sine animalia, enecanda sunt: mortua enim non amplius audiunt oblitrepunt, & facilius extrahuntur. Enecantur autem, si salua auribus insillatur, aut propria vrina insula.

Amara autem citius insecuta enecant. vt centaurii, vel absinthij succus, aut decoctum aloes, & sella quilibet. Actia idem præstant vt acetum, succus ceparum, & similia.

At cum frequentissima surditas, & grauis auditus causa sit frigida intemperies, & humoris pituitosi influxus in eam partem; ad illius oppugnationem hæc præcipue curatio dirigenda est.

Quia verò huiusmodi pituitæ influxus à cerebro ducit originem, illius ideo curatio ad eam partem dirigenda est, non absumis ei, qui frigide cerebri intemperie assignata est; quam prudens Medicus pro vario intemperie gradu, eiusdem contumacia, moderati poterit.

Summa autem huius curationis erit, vt præmissa victus ratione attenuante, & modice calefaciente, atque exsiccante, qualis in gutta serena præscripta est: vitando in primis ventos austros, & abis aures muniendo; vaporosa alimenta, & in primis allium & capreæ, quæ autem nocent, tum etiam quæ humores crassos & pituitosos generant; vt inquit prius euacuatio vniuersalis insituitur per pilulas, apozema cephalicum, & purgans, tunc per phlebotomiam, si illius indicationes aduerint. Cui subnectatur, si affectus sit contumax, dicta sudorifica, eique succedant particularia remedia fluxionem teuentia, vt cauteria, vesicatoria, erethica, stenuatoria, malificatoria, apophlegmatismi; peculiariter vero malificatoria sunt maximi vius in hoc morbo, propter meatum qui ab interna aure ad palatum defertur, & auris excrementa deponit. Ac denique morbo in longitudinem abeunte, ad pilulas vnales, ac (symp) magistralium, opiatum cephalicam, puluerem, aut cucupham caput corroborantem, & alia huiusmodi veniendum erit. Quæ omnia in frigide cerebri intemperie curatione propostia sunt.

In vii dictæ, si affectus sit contumax, conuenient etiam facculi, post assumptam potionem sudorificam capiti admoventi; quales in dicta curatione descripti sunt, hique non fuscipiant tantum, vt ibi dictum est, sed etiam auribus erant admoventi.

Peculiariter vero conducunt ad huius affectus curationem therma sulphurea & bituminosa, cum balneo, tum lotione capitis. Balneo si quidem sudores copiosi provocantur, & materia fluxionis antecedens educatur. Lotione verò capitis cerebrum roboratur & exsiccat, & humores in ipsam aurem impacti dilutiuntur. Vtendi modus peculiaris à Penoto describitur, & valde commen-

datur.

estur, his verbis. *Nihil equè conducit in surditate, ariam post centum remedium vsum, quàm ut patiens optimis prius corpore mundato, & deinde capite purgato, sulphureis balneis caput madefaciat hoc modo.* Ex spongia magna confusa velut cucupham ferat in capite, ad supericula & infra aures descendentes. Sedat sub canali balnearum, & verso epistomio aqua accipiat, quæ absorpta spongia caput continuo calore suo fouebat, atque omnes capitis suturas auriæque commissuras diducens atque aperiens, vapores tollit: vel materiam impactam neruis visque auditoris resoluens per halitum, aut adeo mustat, ut breui fit absorpta. *Hic in diebus tria sedere cum comestis ad horas duas, ac deinceps statim sudare in lecto, duas æque adhibere nectum, ex succo & iure carniū; vniūque, nisi eligophoro, pluri abstinendum est.*

Tandem ad topica materiam iuri impactam discutientia veniendum est, quæ in hunc modum administrari poterunt.

γ. Fol. origani, absynth. puleg. ferpilli, laulæ, menthæ, centaury. m. maluæ, & althææ. ana M. i. florum chamomil. m. el. hecchad. & anih. an. P. i. cinnamomi & caryoph. ll. an. ꝑ. Deccoquantur in æquis partibus aquæ font. & vini albi sub finem additi. Colatura fouatur auris afficta cum, spongia, calide, manè & sero.

Ex eodem decocto poterit fieri suffusio in aurem per infundibulum, quem maximè prodesse certum est, ex eo quod vapor ex decocto calente eleuatus, penitissimas aures partes facile penetrat.

Fomenti loco adhiberi potest panis cum femine carui sobiectus, & calens è fumo per medium factus.

Vel panis ordinarius ex cibano sumptus, & inferiori crusta ablata in spiritu vini immergatur, & calide quantum æger ferre poterit, ad aurem applicetur, vt vapor intro mittatur.

Efficaciter erit panis ex farina vulgari factus, & cum semine carui, bacis lauri, iuniperi, & nucis moschata subactis aequam coquantur; deinde post leuem cocturam, dum adhuc calens distringatur, & auri laboranti impofuitur.

Si decoctum pro fomento & suffusio præscriptum fortius desideres, pulpa colocynthidis & radicis hellebori albi ad 3. l. vel ꝑ. addi poterunt. Idem decoctum in vino albo solo, vel in vino & aceto parari poterit, vt magis penetret, & posentius discutiat.

Pro suffusio etiam vitiler excipi poterit in auris mestum per infundibulum fumus caryophyllorum, caput minnendo linco calidissim. o. dum fumus exipietur.

Potest forum & suffumigium, liquor aliquis in aurem iniiciendus est, eaq; postmodum rotone molcharo obturanda.

α. Olei amygdal. amar. & rutacei, ana 3. l. M. infundantur calide in aurem. Vel

α. Olei de castoreo & lilior. albor. ana 3. l. olei anethini 3. fl. hellebori albi 3. l. aque viæ 3. l. Bulliant in B. M. ad aque viæ consumptionem. Coientur ad visum dictum. Vel

γ. Rad. cyperi, bacar lauri, semini anisi & cumini puluerator. an. 3. l. calli rei puluerati 3. fl. olei rutæ quantum satis. Misceantur, sique impleatur cæpe magni excauatum quod postea coquantur super prunas, & exprimatut succus in aurem infundendus.

Olea chymica efficacissimè operantur, qualia sunt olei rosmarinii, maioranæ, saluæ, feniculi, de spica, caryophylli. Quæ tamen propter nimiam vehementiam sola non sunt viurpanda: sed cum prædictis in parua quantitate admisceantur possunt in hunc, aut similem modum.

α. Olorum prædictorum 3. ij. olei de spica, feniculi aut caryophyllorum, aut alterius cuiuslibet 3. fl. vel 3. l. Misce.

Aque etiam nonnullæ in aurem infundantur, quæ ad surditatem maximè conferre existimantur. Sic plurimum laudatur ab auctoribus aqua fraxinæ, quæ elicitur, ramos virides fraxinæ vna extremitate igni admoendo, & ex altera extremitate aqua stillans visui obseruanda. Præcipue confert quando surditas a causa calida oriunda est, & remedia valde calefacientia suspecta sunt. Si calidas non timeatur, pari auge viæ portione admista efficacior euadet. Matthiolus hanc aquam cum succo quibuldam permisceat, eamque sic compositam valde prædicat his verbis. *Fraxinæ (pomæ), quæ à viridis ligno igni exposito manet, additus succus*

cyclaminis, stilla, rutæ: æqualibus partibus, omnibus simul parumper seruescatis, plurimum valere ad surditatem semis: si in aurem sanam hic liquor calidus infundatur, comit cubitus receperit agere: atque cum super afflicta auri sacere oportet Vbi vero veramque aurem surditas occupauerit, in eam fundatur quæ minus afflicta fuerit, & super alteram sacent.

Spiritus vini in quo helleborus albus infusus fuerit, in aurem affectam instillatur, magne est efficacie.

Alium multum commendat, succum helleboræ depuratum, cum vino albo potenti permittum.

Fella animalium, vt leporis, capræ, perdidis, maxime laudantur, si recentia viurpentur, cum pari mellis portione misceantur, & in cæpe pellicula incalcant.

Pinguedo angulæ maximo in viū est. Ea autem colligitur dum angulla magna in vero affatur, & suppositis lauri folijs excipitur, eaque repide in aurem instillatur.

Zechius oia formicarum prædicat his verbis. *Quæ formicarum contra & cum succo cæpe in aurem infusa, quam vetustissimam surditatem perficiunt.*

Sanguis lupi junioris calens in aurem instillatur surditatē tem curare credunt.

Denique, si affectus contumacissimus propositis remedijs non cedat, non esset abs re extremum tentare remedium, quod a Fonseca proponitur *consul. 58 tom. 3.* inunctionem nempe factam ex hydragro aqua furdas ex lue venerea contracta ita curari solet: quare etiam hæc, licet talis non sit, forte curari poterit. Et ratio hæc sententia videtur suffragari: quia hydragryum tumores duos emollit & discutit, ac humores concretos & partibus impactos potentissime dissoluit: atque ita putant in auris particulis concretas, & reliquos remedijs non cedentem ferre poterit dissoluere. Hoc tamen remedium, non nisi in desperato casu tentandum est: anceps enim & dubius admodum effectus eius est. Siquidem ab inunctione hydragryi cerebrum valde labefactatur, & variæ fluxiones concitantur: ita vt nonnullis ex lue venerea per hydragryum curatis, ipsa furdas aut grauis auditus interdum contingat: quamvis, vt antea dictum est, ex ipsa lue venerea contingens furdas interdum curetur. Et debet administrata hydragryosis, post sufficientes purgationes, nullam in cerebro noxam vt plurimum relinquat.

In topicorum remediorum administratione hoc perpetuo obseruandum, vt non frigida, sed semper tepida ac calidissima in aurem immittantur. Præterea nunquam medicamenta instillanda sunt, quæ priora abstergantur. Instillato vero medicamento, auris perpetuò cotone molcharo obturanda, ille enim solus & per se furdatis maxime conducit: quod confirmatur a Foresto *obser. 15. lib. 12.* his verbis. *Asiæ Delphensis cum ex duarum morbo comalisset, incidit in surditatem satis docturnam, quæ cum satis purgata esset, & deinde à medicamentis abstineret, & longo tempore adhuc surditate laboraret; vetula quadam ei consilium per granum vini, vel alterum moscos reuerteret in bombæ misceret, & auri perpetuò imponeret. Hoc remedium, præter omnem speciem, ab omni surditate liberata est. Ego multos quodammodo auriis sanis longo tempore maderet curas aqua impesita bombyce, vel cotone, in quo moscos reuerteret, quæ & aurem excruciet, & simul surditatem tolleret.*

CAPVT II.

De sensu aurium.

Auditio sensus deprauatur in sonitu aurium: quæ admodum enim oculus debet esse omnis coloris expertus, vt colores omnes obiectorum rite percipiat: & si aliquo colore præternaturaliter afficiatur, vt in idero, tunc deprauari visum necesse est: ita auri nullum in se debet habere sonum, vt omnes sonus extrinsecus aduenientes percipere valeat, & si in ea sonus aliquis præternaturaliter efficiatur, audire deprauatur. Hæc autem deprauata auditio prædicta auctores Græcis, Latinis Obuditio nominatur: vulgo etiam tinnitus aurium appellari consuevit, quamvis tinnitus proprie vnicam tantum deprauatū auditus differentiam constituat, vt in sequentibus patet.

Fit autem sonitus in aures, ex commotione præternaturali aeris vernaculi, seu congeniti in auris cautate contenti. Quamvis enim aer ille congenitus naturaliter in aures moveatur, ut docuit Aristoteles, sonus tamen ex eo motu non exaudiri, nisi quando aures manu concussæ, aut alia re simili obturamus: tunc enim melius fit auditio in aures interna, cum aeris externi ad aures ingressus impeditur, vel docetur vulgari experimento si nimirum testudinis, aut alterius instrumenti musici manubrium dentibus apprehendamus aures obtundendo; tunc enim sonus quadruplo maior percipitur, quam si apertis auribus excipitur; quia sonus testudinis per continuitatem manubii in os ingreditur, & ad aures cautate se infundit per patentem canalem, qui ab aures ad fauces exprogitur. Motus autem ille naturalis aeris implantati, fit à spiritu à *averio*, seu auditorio; qui continuo in aures inilit, & aerem illum tenuem & mobilem icuter exagitat. Si vero aer ille implantatus solito vehementius moveatur, tunc sonus intra aures percipitur, qui præternaturalis est, & auditum variat.

Causæ vero aures vernaculam præternaturaliter commouent quæ plurimæ sunt. Præcipua tamen & frequentissima est vapor, ilatus, aut spiritus in aures ab alijs partibus transmissus, vel in ipsa aures genitus. Si ab alijs partibus feratur, vel toto corpore, vel ab aliqua parte peculiari ducit originem. A toto corpore pronat in febribus, vnde Hippocr. *Crasis, Bombus in acutis, & sonitus aurium lethalis*. Et ille aurium sonitus fit à spiritu flatuoso, per arterias a toto corpore ad aures transmissus. Frequentius tamen accedere conuenit in principio paroxysmorum, & instante crisi per hæmorrhagiam. A parte peculiari flatus eleuati ad aures transferuntur, nempe a ventriculo, hepate, iene, mesenterio, vtero, alijsque partibus. Vnde in vomitu vehementi, melancholia hypochondriaca, & hysterica suffocatione aurium tinnitus frequenter solent contingere. A capite etiam frequentius spiritus flatuosus, ex frigidis & pituitosis humoribus excitatus a calore debili, in aures deferretur per venas, arterias, & quantum nervorum conjugationem; per quas etiam vias vapores & ilatus ab inferioribus partibus transmittuntur.

In aures ipsa generatur flatus ex materia pituitosa in auribus contenta; vnde fit, ut grauis auditus cum tinnitu aurium sæpiissime coniungitur sic. Ab humore enim fit obstru-tio, quæ surditas, aut grauis auditus, dum in minori copia redundat: à flatibus vero ex eodem humore eleuatis aurium tinnitus generatur.

Aliæ vero causæ sonitum aurium excitantes sunt, percussio capitis vehemens, sonus vehementior, aurium vicer, calida interperies, debilitas, & sensus exquisitus.

Percussio capitis vehemens, spiritus in capite contentos violenter commouendo; facit ut illi in aures conserantur propellantur, & sonitum edant.

Sonus vehemens in aures violenter impulsus, aerem implantatum maximè exagitat, ut commotio illius diutius perleuerans sonitum diutius more efficiat.

Aurium vicer, puris, aut saniei luerore, itreptum quandam in aures excitare solent; quod etiam fieri potest à spiritibus maiori copia in partem viceratam transiatis, & in aures cautate effusis, aeremque implantatum commouentibus.

Calida interperies arteriam aures interiora subentem multo spiritu replet, vnde contingit, ut pulsatio fiat vehementior, & sonus pulsans in aures excipitur. Vel copiosior spiritus per arteriam illam effusus in aures, aerem vernaculum commouet & sonum producit. Et ab illa causa sonitus aurium diuturnus efficitur per menses & annos interdum perleuerans.

Auditus debilitas sonitum aurium efficere solet, ut in conuallescentibus quæ omnis sensus debilitatus ab obiecto non solum vehementiori, sed etiam mediocri ostenditur; sic illi qui debilem habent visum, à lumine etiam moderate læduntur.

Ac denique sensus exquisitus, ex Gal lib. 3. de comp. med. fec. loc. cap. 1. tinnitum aurium efficit eadem ratione, quia scilicet obiecta etiam moderata illum nimium afficiunt. Ille autem sensus exquisitus præternaturalis esse debet, ut

affectum præternaturalem efficiat, nam sensum perspicacitas per se ad eum deprauatum non potest producere: quin potius, quod exquisitus est sensus, eo minus aberrare debet. Præternaturalis autem efficitur a calida interperie, vicer, aut alio consimili affectu: quemadmodum partes inflammatae contactu moderatos deprauat sensum, nempe dolorifice. Vel si exquisitus sensus in statu naturali consistat: existimandum est causam rationem efficientem esse præternaturalem, & excedentem tinnitum illius exquisiti sensus vapor enim v. g. ita exiguus, ut a sensu obtusiori non percipitur, sicque actionem non ledat, ab eo qui exquisitiori sensu præditus est percipitur, & tinnitum efficit: atque ita in hoc præternaturalis erit, in alio vero sanitatis limites non excedet.

Varie dari possunt aurium sonitus differentie, quæ a vaporum multitudine, vel paucitate, crassitie, vel tenuitate, notu celeritate, aut lento oriuntur: si enim vapor, aut flatus multus sit, crassus, & celeriter moveatur, sensorio exhibebit similitudinem aque rapido cursu cum fragore fluentis, vel tympani; vel id genus instrumentorum musicorum, vel ventrobotantis, vel id genus similia. Quod si paucus sit, crassus, & celeriter moveatur, arboris contractæ, vel domus collabentis, subitæque ruinæ, ut carapultæ speciem refert. Si multus sit, tenuis, & celeriter moveatur, sibilum excitare solet, & torrentis cuiusdam lenioris imaginem. Si paucus sit, tenuis, & celeriter moveatur: tinnitum excitat. Si multus sit, crassus, & lenite moveatur: murmur quædam excitare solet. Si paucus sit, crassus, & lente moveatur, susurrum repræsentat. Si multus sit, tenuis, & lente moveatur, sibilum remissionem reit. Ac denique cum gradus innumeri dari possint crassitie & tenuitatis, multitudinis & paucitatis, motus celeris & tardi: pro eorum ratione, innumeri propemodum sonorum modi in auribus produci poterunt: pro vt magis, vel minus: ad hanc, vel ad illam accedere videbuntur.

Diagnosis prædictarum causarum certa haberi non potest, docente Galen. 3. de comp. med. fec. loc. cap. 1. artificialem tamen coniectionem ex causis præteritis, alijsque circumstantiis elicere possumus.

A flatuoso spiritu fieri sonitum aurium, inde colligi potest: quod interdum cessat, & interuallo posito reuertitur: tum etiam si præcæritur cibi flatibus generandis idoceri. Per consensum ab alijs partibus fieri ostendunt, si aliqua alia pars affectu peculiari laboret, & affectus per interna repetat.

A cerebro præsertim fieri testatur dolor capitis præcedens, aut grauitas eundem, & vltimum nocuentum alijs sensibus communicatur.

In ipsis auribus vitium esse testatur sonitus continuus, & sine ulla intermissione inestans.

A materia frigida affectum produci cognoscimus, si æger a calidis medicamentis iunetur, & si sanitas tempore omnes strepitus facile præterat.

A vaporibus crassis, vel tenuibus paucis, vel copiosis, affectum produci ostendunt sonorum differentie, quæ in aures percipiuntur, supra proposita.

A facultatis imbecillitate exoritur, facile patebit ex ijs quæ præcærentur, vt pote morbis præcedentibus, ex quibus vix dum ægri conualescere incipiunt.

A calida interperie, & exquisitori sensu inde oborto fieri coniungimus, dum æger percipit caliditatem in capite circa aures; causæ calentes præcærentur, & flatus discentibus medicamenta malum augumentum etiam quod æger sanitatis tempore magnos strepitus, propter sensum exquisitum, perire non potest.

Quod ad prognosin spectat, recens aurium tinnitus facile curatur, chronicus vero difficile, eoque magis si à lue venerea ortum duxerit. Qui à causa calida ortum ducit, facilius curatur: qui à frigida, difficilior.

Diuturnus aurium tinnitus, à materia pituitosa in aures contenta oriundus, in surditatem degenerat: auditus enim materiam illius copiam, meatus auditorius obstruitur, & spiritus in flatum ad aures inhibetur.

Curatio huius affectus pro varietate causarum varia esse debet.

Ac primum curatio sonitus aurium, qui per consensum aliarum partium generatur, a curatione affectuum illarum partium dependet; & ideo ex proprijs cuiusque capitibus ritit desumenda.

Qui verò ab aure primario affectu exoritur, peculiarem curationem desiderat; & si frigida interperie, crassiorque flatus generetur, eandem curationem desiderat, quæ in gravi auditu descripta est, consimiles enim, sunt affectus, qui sæpe simul complicantur, aut unus in alium degenerat; tunc enim non raro grauis auditus, & surditatis prodromus esse consuevit.

Omnia igitur remedia, tum vniuersalia, tum particularia, superiori capite ad surditatis, & grauis auditus curationem propofita, huc transferri poterunt.

Si ab aurium vicere tinnitus provenit, non aliam postulat curationem, quam quæ vicem debetur; qualis capite sequenti proponetur.

Si a lenius debilitate procedat, ut in conualescentibus ab aliquo morbo grauiori; inflammatione ac refectioe totius corporis ipse affectus euacuetur, poterunt tamen inter ini olea quædam temperata in aurem infundi, ad symptoma demulcendum, ut chamæmelinum, anethum, amygdalarum, dulce.

Ac denique, si a calida interperie, vel exquisitior in sensu ducat originem; vitæ refrigerantis & humectans præscribendus est, tum etiam refrigerantia in aurem immittenda, a minoribus ad fortiora progrediendo. Ac primum insillatari poterit decoctum hordei, violarum, lactucæ, nymphæ, quibus ad penetrationem aliquid mellis, aut chamæmeli addi poterit. Quibus non consentientibus, succi lactucæ, portulacæ, & hyoscyami viscerandi sunt: imò ad papaueris succum, ipsum opium confugit Gal. quibus tamen paratè & summa cum cautione vtendum est, ne calore natium partes debilitando, auditum nimis habereant.

CAPUT III.

De dolore aurium.

Aurium dolor *ᾠτίτις* Græcis nominatur, estque grauius affectus, tum propter partem affectam, membranam præter interiorem auris cautatem ambientem, tum propter cerebri viciniam, cuius ratione illud non raro in consensum trahitur.

Cum autem omnis dolor a solutione continui oriatur, quæcumque partium illarum sensibilibus auris cautatem ambientem continuatam solvere possunt, aurium dolorem excitare solent; quorum præcipua sunt interperies, tum immaterialis, tum humoralis, cum materia coniuncta, vulnera, vlcera, & res extrinsecus in auris cautatem insillatæ, vel immixtæ.

Frigida interperies sæpe aurium dolorem excitat, induciturque a ventis frigidioribus, balneo aque frigide, alijsque causis impenfis refrigerantibus. Calida interperies sine materia, raro aut nunquam aurium dolorem producit, quemadmodum frigida, nam frigidum partibus hisce neurosis & membranosis inimicum est, calidum verò amicum: neque dolorem in auribus efflicere potest, quin multum excedat, sicque humorum defluxum ad partem alliciat: vnde materialis interperies producit. Hac de causa nec Galenus, neque alius Græcorum, calidæ interperiei mentionem fecerunt, quæmuis Auienna & Arabes ferè omnes eam propoluerint.

Materia verò frigida dolorem aurium efficiens, est pituitosa, vel serosa in aures a cerebro deflens: vel status ab eodem cerebro, aut partibus inferioribus transmissus.

Materia verò calida, vel biliosa est, ex venis & arterijs in prædictas partes insillat: vel sanguinea, per dictas etiam vias effusa, qua inflammatio generatur.

Prædictæ causæ solutionem continui occum producant, qua dolor excitatur. Solutiones verò manifestæ, ut vulnera & vlcera, non est dubium, quin dolorem etiam inferre possint. Vulnera sunt a causis externis pungentibus incidentibus, & contententibus, ita vt consensio ad hanc classem referatur. Vlcera verò fiunt vel post inflammationem

ab abscessu rupto, vel ab humoribus acris partem erodentibus.

Denique res extrinsecus in aurem immixtæ, si duræ, acutæ, aut alio quouis modo mordentes, aut vellicantes sint, dolorem proculdubio efficere consueverunt.

Diagnosis harum omnium causarum ita instituenda est: Si interperies immaterialis sit, nulla sensus grauitas in aure, neque vlla tensio, & nullus tumor apparbit. Frigidam autem esse interperiem cognoscet ex eo, quod causæ refrigerantes præcesserint, ut peregrinatio tempore hybernæ frigore externo dolor intenditur: & admotis calefacientibus lenitur. Calidam vero interperiem indicabunt extrinsecus caleficientes: ut insolatio, vel aer calidior, & noxa a remedijs calidis in aurem iniectis: lenamen vero a refrigerantibus.

Si ab humore pituitoso dolor excitetur, grauitas quædam in aure & ipso capite percipitur: tum fluxio pituitosa interdum aliquam aliam partem infestabit. Præterea, causæ refrigerantes præcesserint, ut aer frigidus & aquilinus, alimenta frigida: adeq; tempestas hyemalis, ætas senilis, & remedia.

Si a statu oriatur, dolor erit vehemens sine pondere aut grauitate: interpolatus non continuus, & cum tinnitu conuinctus.

A seroso humore fieri ostendunt, alij affectus ab eodem producti, & simul ægrum infestantes: tum fluxiones acres & tenues in dentibus, oculis, aures, pedibus, aliisque partibus: serosi humoris per vomitum, aluum, vrinas, aut sudores euacuationes.

Si ab humore bilioso ducat originem, dolor erit pungens & acutus, cum caloris sensu adiuncto: a refrigerantibus iuuabitur, & biliosæ quædam humiditates interdum in capite manabunt: quibus accedunt calidum & biliosum, temperamentum, ætas iuuens, tempus æstiuum, victus ratio calidior, aliæque causæ calefacientes, a quibus ledi æger consuevit.

Inflammatio cognoscitur ex dolore intenso & passibili, cum calore insigni, & rubore, interdum ad malis, & tempora sese extendente: quibus febri adiuncta est continua, & intensa, necnon aliquando delirium, conuulsio, syncope, & frigiditas extremorum.

Vulnus ex language ab aure profluente cognoscitur: vltus vero a pure vel sanie. Sed quia puris effluxus interdum a cerebro fit per aures, distinctione opus est. Si enim procedat a cerebro, dolor capitis aliæque apoplemias cerebri signa præcesserint: & primo sanies magna copia effunditur: deinde sensum minuitur, donec ex toto consumpta sit. Potest quidem magna copia effundi ex effluuio auris: sed inflammationis in aure conceptæ signa præcesserint. Huic postea vicus succedit, quod postmodum, siue ab abscessu, siue a fluxione humoris acris duxerit originem, sequentibus signis innoscitur. Pauca puris, aut sanies quantitas sanies & continuo profluit dolor, ardor & punctio sensus in ipsa aure præcipitur, præcipue dum auriscalpium immittitur. Imò vero vicis differentias coniectura quadam afficere poterimus. Si enim vicus sit in ore, cognoscitur ex sanie tenui ad citrum colorem vergente, & ex affectus longitudine. Si sit profundum, ex puris multitudine: si mundum sit, ex pure laudabile si sordidum, ex crassitie & copia eiusdem: si virulentum, ex sanie tenui: si putridum, ex icetore puris: si corrosiuum, ex eo quod post saniem sanguis egreditur: filuliosum, ex vetustate vicis, sanie virulenta, & carne callosa ex duriori. Deinceps extrinsecus in aurem immixta, vel insillata, aut sensibus percipiuntur in auris cautate contenta, aut ex relatu ægrotum addiscuntur.

Prognosis doloris aurium varia est pro varietate causarum. Qui a nuda interperie ducit originem, facillè curabilis est. Qui a materia frigida, pituitosa, serosa, vel stativa producit, non est quidem valde periculosus, sed chronicus vt plurimum esse consuevit. Qui vero a calidis humoribus, & præsertim inflammatione efficientibus exoritur, admodum periculosus est: cerebrum enim propter viciniam trahitur in consensum, vnde delirium, & consilii subsecutur. Iuuenes in hoc morbo magis periclitantur.

Cum enim calidiori temperie præditi sint, & sanguine calidiori, infusoribus inflammationis, quæ calorem naturæ cerebralis diffundit, profluere hominem extinguit, unde fit, ut ægri perierunt intra septimum diem intereant. Senes vero, cum humores habent frigidos, & immore inflammatione ætiuntur, sicque minus periclitantur.

Vicaria in auribus diffundit, cuiusmodi quæ creberrum vicium ad eas partes excrementa deponit, hæc tamen quæ abscessus coniectaria sunt, facilius curantur, tum etiam ea, quæ plus laudabilia continent. Vbi vero tamen virulenta, & fetida, aut alia præputa quæ prædicta fuerint, difficillimam curationem arguit, iocum magis, & vicus huiusmodi, aut cum ossis carie copulatur, super.

Curatio, non secus ac diagnosis & prognosis, iuxta varietatem casuum varianda est.

Si enim a frigida intemperie nuda producatur, calefacientia remedia puri admodum ad plures curationem sufficient, qualia in lurdiditate curatione sunt propolita, ac præcipue sopor & somnus, tum etiam olea calidissima, ibidem descripta. Calida vero intemperies, si aliquando sine materia contingat, topicis refrigerantibus quæ paulo inferius propoluerunt, edomati poterit, ac præcipue oui candido cum lacte muliebri subactis, & in auriem instillato.

Si a frigida intemperie cum materia coniuncta, pituita scilicet, aut fluxus ut fetida materia; eadem curatio erit admodum, quæ ad lurdiditatem curationem sunt propolita. V. primum. Si caput calcuitur, cerebri intemperies corrigatur, & topica remedia calefacientia, ac discutientia auri adhibeantur, ut a curatione prædicta desumenda.

Si a calida intemperie, cum bilis humoris affluxu, aurium dolor producat, qui chronicus sit, aut per interualla regatur. Primum huiusmodi ad partem affluens refluendus erit, per ebullitionem, quæ etiam calida intemperies totius corporis, cum ipsius hepatis in quo humor biliosus generatur, emendari poterit. Deinde humoris periculis evacuatio fiet purgationibus idoneis. Dieta hepatis intemperies calidior emendatur oleis, aut melleis refrigerantibus, siro lactis capreo, & aqua mineralibus & acedulis & vitriolatis, balneis aquæ tepidæ, & similibus. Ac denique ea omnia conveniunt, quæ in doloris capitis a calida intemperie oriundi curatione propolita. Dolor vero ipse demulcebatur topicis refrigerantibus & anodynis, pro inflammatione infra describendis.

Inflammatio auri curabitur, missio prius sanguine, ea quantitate, quæ tum plenitudini satisfaciatur, tum humorem ad auriem affectam consequentem recellere possit, idque præmissio clyster emolliente, refrigerante & laxante. Debet autem sanguis detrahi magna copiam, ut saltem vicibus, id enim postulat morbi magnitudo & acuties. Secunda est autem vena cephalica & directio auri affectæ. Si d. suppuratione mensium, aut hamorrhoidum affectus originem duxisse videatur, venæ inferiores aperiri debent, dempta prius plenitudine pro venam brachii. Imo & ab sensibus huiusmodi causis, venarum interiorum apertio optimam revulsionem præstabit ad opposita distantissima, cui etiam viti consentit hirudines auri affixæ.

Requisitiones etiam commodè fiet per frictiones, & ligaturas brachiorum & crurum; cucurbitula scapulis & dorso admodum, tum siccas, tum scarificatas.

Intendum etiam ad detrahendum, cucurbitula scarificata ponere aures apposita, multum iuvare videtur historia luculenta a Zacuto Lusitano propolita, lib. 6. cap. 1. praxi admodum his verbis. *Divinus senex lib. 2. epul. tit. 6. post modum fit profator. Ad aures dolorem excruciatum affligit. Hæc mem. randa sententia iulianum attulit speciem miror eundem, qui ex d. h. re auri atroci male habens omnibus prædictis destitutus rogatus debilis, & amens factus, continuo febriens, in horas mortis perorabat. Hæc cum ex vene sectione, cucurbitula effusa, humeris collo affixis, revulsionibus et scarificationibus, cæterisque reconvalescentiæ, sicut & anodynis, intra aures induta, nullam sentire videretur, cucurbitula scarificata, iuxta aurium glandulas applicata, lenius est: extraxit enim copiosè sanguinem inflammantemque revolutum humorem, beneficio omnino sanus permansit.*

Idem Zacutus Lusitanus, in præci ad hisorias, laudat hircudines ponere aures admodum quaternario numero, quæ maximum leniunt attulit referre iuveni cuidam, & scissimam auri inflammationem laboranti.

Mitandum etiam interdum effusum propter arteriotomia in temporibus celebrata, ad aurium dolorem atrocissimum compellendum, sanguinem iterpidum & spirituosum educendo, qui symptoma plus glutinosum producat. Operandi modus a nobis expressus est, in curatione doloris capitis a materia calida oriundi.

Purgatio etiam in hoc affectu utilisissima est, ex chologogis composita; humores enim biliosi sanguini pertrahunt, & fluxibilitatem, & anthrithoniam conciliantes, ad inferiorem retrahuntur, & foras educuntur.

Postmodum vero oleis refrigerantibus, tota humorum massa contemperanda, qui sunt ex decocto lactis, portulacæ, plantaginis, acetosæ, & similibus, cum syrup. limon granat, aut papaveris, theosotis.

Interim verò dum prædicta remedia viurantur, topica continuo administranda sunt, quæ perpetuo anodyna esse debent propter doloris vehementiam, cuius mitigatio periculis indicationes superat, quarum tamen ratio haberi poterit, si prædictus anodynis, in principio & augmento, sentit repellentia admittantur; in statu vero & declinatione resolutiva, quorum exemplum talia esse poterunt.

Y. Lactis muliebri recentet mulieris 3. ss. a. b. cum. qui agitatur, ut in liquorem abeat 3. ss. M. instillentur tepide in aurem.

Vel lac solium ab vberibus auriem instillatum, valde dolorem lenit.

Y. Fol. plantag. & folani, ana M. ss. flor. chamomil. & melilana P. ss. fiat decoctio, cuius fumum æger excipiat in auriem per infundibulum.

Y. O. vol. nymphaeæ & rosæ. ana 3. ss. M. instillentur in auriem tepide suffragium.

Alleli in prædictis oleis infusi & expressi, præstantius faciunt anodyni: hæc cum animalia ex unguine habent vim dolorem sedandam, & ratione in doloribus dentium, hamorrhoidum, & quæ viurantur. Vel dicti alleli vini capiuntur, & in oleis cum, quæ decoquuntur ad aquæ consumptionem.

Si ardor sit valde intensus, succi refrigerantes, oleis prædictis admisceri poterunt, in hunc modum.

Y. Ol. nymphaeæ & rosæ ana 3. ss. olei solani & plantag. ana 3. ss. M. instillentur in auriem.

Oxyrrhodium a Prædictis non paucis viurantur, ex olei rosacei partibus duabus, & aceti parte una compositum, quod tamen suspectum esse debet, quemadmodum omnia, quæ poterit repellunt. Periculum enim est, ne humor defluens in cerebrum vicinum retrocedat. Et quæ præceptum generale perpetuo observandum, ne inflammationibus, quæ partibus nobilibus proximæ sunt, repellentia admittantur. Admiseri tamen possunt leviora repellentia cum anodynis & relaxantibus. Sic enim fluxionem moderate reprimunt, nec tamen eam longius propellunt, cuiusmodi sunt antea propolita, quibus etiam sequens commodè addi poterit.

Y. Ol. rosæ & nymphae, ana 3. ss. si quæ rosæ & plantag. ana 3. ss. oleis muliebribus 3. ss. mucilag. femin. pilyli & cydon. extractæ cum aqua rosæ. ana 3. ss. M. iniici in aures guttulis aliquot huius liquoris tepentis, & circum aures, lintea in liquore macerata, appone.

In dolore vehementissimo ad narcoticam interdum confugere cogimur: sed raro ea viurantur sunt, & maxima cautione adhibita, quia cerebrum intena lues. Noni quendam (inquit Gal 3. de comp. med. sec. loc. *Yelo vsum opii, & vocem & sensum ægro admississe; ut ne opobalsamo quidem, aut alijs medicis calefacientibus, hunc amplius restitui poterit.* Si igitur magna viget necessitas, in hunc modum præscribenda sunt.

Y. Ol. de sem. papaveris 3. ss. camphoræ opii, ang. 3. ss. M. instillentur in auriem.

Y. Ol. amygdal. dulc. 3. ss. suc. cit. malus 3. ss. myrrhæ 3. ss. croci 3. ss. opii 3. ss. vel M. v. M. v. utar vi supra.

In topicorum administratione diligenter observandum est Gal. præceptum, quod habetur lib. 3. de comp. med. sec. loc.

loc. cap. 1. vt. scilicet auris inflammatione affecta non attingatur, sed medicamenta in eam infundantur per auricularem specillum, lana mollissima obvolutum, & in ipsa intinsum; tum æger interrogetur, num medicamentum tepidum ei videatur, & num calidius ipsum ferre possit. & ad tantam caliditatem procedatur, vt ipsum non offendat. Tinctum itaque pharmaco specillum ad principium meatus auditorij moderatè imponendum est, vt ex eo in altum medicamentum defluat; idque toties iterandum, donec meatus impleatur; mox lana eodem medicamento imbuta, tum meatus oculo, tum auri vniuersè imponenda, est.

In statu morbi olea leniter resolutentia cum anodynis permiscenda sunt, in hunc modum.

¶ *Ol. chamamel. amygdal. dulc. & violac. an. 3. i. ol. lilior. 3. 6. M.*

Sed si omnia & suffragina potentius resoluunt, quæ ex decocto sequenti parari poterunt.

¶ *Rad. alth. 3. i. fol. malua. folan. hy. perici. ana. M. j. sem. lin. 3. 6. sem. malua. alth. & papau. albi. an. 5. n. flor. chamom. aeth. & rosar. an. P. i.* Fiat decoctio in aqua, vel lacte, pro forti vel fustito. Aqua è spiritibus itramis extracta, in aurem infusata muricè dolorem sedat, eiusque causam resoluunt. Stipites itrami vinctus igni admoventi, & aqua ab eorum extremitatibus stillans viui referenda.

Si tumor resolu non possit, sed ad suppuracionem tendere videatur; quod ex doloris incremento, pulsatione, maiore, & febre intensiore dignoscitur; naturæ motus adiuvandus erit, & cataplasma leuans admoventi poterit.

¶ Resistentiam prædicti decocti, pro forti & fustito descripti, cui addè ad ipsas antheras, gallinæ, medullæ vituli, mullæ agn. sem. p. l. y. l. j. & sem. an. 5. i. olei chamom. violac. an. 3. i. butyri recens 3. i. 6. croci 3. 6. fiat cataplasma.

Cataplasma de mica panis hic etiam erit conuenientissimum, dolorem enim sedat, & suppuracionem leniter sine calefactione iuuat, eaque ratione in omni phlegmone felicitè vsurpatur. Illius compositio talis est.

¶ Medullæ panis albisimi 3. i. Coquantur in lacte caprino ad pulvis consentiant; deinde addè vitellos quor. nu. ij. ol. rosar. 3. i. croci 3. i. fiat cataplasma.

Maximè etiam commendatur cataplasma ex cepa. *Vi. clorij.* Fauentius quod in hunc modum componitur.

¶ *Cepam n. s. butyri recens 3. ol. chamom. & rosar. an. 3. i. croci 3. i.* Fiat cataplasma, quod moderatè calidum, pari applicetur.

Facta suppuracione abscessus rumpitur, & pus egreditur per auris membranam rarsactam, aut erosam. Tumque æger in aurem affectam decumbere debet, vt pus commodè effluat; & in aurem infundenda, quæ pus elucet, & abstergere valent.

¶ Decocti hordei 3. iv. mellis rosar. 3. i. M. infunduntur tepidè in aurem.

Si a puris acrimonia vicius generetur, peculiaris cura illa adhibenda est, quæ etiam conueniat viciis ab humorum influxu orundo.

Ac primum, quia ex sententia Galen. *de comp. med. fecund. loc.* topica alicui membro adhibere non debent nisi prius toto corpore repurgato; Eucasiones solennes instituendæ sunt per phlebotomiam, & catharsim, ægrotantis naturæ, & temperamento appropriatæ; eaque per curationis decursum repetendæ, quoties opus videbitur. Mox topica abstergentia & exsiccantia vsurpanda, a mitionibus ad validiora progrediendo. Quorum exempla talia esse poterunt.

¶ Mellis optimi, & vini albi antiqui an. 3. ij. Bulliant ad depurationem, & infunduntur in aurem, cotone postmodum eodem liquore imbuto obturandum.

Deinde, vt medicamentum potentius efficiatur, succum marrubij, api, abinthij, centaury minoris, aut cyclaminis cum melle admixce, leuiter decoque, & in aurem infusa. Vel

¶ *Succi betæ 3. i. marrubij 3. 6. mellis opt. 3. v.* Coque parum, postea addè syrapi abinthij 5. ij. M.

Fortius medicamentum ita parabitur.

¶ *Succi cyclaminis 3. i. myrrhæ 3. i. croci 3. 6. thuris 3. i.*

viridis aris 3. 6. vini antiqui 3. i. 6. Bulliant leuiter ad vini consumptionem; liquor bis aut ter in die infundatur.

Nota, ante quamlibet liquor infusionem aurem esse abluenda hydromelè tepido, probeque abstergendam peniculis, ex mundis linteis confectis, vel specillo auriculario cotone obvoluto.

Deterum viciis sufficienter, ad cicatricem perducendum est medicamentis epuloticis in hunc modum vsurpatis.

¶ *Aristolochia rotunda. cortic. granat. & gallanar. 3. 6.* Coquantur in aquis partibus vini & aquæ ferratæ ad th. si. Colat addè succi plantag. & polygoni an. 3. i. mellis rosar. 3. ij. M. infunduntur in aurem. Vel

¶ *Thuris, myrrhæ, ana. 3. i. gummi iuniperi 3. 6. larcocollæ, ladani, an. 3. i.* Fiat puluis, qui excipiatur tr. binthina, & fiant pulilli, supra carbonem iniiciendi, quorum fumum recipiat æger in aurem per infundibulum.

Vel puluis iste misceatur cum aliquo ex succis prædictis, & auri infundatur. Vel alumen vitum cum vino mixtum in aurem infundatur; potentissimam enim exsiccandi vim obtinet.

Si vicius contumax fuerit, & vetustatem contraxerit; a fluxione foueri necesse est vicius remotioni incumbendum est purgationibus viciuilibus, de qua ex guaiaco, & sassa parilla, ærthris, malbicatoris, cauterij, alijsque remedijs fluxionem auertentibus. Mox viciis exsiccationi incumbendum est remedijs fortioribus, quale est antea præscriptum, ex succo cyclaminis, myrrhæ, viridi græci alijsque compositum. Vel sequens Valeii, quo se aurium viciore laborantem Presbyterum ab octo annis, curasse refert.

¶ *Mellis 3. x. aceti 3. vii.* Coque ad ignem, & de spuma, deinde addè viridis aris 3. i. M.

Hæc remedia manè & serò in aurem infundenda sunt, & antequam infundantur, auris abluenda est sequenti decocto.

¶ *Folior. abinthij. althææ, & agrimon. an. M. i.* Fiat decoctio in aquis partibus aque fontis; & vini albi sub finem additi ad th. si. In colatura dissolue o. y. mell. simpli. 3. i. salum. puluerat. 3. i. M. abluatur auris calidè, & postea exsiccetur specillo cotone obvoluto.

Si dolor excitetur a remedijs acrimonia immittatur olamygdal. dulc. vel amarar. cum myrrhæ, aloe, & croco; & si maior sit dolor, misceatur parum opi, vel infundatur oleum ex vitellis quorum in mortario plumbeo subactum.

Si vicius valde fordidum appareat, vnguentum Aegyptiacum in succis prædictis dissolutum, vsurpandum erit.

Denique plaurum commendatur a Gal. Actio, alijsque tum Græcis, tum Arabibus, cum neotericis, scoria ferri ad vicius aurium potenter exsiccandum Gal. *de comp. med. fec. loc.* scoria ferri cum aceto acerrimo tritam, vel decoctam vsurpat. Hollerius in commentario illius capitis, Arabum præparationem magis probat, qui scoriæ cum aceto tenunt, & postea exsiccant; idque sepius repetunt, postea in pollinem redigunt, & cum aceto acerrimo coquant longa coctione, dum mellis crassitudinem acquiescit; atque ita ficiant, & in vium reuocant, cum melle alijsque liquoribus dissolutum.

Si auris dolor excitetur ab aliquo corpusculo in aurem, immisso vt lapillo, nucleo cerasi, aut alijs huiusmodi, quæ intantum dolorem parere concuenerunt, & interdum inflammationem, conuulsiones, ac mortem accellerent, vt refert Mathæus de Gadi, pucto cuidam decem annorum, nucleum cerasi in aurem immisum, & malè a chiturgo tractatum, insignem dolorem, ac mortem intulisse. Eorum corpusculorum extractio sic molanda est.

Primum aduertendum est, in auriculario specillo corpuscula illa extrahi possint: quod cautè admodum agendum est, ne ab eodem specillo peniculis immittantur, quod non raro solet contingere. Ideo si res in aurem immissa totum forum impleat, latius est ab vsu specilli omnino abstinere, & reliqua auxilia tentare, quæ in hunc modum administranda sunt.

Paulus specillum lana inuolutum in refinam, seu teberinthinam, aut gummi, aut aliud quoddam glutinans medicamentum demittendum esse scribit; idque verendum, donec sensim res in aure contenta extrahatur.

Si hoc modo nihil efficitur, oleum calens meatui continuo instillato, ut pars illa relaxetur, & res in aure contenta lubrica fiat: sic enim facilius exsistens aut extrahi poterit.

Adhibeatur iterum menta naribus, nareque claudantur, & os comprimat, ita enim a vehementi spiritus expulsiōe, id quod in aure continetur, expellitur.

Hæc auxilia in diu sicut vixenda sunt, donec æger liberetur, si enim res in aures immixta diutius perstitit, inflammatio orietur, & postmodum nullo discrimine erit corporis extractio, & græue suspensio, hic periculum.

Articulus in *nonum* Res. affert, caput lætere auri admotum, corpuscula illa extrahere, & propria experientia confirmat his verbis. *De experis per me in extrahente rem infixam in aures est, ut laceri, & vna, aut nouer mortuæ applicatæ cum capite suo auri, & hoc r. si per tres horas retinetur, cum eam amoveris, invenies rem infixam adhærentem capiti laceris. Et hoc valet in extrahendis cunctisque res vnicunque fixæ.*

Denique, si prædicta remedia non sufficiant, ad extractionem veniendum est, quæ sit per instrumenta a chirurgica, quæ huc & eleganter docetur Fabricio Hildano *sent. observ. 456.* & ab Aquapendente in *operationibus chirurgicis, capite de aurium chirurgiæ.*

Pulvis aliquando in aurem lene infusuat, & in illius cavitate sese commouentes magnam molestim pariunt. Ad illam extractionem globulus ex pilis caninis composuitur in aurem demittatur, & pulvis sese in eum inferet, ob lympham quam habent pubes cum canibus. Vel ex lana molli compressa pessulum composito, & in aurem frequenter demitto. Vel dictum pessulum cerebrum lana instillo, & alius in aurem demitto.

Aqua in aurem introducta natando, aut caput irrigando, facillime molesta esse consuevit, & dolorem efficere. Illa vix plurimum facili excutitur, si quis alteri pedi mixtus gualdem lateris cum auge affecta capite parumper declinat saluo. Si hoc non sufficit, extractio molenda est extrahendo facta per titulum, aut arandem peritissimè in aurem immittam, aut illic paruo in eandem introducto, & postea dilatato. Extremitas autem titule quæ in aurem demittitur, cotone opobasatur, ut fortassis auris ætius vniatur, neve aer externus ingrediatur, qui extrahentem impediret.

Galenus, & Aetius affundit oleum infundunt, & aurem irrigant, mollique lana siccant, deinde molli etiam lana extergunt, rursumque infundunt, idem iterum repetendo.

Ac denique spongia molliissima, & sicillima frustula in aurem demittantur, donec sicca, nec amplius humida extrahantur.

CAPUT IV.

De exēuntibus præter naturam ab aurium cavitatibus.

EX auribus multa præter naturam egrediuntur, quæ si sigillatim commemoranda sunt, utique propria remedia sigillatim adscribenda.

Primo igitur rupto abscessu, post inflammationem genito, aut ex viceri ab humorum acrimonia, pus aut lanies solet effluere; cuius curatio a prædictorum affectionum curatione dependet, quæ superiori capite fuit proposita.

Sanguis etiam aliquando ex auribus profluit, ut in vulneribus capitis, percussionibus, in quibus vena aurium, rumpi, aut lacerari possunt. Si autem modicus sit ille fluxus, cohibendus non est, quia intus retentus inflammationem efficere solet. Si vero immoderatus sit aut diuturnior, cohibendus est vena sectione in brachio celebrata, & cucurbitulis icalulis capitis cum scarificatione. Deinde astrigentia & refrigerantia in aurem instillantur, qualia sunt succus plantaginis, polygoni vel decoctum rubi, rosar. rubr. mastichæ, sacchar. hypocalidis, balastulorum, sumach. & similia in vino & aceto, aut aqua lerrata.

Aquosus humor per aures & cerebro nonnunquam effluit, idque pueris puerumque solet contingere, qui humor cohibendus non est: nam immoderata suppressio epilepsiam, aut gravem alium cerebri affectionem parit, natura enim per hanc viam lætè minus idoneam, excrementa depolit: nimiaque humiditas in capitibus puerorum luxurians, non solum per vias ordinarias, huc vixi a natura destinatas, nareque, & palatum; sed etiam per aures, oculos, & totam capitis superficiem, (vide viceri & achoris capitis) expurgatur. Cum tamen illa euacuatio symptomata sit, & humor ad aures profusus, eas tandem exulcerare, & auditum ledere valet; illius curationi consequenti methodo in umbendo est.

Ac primum humores superflui in cerebro redundantes, educendi sunt blandis: & frequenter repetitis purgationibus: cum etiam denudationibus, per vesicatoria posteriori parti cervicis admodum, & cauibum occipiti instillantur.

Postea meatus aurium detergendus, & exsicandus est tali medicamento.

℞. Succ. agrum & absinth. ana ℥. iv. vini albi & mel. rosac. an. ʒ. i. Bulliant parum, & in aurem instillantur, sordibus prius ablatis; postea vero aures cotone obturantur eodem liquore imbuto. Vel.

℞. Vini albi ʒ. iv. succor. agrimon. absinth. & centaury. an. ʒ. i. Bulliant simul, & in aurem instillantur.

In adultioribus vero, si aquosus humor per aures effluat, & diu perleuerit, totum corpus, & ipsam cerebrum euacuandum & apozemata cephalico & purgante. Postmodum humiditas superflua absumenda dura sudorifica; deinde veficatoris, cauteris, & cucurbitulis cæteraque remedia administranda, quæ in frigide cerebri intemperiei curatione proposita sunt.

Vermes denique in auribus aliquando generantur, ex putridis viceribus, & ex his emanare solent, qui curatis quidem viceribus cessant. Quia viceris sanatio non ita brevi tempore obtineri potest, verum extindio interim molenda est remediis convenientibus. Hoc vnicum exempli loco haberi poterit.

℞. Ol. amygdal. amar. succi apij. centaurij. minor. an. ʒ. ʒ. acet. ʒ. ʒ. Bulliant parum, deinde adde myrrhæ, aloes, an. ʒ. i. M. instillantur in aurem. Si fortius desideres, colocynthidis ʒ. ʒ. addi poterit.



PRAEPOS MEDICÆ

LIBER QVARTVS.

DE NARIVM AFFECTIBVS.

P R A E F A T I O.



Nares varios affectus prater naturam pati consueverunt, quos ad morborum, vel symptomatum seriem referuntur. Ad morbos referuntur vici & ozæna, sarcamæ, & polypus. Ad symptomata vero reducuntur, si scilicet laesio, sive narium, sive, & steruatio, hæmorrhagia. Vnde quartus hæc loquitur. Abscedit capitis. Primum erit de narium vicere, & ozæna. Secundum, de sarcamæ, & polypo. Tertium, de laesio ossis. Quartum, de narium fetore. Quintum, de coryza. Sextum, de steruatiōe. Septimum, de nique de hæmorrhagia narium.

C A P V T P R I M V M.

De narium vicere & Ozæna.

Vlcus narium, aut recens, & simplex est, aut vetustum, & putridum, quod Ozæna nominatur. Recens & simplex fit, vel à causis externis, vel vulnere, aut contusione; vel ab internis, humorum quippe acrimoniis, ad illas partes decurrentibus, præcipue pituitæ salis à cerebro profluentis.

Ozæna vero fit ab vicere simplici, si negligatur, aut propter causæ maiorem, & maiorem acrimoniam magis poterit, putridum & sordidum efficiatur.

Diagnosis vtriusque petitur ex eo, quod vici simplex nullum, aut exiguum dolorem effert; sed tantum aliquod sanguinis frequenter emittit, præsertim cum attingitur, aut irritatur, aliqui crustula sicca quæ nigra obducitur, quæ emunctionis impetu nonnumquam excutitur. Ozæna vero maiorem dolorem infligit, & crusta illius sordidior est, tum grauior sensus ex ea profuit. Ager ipse tum sibi grauior, tum aliantibus recti odore expiratione molestus est, & à sordido illo odore ozæna Græcis nominatur. Sæpe vici illud serpit, & vel narium pinnae, vel earum interitio, vel interdum tenella illius loci ossa exedit ac putrefacit, exsiccumque palatum aliquando perforat, idque maxime, si ad canceri naturam accedat, vel ex lue venerea (quod frequenter contingit), aut elephantiasi originem duxerit.

Quod ad prognosim attinet, vicera recentia, & ab humore benigno, minorique acrimoniae participia genita, satis facile curantur. Vetusita vero, sordida, putrida, difficilissime & si cancerum degeneret, Propterea insanabilia sunt. Si à lue venerea, aut elephantiasi oriuntur, curati non possunt, nisi affectus illi prius auferatur.

Ad curationem, primum victus ratio conueniens instituitur, quæ humorena acrimoniam temperet eorumque generationem prohibeat. Mox totum corpus euacuandum est phlebotomia, & purgatione conuenientis, tum curæ subtilis attingendæ cum scarificatione. Et si fluxio humorum acrimia in nates, in vâle contumax, velicariorum, & cauterij, potterioribus partibus admodum, etit detrahenda; tum caput roborentia administranda.

Prænullis vniuersalibus remedijs, ad topica veniendum est. Ad primum aduertendum, non vicera crustula sive, & antequam vicius progrediaris, crustula auferenda est; eam emolliendo foci aque tepidi, butyro infuso, adipe anseris, aut galinæ recentis, oleo amygdalarum dulcium, & similibus. Emollita crusta, si excutienda non est, ne irritetur vicius, & fluxio exasperetur, sed expectandum est, dum, si sponte decidat, nates emungendo, aut saltem leniter &

blandè fumentare digiti, oleo amygdalarum dulcium, iunctis detrahenda.

Ablata crusta, astringentia & exsiccantia remedia vsurpanda sunt. In simplici vicere sufficit aqua ordeum mellis rosaceo vicius ablueri, deinde vnguento de pathia, vel albo Rhafis, vel oleo ex vitellis ouorum illanire, quod erit efficacious, si in mortario plumbeo prius agitur.

Ad ozænam vero sequentia parabuntur.

1. Hordei integri P. j. fol. agrimon. plantag. absinthij & centaury min. ana M. j. rosar. rubr. P. ß. Coquantur in aqua, ferrata. In colat distilue mellis ros. f. iii. Fiat certhium narium frequenter attrahendum.

Post aliquam detractionem, sequens decoctum vsurpandum est.

2. Balsastiorum & cortic. granat. an. j. i. fol. plantag. cau. de equine, polioellæ & herniariae ana M. j. radic. bistortæ f. j. aluminis crudi f. j. ß. Fiat decoctio.

Aqua aluminosa ad idem etiam est efficax, tum ea remedia, quæ ad polyrum astringendum & exsiccandum capite sequenti proponuntur, erunt efficacia.

Ad idem locum vnguentum Aegyptiacum in aqua hordei dissolutum.

Deinde sicut vnguenta, quæ astringant, detergant & summi exsiccant; vt vnguentum pompholygos, addito alumine, chalcitide, & cortice mali granati. Vt sequens vnguentum prescribat.

3. Omphacij f. j. cortic. mali granati, balsastiorum, ana 3. i. myrrhæ aluminis ladani, ana 3. i. chalcitidis, aloes, cortic. thuris ana 3. j. olei rosæ, & myrrin ana j. i. cere rubræ quantum satis. Fiat vnguentum, quod applicetur vici, vel dissoluatur in vino, aqua plantag. peculi rosar. aut myrtillor. & frequenter narium attrahatur ore aqua pleno.

Si hæc non sufficiant, abluatur vicius aqua sublimata bis, ter, quaterque in die fiat enim egregie, & citra vilius mortuum detergit, illius preparatio talis est.

4. Aque plantag. f. iii. sublimati crudi pulueri gr. xij. Bulliant in phiala vitrea ad medietatem consumptionem. Post augeri vel manu sublimati quantitas, pro fortius, aut debilius medicamentum efficere volueris.

Vicere probè detergo, ad illius exsiccationem veniendum est, cui rei conferet puluis rosarum rubrarum exsufflatus, & si efficacius id præstat velis, puluere vnguenti prædicti addi poterunt.

Rondeletius ad vicera exsiccanda, post sufficientem detractionem, nihil efficacius esse testatur, fuscimigio, quod partes illas profundas attingit & siccat, idque parandum, esse docet ex potentissime reficantibus, vt auripigmento & cinnabris, quibus addenda sunt aliqua odorata, ex quibus fuligo excitatur, & vicera siccantur, vt myrrina, thus, mastiche, benioinum, &c. aque in hac formam reduci possunt.

5. Ladani purij, hyposocitidis, mallich myrrinæ, ana 3. i. styracis rubræ, & calamitæ, cortic. thuris, sandaracæ, auripigmenti, an. 3. i. Excipiantur omnia terebinthina, & sunt trochisci, quibus suffragari ager ferè & manè in cubiculo.

Optimum etiam est parare candelas ex cera rubra; nam fuligo talis candelæ natum vicera potenter exsiccant, maxime si ager continetur in cubiculo benè clauso & angusto. Quod autem fuligo recipiatur, idem experitur (inquit Rondeletius), cum distillis in studio moram trahimus notum, nam postea (sputum) & excrementa narium fuligine illa denigrata redduntur. Dem de hac addit. Hæc varietas vici curam non habet, neque ab Italos, neque a Gallos Aethiopes curari potest.

CAPVT II

De faciemate, & polyo.

Narium viceribus excrefcencia carnez interdum fuperueniunt, que aliud morbi genus, nempe tumorẽ præter naturam conftituunt. Earum autem duplex eft differentia, quarum vna Sarcoma nominatur, altera verò Polypos.

Sarcoma eft excrefcencia carnez in naribus genita, certa figura carnez, & vicerum, que partibus ex ternis adueniunt, hypercarcofi quàm fimilima.

Polypos verò eft excrefcencia carnez, radicibus exilibus adhærens, in latum fele porrigenz, & ad inferiores narium partes propendens, ita vt polypt pulcis fpeciem referat, vnde nomen fortius eft. Rhabis narium hamorrhoidas appellatur quoniam hamorrhoidibus, que in ano fuccrefcunt, quodammodo fimiles funt.

Hæc autẽ ca: uicula mollis eft, modò alba, modò rubra, ac interdum liuida, & fi multum excrefcit, aliquando extra nares propendit, fi verò in fummis narium partibus adnæfcit, aliquando ad palatum propendit, & communes oris meatus obftruit, & potũ vñ facili confici potefit, in aullrina conftititioe maxime uilitatur, tum etia in plenilunio. Tempore verò aquilione & ficciore exilente, tum etiam in nouilunio plurimum immutatur. In hoc etiam a faciemate diff. re, quod farcoma magis in ius narium partibus, quæ carnofiores funt, folet fuccrefcere, polypos verò in fummis ac fuperioribus, iuxta nafĩ radiceẽ.

Vitrioli que tumoris caufa eft humor craffus, vifcidus ac pituitofus e cerebro defluens, cum aliqua languinis portio ne admixta. Aliquando humoris melancholici portio quedam admixta eft, tuncque merus eft ne in cancrum degeneret. Ex fuperfluo tamen narium nutrimento, in carnem luxuriantem commutata, farcoma lepe generatur, ideo curatione facilis eft.

Horum affeetuum diagnofis, ex his que dicta funt, facile intelligitur, tum ipfis oculis per fe patet.

Prognofis verò ita inftituenda eft, vt farcoma plerumque faciliẽ curationem recipiat, polypos verò admodum diffidentiffime, tamen qui mollis eft, albus, vel ruber, vel colore ex albo & rubro compofito præditus, facilius curatur, & durus verò ac liuidus, diffidentiffimus, & periculofus eft, ne in cancrum degeneret. Item qui in ima aut media narium parte radicatur, diffidentiffime curatur, qui verò in fumma parte radicatur, diffidentiffime curatur, quoniam remedia ad eam partem vix poffunt pertingere.

Vterque affeetus iſdem remedijs curatur, que ad hunc scopum redigenda funt, vt caro fuperflua auferatur, fed prius caufa accendens tollenda eft, humor fcilicet pituitofus e capite defluens, quod fiat viciũ ratione attenuante, & exſiccante, vacuatione vniuerſali, reuulſione, detractione, & capitis exſiccatione. Que omnia perficientur remedijs in frigida ccc. bri interdip. rici curatione propofitis, cum Medici curantis prudentia vſurpanda. Quamuis enim multiſſimi auctores teſtentur decoctum guaiaci, cum viciũ exſiccante in hoc affeetũ plurimum ſæpè contuliſſe, cauendum tamen eſt, ne calidi humores pituitæ admixti ſint, eorum enim efferaetio polypos in cancrum conuerſi tandem poſſet.

Postmodũ verò caro fuperflua abluenda eft cauſticis medicamentis, vel ferramentis idoneis abſcindenda, & vulcus relictum cicatrice obducendum. In principio tamen dum adhuc morbus recens, ſolũ alſtrigentibus & valde exſiccantibus interdum curatio obtineri poſſet, & perpetuò mitiora illa remedia prius tentanda ſunt, antequam ad vehementia deueniatur.

Primo igitur tentandum eſt medicamentum, compoſitum ex tribus generibus malorum granatorum a Galeno propoſitum lib. 3. de comp. med. ſec. loc. cap. 3. quod ſic habet. Accipiantur tria mala granata, ex tribus generibus eorum, acidiſſimi et dulciſſimi, & mediocriſſime maturata, ac recentia terantur ſimul in mortario. Deinde ſuccus exprimitur, & coquatur in liſtimenti formam. Specillum ex ſ. lana, vel lingeo conſectum ex ſucco imbutum, & frequenter in na-

rem demittatur. Hoc remedium ſiccet & alſtrigat ſine morbo, & excrementitium humorem abluat.

Sequens verò aqua eundem effectum præſtat efficaciter. g. Vuarum immaturarum th.ij. cortic. mali granat. b. laſtiorum, ſumachana th.ij. Macerentur in aceto & deſtillentur, deinde adde aluminis th.ij. vitrioli. j. ij. Deſtillentur iterum omnia ſimul, & aqua illa tangeretur partes internæ narium frequenter.

Si hæc non ſufficiant, ad potentiora veniendum eſt, & aquæ prædictæ ſandaracha & auripigmentum adijcienda ſunt.

Vel ſpiritus vitrioli, aut aqua ſeparationis auri, quæ ſecunda vulgò nominatur, aqua plantaginis temperanda eſt, & que polypos frequenter attingendus.

Vel imbutur aqua mercuriali in viceris narium curatione deſcripta.

Vel immutatur turunda ſucco radicis ari imbuta, & ſi ſuccus acrior fuerit, aqua plantaginis etiam temperari poterit.

Inter præcipua annumerari debet mercurius præcipitatus rubeus, qui ſi plurimis lotionibus dulcoratus, hypercarcoſini egregie abluunt ſine viro, aut exiguo dolore. Ille puluis cum melle roſæco permilcendus eſt, & que intincta turunda in nares demittenda.

Emplaftra etiam in hunc uſum reuocantur, quæ ſine ingnifici dolore polypos abluunt valent, quorum formula, talis eſſe poterit.

g. Malle emplaftri de mucilaginibus 3. ſ. pulueris ſabinæ 3. ij. Malaeſcitur, & incorporentur ſimul. Ex hac maſſa fiat cereoli debite magnitudinis, in aures immittendi. Vel.

g. Vitridis æris, auripigmenti, vitrioli aluminis crudi. an. 3. j. 3. antimonij. 3. v. Macerentur in aceto, deinde exſequiſſe terantur, poſt ſiccantur, eadem tritura, & maceratio octies repetenda, in aqua plantaginis deniq. macerata, ſiccantur. Poſtea recipe oleo roſæco 3. iij. ſt. b. g. r. i. 3. ij. Nartriantur & coquantur, addendo lub ſinem coctiõis, prædicti pulueris 3. ij. Coque in emplaftrum facis glutinofum, & ex quo torquentur cereoli, vt ſupra.

In vſu medicamentorum cautiorum primò notandum eſt, ante eorum admotionem nares eſſe munienda, vñgute refrigeratæ Galeni, vel nutritæ, vel populeæ, vel oui albumine agitata cum oleo roſæco & ſimilibus.

Secundò obſeruandum eſt medicamenta cauſtica, ne nares lædant, per ſtitulam argenteam immitti poſſe, ita vt ſi ſiſtula extremis polipum ambat, atque ita medicamenta ad eum conſerri poſſint naribus intactis.

Tertiò notandum eſt dicta medicamenta decreſcente luna eſſe vſu, pandantur enim tumor admodum immittitur, & ita remedia facilius ad radicem vſque inueniri poſſunt, cum tumor eorum introitum non impediatur.

Denique ſi medicamentis polypos auferri nequeat, ad operationem chirurgicam veniendum eſt, quæ deſcribitur a Paulo Aegineta. Cornelio Celſo, Hieronymo Fabricio ab Aquapendente, alijsque recentioribus.

CAPVT III

De leſioſaſta.

Olfactus, quem admodum & reliquæ omnes corporis actiones, tribus modis læditur, immittitur, abolit, & deprauatur.

Immittitur & abolitur olfactus eadem ſunt cauſæ, ſecundum magis & minus tantum differentes, intemperies ſcilicet obſtruictio, & adſtriictio.

Intemperies frigida & humida cum materia pituitofa, coniuncta, vt quælibet ſenſum obtundere nata eſt, olfactum in primis immittit, aut abolit, vnde in catarrho & coryza reſquens eſt ſolet huiusmodi olfactus læſioſiſſimus, enim ſenſum immittit, aut abolit, quærens calorem, narium partes, actionum omnium opticeẽ obducit, ac debilitat.

Obſtruictio ab eodem humore pituitofa prodiciens, quæ meatum cum ſenſib. ſeu narium ductum, cum ſenſib. ſeu poros

poros ipsius cerebri, & processum mamillarum, replet, ut odores ad eas partes pervenire nequeant, potest etiam fieri à sarcomate, polypro & aliis quas calidæ, narium meatus replente & obturante.

Africtio etiam interdum potest contingere ab humore putriloso in anteriore cerebri parte collecto, & processus mamillares comprimente, ut de viuis immutatione à nervorum opticorum africtione, à nobis dictum est. A natura etiam narium conformatione eadem africtio potest contingere, si nimirum illa ita deprimitur & angustia fuerit, ut liber odoribus additus non possit.

Depravati olfactus causa est odor parvus nares continuo lacerans, qui quidem aut ex vicere narium exhalat, aut putrida circa nates, vel os ethinoides contenta: namque in ipso olfactu sensu, aut prope hunc intra meningis putrescentiam ipsum haudquaquam sentiunt, nec ea laborant, sed quibus aliis deprehendit. Vt enim quippiam odoratum feriat, oportet aliunde ad ipsum lenium delerri. Potest etiam teter ac foetidus vapor ab aius partibus, ut ventriculo, gingivis, & cerebro ipso ad processum mamillares exhalare, eoque ita inhere, ut omnes odores eo delati finiali fetore intus appareant, quæ in eodem lingua bile autia infecta existunt, omnia que gustantur, sapore amaro prædita esse videntur.

Hærum causarum quælibet satis facile dignoscitur. Frigidam intemperiem & puritatem redundantem ostendunt frigida & humida cerebri intemperies, & mucosa puritatem cerebri Italians.

Obstructio verò si pituita originem duxerit, ipsam signis indicabitur. Si à sarcomate, vel polypro, ex propriis capitibus diagnosi erit delendum.

Locus verò, quoniam materia refidet, obstructionem efficiens, dignoscitur ex consuetudine, si in narium meatibus heletur, vocis obsequio contingit, quia nates ad vocem efformandum plurimam vim conferunt. Si verò anteriori cerebri parti, aut processibus mamillaribus dicta materia hæreat, vox autem præsternatur.

Odor parvus olfactus finisiorum feriens, à qua parte ducat, & quibus ex proprio cuiusque viro erit dignoscendum. Quod ad prognosim attinet, si olfactus isdem recens, & à simplici coriza generatus, facile curatur: immo, curata verò & à concatenata mucositate procedens, difficile, quæ ex narium conformatione potest incurabilis est.

Curatio pro diversitate causarum diversis modo instituta est. Si à frigida intemperie oriatur, & inedia illi adhibenda sunt, quæ pro frigido cerebro propolita sunt.

Ad obstructum, quoniam verò ab eadem pituita, ductibus narium, aut processibus mamillaribus impaetia, auferendum: partes illas expurgantia remedia viurpanda sunt, æthina nimirum, itermitatoria, & apoplegmatica; quæ etiam in frigido cerebri intemperie curatione à nobis propolita sunt.

Si denique à sarcomate, aut polypro nares obstruantur à præcedente capite eorum curatio erit delendum.

CAP. V.

De fæctore Narium.

Narium fætor, & fetor anhelitus valde differunt intra se, ille enim ex narium tantum prodit, hic vero ex variis partibus, ventriculo nimirum, pulmone gingivis, aut faucibus viceratis, quæ vel sensu ipso, vel propriis signis discerni possunt.

At narium fætor ex putridis vaporibus, vel in narium ipsi generis, ut in ozena, sarcomate, aut polypro putrelatis, vel ad nares transmissis, & humoribus putridis in ipso cerebro, & parte illius anteriore, vel circa processum mamillares, aut os cribrosum contentis, Putrescent autem humores putrilosi in dictis partibus quando in ipso præter modum retinentur, præsertim si calida & humida cerebri temperies accesserit. Retinentur vero propter obstructionem earum partium, aut constitutionem nimiam, ut infans, & depressioribus contingit.

Narium affectus talem fæctorem producentes, propriis

signis supra propolitis dignoscuntur, quoniam si nullus àduerit, ab humore putrido in ipso cerebro, aut processibus mamillaribus, aut osse cribroso contentis, gravem illum odorem provenire coniiciendum erit.

Prognosis fæctore narium, quæ ab vicere, polypro, aut sarcomate promanat, ex eorum prognosibus dependet. Qui vero à corporis humoribus in cerebri anteriori parte contentis exoritur, si recens fuerit, facile curatur si inueteratus, incurabilis est, maxime si à mala narium conformatione, nempe fimitate, & depreffione nimia contingat.

Curatio perficitur causarum ablatione, & lymphomatibus lenitione.

Viceris, sarcomatis, & polypro curatio supra posita est. Humor verò putridus in cerebro, processibus mamillaribus, aut osse ethinoides contentus, vacuantibus, & abstergentibus auferendus erit.

Ac primum evacuationes universales instituenda sunt, quæ totum corpus, & ipsum cerebrum ab excrementis putrilosis liberent, per apozemata, pulas, & alia id genus, quibus, si magna humorum laboria reducere videatur, dieta sudorifica addi poterit. Mox æthina abstergentia, & materiam contentam educantia erunt administranda.

Ac primum manè & vespere, si vola manus vinum album attrahatur, in quo centaureum minus, & calamentum incotum fuerit.

Deinde betæ succus cum aqua maiorana extractus, loco prædicti attrahatur. Vel

Rad. cyper & calami aromat. ana 3. si. colar. rub. p. j. myrrha 3. j. Coquantur cum vino albo pro erthno.

Ad potentius purgantem ex alto eliciendum, sequens componi poterit.

Rad. ieros. siot. 3. j. ellebori albi, piperis longi, an. 3. si. sem. anisi & maiorana sicce pulvis ana 3. j. enphorbi gr. ij. nardini, cheiridi & violac. ana quantum satis. Fiat vnguentum molle, ex quo intincta minimi digiti extrimitates tracentur nares interne, vel turunda, aut alio linimento, lentis magnitudine in nares immittantur.

Denique ad leniendum odorem fallendum, sua volentia, narium sæpe attrahenda sunt, ut gallia moschata in vino odore dissoluta, aqua angelica, & alia huiusmodi.

CAP. VI.

De Coryza.

Coryza, quæ & graevetudo à Latinis nominatur, est cathartici species, in qua fluxio est cerebri in nares defluta. Illa autem defluxio est humoris crudi in anterioribus cerebri ventriculis contenti, qui à causa pierumque externa concitatur, æthina nimirum, vini potu largiori, balneo calidiori, & similibus: quæ pituitam in cerebro collectam lundere, ac liquare possunt. Fit etiam à causis externis cerebrum refrigerantibus, comprimitur enim tunc temporis spongie milar, & humorem in se contentum ad partes subiectas amandat. Tum etiam cerebri refrigeratione novus fit pituitæ proventus: illius enim calor penuria male concoquit alimentum, unde plurimi excrementi proventus, quod à facilitate expultrice per vias patentes excluditur.

Affectus ille per se patet; in eo enim plurimus humor per nares excurritur.

Inter reliquas cathartici species, quæ in nares fit, levisissima, & tutissima est, quæ cito curatur, si recens fuerit, & à causa externa concitata. Quæ vero diuturna est, à contumacia cerebri intemperie oriunda, difficile curatur. Tum etiam, si à calida hepatis intemperie producatur, quæ non raro catharos calidos & acres iniecit, à quibus nares sæpe exarcentur, alioquin affectus graues patitur.

Curatio huius affectus à cathartici curatione defumenda est. Eadem enim evacuationes, ressolutiones, & derivationes possunt. Nisi quod æthina hic viurpanda non sunt, ne nimium ad partem affectam attrahant, sed apoplegmatica, & masticatoria post universalem maxime conveniunt.

Ac præter dicta remedia, auctores nonnulla commendant, quæ coryzae compellende peculiariter conveniunt, ut vapor decocti maiorana narium exceptus, vel aqua maiora.

horas naribus excepta. Vapor eceti inferrea laminam candentem insuli ad idem confert, idque efficacius, si in aceto rosæ rubræ prius infundatur.

Si fluxio valde frigida fuerit, iussus sicci ex nigella, these, aliique improprie concictis erunt vtilissimæ enim frigida cerebrum temperie corrigunt, & superflua humiditas abluuntur.

CAPUT VI.

De Sternutatione.

Licet Sternutatio in statu sano sæpissimè contingat, & ita levis affectio ut plurimum esse soleat, vt symptomaticum nomen non mereatur. Aliquando tamen ita molesta efficitur, vt Medici curantem opem desideret, quemadmodum apud Forellum videre est, qui *observatone* 12. 7. lib. 10. hystoriam proponit cuiusdam ancillæ, quæ ita grauem & molestantem ex catarrhe acris & lasso sterntationem patiebatur, vt ad plurimum Medicorum opem coniungendum fuerit. Idem confirmat vetus consuetudo sterntationibus bene precandis, quam nonnulli inde ortam existimant, quod Gregorij Magni temporibus suis vixit epidemicus fœuerit, in quo ægrotautes sterntando moriebantur; quamvis alij antiquiorem esse illam consuetudinem asserunt.

Est igitur sterntatio cerebri motus velox, quo per nares conseritur adio spirituum, molesta excernere conatur. Per cerebrum autem non solum cerebrum substantiam, sed totum aggregatum ex eo, & eius membranis intelligimus, præcipue anterioribus, quæ in primis in hoc affectu contrahuntur. Quod ex eo licet colligere, quòd dum caput attollimus, facilius sterntumustunc enim materia irritans, quæ ut plurimum vaporosa est, & (sarium sua natura fertur, facilius ad illam partem deferretur.

Ille autem motus qui in sterntatione contingit, ad cerebri & membranarum facultatem expultricem naturalem spectat, iuxta Galeni doctrinam, & de *symp. caus.* cap. 1. ubi distinguens sterntationem a tremore & palpitatione, dicit palpitationem a solo morbo fieri, tremorem vero a natura & morbo; sterntationem vero a sola natura.

Sibi tamen prima fronte contradicere videtur Galenus, qui *cap. 4. de diff. lib. 7. tussim & sterntationem voluntarie, facultatis symptomatica esse dicit.* Nulla tamen contradictio est, siquæ ab eâ differet liberat Galenus, innuens facultatem animalem in sterntatione concurrere tantum secundario, quòd videlicet in sterntatione a capite, & a pulmone spiritus emittatur; attamen caput pectoris principium, motus tradere. Cum enim quis in naso offenditur, persequi properat, vtriusque emittendi spiritus vis simul vtatur, altera quidem, quam ipsum per se facit, altera quam per nervos, veluti per quadam longa brachia, quæ in pectus descendunt: vnde idem Galenus *comment. Aph. 1. sect. 7.* docet antecedente inspiratione sterntationem fieri, natura, ægrediente aëre copiam ad sterntationem. Tunc enim aër, qui è pectore egreditur, coniungitur ei qui per nares ad cerebrum attrahitur, quidquid narium membranis exquisito sensu donatis, molestum est, cum impetu & sono expulsi.

Ex hoc etiam Galeni loco colligitur, irritationem sterntationem excitantem, in naso potissimum fieri, quòd etiam confirmari alia sententia: quæ habetur in *comment. Aph. 1. lib. 7. ubi* inquit, *ex his ita affectis illi sterntant, quibus morbus est ea quæ a capite sunt humiditas; seu & si quid morbus naribus imparet. Sic enim tussis motus quidem naturalis est, sed expurgandæ causæ sunt in pulmone, asperæ arteriæ sic & sterntationem manifeste videtur expurgare narium meatus.*

Verum obijci potest, quòd multi caput nudantes, aut alio quouis modo aeri frigido exponentes; sterntationem illico patiuntur: vt videtur ex temporis cerebrum immoderate irritari. Respondendum est, aërem frigidum esse causam sterntationis; nondum in cerebrum immediate agit, sed quia cerebrum eiusque membranas experiendo, ea causa est, vt acris materia ad nares descendat. Quamvis

igitur in hoc symptome, cerebri membranz possint etiam irritari, prius tamen sterntatio promouetur, quàm noxa ad narium membranam, quæ exquisitissimo sensu prædita est, perueniat.

Causæ sterntationis ex dictis colligi possunt, quæcumque nimium tunicam narium internam irritare possunt, & quales sunt humores, aut vapores acres, vel a cerebro dolabentes, vel a partibus inferioribus transmissi vnde, in febribus interdum sterntationes contingunt, vt ait Aui-cenna, quia vapores acres a toto in caput transferuntur; vel externis in nares acris immittuntur, quemadmodum medicamentis acrimonia præditis, quæ parum nominantur, sterntationem excitamus. Hæ quidem causæ externæ sterntationem immediate producant. Danur tamen aliz quæ plurimæ, eandem mediate efficiunt, internas scilicet generando, vt commouendo, quales sunt umores acris alterationes, vel de frigido aëre supra dictum, est Galenus *lib. de infirm. eductis cap. 6.* dicit a Solis aspectu sterntationem excitari, quia cerebri spiritus vapori similes a Sole funduntur.

Diagnosis ipsius affectus per se manifesta est. Causæ externæ ex ægri relatione patenti; internæ vero ex signis partium affectarum a quibus materia irritans ad nares, & anteriorem cerebri partem transiuit.

Quod ad prognosticum attinet, hic affectus ex eo omni var periculo. In principio tamen catarrhi & coryzæ valde nocet, quia humor concoquendus quicquid indiget. Interdum autem in febribus adeo viget, vt vix deiciat, & fluxum sanguinis è naribus interdum excitet. Sæpè tamen nullo modo nocet, & in sanis cerebri superfluitates expellit: In ægris vero pro bono signo habetur. In febribus præcipue malignis, etiam rebus omnibus desperatis, salutem promittit. Hystericæ mulieri aut difficulter parentiis sterntatio accidit, bonum, *Aph. 35. sect. 5.* Medicamentis præmictis provocata sterntatio, apoplexiz, aliis quæ grauioribus cerebri affectibus prodest. At si provocata non adueniat, signum lethale est, naturam enim succumbere significat.

In morbis pulmonum, pleuritide præsertim, & peripneumonia, sterntatio mala est, ex Hipp. 2. *progn.* quia ex concussione alia sterntantis cerebri lacerantur & violentè diuelluntur partes thoracicæ, vnde inflammatio valde augeatur, & nulla præterea hic materia morbificæ vacuatio. Ad putum vero in bronchij pulmonem contentam, potenter expellendam, quæ tussu reuici non potest, sterntationem conserre docet Gal. 2. *de symp. caus. cap. 5. & 6.*

Curatio, quando necessaria est, dum scilicet sterntatio alia iuxta incommoda, perfitur; primò causarum externarum amonitio, si ab eis excitetur. Si vero fiat a causa interna, illa etiam auferenda est, euacuantiis, reuellentibus, derisantiis, & discutientibus remediis.

Si itaque a alia cerebri, aut alterius partis intemperie, vapores acres ad nares & interiores cerebri meninges transfuerint, venæ scilicet celebranda est, mox purgatio idonea, inliruenda. Deinde vapores, qui reuellantur tridionibus & ligaturis extremorum, cucurbitulis scapulis admotis; tum reliqua reuellentia, derisantia; & discutientia vsurpentur, caput pectinetur, aures vellicentur, oculi conficiuntur, nares eniungantur, spiritus cohibeatur.

Ad acrimoniam denique demulcentia, & narium irritationem compescenda, vtile erit aquæ tepidæ vaporem natibus excipere, vel eadem oleo violacæ, rosæ, amygd. dulcium, aut butyro recentis illinere, vel lac tepens naribus attrahere; quòd remediis Forellus ancillam à graui sterntatione in principio huius capitis proposita, consilium liberauit.

CAPUT VII.

De Hemorrhagia Narium.

Hæmorrhagiæ nomen quemlibet sanguinis fluxum à quacunque parte profluens vulgò significat. Peculiariter tamen, quando simpliciter abique vili partis affectu mentione enunciat, ab Hippoc. id tantum profluum signi-

significat, quod è naribus fit, à quam speciem primariam; & evidentissimam; vt annotat Galenus *comm. t. in t. Epid.*

Est autem hæmorrhagia narium symptoma in excretis eorum que sunt toto genere præter naturam. Sanguinis autem per nares effluens aut à venis & arterijs cerebri basin perreptantibus effunditur; aut à valis palato ad nares descendentes, que sunt inlar venarum hæmorrhoida- rum in ano & vtero.

Cum verò omne symptoma pendeat à morbo; tanquam à causa proxima & immediata, huius causa erit morbus or- ganicus, vel communis. Organicus duplex erit, valorum, apertio; que *diarrhæia* Grecis dicitur, & rarefactio *diarrhæia* appellata. Communis etiam duplex, eorundem va- lorum ruptio; que *ipæ* nominatur; & erosio *diarrhæia* ap- pellata.

Causæ istos morbos immediate producentes sunt, san- guinis quantitas, vel qualitas excedens. Sanguis quantitate peccans, venas rumpere, aut ostia illarum aperire potest. Idem vero qualitate peccans; si nimium calidior tenuioreque, fit per anastomosis effluere potest, quia calor ostia dilatat, & tenuitas efficit, vt iacilius effluere possit. Eadem qualitates diapedesin etiam efficiunt: Calor enim rarefacit tunicas valorum, & sanguinis tenuitas efficit, vt per poros earum tunicarum transilire possit. Sanguinis denique acrimonia venarum amicas erodit & exulcerat, & diapedesin parit.

Causæ etiam è interna ad horum morborum productio- nem concurrunt, mediate, vel immediate. Immediata id præstent casus acutus, vniuersus & alia id genus, que venas rum- pere, aut diuidere valent. Mediate vero operantur, quæcumque sanguinem multiplicare, calefacere, & aut attenuare possunt, vt sanguis plenior, & crassius. Oculum aut è vicia, nimia vigiliis clamor, æstus, longa in sole mora, & alia quæ plura sunt.

Hæmorrhagiæ differentie ex eo desumuntur, quod alia critica est, alia symptomatice, critica fit in febribus acutis, vt natura causam morbumque per has vias expellere conatur: præsertim in ipsa que visceris alicuius inflammationi coniuncta sunt, ac in primis hepatis & lienis que per has vias sepius solent. Fit etiam interdum sine febre, natura sese à superfluo sanguine exonerante; vnde vidimus quæpiam primis ætate iuuenili periodicam hæmorrhagiam pati, alios etiam per alias vias sanguinem vtiliter effan- dere.

Symptomatica verò in morbis chronicis præcipue continetur, in quibus sanguis vitiosus ab hepate debili, & insigni aliqua intemperie laborante producur; qui vel ob reten- tricis facultatis imbecillitatem, per venas illas effluens vel ab expultrice reijcitur, tanquam onus inutile, cum sanguis im- purus & vitiosus corpori alendo idoneus non sit.

Cognoscitur per se ipsa hæmorrhagia. Causæ verò illius hoc modo distinguuntur. Ea quidem que fit per *apertio- nem*, hoc habet commune cum ea, que per *ipæ*, quod in vtra que sanguis copiosè fluat; sed in eo distinguuntur, quod si præcellit, ut ictus, vel calus *ipæ* potius adiecit coniciendum est. Cum tamen à plethora & sanguinis multitudine ruptio & apertio valorum possit contingere, ita distinguere possunt, quod rupto vale sanguis continuè effluit, apertio verò tantum per intervalla: quia valorum ostia constringi solet, quando humoris copia dilataus ad ea minus con- sultiva auctum rupta, semper aperta manent; & ideo san- guis continuè effluit, donec solutio continuè in ipsa facta iterum veniat. Præterea distinguatur apertio valo- rum à rupture, ex ipsius sanguinis inibitanta, Si enim, tenuis sit, ab apertis valis potius; si crassus, à diruptis emanat. Hinc fit, vt hæmorrhagia plerumque in iuueni- bus à valorum apertione fiat, quia sanguinem habent tenuiorem; in senibus verò à rupture quia crassiorum obti- nuerunt.

Si à venarum erosione fiat hæmorrhagia, adfunt signa cacochymia, visceris, & pus aut sanies interdum egredi- tur, aut saltem catarrhus salis præcellit. Si per *diapedesin* effluat sanguis, iste tenuis est, & admodum paucus.

Causæ verò antecedentes & externæ faciliè distinguun-

tur. Si enim à copia sanguinis hæmorrhagia contingat, adfuit rubor in facie, & tensio venarum: tum etiam præcel- lit vitus largior & calidior, aut causa aliqua externa fun- dens & attenuans sanguinem: hæc autem præcipue contin- gunt, iis qui calidiori hepate præditi sunt.

Si à cacochymia affectus proenat, illa proprijs signis distinguetur, que bilem, aut melancholiam redundantem ostendunt: propterea sanguis effluens, aut per venam bra- chij deactus, corruptus, aut praua qualitate infectus appa- rebit.

Si à retentricis facultatis imbecillitate hæmorrhagia, contingat, pallidus faciei color, & totius corporis debili- tas apparet; tum etiam affectus alicuius præcellit, à quo hepar in primis debilitatum est; ac denique sanguis paucus & per intervalla effluit.

Si sanguis è venis narium immediate effluat, astrin- gentibus remediis naribus admotis, faciliè sedatur, & nullibi capitis dolor percipitur. Contra verò, si à cerebro pro- fluat, in aliqua capitis parte determinata dolor percipitur, fluxus difficile sedatur, & in naso postea nihil conseruit. Ab aliis etiam partibus sanguis interdum profluit, vt he- pate, lienis vtero; quatum indicia dantur dolores, & ten- siones circa eadem partes.

Si sanguis fluat ab arteria, cum impetu egreditur, calidus est, purus, floridus & rutilans; ex vena verò rubescit, in ful- cum tendens, crassus, interdum impurus, & cum paruo im- petu egreditur.

Prognosis imminens hæmorrhagiæ, præcipue critica, ab actionibus læsis, excrementis & qualitatibus mutatis de- sumitur; siquæ futuram hæmorrhagiam indicant infomia, & imagines rerum rubrarum capitis & cerebri dolor sub- inde ortus, temporum grauitas, & pulsatio magna in arte- cijs illorum; tinnitus, vel sonitus aurium, oculorum habedo, & marmæ ges illis obuerantes, rerum eorundem, ac totius teræ faciei iucis auersio, lachrymæ inuolutarie, pruritus nasi, sanguinis stilla de indice, spirandi difficultas, ten- sio hypochondriorum sine dolore.

Quorum signorum ratio talis est. Quando sanguis ad caput deferri incipit, patet in cerebro plantasma rerum rubrarum, tum per infomia, tum etiam inter vigilandum vt iuueni Romano contigit, huius mentionem facit Galie- nis, de præsentatione ad *Psittimum* capite. Si enim morbo acuto laborans, rubrum serpentem ac cubicali laquearia oberrantem videre visus est, quo perterritus, è lecto subin- de exiit. Vnde Gal. aduertente hæmorrhagiam prædixit, & sanguinis missionem impediuit, quam alij Medici præscripserant. Dolor capitis & ceruicis ex eadem sanguinis transiitione ad partes superiores exoritur, qui membranas duellens distenditque, doloris sensum parit. Pulsant au- tem arteriæ temporum extraordinario motu, propter earum compressionem, quæ à venarum repletionem fit. Aurium tinnitus fit ex vaporibus, ad cerebrum magna copia tendentibus. Visus habetudo fit, quia copiosi, & crassi va- pores ad superiora elati, meatus obstruunt, vnde fit, vt de- negato auditu spiritui animalis habeat visus. Marmæ ges oculis obuerantes, nihil aliud sunt, quam tenuia quedam, & diuula corporcula variorum colorum, intra corneam, & crystalloidem contenta, ex vaporibus sursum elatis pro- ducta; quæ licet interius sint, exterius tamen posita, decep- tione visus apparent; quandoquidem oculus eterne af- fectus visioni, quæcumque intus sunt, extra esse iudicat. Rubor faciei & oculorum, sanguis fit, qui maiori copia, ad illas partes cumulat. Lucas auersio ex eo proficiscitur, quod distenti oculi humorum copia, ex nimia luce magis distenduntur, quia lux diffregat spiritus, vnde oculi dilata- tio, ex qua dolor consequtur, quem vt eundem agrotantes lacerant fugant. Lacrymæ inuolutarie sunt ex repletionem oculorum, & partium adiacentium, quæ præter modum distente compriment glandulas illas humorum continen- tes, ex quo lachrymæ generantur. Pruritus narium fit ex vaporibus sursum ascendentibus, & nares viliantibus. Sanguinis stilla de indice apparet, v. g. quarto, vel vndeimo, ostendit futuram hæmorrhagiam de iudica- torio; nempe septimo, vel decimoquarto, quia diebus iu- dicibus natura incipit transferre humores ad eas partes.

Diffi-

Difficilis redditur respiratio, quia dum sanguis ad superiora transferatur: diaphragma comprimit. Tunc denique, hypochondrium fit, quia sanguis in suo fonte, & radicibus venarum moveri incipit: sed latus est ea diffensio, & sine dolore, quemadmodum & difficilis respiratio; si enim diutius & contumaciter perlicet, signa sunt potius hepatis inflammari.

Præsentis verò hæmorrhagiæ prognosis ita instituenda est.

Sanguis est naribus die critico moderatâ quantitate fluens, salutaris. Quamvis hæc lententia a Galieno sæpius inculcata sit illi tamen Fernelius relatuæ lib. 2. de sanguinis missione cap. 1. dicens nullum sanguinis profusum, licet criticum, salubre esse. Quoniam licet deliria, vigilas, capitis dolorem, & reliqua symptoma de mulceat, vix tamen morbum penitus euclat, quia sanguinis portio pariter emittitur, impurioti remanente. Idque ex eo probatur, quod sanguis ex nare profusus colore & substantia laudabilis apparet; cum sanguis eodem tempore è vena detrahitur, impurus & corruptus appareat.

Speciosa quidem est hæc Fernelii doctrina; non tamen absolute recipienda. Verum quidem est in plurimis morbis acutis, præcipue verò in febribus malignis, hæmorrhagiam sæpe morbum penitus non solvere, quemadmodum nec sudores in ipsâ febribus perpetuo salutares sunt; quia tales evacuationes a natura irritata ante tempus, materię morbificæ malitia plerumque sunt. Attamen non raro morbi acuti hæmorrhagiâ solvuntur, ut docuit Gal. lib. 3. de crisi. cap. ultimum, & passim alibi. Quod autem sanguis per nares & cretus, purus semper appareat, ratio inde desumitur: quod nimium ille gutturi effluat, siquæ statim refrigeretur, ut partes impure separari nequeant, & ille puriores partes reliquis permixtus rubrum colorem toti melle conciliat. Sanguis verò è brachio detrahitur, quia affatus effluit, calorem in valculo duo retinet, quo partes impure separantur, ita ut crassa & sacculenta fundum petat, biliosa verò & pituitosa, quæ magis alterata, & impuriore effluat, superat, & ita sanguis impurius, ac foetidus apparet. Contra verò si sanguis è brachio gutturi effluat, purus apparebit, quia citò concrevit, antequam partes heterogeneæ calore lætæni poverint. Imò verò sanguis copiosè effluens, si in pelvis latiore recipiatur, purus etiam apparet, quia citò refrigeratur.

Hæmorrhagiæ nimis copiosæ & vehementes pessimæ: nam ad convalescentiam delinunt. Fit enim aliquando, ut natura copia sanguinis grauiora, ad excretionem concitata, modum tenere nequeat, & supercrisum efficiat, quam Medici sæpe cohibere coguntur.

Hæmorrhagiâ in principio morbi, mala, quia symptomatrica est, & sic natura ante tempus irritata ad excretionem, a materię morbificæ malitia.

Hæmorrhagiâ quæ è directo partis affectu accidit, bona, contra verò, mala, si in hepatis inflammatione, sanguis effluens è nare dextra, bonus, è sinistra vero, malus. Contra, si in inflammatione, è sinistra bonus, è dextra vero malus; quia omnis bona evacuatio æquâ debet fieri.

Stille sanguinis paucæ per nares effluentes, malæ: significant enim naturæ imbecillitatem, & malignitatem morbi. Omnis siquidem excretio in morbis acutis quæ inchoatur autem, & non periclitatur, maximè damnatur ab Hippo, quia maior est securitas in febribus, in quibus natura nihil æternit, quam in quibus pauca & inuicilia, siquidem conditioni esse intentum tunc respiratio arguitur. Quod si illa appareat, signum est ante tempus naturam irritari. Stilla, tamen de indice prodens, signis concoctionis ut cum quo apparentibus, futuram crisin per hæmorrhagiam die critico significat.

Hæmorrhagiâ longo tempore perdurantis, hepatis imbecillitatem, & refrigerationem, & inde cachexiam atque hydropem portendunt.

Quibus in febribus quantitas sanguinis è naribus fluxerit, prænotum, Hipp. Aph. 87. sect. 7. quia, ut docuit Aulc. sanguinis fluxus in melancholicis & pituitosis, nocturnus, ab eo enim, magis refrigerantur.

Quibus febribus sanguinis fluxerit multitudo,

quæcumque ex parte, cum reficiuntur, alii iis humectantur. Hipp. Aph. 17. sect. 4. quia, ut docuit Galienus, calore nativo diluato ex profusum sanguinis, neque cibi bene concoquuntur, neque in sanguinem transmutantur, neque distribui possunt per corpus; & propterea alius fieri humidiores patitur, donec processu temporis vires suas naturam recuperent.

In hæmorrhagiæ curatione, primum aduertendum est, an illa critica sit vel symptomatrica. Critica enim cohibenda non est, sed ad sanguinem quantatem sanguis fluere permittendus. At enim Auicenna, sanguinem & narium intermedium critica expulsiõe ad libras quatuor vel virum infigni lapu prolixius. Idque videtur desumptum a Gal. qui lib. de præcogn. ad Poffh. 13. iuveni Romano hæmorrhagiâ correcto sanguinem fluere permittit ad libras quatuor cum dimidia, priusquam remedia liquida cohibenda visparet.

Quod quidem, ut in valde plethoricis corporibus aliquando vultus contingere, ita in aliis vitæ periculum inferre potest: æ certum est criticam hæmorrhagiam, quantumvis opera nature fiat, modum non raro excedere. Natura siquidem sanguinis multitudine grauiata, & ad illius expulsiõe excitata, modum aliquando tenere non potest, immo quæ evacuationem facit; vnde maximam virium deiectionem, & mortem meture oportet: & tunc cohibenda est, quæ nimium ex ea notabilis virium atroxitas prodient.

Sic etiam sanguis, qui sine febre, ex consuetudine fluit, cohibendus non est, naturæ arbitrio relinquendus, nisi immoderatus fuerit; multi enim per huiusmodi hæmorrhagias periodicas, a grauius morbis immunes fiunt, quos earum suppreiõe incidere consueverunt.

Symptomatrica verò hæmorrhagiâ cohibenda est. Quod fiet sanguinem ad nares confluentem reuellendo, ab ipsâ & vicinâ partibus repellendo, venas apertas occultendo, sanguinis motum præpulsu inhibendo, & humores acriter, aut tenuiores sanguini permixtos, hæmorrhagiæ causas præcipuas, euacuando, corrigendo, eorumque generationem prohibendo, & facultatem retentricis hepatis & venarum roborando. Quæ omnia sequentibus prædictis præstari poterunt.

Ac primum sanguinis missio inter scissoria remedia, principem locum obtinet: quæ maturè celebranda est, antequam vires admodum debiles eualerint, idque è vena brachij directo partis, quæ sanguinis profluit, de tri nimirum, si è nare dextra: vel sinistra, si è sinistra sanguis emanauerit. Et Gal. libro de sang. miss. cap. 1. r. huius remediis efficaciam confirmat, afferens se vasis sanguinis & narium fluxiones repente venæ sectione lassasse. Debet autem detrahi sanguis & latis larga manu, si vires serant, & amplo foramine: Quamvis maxima Medicorum tum antiquorum tum recentiorum pars alter censet: qui angusto foramine, & exigua quantitate sæpius repetat, sanguinem detrahendum esse censent, siquæ reuersionem melius fieri. Nam ut sanguinis motus contrarius concluditur, vehementiori motu agnandus est siquidem motus vehementior debiliorem ratione quò ampliori foramine, & magis contractis sanguis effluit per venam sedam, eo promptius & narium profluere in sanguinem abducit: ita ut non raro hæmorrhagiâ vehemens, phlebotomia hoc modo celebrata, sine phlebotomia in instanti fuerit cohibita. Attamen si vicia phlebotomia, alijque remediis inferius describendis hæmorrhagiâ cohibita non fit, illa restatari poterit per virum modum. Tum etiam vena pedis læteri poterit, ut reuulsio fiat ad distantissimam, quæ etiam læpe plurimum conset ut tellatur Auicenna, Paulus & Trallius.

Post venæ sectionem, vel etiam ante ipsam, sicut frictions & ligaturæ partium extimarum: & cucurbitula satis magna hypochondrio admodum, dextrosiâ nare dextra, sinistro verò, si è sinistra sanguis prolixius. Galenus enim hæmorrhagiam cohibuit in iuvene Romano, cucurbitula hypochondrio admodum, & venæ sectione, ut ipse refert lib. de præcognitione ad Poffh. lib. 1. c. 7.

Non est tamen viqueque tota cucurbitularum applicatio hypochondriorum regioni. Sanguis enim tunc teporis effluens, ad hepatis aut lencem nimia copia attrahi potest, & inflammationem in ipsa partibus efflicere. Cuius

rei exemplum habetur apud Fabricium Hildanum *obs.* 47. cent. 2. de quodam amico maxima hæmorrhagia narium laborante, cui præter alia remedia, cucurbitulæ magno ad regionem hepatis admotæ sunt. sanguis quidem sublevis, sed inflammatio hepatis lequuta fuit. Cautè igitur agendum est in cucurbitularum aduotione regioni hypochondriorum, & ad eam confugiendum non est, nisi reliquis remedijs non conferentibus, & post iteratas phlebotomias. Copia enim sanguinis in venis immota, multos est periculum sanguis immo copia ad hepar attrahatur, vt inflammationem excitare valeat. Attamen quocumque modo applicentur cucurbitulæ hypo. hondriarum regioni, sanguinem, & spiritus attrahunt ad illas partes, & sic calorem carum augent, quod aduerſari videtur lententur Hippocratis *Aph.* 13. *ſect.* 5. Vbi in his vnde sanguis fluit, aut fluxus citi, frigidus viendum est præcipit. Interpretes autem volunt ad ea loca frigida esse admoventia, vnde motus sanguinis incipit, qualia sunt hepar & lien.

Forcitus commendat cucurbitulas supra pedes, insigni experimento, quod habetur *obs.* 14. lib. 13. his verbis *Virgines* sanguinis narium profusum cum extremis laboraret, neque remedia commode adhibuitur, cunctis duodecim libris sanguinis ex vtriusque nare per vices efflueret. Cum ad eum accessu efflueret, per integrum diem sanguis efflisset ut duas ventosas abſque ſcarificatione, vnam iuxta hepatis regionem, alteram supra lienis locum poneret mandauit, quibus parum videbatur fluxus subsistere. Vtrum post mortem decessum, puer cum videret, sanguinem iterum ex vtriusque nare cum impetu erumpere, quod ventosæ hypochondrij adhibuit a nullo modo mouerent, duas vtriusque supra pedem de acrum, alie, vnam supra sinistram affixi iussit, & dicta mirum sanguis præter spem fluxu refractus est. Vtrum cum aliquanto tempore ventosa cui adhaerent, ager in animi deliquium incidit, quare tunc demum ventosæ detrahitis, aquam faciem conspersa excitatus est, mox odore vini recreatus ad se rediit, & fluxus sanguinis narium miraculis, aut incantationibus cessare præter omnium spem, præstare sanatus restitutus est.

Cucurbitulæ etiam scapulis admotæ, cum sicce, tum humide fluentem sanguinem & narium retrahunt. Attamen, non est viqueque tutum remedium. Possunt enim à partibus inferioribus ad superiores sanguinem attrahere, & nouo fluxui occasionem præbere.

Quidam præctici cucurbitulas brachijs admovent supra scutulum bicipitem quibus etiam sanguis ad nares profusus reuoluit.

Craio in consilio, inter reuulsoria remedia proponit incuotationem digiti minimi in dextra manu, si ex dextra nare fluit, vel in sinistra si sinistra. Cum enim vehemens illa compressio intentioni dolorem pariat, ab illo dolore sanguinis retractio fieri potest.

Sed vultu potentius sanguis & spiritus ad interiora retrahuntur per animi deliquium, cuius interuentu cunctum maxillam hæmorrhagiam curatam vidimus in Illustrissimo Episcopo Lodouico, anno 1639. qui febre maligna laborans, cum renis dextra inflammatione, quæ polymorpha in abscessum abſque die 7. morbi, tam vehementi correptus est hæmorrhagia, vt intra quatuor horas sanguinis libras duas excreuerit, & cum adhuc sanguis affatus fluere, vtriusque cohibebatur, de hæmorrhagia cohibenda cogitandum fuit, & in hunc finem multa remedia vtriusque. Quibus nihil proficiuntibus, æger se alium deponere velle dixit, nec potuit cogi, vt in lecto decideret. Præmonimus, si est electio surgeret, cum tanta virum exolutione, fore vt in syncope rueret, eam tamen syncope cohibendæ hæmorrhagiæ futuram esse periculum. Ita scilicet successit nam postquam surrexerat, animi deliquium passus, à quo statim excitatus est vino exhibitio, & aqua frigida in faciem proiecta, postea copiose decedit, & postquam in lectum delatus fuisset, sanguis multo minori impetu fluebat, & exhibitio facile pruenit ad 3. j. in aqua frigida dissoluta, statim sanguinis fluxus omnino liti cohibitus, cum tamen antea idem remedium & quamplurima alia frustra in vsum reuocata fuissent.

Quamuis autem animi deliquium à vulgaribus præctici inter hæmorrhagiæ remedia non proponatur, habetur ta-

men apud Hipp. lib. 3. *Epid.* *ſect.* 7. his verbis *Sanguinis venarum suppresiones faciunt, animi deliquium, figura alterata, interceptio, lunamentum interius appositum, deligatio.* Idem quoque docuit Gal. 5. *meth.* c. 5. his verbis. *Porro sanguis cohesere prohibetur, & propter animi deliquium, & cum ad contraria reuoluitur, & in ad vicina deriuatur, & per refrigerationem in corporis totius tunc vero præcipue ipsius partis afficitur.* Notandum tamen est, animi deliquium tantum conuenire, quando sanguis effusus est, & vena qua ad corpus superficiem defluit, quod innuit Hipp. idem lunamenta deligatones, & alia eiusmodi præscribit. Quod etiam sanguis à partibus interioribus profluit vt in hæmoptoe, mensium fluxum immodico, aut vulneribus partium interiorum, tunc animi deliquium fluxum augere potest, retracto calore ad interiora, & ad eas partes à quibus sanguis profluit.

Zacutus Lusitanus lib. 1. *praxis admiranda obs.* 66. refert se desperatam hæmorrhagiam, à nullis alijs remedijs cedentem, appposito cauterio actuali in vtriusque plantæ pedum cohibuisse. Quod remedium similem luccellum habuisse reicit in magna sanguinis excretionem per os, ex vena ranæ apertione producta, quæ ab acri catarrho croci fuerat, & cum per biduum sanguis ad libras viginti effluxisset, multaque euasipata, & altigentia parte admodum fuisset, reuulsuta, & incrassata remedia, tum etiam narcotica vtriusque. cauterio in eadem parte partis indito, fluxus omnino cessauit.

Reuulsionibus prædictis aliquandiu vsurpatis, si fluxus nihilominus perſisteret, ad ea remedia veniendum, quæ fluentem sanguinem repellunt, qualia sunt ea quæ anacallemata vulgo nominantur, fronti, & temporibus applicanda, quæ in hunc modum componi poterunt.

℞. Boliarum tæ. terzæ sigill. sanguinis dracon. thuris, matthes. & aloes, ana 3 j. tanze volatilis, & pilor. leporis minutum incisa ana 3 ss. albumen oui num. 1. lucci plant. & solani ana q. l. Fiat cataplasma fronti & temporibus applicandum.

In calu virgente, promptissime parari potest cataplasma ex bolo armena folio, cum albumine oui & aceto subacta, fronti ac temporibus appositum.

Ethiacatulum etiam paratur cataplasma ex gypso cum aceto subacta, & ad crassitiam duorum digitorum fronti, & temporibus admotum. Et si prima applicatio non succedat, iterabitur, & certò curare credetur.

Amatus Lusitanus laudat pileum ex dictis affingentibus cum oxycrato subactis, capitis raso appositum; quod in summa necessitate tentari poterit.

Fotus etiam fieri potest ex aqua valde frigida, vel oxycrato fronti & temporibus, cum linens frequentè immutatus, quamprimum scilicet calcescere incipiant. Vel idem fotus fieri potest ex succo plantag. polygoni, equiseti, bursæ pastoris, & similium, addito aceto ad penetrationem.

Vbi notandum, caput non esse aqua frigida perfundendum, acque repellentia fronti admoenda, donec reuulsiones sufficientes præceſſerint; alioqui sanguis per refrigerantia intro compellitur, venas que in alto lute replet, vt docet Gal. 5. *meth.* cap. 6. atque ita fluxus sanguinis augetur calore aucto per antipræstam, à quo sanguis motus & impetus adiuuatur, aut si sanguis recitatur, consilio, apopleiæ, dyſpnoeæ, aut alius quispam grauis affectus excitari poterit.

Solum etiam acetum sanguinem fluentem cohibere potest, si co froas cum spongia foveatur.

Eadem spongia aceto nubit, & in nares immittit ad idem est ethica.

Conspitio faciei aqua frigida, non solum repellit sanguinem fluentem, sed etiam eundem retrahit ad interiora intentioni timore, qui ex aqua frigida in faciem ex improposito inieci, exoritur. Quenammodum enim syncope, vt antea dictum est, fluxum sanguinis cohibet, propter caloris retractionem ad interiora; eadem ratione timor, à quo similis retractio potest conducere. Atque ita, quocumque modo excitetur, consistere potest. Aqua autem frigida, satis magna copia, in faciem conijci debet, rempe ad duos, vel tres cyathos per breuia intervalia proſectis.

Vulgo etiam vsurpatur ad sanguinis impetu ad superiora

retinendum, illiusque ascensum prohibendum, sicut cer-
tius ex limbo aceto frigido imbuto, quod collo circum-
duci debet, & frequenter immutari antequam calefaciat.

Idem oxyratum in ore detentum, & sæpe immutatum,
linguam etiam ad partes superiores confluentem repel-
lit, tum etiam impedit, ne sanguis e naribus ad gulam de-
fluat, quod sæpe contingit.

Ad idem valet acutum instillatum in aurem, quæ nari-
bus vicina est, sic enim vena per quam flux sanguis, re-
stringitur.

Faba, aut nympha argenteæ radicis narium inter cilia
admotum, & fascia arcte alligatum, vel fortiter paritè com-
primat, eundem fluxum cohibet. Tum etiam animadu-
tendū est in temporibus, aut fronte venæ aut arteriæ
tumentum cum eas nympha aliquoties faba fissa,
per medium in longi tudinem secta comprimetur, fassa in-
terueniente, & opuntia, & ferremum remediū est. Et ad
maiores compressiones supra labiū aut nympha, albu-
men cui concussio adiecto gypso & nympha exceptum ad-
ponitur, ut est.

Vapores aceti in laminam candentem affusi, naribus ex-
ceptis, venas aperias constituunt.

Ad idem confect oxyraū nariū, & pueri attactum.
Præter repulsiua dicta, in vltimæ uocandi sunt quæ ip-
sas venas aperias occludere & conglutinare solent. In quæ
sunt multa remedia in nares immitti consueuerunt.

Galenus lib. de parati facilius, cap. 13. thuris & aloem in
puluerem redacta albumine cui excipit, & cum inteo-
lo, asperis prius pilis leporinis, in nares immittit.

Vel turunda in hunc modum parari potest.

Thuris aloes, sang. dracon. farinæ volatilis, tele. aranea-
rum, & pilorum lepori plantam minutim incisum, ana 3. ff.
Excipiantur succo pistorum & gossipio, fiantque turundæ in
pares frequenter immittentur.

Idem pulueres in nares instillari poterunt. Cui etiam
visu maxime conferre testantur practici magni nominis,
cinerem testarum, ouorum, & chartarum. Verum circa ho-
rum puluerum vsum, obseruandum est, dum illi admi-
nistrantur, os aqua frigida plenum esse debere, ne medica-
mentum ad os per palatum transierit.

Potenter etiam linguam fluentem cohibet gossipium
atramento infectum, quod in thecis scriptoris atramentum so-
let, si aliquantulum exprellum, & in turundæ figuram ef-
formatum in nares immittatur.

Idem gossipium atramento imbutum, & fronti admo-
tum cum fascia, fluentem linguam poterit sistit.

Tandem hæmorrhagia predictis remedijs tum etiam
infra propolis peruenit obstitere ad elcharotica,
venendum est, quæ venarum extremitates a peras com-
burendo crustam inducunt, & sanguinem inhibent. In ijs
tamen magna cautio adhibenda est, quia dum elchara de-
cidit, valorem apertis plerumque renouatur, & sic fluxus
reintegrari solet.

Inter elcharotica autem principem locū obtinet vitrio-
lum vltimū, quod præterquam quod elcharam inducit, ad
quemvis sanguinis fluxum cohibendum est efficacissimū.

Si mitius remedium habere desideres, vitriolum alijs
permiscendum est, in hunc modum.

1. Galliarum 1b. & aluminis quartarium 3. Combustantur
& calcinentur, hæque puluis in nares profundum demit-
tendus. Vel

2. Boli armæni, sang. dracon. thuris, aloes, gypsi, vitrioli
vlti faccolici, masticis, ana 3. ff. Fiat pulvis subtilissimus.

Vitriolum album mitius operatur, quia vitriolum vltimū
neque valde elcharotica est: hæmorrhagiam tamen po-
tenter cohibet, orificia venarum contrahendo, si in nares
cum turunda ex gossipio confecta immittatur.

Remedia vero, quæ sanguinis motum cohibendo, refri-
gerando, incrascendo, & veluti coaglando, hæmorrhagiā
cohibent, in hunc modum præscribi possunt.

1. Salis prunellæ 3. trochiscorum de carabe 3. ff. lapidis
hæmatis, coralli rubri præparati, ana 3. ff. Syrupi de rosis
decis 3. ff. aque plantag. 3. ff. Fiat nlep, qui detur bis, aut ter
in die.

2. Conferat rosarum & minur cydoniorum ana 3. ff. tro-

chiscor. de spodio & de terra sigillata ana 3. ff. coralli præpa-
rati & cornu cerui vltima ana 3. ff. Fiat opasta de qua capiat æq
magnitudinem calthane bis, aut ter in die.

Oxyratum satis copiose sumptum hæmorrhagiam effi-
caciter sedat.

Exterius verò, ad sanguinem refrigerandum, illiusque
motum cohibendum, aqua frigida, vel oxyratum varijs
partibus applicanda sunt: sicut aqua frigida brachia af-
fundenda, pedes in aquam frigidam immergendi, testes
oxyrato frigido fouendi, tum etiam dorsum, propterea
quod vena cava eam regionem occupat, & ita sanguis in
ea seruens refrigeratur.

In maximo autem seruire sanguinis, qui predictis co-
hiberi nequit, quidam practici totum corpus oxyrato ir-
rigant, vel in balneo frigidum demittunt, quod tamen,
iam debili agro existente, periculo non vacat.

Optimum etiam est hepar & lienem epithimæ refri-
gerante, vel etiam oxyrato tepido fouere, ad sanguinis
ebullientis seruire temperandum.

Denique in contumacissimo affectu, & alijs remedijs nō
cedente, ad narcotica veniendum est, quæ omnem tum fluxi-
onem, tum euacuationem, & quemcumque humoris
motum citissime cohibent, & inter cætera laudanum ad
gr. iij. exhibitur, principem locum obtinet.

Cauendum tamen est, ne agro valde debili exhibeatur,
periculum enim est, ne calor naturæ admodum debilis,
narcotica vi omnino suffocetur.

Syrupus de papauere idem præstare poterit ad 3. ff. in ite-
lepo adstringente, bora fomi.

Tandem specifica remedia, quæ scilicet proprietate oc-
cultâ linguam fluentem cohibet, multa ab autoribus
proponuntur, quorum præcipua & frequente vtu compro-
bata sunt, quæ sequuntur.

Succus viticæ miris laudibus effertur ad quemlibet san-
guinis fluxum ex quacumque parte procedentem, maximā
efficacia cohibendum, & ideo tum per os exhibetur: tū fron-
ti, & temporibus admoventur, in formam cataplasmati cū
farina subactis, vel tota vitica confusa dictis partibus ad-
mouetur. Nonnulli afferunt radicem viticæ in ore detenta
linguam fluxum statim costringere.

Fimus porcinus inter præstantissima specifica etiam re-
censetur, si adhuc calens fronti & temporibus admouea-
tur, vel ossificatione præbeat: vel siccus in nares immitta-
tur. Posterioris formula talis esse poterit.

1. Stercoris porcini exsiccati 3. iij. pulueris rosar. ad
forem ascendum 3. ff. Excipiantur succo plantag. in eo-
que interfundat bombax in nares immittendus.

Laudatur etiam ab authoribus sterqus asinum eodem
modo usurpatum, vt de porcino diximus. Et narrat Rodri-
cos a Castro lib. 1. de morbis mulierum cap. 5. Medicum
quendam septuagenarium, hæmorrhagiæ maximæ obno-
xium, sterqus asinum modicè exsiccatū in capsula sem-
per gestare solitum, qui medicamento nullum aliud simile
le reperire reſerebat, præsternit, si lucco viticæ commixtus,
si siccatum, aut recens per se naribus adhiberetur.

Zacutus Lusitanus lib. vlt. præcis. Hystoriarum cap. 2. stu-
pendam narium hæmorrhagiam, in septuagenario exacer-
piti & debili hoc remedio curasse refert, cui reliqua reme-
dia frustra administrata fuerant, & septuaginta linguam
libre effluxerat. Stercus itaque asinum in exactissimum
latuorem redactum omni iuri positique permiscerat: eod-
em tabellam cum saccharo efformabat, agro edenda
præbebat cum aqua chalybeata, quo auxilio solo, septem
dierum spatio, æger a fluxu saluus euasit.

Sanguis per nares effluens non solum apud vulgus com-
mendatur, sed etiam a quibusdam Medicis præstantissime
probatum, tantum superficiei vi hæmorrhagiam cohibens
eique frigit in sartagine, ægroque infuso edendum exhi-
bent. Tū etiā oīla singula exulsum, & in puluerem redacta,
cataplasmati adstringentibus supra propolis adhibent.

Alij laudant puluerem ranarum etiam combustarum, in nares
immittum.

Reſert Petrus vetulam quandam Montepessulanam, solā

quæ-

mentha naribus imposita, sanguis profluens est naribus trium dierum curatilis.

Inter cætera autem remedia præstantissimum est, & a nobis frequenter viis expertum, ipicanai di in tenuissimum puluerem redactæ, & ad 3. cum iusculo, aqua plantaginis, aut alio liquore exhibitæ: non solum enim ipicanai valedet etiam hepatis roborando, sanguinis fluxum cohibet.

Finkus testatur bulonem exsiccatum, & puluerisatum, in fisione rubra, axillis suppositum, vel manibus retentum, ut incalecat, sanguinem istum hîgere, & emoque, velut Gorgonis confectio caput istum rigescere. Alii bulonem sub duo suspendunt, donec raro vniuersa ablumpta sit, os femoris denudatum sruant, idque nari inditum, hæmorrhagiam in instanti cohibere alicuius.

Dum remedia prædicta in vnum truantur, de omni moda causæ oblatione cogitandum est, quæ vtiplurimū esse solet, humor tenax, serofus, aut biliosus in sanguine redundans, eique motum præpotiterum concilians, naturamque ad illius excretionem irritans: vnde fit ut humore illo euacuato, & sanguine repurgato, natura cum taquam amicus finium, & familiarissimum ac vitæ thesaurum retineat, neq̃ amplius excernat. Ideo purgatio institueda est bis tertie, iterata si opus fuerit, ex purgantibus adstrictione prædicta, & refrigerantibus composita, in hunc, aut similem modum.

¶ Tamatindor, ʒ. ʒ. fol. plantag. M. Coquantur ad ʒ. iij. In colat. infunde rhabarbari electi ʒ. myrtobalan. citrin. ʒ. ʒ. spice nardi gr. vi. In expressi diss. syrapi rosacei ʒ. rhabar. pulu ʒ. i. Fiat pocio.

In affectu inueterato & frequenter recurrente, talis purgatio semel in septimana repetita erit efficacissima: & interim iulepi adstringentes post singulas purgationes, vel opiatæ per aliquot dies exhiberi poterunt. Opiatæ super descripta huic viui insuerit. Iulepi verò in hunc modum, concinnari poterunt.

¶ Radicum bistoria & consolidæ maioris, ana ʒ. j. fol. plantag. centinodæ herniariæ, lumarie, ana M. j. sem. 4. frig. maior. ana ʒ. j. Coquantur ad ʒ. j. In colat. diss. sacchari albi ʒ. ii. Fiat iulep. pro ʒ. i. dosibus matutinis.

Loco iuleporum vel opiatæ, aut post eorum vsum per aliquot dies continuatum, syrapi vitiupari poterit ex succo vitæ cum saccharo paribus æqualibus, c. impositus, & ad coheerentia duo singulis diebus manet, exhibitus.

Neque sufficit causam hæmorrhagiæ præsentem auferre, si licet peccantem humorem euacuare: sed etiam noua illius generatio impedienda est, viscerâ roboranda, eorumque intemperies corrigenda, præcipue hepatis, in quo humores illi generi conuescerunt. Atque ita iulepi teingeræ

tes supra præscripti, huic viui insueriunt, etiam tinctura roliarum, ad hepatis refrigerandum, & maxime roborandum efficacissima est. Externis vero epithemata eidem parti admoueri possunt, in hunc modum composita.

¶ Aquæ rosar. plantag. portulacæ, acetosæ, cichan. ʒ. iij. sem. portulacæ, acetosæ, cichor. ana ʒ. i. trochiscor. c. caputæ & lantulæ citrinæ ana ʒ. i. acetu ʒ. i. Fiat epithema.

His etiam addi poterunt omnia remedia, quæ pro calida hepatis intemperie curanda descripta sunt.

Interdum etiam calida lenis, aut remum intemperies, huic affectui præbet originem, & tunc refrigerantia medicamenta, his etiam partibus admouenda sunt.

His omnibus accedere debet idonea victus ratio, quæ ab ipso curationis principio sedulò instituenda; atque ita primum aer in quo decumbit æger, frigidus sit, & si tempus sit æstiuum, alteretur, irritando prauum ventum aceto, & aqua totum stremendo folia vitæ, lalici, nymphæ, & similia. Cibi sint incrassantes & pauci nutrimenti, ut pedes vituli, arctis, hedi, & aliorum animalium oryza, calceus recens, & pinguis, oua indurata, & similia. Fructus acerbiores, astringentes, aut aciduli ex vlu esse poterunt, ut pyra, cydonia, metipula, sorba, & condimenta ex succis granatorum, limonum, arantorum, acetosæ. Quidam laudant vnum lentum in aceto decoctum, quia astringendi, & incrassandi sanguinis, eiusque acrimoniam retundendi vim obtinent. Ablinac æger, saltem in principio morbi, dum vires adhuc non sunt debiles, a vino carnis, & cuis forbilibus & tremulis, quæ copiosiores & liquidiores sanguinem generant. Alimenta autem liquida præsentē sanguinis fluxum, & forbilis, quantum hîci potest, exhibenda sunt, ut iuscula refrigerantia, hordecia, auenata, & oryzata, cum aqua, non iusculo parata. Masticatio enim hæmorrhagiam promouet. Si vires sint debiles, iuscula carnis, & panatellas exhibere oportet, in quibus amyllum sine calore paratum, aut gummi arabicum dissoluatur.

Potus sit aqua chalybeata, & omnes cibi in ea decoquantur, & radices viticæ prius in ea decoctæ fuerint.

Quies totius corporis imperetur, ita ut æger ambulet, nec tussiat, nec vociferetur, nec loquatur, motus enim linguae, & maxillarum sanguinis fluxum commouet.

Teneat caput detectum, & oculos clausos, ne sanguinem fluxum vident, quoniam illius conspectus, mota imaginatione, sanguinem commouet.

Vigilæ immodicæ maxime vitentur, quia sanguinem, acriorem, biliosorem, ac fluidiorem efficiunt. Somnus contra humores contemperat, eorumque motum cohibet.

Denique animi pathemata vitentur, quæ sanguinem fluxum impellant, ut ira, timor, & gaudium.

P R A X E O S M E D I C A E

LIBER QVINTVS.

DE AFFECTIBVS LINGVÆ.

P R A E F A T I O.

C A P V T P R I M V M.

De lingvæ inflammatione aliisque eiusdem tumoribus.



LINGVÆ tum gustus, tum loquela instrumentum est. Vtraque actio laeditur per tumores varios, quos lingua adnasci consuevit. Speciatim vero vnaquæque actio à peculiaribus causis immutatur, & deprauatur. Quæ omnia ut singillatim describantur, quin tu hic ubi in quatuor capitâ distinquendus est, quorum primum erit de inflammatione aliisque lingvæ tumoribus. Secundum erit de ramula sub lingvæ quæ licet ad tumoris genus pertineat, seorsim tamen tractanda est, quod diuissimam à reliquis tumoribus curationem desideret. Tertium erit de gustu lesa. Quartum denique de paralyssi lingvæ, aliisque motus illius lesionibus.

Quemadmodum omnes corporis partes, præcipue carnosæ, inflammatione affici consueverunt, sic etiam lingua eadem aliquando tentatur, ex sanguinis in eam affluxui qui prout vel purus ac syncerus, biliosus, pituitosus, ac melancholicus est, phlegmonem veram, aut eandem erysipelatam, oedematolam, aut carbunculam producit; quæ interdum etiam ad suppurationem definit. Causæ rei exemplum habetur apud Forestum obs. 24. l. 14. cuiusdam circuliarii, qui ingentem lingvæ inflammationem patiebatur, quæ in suppuratum abiit.

Patitur etiam lingua, idque multo frequentius, tumorem

Kk 2 mol.

mollem & laxam, ac purè œdematofum, ex pituita à cerebro in eam affluu. Cuius exemplum proponit Gal. lib. 14. *meth. cap. 8.* in quodam homine, cui lingua ita uarietata erat, vt ore contineri non posset.

Interdum etiam lingua in magnitudinem excedentem, accrescit, quæ tamen neque sub œdematis, aut scitica, aut alterius cuiusvis tumoris genere collocari potest, vt docet Gal. lib. 14. *diff. meth. cap. 9.* de cuiusdam linguae vidisse, quæ in ingentem molem excrescerat abique vili doloris sensu: neque enim prementi manui cederat, neque dolore infestabatur, sed nudum lingue incrementum erat, ipfius substantia nullo modo vitata: quod ex nimia copia vtilis alimenti eius in substantiam conuersi acciderat. Eiusque rei exemplum proponit Claudinus *consul. 9.* puellæ 12. annos natæ, cuius lingua in tumorem excrescerat, qui neque ad œdemam, neque ad scitum referri poterat, quoniam indolens erat, nec prementi manui cederat, vt loua remaneret, nec sensu naturali carebat: cuius prima origo fuerat ex violenta frenelli lingue disruptione, cuius dolore sanguis ad partem in attractus fuit, & continua postmodum eiusdem inflammationis tale incrementum productum. In hoc ætatis tali peculiarietate notat Claudinus, tumorem illum in vespica uocari, quæ, mane uero augeri, & semper lucere. Quorum cum, nunc rationem reddat, quoniam in coctione & assimilatione sanguinis illius, aliquoq; pituitosi (quasi in pueris obstatum humiditatis & ingluem reuerberat) multo statim, postillam autem per noctem, retracto & coacto calore concitantur, qui lingue tumorem augent. Per diem uero ob motum lingue, & ambientis calorem dissipantur, unde tumor parui decreuit. Laudatam tamen reteri ad ærem ambientem, in quo lingua continuatur, uersatur: ab illius enim frigida tæte sanguis ad superficiem lingue affluens, antequam assimiletur, concretit aliquo modo, & de humiditate contrahit: a frigore enim sanguinem visciditate scribit Gal. 3. *de sympt. causis cap. 1.* quod tamen in alijs corporis partibus non contingit, quoniam ad illas ea sanguinis tantum portio, quæ pro nutritione sufficit, sed non superflua, amandatur.

Horum tumorum diagnosi difficilis non est, quandoquidem magnitudo aucta præter naturam, visu fubiciunt. Tumorum autem differentie ita distinguuntur. Si fuerit inflammatio, adol color & caliditas in lingua, tum etiam rubedo, quæ etiam facies aliquantulum inficitur. Si uero à pituita tumor duxerit originem, lingua alba est, multumque pituitæ effluit, cuius sapor dulcis, ut insipidus est. Si nudum sit lingue incrementum, aliorum tumorum, ac vitiolorum humorum signa non adfunt.

Quod ad prognosim attinet, tumores lingue vix plurimum vite periculum non afferunt, nisi in tantam molem excresuerint, vt inde suffocatio metuenda sit, aut ex humore quodam maligno atque atrabiliario ortum duxerint, unde canerosus tumor generari potest; quod duritie, lauditate ac dolore pungitius intermouetur.

Curatio inflammationis lingue reuellentibus ac repellentibus remedijs inchoanda est: atque ita primis præmissis clystere laxante, venæ secti celebranda est, & sanguis satis magna quantitate detrahendus pro virum modulo.

Mox cucurbitula cū scarificatione scapulis admoenda.

Postmodum gargarismata refrigerantia ac repellentia, viurpanda; & inter cætera commendatur à Galen. 14. *meth. cap. 8.* succus lactucæ, quo lingua frequenter abluenda est. Vel magis compositum gargarisma parari poterit ex decocto plantaginis, solani, lentis decorticatis, & cortic. gta. natorum, addendo syrump de rosis ficis, vel diamorum.

Poli venæ sectionem, purgatio etiam influenda est medicamentis ex cholagogis, & plegmagogis compositis, quandoquidem pituita & capite deliens, ad horum tumorum productionem particulariter saltem concurrat.

Sedata fluxione euacuantibus, reuellentibus, ac repellentibus remedijs humoris parti impæcti deriuatio munda est, & in hunc finem venæ sub lingua aperienda, quod si fieri non possit, propter lingue magnitudinem, cucurbitula sub mento cum scarificatione erit admoenda. Si tumor ad luppurationem destinat, promouenda erit sicut per medium secta, frequenter admoa, vel gargarismate ex

decocto hordei maluæ, violarum ficum passularum, fenniminum & ydionorum, & fennigræci composito, addendo syrump violaceum, & niubinum.

Facta luppuratione, si abscessus sponte non aperiat, scalpello aperendus est. Mox vulcus detergendum decocto hordei, agrimonij, plantag. cum melle rosaceo.

Tumor uero mollis & laxus à pituitæ influxu oritur, curatur primum reuulsione facta per phlebotomiam, si æger sanguine abundet: deinde purgans medicamentum satis vehemens est exhibendum, quales sunt pilule cochlear minores ex aloë, cammonio, & colocynthide paratæ, quæ à Gal. scilicet viurpate sunt in quodam sexagenario 14. *meth. supra citato*. Quod si æger pilulas deglutire nequeat, medicamentum componi poterit ex fennaagarico, diaphanico, & similibus.

Poli huiusmodi euacuationes, refrigerantia & repellentia in principio admoenda sunt, quemadmodum in inflammatione dictum est. Et Galenus *loc. citato*, dictum sexagenarium oris collusione ex ipso lactucæ succo post purgationem viurpata sanant.

Potest etiam vtiliter lingue collutio fieri ex succo limonium grauatotum acetosæ, & plantaginis: quandoquidem prædicti succi non solum frigida tæte sua repellunt, sed etiam acetosæ humiditatem lingue impactam euacuant.

Vtilior etiam lingua illinatur oxymelitis simplicis, cui in augmento addi poterit parum zinziberis, salis gummei, aut ammoniaci.

Collut etiam os poterit decocto origani, pyrethri, cum hydromiele.

Zacutus Lusitanus lib. 1. *hysteria Medicorum principum*, lib. 17. in casu valde præcepti, vbi lingue tumor in molem ingentem excrescerat, vt inde suffocatio metuenda videretur, vacuantibus ac reuellentibus remedijs frustra tentatis, hirudines quatuor lingue affixit, & breui tempore copiosa sanguinis vacuatio sequuta, ipsa exilis tenuisque facta, est, & sic æger a periculo euasit.

Idem Zacutus lib. 48. *idem libri*, decem annorum puerum ex catarrho fluxione lingue tumore ingenti laborantem, vt ipse præ contineri non posset, poli reuulsiones per venæ sectionem, cucurbitulas scarificatas, & acres clysteres: cum lingue tumor mollis, laxusque effect, profundius lingue scarificationibus vius est, moxque aqua saluta linguæ abluuissit, vnde tanta æquos humoris vacuatio facta est, vt illi colescit æger recuperaretur. Quam obseruationem à Ioaquimo Camerario desumptam, qui libro obseruationum suarum narrat, quendam tumente lingua suffocatum, ipsam sibi acuto cultello decussauit, incidisse, multoque sanguine effluente iussit perfontam.

Denique tumor lingue carnosus, seu lingue incrementum nimium, ex superflua ipsius carne progenitus, licet curationem suscipere non possit videretur, illa tamen à Claudino proponitur, *loc. cit.* per operationem chirurgicam: vt scilicet quidquid lingue superfluum est, cultello abscindatur, adhibitis prius præparationibus necessarijs, quæ omnia dicto loco iussu ab eo describuntur.

C A P V T I I.

De Ramula sub lingua.

Quamuis superiori capite varij lingue tumores à nobis expostiti sint, vnus tamen adhuc explicandus superest, qui *Adenopha* Græci. Ramula Latinis nominatur. Cum enim ille natum à prædictis maximè diuersim obtineat, ac diuersum planè curandi modum requirat, satis esse diximus peculiari capite illius descriptione exponere.

Est autem Ramula tumor, qui sub lingua colligitur, in ea parte, qua illa vinculo alligatur: & tantus vix plurimum apparet tumor, vt dente interiores lupret; ita autem media, dextramque tumoris partem à sinistra dirimente, rante posteroarem partem refert, vnde affectus nomen. Alij uero Batrachum idem dictum existimant, quod eo affecti loquelæ impedimentum patiantur, & nonnisi coaxando loqui possint, tanarum inilar. Ad œdematis, aut meliceris nature naturam accedit, quo a pectus materia profluit, cui cædido.

aido, aut melli perſimilis. Et cum dicta materia in folliculo continetur, ideo inter Melicerides à nonnullis reponitur. In ijs folliculis interdum calculus inuentus eſt, vt plurimum auctorum obſervationibus couolat, quas collegit Schenckius *cap. 388. lib. 10.*

Diagnos huius affectus difficilis non eſt, dum enim ſubleuatur lingua, quædam veluti carnoſitas laxa & mollis ſub ea continetur, & ab vtroque parte ligamenti quædam prominentia ſphærica, cicercis, vel ſabe, vel interdum callaneæ magnitudinem æquans conſpicitur.

Periculo vacat vtrumque huius affectus. In pueris tamen aliquando ſuffocationis periculum intentat, propter aſperæ arteriæ & laryngis viciniam. In adultis etiam ſi dolor, & lebris addit, vitæ periculum affert, quandoquidem in anginam degenerare poteſt. Periculosa etiam eſt Rannia, quæ nigra, aut fulca, & dura eſt, ad canceri naturam accedens, & illa non eſt ætiogenda.

Ad curationem huius affectus, primum cauſa antecedens auferenda eſt venæ ſectiōe, & purgatione ægrotantis naturæ, & ætati accommodata. Et ſi affectus fit inueteratus, ad cauteria & decocta fuſcoria veniendum eſt.

Poſtmodum topicis medicamentis reſoluto tumotis tentanda eſt hunc modum.

¶ Cortic. granat. h. flopiſci, ſalis commun. ana. ſ. ſi. Fiat pulvis ſub lingua detinendus, & frequenter ritrandus. Reſert Foetius puellam 12. annorum, intra biduum fuſſe curatam hoc ſolo remedio, cuius auſor eſt Nicolaus Florentinus, qui in adultis loco ſalis communis vitæ ſale ammoniaci quod magis penetrat & potentius diſſoluit. Foetius vero iſtudioſo quodam prædium puluerem cum ſale comuni paratum vſurpauit; tum etiam decoctum, & baſilicis, alumine gallis, æquis partibus, paratum; ac denique partem ſale toſto & gemma lricari iuſſit, & æger curatus eſt ſine operatione chirurgica, quod rariſſime ſolet contingere; qua tumores iſti ad naturam abſceſſum accedunt, & in quodam veluti folliculo continentur, ita vt diſſoluta quadantenus materia contenta, iterum repleatur.

Si diſcutientibus remediis tumor curari nequeat, ad illius apertionem veniendum eſt, quod vtrumque ſacientium, rariſſime enim per reſolutionem curatur.

Apertio autem exiguo foramine facienda non eſt, quia materia in folliculo contenta, iterum colligitur, & folliculus impletur; cui rariſſime conducitur ſumma partis laxitas, & mollities recipiendis excrementis maxime idonea. Sed per ſuum tumorem, longiſſima ſectio fieri debet vtque eminentia, vt tota materia ſimul effluat. Poſtea vitæ abluendum eſt, primum lenientibus, vt decocto maluæ; poſtea vt detergentibus, vt vino albo cum melle roſaceo, aut diamoronicæ demum oxy-melitis, donec purum, appareat viciuſ, & folliculo liberum. Ac denique ad cicatricem inducendam, vino nigro, in quo alumen diſſolutum fit, oſ frequenter colluendum.

Foreſtus ſimilem abſceſſum curauit in quadam muliere ruſtica, ſectiōe vtrumque facta, & poſtmodum ore frequenter collato poſca, cui exiguum ſalis admixtum fuerat.

Si affectus fit inueteratus, & viciuſ prædictis remedia exſiccari nequeat, tangatur oleo ſulphuris bi in die, temperato tamen cum aqua roſacea, ita vt ad vnam guttam olei quinque vel ſex guttæ aque roſacæ miſceantur; ita enim intemperies corrigetur, & exſiccabit pars quæ ad roborationem vino nigro admixto alumine ſæpe abluenda eſt. Si poſt hæc remedia debite vſurpata morbus rodet, ad cauterium aduale veniendum eſt, cuius adminiſtrationem docet Patreus *lib. 7. cap. 5.*

CAP V T III.

De Guſtula ſeſo.

Guſtus quemadmodum reliqui ſenſus, omneſque corporis actiōes, tripliciter læduntur, imminuuntur, abolitæ, & deprauatæ. Imminuuntur cum lapores remiſſius ſeu percipiuntur, ſenſus verò remiſſi. Abolentur cum prædictos lapores tunc ſenſus ſint, ſive remiſſi, nullo modo ſentiat. Deprauatur denique, cum obiectum alieno lapore inſectum iudicet.

Imminutione & abolitionis guſtus cauſæ eædem ſunt, magnitudine tantum diſtincti, eſſe enim leuioribus ſint, alium imminutionis grauioribus, abolent. Et ille cauſa ſunt, vel defectus ſpiritus animalis in ipſa parte, vel lingua ipſa aliquo affectu præternaturali afflicta.

Spiritus deſiciunt, vel propter ipſorum penuriam, vt in moribundis, vel propter obſtructiones neruorum tertii paris, per quod deſcendunt; vel propter tumorem in ea cerebri parte genitum, à qua nerui oriuntur.

Lingua vel humida & pituitola materia obducitur, vel tumoribus, pulſulis, vt viceribus afficitur, & in propria illius actiōe guſtus imminuitur, vel aboleri poteſt.

Guſtus deprauatur, quando lingua vitioſo aliquo humore inſectitur, vt in febribus ſæpe contingit, cum bile inſecta lingua, omnia quæ guſtantur, amara eſſe iudicat. Alias pituita ſalfa, vel humore melancholico inbuita, omnia ſalfa, vel acida eſe videtur, obiecta enim extra linguam admodum vitioſum ipſius ſuccum commouent, qui tunc temporis linguam magis leniens, ſaporem ſuum in eam fortius imprimunt; & ira, quæ guſtantur, tali lapore inſecta videtur. Contingit tamen non raro, linguam ſaccorum in ſe contentorum ſapores percipere, etiamſi nullum obiectum externum ipſi admoueat, vt docet Gal. *de ſymp. cauſis cap. 4.* Et quotidiana confirmatur experientia in febricitantibus, quorum lingua bile perfunditur; quæ ſi valde amara, fit continuam amorem in lingua perſentiunt, licet nihil extrinſecum deguſtetur.

Caularum prædictarum diuerſitas ex ſaporum varietate, & linguae ipſius diſpoſitione cognoscitur; dulcis enim ſapor, & linguae rubendo languinem ſignificat; amaror, & color flauus, bilis; albedo cum dulcedine, pituita; color ſulfus & aciditas, melancholiam. Sapor abominabilis, prauos humores in ventriculo contineri oſtendit. Pulſulae, tumores, & vlcera oculis patet. Ac denique, ſi nulla in lingua permutatio apparat, & guſtus immutatur, aut aboleatur, hoc cerebro, vel neruis cauſam latere cenſendum eſt.

Curatio admodum varias eſt, pro varietate cauſarum. Et ideo, ſi in cerebro, vel neruis affectus lateat, illi remedia aptanda ſunt, prædicta enim, quæ ad paralyſin curatione præſcribi ſolent. Cum verò à prauis humoribus guſtus deprauatur, illud ſymptoma vt plurimum ab alijs morbis dependet, præcipue vero febribus, quibus curatis illa etiam ſymptomata tolluntur.

Si à tumoribus lædatur guſtus, illius curatio ex diſtincto tumotis curatione dependet, quæ ſupra propoſita eſt.

Si denique à pulſulis, aut viceribus linguae, affectus oritur, curatio horum affectuum inſtituenda eſt per venæ ſectiōnem, & purgationem humorum acrimiam quibus accedent topica refrigerantia, aliſi ingentia, & exſiccantia; ad gargariſmatis formam redacta, & ſi vlcera ſordida ſint, abſtergantur melle roſaceo, addito oleo ſulphuris, aut vitrioli ea quantitate, quæ linguam moderate ſeruet, etiam ad potius exſiccandum oleis prædictis puris, & impermixtis pars affecta, ſemel atque iterum tangenda eſt. Sic enim aphthæ omniaque oris & linguae vlcera citiſſime ſanantur.

CAP V T IV.

De paralyſi linguae, cuiusque moru laſo.

Actio linguae præcipua loquela eſt, & quæ aboleretur, imminuitur, & deprauatur à varijs cauſis, quæ ad morbos ſimilares organicos, vel communes referuntur. Quod ad ſimilares attinet, humida intemperies cum materia conuulſa, linguam molliorem & laxiorem efficit, vt motus ſuos liberè exercere nequeat. Siccitas etiam nimia loquela vitiat, vt in febribus contingit. Morbi verò organici ſunt, magnitudo aucta, vt de tumoribus antea dictum eſt, qui liberum linguae motum impediunt, figura vitata, vt ſi lingua breuior eſt naturali conformatione, aut præſione apicis illius, aut ſi ſtræno, ſeu vinculo vxo ardens alligetur, & obſtructione neruorum ſeptimi paris, quæ ad muſculos linguæ mouentes deſcendunt. Morbi denique communes ſunt ſolutiones continuæ ſeu vulnera eadem partis.

Kk 3 Nimia

Nimja lingue humiditas balbutiem efficit, qua affecti jiterant R. pronunciarit nequeunt; eaque vel nativa est, vt in pueris, qui ob nimiam humiditatem hoc affectu laborant, ab æque libera iure etatis progreſſu, quo ſuperflua ſua humida abſorbuntur. In quibuldam vero intemperic humiditas a vi-a petierat, & illi perpetuo balbi remanent, de quibus agit Hipp. Aph. 3. 1. ſect. 1. his verbis *Balbi ætate ſua ſine auxilio maxime capiuntur*. Gal. in commentis. In natura balbi tunc, aut cerebrum habere humiditatem, tunc aut vtique, & a cerebro humido multas profluere ſecernit, quas in ventrem delabi par est; unde alia profluunt. Lingua vero admodum humida natura exiſtente, & ventriculum talem eſſe par est, (vt qui alteram tunicam communem habent cum lingua,) imbecillemque ex humiditate. Ventriculi autem humidi propria pulſio eſt diuturnum profluunt.

Aitamen Auicenna propoſitæ doctri-næ adſeruari videtur, dicens *Feu. 1. lib. 3. tract. 4. c. 18* balbos eſſe maxime diſpoſitos ad melancholiam, cum tamen melancholia à ſiciori cerebri intemperie procedat. Conclitatur tamen illa contrarietas, dicendo, per balbos, ſeu traſulos Auicennam intelligere; non balbos proprie dictos, qui literari R. pronunciarit nequeunt; ſed eos qui lingue huiusmodi laborant, quique eandem ſyllabam n-ut-oties repetunt, antequam diſtinctionem proferant hæc enim lingue hæſitatio, ex calido & ſiccio cerebri temperamento oritur, in quo adeo promptæ ſunt cogitationes, vt linguam præcurrant, cuiusque motum præcipiunt, unde conturbatio ipſius atque hæſitatio e-ſt oritur. Prædicta autem balbuties à nativitate contraria incurabilis eſt.

In quolibet vero balbuties accidentaria contingit à caritate, & copioſo humoris pituitofi deluxu in fauces, & linguam, quæ euacuatione, reſuſſione, & deriuatione humoris inſolentis tunc etiam capitis roboratione & exſiccatione curatur. Cum autem remedi. propoſitis indicatio-nes conueniant adimplentia, paralyſi lingue iam deſcribende conueniant, ex illius curatione erunt repetenda.

Ad linguam deſeruntur duo neruorum pars, tertium, videlicet ad guſtandi & ſentiendi actionem exercendam; & ſepimur ad loqueliam, & linguam variis modis mouendam. Ex horum igitur neruorum, qui à ſepimo pari oriuntur, obſtructione, & relaxatione paralyſis lingue procedat, quæ eſt priuatio, aut immutatio motus illius partis. Eaque ſi cedere conſequit frequenter apoplexie, cerebro ipſo ſecundum poſteriorem partem humore pituitolo imbibito; & tunc aliæ quoque partes, & præterquam dimidia corporis pars, paralyſi tentantur. Interdum tamen ſolitaria eſt, neruis tantum, aut muſculis linguam mouentibus, humore pituitolo imbibitis, & repletis. Ex præſcriptione etiam totum neruorum lingue paralyſis generari poteſt, cuius rei exemplum habetur apud Auc. *Feu. 6. lib. 3. tract. 1. cap. 12*. his verbis *Quidam homo iam venieſatus fuſt, & perſonatus eſt cum ſcalpello villis neruis in ſubſtantiâ panniculi conueniſſis cum lingua, quæ molliſſima eſt lingua*. Hæc autem, cucurbitulas, in ceruice, & iuxta occiput admotas fuiſſe conſiderandum eſt; cum enim nerui linguam mouentes à principio ſpinalis medullæ oriuntur, quæ eſt in occiputo, ex profundiori ſcarificatione cuiuspiam illius rami præciſionem contigiffe certiffimum eſt.

Quamuis autem materia huic affectum producat pituitola ſit: interdum tamen craſſior & frigidiore, interdum tenuior, & calidiore eſt conſequit: pro ratione humorum in corpore prædominantium, quorum diagnoſis proponitur ab Auicenna. *Feu. 6. lib. 3. tract. 1. cap. 6*. his verbis: *Et quandoque ſignificat quod materia ſit ſanguinea, rubedo lin-*

*gue, & caliditas eius. Et quandoque ſignificat quod materia ſit bilioſa, & aquoſa, multitudine carſus ſalutis aqueæ, & pan-
tatis inuicem ex reſolutione; & inuicem ab eo, in quo eſt ſpecificata.*

Affectus ille, ſi à cerebri vitio dependeat, & apoplexie ſit conſectarius, ita vt aliæ quoque partes afficiantur, raro curationem recipit. præſertim ſi æger ætate proceſſione fuerit: ſi vero ſimples, & ſolarius fuerit, curationem recipit, idque multo facilius, ſi æger in ætate floreſcente conſtitutus fuerit.

Curatio Paralyſis lingue perficitur ſublatione cauſæ antecedentis, humoris ſcilicet in cerebro redundantis; & diſſecatione ac reſolutione cauſæ conſequentis, humoris ſcilicet neruis linguam mouentibus impacti & imbibiti.

Cauſa antecedens elaminabitur iſis remediis, quæ in frigide cerebri intemperie curatione propoſita ſunt.

Ac primum purgatio inſtituetur portione, aut pilulis diſto loco propoſitis. Mox ſi languis redundare, & affectus cauſa principalis, vel adiuuans eſſe videatur, detrahendus eſt ea quantitate, quæ viribus & ætate conueniat. Poſtmodum apozema cephalicum exhibendum. Et ſi affectus contumax eſſe videatur, ad diſtans luſidificam tranſeundum eſt; quorum omnium formulæ dicto loco propoſitæ ſunt.

Post muſcularis euacuatione, ad materiem morbiſic deriuationem deueniendum eſt, per cucurbitulas & veſicatoria poſteriori parti admoſa; tum etiam cautium occipiti inſtituit. Auicenna cucurbitulam ſub mento affigit, quod etiam à recentioribus probatur.

Vena etiam ſubi lingue vultus aperitur, præmiſſis euacuationibus vniuerſalibus ad deriuationem humoris muſcularis lingue imbibiti.

Ad diſcutiendum vero, & extrahendum eundem humorem, gargarifia ſequens frequenter viſurpabitur.

R. Rad. iros Flor. 3. ſ. fol. origani, ſalutis, ſtochad. roſmar. ana M. ſ. cubbarum 3. iii. liquiritiæ 3. i. Coquantur in æquis partibus aque & vini albi ſub fine additi ad 12. In colatura diſſolue oxy-melitis ſcilicet 3. ii. Fiat gargarifium, quod ſi non ſatis efficaciter operetur, addi poterit decocto radix pyrethri ad 3. ii. vel 12. vel etiam ſemen ſinapi pari quantitate. Ad diſtans poterit caſtoreum, niſi ægro nimium ingratum videatur.

Ad eundem viſum poteſt frequenter lingua confricari oxy-melitis ſcilicet ſolo, cui etiam ſemen ſinapi addi poterit.

Succus ſalutis ad linguam paralyſin multum commendatur, ſi eo lingue frequenter confricetur; cui etiam ſicut in præcedenti ſinapi addi poterit.

Pilule etiam ſequentes ſupra linguam frequenter deſtineri poterunt in eundem finem.

R. Sacci betonice & liquiritiæ, ana 3. i. ſ. caſtorei, & aſſe hætidæ, ana 3. 6. nucis moſchatæ, & ſpicæ nardi ana 3. i. Incorporentur cum mellæ, & ſiant ſormentis inſtar lupinorum.

Hic etiam conferre poterunt gargarifmata, maſticatoria & erithrinæ in frigide cerebri intemperie curatione propoſita.

Ad cerebrum vero roborandum, & humoris pituitofi in eo contenti reliquias diſcutiendas, conuenient iuſſurus, pulvis capillis inſpergendus, & cucurbitula dicto loco propoſita.

Ac denique, ad nouum pituitæ prouentum, quem cerebri intemperies, etiam poſt vniuerſales & particularis euacuationes ſolet efflicere, vniuerſalia remedia præſcribenda; nempe iſyrupus magiſtralis aut palule vniuerſales, quibus opiata roborans adiungenda eſt eorumque remediis ſubſcripto à prædicta curatione deſummi poterit.



PRAXEOS MEDICÆ

LIBER SEXTVS.

De affectibus dentium, gingivarum, faucium, vultus, & laryngis.

PRAEFATIO.



PArtes in ore & faucibus continent varias affe-
ctus patiuntur, quorum principis tantum de-
scribere animus est, & reliquos minoris mo-
menti, quae a solo Chirurgo vix plurimum cu-
rari consueverunt, consilio praetermittere. Hic
igitur liber septem concluditur capitulis. Pri-
mum erit de aile dentium. Secundum de dentium ingreditur,
& erosione. Tertium gingivarum erosione, & excitatione.
Quartum de fluxu sanguinis ex gingivis. Quintum de eris-
sione viceribus. Sextum de vultus relaxatione. Septimum
de angina.

CAPVT PRIMVM.

De dolore Dentium.

Dentes non solum secundum nervos eorum radicibus
insertos, & membranam, dentis cauitatem intus
succingentem: sed etiam in propria substantia sentire do-
cuit Galenus de compositione medicamentorum secundum
loca, cap. 8. & 16. de usu partium cap. 3. ubi dicit, dentes &
ceteras oris particulas, una cum linguae sapores percipere.
Tum etiam lib. de ossibus, 4. 5. inquit, ex ossibus dentes tan-
tummodo mollium cerebri nervorum esse participes, ob
idque solos manifeste sentire. Dolor igitur non solum ner-
vus & membranae interiori, sed etiam ipsi dentium sub-
stantiae contingit.

Fit autem dolor dentium ab humorum influxu, qui vel
frigidi & pituitosi sunt, & terrosi, salii & acres, unde particu-
larum dictarum distensionem aut vellicationem contingit. Illi autem
humores, vel in maxillarium, & dentium alveolorum
membranas confluunt, vel in nervulorum radici den-
tis inferunt, vel in ipsam densis substantiam. Quan-
tus enim multi existunt, dentes humorum afflu-
xum ac distensionem in propria substantia recipere
non posse, cum sint corpora densissima & durissima; id
tamen docetur ab Auienna Fen. 1. lib. 3. de crura 3. cap. 5. &
Fen. 7. lib. 4. tract. 3. cap. 4. Et quandoque, inquit, est materia
apostemata dentem ipsum. Quam sententiam confirmat, ac
perspicue demonstrat Fen. 1. lib. 3. tract. 3. cap. 1. his verbis. Non
enim est quae admodum quidam existimant medicamentum, quod
cerebrum ipsum non apostemat, sic rariocinantes. Nam
quod bene est sicut cerebrum, & durum, sicut ossium extendi-
tur, & quod non extenditur, non apostemat. Hic autem sermo
est erroneus, & illud idem, quoniam bene viscosum extenditur, &
ossa etiam apostemat, & Galenus confisus est, & nos mon-
strabimus sermone in capitulo dentium. Imo dicimus quod om-
ne quod nutritur, extenditur, & augmentatur cum nutrimento:
& similiter est possibile, quod extendatur & augmentetur cum
superfluitate, & illud est apostema. Hoc vero docet Auienna
en. Galeni sententia, qui lib. 5. de compositione med. sec. 1. d. Cum,
inquit, impossibile fit dentes incrementum accipere citra
nutrimentum, immo duas affectionibus, & his contra-
riis obnoxii erunt inique videlicet, & redundantis alimentis,
quod eis suppeditatur. Immo igitur aridiores & magis
alimentum non sentientes, & ob id remiores eos reddet: redun-
dantia vero, & consimilem in eis affectionem excitare potest,
qualis est circa carnes partes in inflammatione. Hec Galenus.
Verisimile tamen est dolorem frequentius fieri (si modo il-
le valde intensus fuerit) in partibus illis ex quibus sensu do-
natis; necnulo nimirum & membrana alveolorum succin-

gente, dentiumque radices proxime ambiente. Quae ab hu-
moribus influentibus, non solum distensionem ac vellica-
tionem, sed etiam interdum inflammationem patiuntur: si
nempe sanguis cum aliis humoribus adnascatur: tunc
enim dolor a duplici causa exoritur, distensione videlicet,
& compressione, quae fit a dentis dardie, quam ferre non
potest sine dolore, membrana inflammata. Hanc autem
membranulae inflammationem comitatur vix plurimum
gingivae inflammatio, quae idcirco a Gal. & Aui. inter causas
doloris dentium recensetur.

Fluant autem humores in dentes & partes adiacentes vix
plurimum a capite: interdum tamen a partibus inferiori-
bus promanant. Cum enim vitiosi aliqui humores prae-
cipue ierosi in parte aliqua genitum venis cumulantur, natu-
ra illorum onus excutere tentans, ad partes debiliores eos
praecipitat. Et si dentes propter intemperiem, cariem, aut
erosionem tales existerint, ad eos praeterit fluxio decum-
bit. Huius rei experimentum proponit Carolus Piso (qui
etiam Iexilium dolore dentium a ierosi humore vix plu-
rimum fieri) lib. de morbis ab illius ierosi ob. 7. ut refert se
ipsum dolore dentium per multos dies afflictum, ab afflu-
entio medicamento purgante, post sequehoram, sinceram
aquam ad 10-j & amplius euomuisse, tanto successu, ut pos-
tea vel decem annos ab huiusmodi dolore immunis pro-
fusus fuerit. Quo edoctus experimento simili affligit laboran-
tibus, medicamenta ferulos humores educuntia praecipit
spici, & celsus. Praeter hunc affectum a tali causa vix plu-
rimum dependere, hoc signo probare nititur, quod assidua
salinatio doloris dentium comes fere perpetua esse solet.

Praeter causas enumeratas, vermes in dentibus cariosis
geniti, doloris dentium causa esse possunt: ique producunt
tur ex quilibet materia in illis cauitatibus retenta & putre-
facta, siue excrementaria sit, siue ex alimentis putredini ob-
noxii, caribus praeterit & dulcians, quae propter lento-
rem cauitatibus dentium adherescunt.

Nonnulli etiam existimant, dolorem dentium interdum
fieri a spiritu statulento intra dentis cauitatem & nervulorum
incluso, ac membranam anteriorem violenter diuellente;
unde dolor atrocissimus, ac penitus intolerabilis excitari so-
let.

Cause externae & procatarticae dolorem dentium pro-
ducentes, sunt illae omnes, quae humorum fluxiones promo-
uere solent, quarum praecipuae sunt, aer frigidus, vel aultrius,
mora in sole ardente, aut in acre nocturno, & rapula;
omnes denique errores in viciis ratione commissi. His ad-
de easque partem debilitate, & fluxioni recipiente magis
idoneam reddere valent, qualis est praeterit caries & per-
foratio dentis, per pertinaces non raro dentium dolores
efficere consuevit.

Caularum diuersitas varij signis dignoscitur. A calidis
enim humoribus dolor occidens intensior multo est, tem-
peramentum calidius, etas florens, tempus aestiuum, calidi-
tatis sensus in parte percipitur, & (expe) gingivarum in-
flammatio contingit. A frigidis remediis iuuantur, sedun-
tur autem a calidis. Si vero a frigido humore dolor oriatur,
signa praedicta contraria apparere solent.

Si veritas causa doloris extiterit, dolor erit interpolatus,
exiguus, interuallicus definitis ac tedeus; tum motus vermis
parte aliquando percipitur.

A spiritu statulento dolore, produci testatur illius atro-
citas, & diuulsio sensus, qui in parte percipitur, quique
exiguus tempore definit, ac dilucidius remedijs parti-
admotijs facile curatur.

Pro-

Prognosis varia est pro causarum varietate. Dolor enim qui ab humore calido, tenui, & lero acri & salso producitur vehementior quidem est, sed citius diffinit, ob humoris illius subtilitatem mutationis. Qui vero ab humore frigido & pituitoso excitatur mitior est, sed multo diuturnior.

Tumor in gingivis aut maxillis obortus, doloris dentium solutionem affert, transalva fluxione ad partes exteriores: ita ut, non amplius ad internam dentis cavitatem decumbat.

Curatio ad doloris causam auferendam, & ipsum dolorem mitigandum, dirigenda est. Licet enim anodyna parum proficiant, nisi fluxio auferatur: ita tamen non raro urget ut non solum anodynis proprie dictis, sed etiam interdum narcoticis ante causæ ablationem demulcendus sit. Humor igitur qui ad dentes consiluit, repellendus, evacuandus & repellendus est: qui vero iam influxit, detrahendus & diluendus.

Primo igitur, si dolor ab humoribus calidis oriatur, venæ sectio celebranda est: è brachio euulsum lateris qua fluit humor plurimum recutitur. Si vero dolor à frigida humoribus excitetur, minus venæ sectio convenit, ratione tamen fluxionis etiam viurpari poterit, cum inter recutientia remedia principem locum teneat. Sed minori copia tunc temporis sanguis detrahendus, nisi plethoræ signa appareant: consultatione, etiam si ea pituitosa sit, liberalis venæ sectio instituida, iuxta præceptum Galeni, qui largam sanguinis detractionem præcunctudini respondentem, omnium dolorum promptissimum esse remedium afferunt; quod non frequentillima experientia, utpote in aliis doloribus tum præcipue in dolore dentium, verissimum esse componimus.

Sequenti die purgans medicamentum exhibeatur, humor peccanti accommodatum in forma, vel portione, si humor peccans calidus extiterit, vel pulsaturni ligidus, & pituitosus humor doloris causa fuerit.

Potissimum perleucantem dolor, cucurbitula scapulis cum scarificatione applicetur; vel cucurbitula magna inter scapulas sine scarificatione affigatur. Vescicatorium posteriori parti ceruicis, vel pone aures admotum, humores fluentes potissimum retrahit ad posteriora.

Ad fluxionem etiam inhibendam, astringentia temporibus vitiliter applicentur; qualia sunt emplastrum ex gummi elemi, vel mastiche sola, supra pannum sericum liquata, cum pulvis arreo calefacto, emplastrum de mastiche officinarum, vel contra rupturam; vel tale in rem præsentem præscribitur.

Thuris, hypocistis, ladanii, ana 3*ss*. sic-pis, mastiche, ana 3*ss*. opii 3*ss*. olei lentici q*l*. Fiat massa emplastri.

Radix consolide majoris recens, contusa & admodum temporis in formam emplastri fluxionem efficaciter intercipit.

Fir etiam emplastrum ex pulvere aluminis & gallarum cum pice subactum, efficacissimum.

Ruertius Heurici magni Archiater emplastrum sequens pro secreto habebat.

Nucum cupressi, rosar. rubr. feminis nasturtii torrefactis, allicis, terre sigillatæ, ana 3*ss*. Macerentur in aceto rosaceo per horas 24. postea siccentur, & adde opij in aqua vitæ dissoluti 3*ss*. picis navalis colophonis ana 3*ss*. ceræ liq. in oleis expressis, seminum hyoscyami, & papaveris albi liqueat q*l*. Fiat emplastrum, quod applicetur artens, vel etiam loco dolenti.

In aures quoque immittuntur medicamenta ad dolores dentium, quia venule, per quas fertur alimentum ad dentes, per illas partes excurrunt. Ideo iniicitur oleum amygdalar. amar. in aurem vicinam denti dolenti, aut excipitur fumus acetum, in quo plucium aut origanum cocta sint.

Alii acetum in auram infundunt, quo fluxio coheretur efficacissimè, & in fluxione calida præcipue confert.

In frigida vero fluxione, succus alni cum thetiaca mixtus & in aurem repide instillatus, mirum in modum dolorem compellit. Idem præstat aliquibus detracto cortice in formam suppositorij illitus, & in aurem intrusus.

Astringentia etiam ipsi parti dolenti admoventur, in fluxionis principio, & que refrigerantia si materia calida sit frigida vero existente, calida cum repellentibus sunt per-

miscenda. In quolibet autem causa, si dolor vehemens fuerit, a nodyna repellentibus erunt adiuvanda. Materia vero heica visibus idonea talis esse poterit.

Rad. bistortæ, pentaphylli, tormentillæ, ana 3*ss*. fol. verbenæ, plantag. & rapidi barbatis, ana M*ss*. nucum cupr. gallarum & cal. cum glandinum ana 3*ss*. is. fantali rubri, & crystallorum ana 3*ss*. rosatum rubr. & balsalliorum ana P*ss*. Fiat decoctio in vino hyptico, & aceto, qua abluatur pars dolens tepide, frequenter. Hæc in fluxione calida viurpari poterit ab immo in frigida vero addi poterunt radix cyperi cortex baxi, folia hederæ, & similia.

Simplicius medicamentum componitur ex aqua plantag. & rosar. cum aceti tantulo ac formam oxytrati.

Vel galij & coquatur in aceto, quo abluantur dentes. Vel Rad. pentaph. 3*ss*. fol. salicis M*ss*. gallarum 3*ss*. Fiat decoctio in vino hyptico, qua colluatur os. Hæc decoctio filit fluxionem, & dolorem sedat.

Potissimum etiam viurpanda erunt remedia, quæ dolorem sedant, eulque causam discutunt, quorum maximus apud aurores, & apud vulgum numerus habetur. Nos efficaciora hic proponemus, ex quibus eo iudicio delectus habendus est, ut que non solum resoluunt & discutunt, sed etiam fluxionem cohercent, & stringunt admixtione, in principio & augmento magis viurpentur; quæ vero tantum discutunt in statu & declinatione.

Succi temperum & solani, ana 3*ss*. lactis vaccini, aut ouili 3*ss*. vis. olei rosacei opihacini 3*ss*. opii, croci, an. gr. m. Nicotian. uræ linteæ ex. pus liquor maxillæ dentis dolentis tepide applicetur frequenter.

Medulla pistorum dulcium coctorum 3*ss*. furfuris aceto, macerati 3*ss*. vis. olei rosacei opihacini 3*ss*. croci 3*ss*. opii gr. m. Melle, fiat cataplasma parti dolenti applicandum. Vel

Farinæ hordei & fabarum, ana 3*ss*. olei rosati completi & amygdalar. dulc. ana 3*ss*. succi semperini maioris 3*ss*. lactis q*l*. Fiat cataplasma parti dolenti applicandum tepide frequenter.

Albumina ouor. num. 4. Agitentur cum aqua rosacea, & excipiantur stupor cannabis, quæ aspergantur pipere pulverati 3*ss*. & parti dolenti applicentur, ut totam genæ ledem comprehendant.

Hic tamen sedulo aduertendum, ne astringentia maxillis applicentur, si tumor eas occupet, periculum enim est, ne humor ad fauces repellatur, & gravior suffocet. Cuius rei exemplum proponit Valescus de Tarantia, cupidum medicum, dolor e ceterum laborantis, cum maxillæ inflammatione, qui oleum rosaceum cum aceto admouit, unde incidit in anginam, & mortuus est.

Aliæ oris collutiones in morbi decursu parari poterunt in hunc modum.

Vini albi generosi 3*ss*. radices hyoscyami albi 3*ss*. Bulliant ad consumptionem tertie partis. Colaturæ adde aceti 3*ss*. vernicis 3*ss*. iterum quæ bulliant vnicæ ebullitione. Cola, tura abluatur os frequenter.

Decoctum verbenæ simplex ad eundem viam a quamplurimum commendatur.

Laudatur etiam decoctum guaiacii in aqua, vel vino paratum, cui sal interdum permisceri poterit. Vel

Fol. perficariæ teræ & cortic. rad. hyoscyami, ana partes æquales. Coquantur ad omnes fluxiones acres & biliosas coercedas, per os tuto exhiberi possit. Folia etiam hyoscyami loco radices viurpari possunt.

Si perficariæ acrimonia offendat, illius quantitas minuenda est. Iam penitus omitti potest in fluxione a causa calida, & in illius locum subrogari perficariæ maculata, quæ refrigerandi & astringendi facultate prædita est, cuiusque succus, aut decoctum ad omnes fluxiones acres & biliosas coercedas, per os tuto exhiberi possit. Folia etiam hyoscyami loco radices viurpari possunt.

Quidem tamen hyoscyami, & perficariæ maculata pro remedio magnetico videntur, quæ decoquantur in aceto, cocta comburant igne luculentos dentes aceto abluunt, & dolor tum evanescere aiunt, quamprimum folia combusta sunt. Ego vero effectum aceto tribuere malim quod dentes abluantur.

In predictis decoctis, si aceti acrimonia tanta sit, ut eam per difficile terre valeat, ex aquis paribus vini & aceti parari poterunt; imò vero in causa frigida vinum solum vsurpabitur.

Amatus Lusitanus sandaracham valde laudat in aceto & vino decoctam, hoc modo.

Radix sandarachae 3. i. vini & aceti ana lb. ss. Coquantur, & colatura calida tenetur diu in ore.

Decoctum radices vtriusque maioris, cum patxillo nucis molchata & croci cum quibusvis vini & aceti paratum, & calide in ore detentum, humores illarum mirabiliter extrahit. Ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulò post mitigatur.

Radix lapathi acuti, vere, ante germinationem collecta & exsiccata, denti dolenti admodum, specifica proprietate dolorem dentium tollit; quod confirmatur Forelli experimento, quod habetur *ibid.* 6. lib. 14. vbi etiam dictam radicem recentem in taleas concinam denti dolenti feliciter applicauit in puella quadam; quo etiam remedium in aliis quamplurimis, præcedentibus vniuersalibus remediis, se feliciter vsu testatur.

Si corpus rite purgatum fuerit, caput pituita non sit admodum repletum, maliciorumque ad humores a parte affecta extrahendos, erunt efficacissima; quae parantur, vel ex pythio solo dentibus diu premendo, vel sequens componi poterit.

Malliches, pyrethri, & flaphlagris ana 3. i. ss. hyocyanini 3. ss. Puluerentur, & melleantur, ex illoque hant globuli in panis lineo raro, quos diu mallicet, & sequenter eueniendos.

In vulgari vsu habetur oleum caryophyllorem, quo frustulum gossipii intrinsecum denti admoventur; & si ferous fuerit, cauo illius inferitur, sique humor parti adhaerens extrahitur, & illa roboratur.

Oleum camphorae ad eundem vsu mire est efficax.

Vel in olei caryophyllorem 3. i. solue camphorae gr. viii. illique eodem modo vtere.

Verum præ ceteris commendatur, & miris laudibus effertur oleum buxi, quod si gossipio per stilum excipiat, & in foramen dentis gutta vna, vel altera iniiciatur, illud dolorem tollit. Fit autem hoc oleum, conciso ligno buxi in multas particulas, deinde destillatur per descensum, duobus vasibus, altero intra terram, altero supra posito, & circa hoc apponitur ignis ex carbonibus validior, & oleum exillat in vas inferius.

Præter olea prædicta, Chymici etiam laudant oleum ligni quod vocant. Heraclei, scilicet corylini, eodem modo vsurpantur.

Si dolor ita vehemens sit, ut predictis remediis cedere non valeat, ad nautica veniendum est, quae sub variis formulis à practico proponuntur, & denti dolenti admoventur, quorum tamen affectus, non minus, quam cæterorum admodum incertus est. Verum eadem assumpta dolore certo consopiant. Inter cætera laudanum opiatum principem locum obtinet, quod non solum dolorem sedat, sed etiam fluxionem cohibet, & ruto exhiberi potest post remedia vniuersalia ad gr. iii. vel iv. modo à perito artifice præparatum sit.

Topica vero remedia ex narcoticis parata multa circumferuntur. Sequentia duo nobis sint instar omnium.

Opium vtriusque, & ladanii ana 3. i. Puluerentur, & cum vino albo decoquantur in formam linimenti, quod pauco gossipio exceptum denti applicatur.

Alterum est emplastrum Ruerni, Henrici magni Archiepiscopi supra descriptum.

Si vermes in dente fuerint, amaris necandi sunt, & inter alia sequens conferre poterit.

Aloes 3. i. camphorae 3. ss. aque vitæ 3. ss. Melleantur & cum bombace denti admoventur.

Notandum est raro dentes dolere, nisi perforati fuerint, & erosio vique a d. autatem internam penetret, ac neruum tangat, adeo ut doloris sensus auferatur, neruus adurendus est caustero actuali, vel aqua forti, aut oleo vitrioli in causi dentes immisso, quod si frequenter iteretur, & dens valde corrolus fuerit, in agmēta sensim concipitur, & extrahitur.

Si hinc omnibus dolor dentium non cedit, & dens valde exelus fuerit, ferro extrahendus est; eoque extripto dolor statim cessat, non amplius reuertitur. Cauendum tamen est, ne dens euellatur eo tempore, quo fluxio impetu ruit, aut caput dolet, aut tumeret gingiua, aut dolor atrox sentitur. Et monendus est Chirurgus, ne violentem & affatam, vno scilicet iuxta dentem euellat, ne violentam extractionem consequatur maxima cerebri concussio, & ossis maxillæ disrumpio, quam sepe magna hemorthagia, febris, & interdum mors consequitur. Eiusdem dente, ea pars à qua extrahendus est digitis vndiqueque comprimitur, ut ad naturalem statum redeat; postmodum æger os colluat oxycrato tepido, caueatque ab aere frigido, ne noua fluxio in alios dentes delabatur. Si verò sanguis in tanta copia effluat, ut vix comburi possit, quod interdum contingit, etiam sine maxillæ rupture ex vena, vel arteria discessa, & refert Valerius historiam cuiusdam, qui dente sine vili vi & sine ferro, sed folio digitis extrahito, sanguinis fluxu in vno impetu eiecit, & altero die ferè tantumdem ex arteria gingiuae supposita; Sanguis vltimum illi sanguinis fluxu, appposito globulo solidiori ex linteis confecto, & digitis per horam vnā, aut alteram compresso. Quod si non succedat, vitriolum vitrum admoendum est, & linteum in acetum maceratum superimponendum, idque digito comprimentum, donec crusta inducta fuerit. Postremo remedium est cautum igni, tum quo sanguis erumpens statim cohibetur.

Si quis metuculosus Chirurgi manum refugiat, & aliis remediis sibi dentem extrahi cupiat, ea tentanda sunt, quæ ab authoribus passim proponuntur, & dentis calum promouere censeantur; qualia sunt, pasta ex lacte tithymali, & thuris puluere simul incorporata cum pauco amylo in cauum dentis immissa; radix renouclæ, cortex radicis moricinis verumum terrestrium, pyrethrum in aceto insusum, radix cæcumeris agrestis in aceto insusa, & similia. Sed præ cæteris efficacissimum vim obtinet ad dentium calum promouendum elleboraster, si eius folio conferto dens confricetur; sed diligenter cauendum est, ne alii dentes hoc remedio tangantur, eorum enim calum etiam promoueretur. Quidam rusticus cum dolore dentium acerbissimo premeatur, suavit alter vt elleborastro dentem confricaret; ille incaute hoc vtens remedio, maiorem partem dentium maxillæ afflicte confricuit, & intra paucos horas omnes prope modum deciderunt. Si quis igitur tantum vehemens remedium experiri cupierit; suauiter vt reliquos dentes cæte diligenter obducatur, ita vt ille qui euellendus est, nudus relinquatur, & ad vniuersum medicamentum paratur.

Quamuis tumor in maxillis obortus, vitriolum doloris solutionem affert, translata materia ad partes exteriores, vt tamen ille citò resoluatur, quedam remedia vsurpanda sunt, cui res confert sequens linimentum.

Butyri recentis & auxugis gallicant 3. j. pulueris irosos Florent. 3. j. croci 3. ss. ol. chamemel. & amygdal. dulc. ana 3. ss. Fiat linimentum.

Promptius operatur cataplasma ex ficibus, pane & aceto.

Vtriusque confusa maxillæ admodum cito dolorem soluit.

Hæc est doloris dentium præsentis curatio. Si autem ille frequenter recurrere consueuerit, vt in multis huius affectus obnoxius contingit, prophylaxis adhibenda est, quæ in eo consistit, vt humorum ad partes istas fluentium generatio impediatur, & dentes ipsi reboventur, ne tant facile fluxionem excipiant. Si igitur ab humoribus calidis affectus producat, eadem curatio adhibenda est, quæ in calida hepatis intemperie & catarrho calido supra posita. Si verò à frigidis, & pituitosis humoribus ducat originem frigida cerebri intemperie, & catarrhi frigidi curatio vsurpanda est, dentium verò roboratio ex sequenti capite erit desumenda.

C A P V T I I

De dentium nigredine & erosione.

Dentes non raro nigri, lividi, aut flauum colorem contrahunt, ab humoribus vitiosis, illorum superficiei.

ei adhaerentibus, qui longa mora eos tandem corrodunt, & carie afficiunt: Producentur etiam idem afflicti a vaporibus terribilibus exhalantibus, qui ex prauis alimentis ingelitis, aut a ventriculi intemperie cibos corrumpentes exoriantur. Plurimum ad dentes denigrandos conlect hydragrum, siue toti corpori adnotum, vt in hoc venerat contingit, siue facies tantum eo illinatur. Vnde mulieres, quæ fucus ex mercurio vituantes nigros, aut tædo colore infectos habere consueverunt.

Ad curationem, causa antecedens prius auferenda est, & si humores prauis in ventriculo redundantes huic malo originem dederint, euacuandi sunt, & partium eos producentum intemperies corrigenda, optimaque victus ratio instituenda, eaque alimenta eliminanda, quæ dentes corrumpere nata sunt: præcipue verò dulcia.

Infinita propemodum ad dentes dealbandos proponuntur remedia apud auctores, quæ vniuersique ex periti potuerunt. Nobis vnicum saltem sufficere poterit, quod in infantibus dentes dealbat, ab omni forditie liberat, & a carie præseruat, nempe spiritus sulphuris, aut vitrioli, in quo exiguus bacillus denigrandus est, cuiusque extremo dentes confricandi, moxque linteo detergendi. In magna dentium forditie purum & purum oleum vsurpari potest: aliis verò cum melle rosaceo permiscendum, aut aqua simpliciter temperandum erit, ne viâ frequenti gingiuas erodant. Montanus consil. 113. refert se id didicisse Romæ ex quadam muliere, quæ Mariam Græcam appellabant: ad quam cum venisset, admodum iuuenis, atque illa esset annorum 10. postea quinquagenariam in eodem seæ statu eam reperit: quæ formæ atque virtutem integratam oleo vitrioli acceptam tulisset, atque significasset, se ex eius viâ dentes, quos in iuuentute pessimos habuerat, pulcherrimos habere, & similes mos, gingiuas etiam firmas, & addidisset, quod videretur sibi ob eius viam tardius fenescere. Viâ erat autem singulis diebus viâ altera guttula, gingiuas & dentes leuiter fricando.

Cinis tabaci ad dentes abstergendos & dealbandos est etiam mirè efficax.

Ad præcautionem verò, & dentes conservandos, primum ipsi forditibus, & cibi quodvis mandandi sunt dentalcalpio ex ligno lentiscino, aut alia materia idonea: mox vino os colluendum, dentes verò confrucandi puluere sequenti.

Rad. bistortæ, aluminis, & coralli albi ana 3.ij. Fiat pulvis tenuissimus, quo dentes confricentur. Vel aqua sequenti abluantur.

Aluminis viti subtilissimè puluerati 5.ij. cinamomi integræ 3.ß. aquæ fontis & rosarum ana 3.ij. Bulliant in phialâ vitrea supra cineres calidos ad tertie partis consumptionem. Hoc liquore dentes confricantur manè, cum linteo in sp. madefacto.

C A P V T III.

De Gingiuarum erosione & exulceratione.

ERoduntur gingiæ, & exulcerantur ab humoribus acerbis & eroduntur ab eas confluentibus. Partes autem mandantes sunt cerebrum, ventriculus, lien, aliaque partes. Lenosius præsertim viceribus gingiuarum maxime obnoxii sunt, unde in scorbutu magna earum partium exulceratio, & corruptio contingit. Interdum etiam ex lumbicis, aut corruptis humoribus ex quibus illi generantur, gingiuarum erosiones solent contingere, ita vt illæ diu perferant, lumbicorum intus latentium indicia esse soleant. Sic refert Fabricius Hildanus ob. 59. centur. 1. cuiusdam cuius Dufeldio perennis puerum erosione gingiuarum a longo tempore grauissimè vexatum, cum varia multisque remediis tam interna, quam topica adhibita fuissent, tandem vitam cum morte commutasse. Et aperto corpore tantam inuentam esse vermium copiam, vt aliquibus in locis intelligentia exolerint, multique in vacuo ventris reperti fuerint.

Curatio primus ad causam antecedentem dirigenda est, & humores vitiosi vacuandi per venæ sectionem & purgationem acres & calidi temperandi per apozemata, iulepos, iuleculâ medicata & alia huiusmodi. Eorundem humo-

rum fluxio auertenda per cucurbitulas & cauteria partibus idoneis adnota. Ac denique partis præcipue afflicte vitia corrigenda.

Postmodum verò ad topica veniendum est, quæ pro magnitudine afflicti varianda sunt: ita vt simplici erosioni ea tantum adinuenda sint, quæ astrigendi & exsiccandi vi prædita sunt: atque lotio sequens primò vsurpari poterit.

Gallicanum immaturum, calvum cum glandium, & balsamum iordan. 3.ij. ros. rubr. P. aluminis crudi 5.ij. Coquantur in aquæ ferratæ partibus duabus, & vna vini rubri aquæ tinctio decocto fæpe gingiuas abluantur.

Si hoc decocto non tollatur erosio, opiata sequens adiungenda est.

Sang. drac. 3.iii. ligni aloes rosar. rubr. spodiæ, cornu cerui ad albedinem viti & nucum cupressi, ana 3.ij. myrrhæ & cinis tabaci, ana 3.ij. aluminis 5.ij. Fiat omnium pulvis, qui excipiat melle, additis spiritus vitrioli aut sulphuris gurtis aliquot. Fiat opiata, quæ extendatur supra lintea in illarum lamellarum, gingiuas applicanda hora somni.

Spiritus sulphuris aut vitrioli, quemadmodum dentes mundificat & dealbat, sic etiam gingiuarum putredinem arceat solus vel cum aqua, aut melle rosaceo permixtus, vt superiori capite dictum est.

Si vicius profundum fuerit, aut fordidum, sequenti balsamo illina tur.

Myrrhæ electæ, & sacchari candi, ana partes æquales. Puluerantur, ique impiantur album oui ad duritiem coctum, & per medium sectum: postea filo probè alligetur, & suspendatur in cella vinaria, supponendo vas vitreum, infulsabit liquor, seu balsamum, quo pars sæpius in die illinatur.

Quod si prædictis remedijs ex parte administratis, afflicti sit, ad illius auulsionem veniendum est, & vicius citò curabitur, alioquin incurabile prorsus remanebit.

C A P V T IV.

De fluxu sanguinis ex gingiuâ.

Sanguis magna copia interdum est gingiuâ fluere consuevit, idque vel criticè vel symptomaticè. Quamuis autem hemorrhagia critica rarissimè per gingiuas fieri consueverit, id tamen interdum accidere docet experientia & authorum obseruationes. Sic refert Dodonæus ob. 6. 14. cuidam Latomo ethymata laborantis sanguinem est gingiuâ etu pisse, eumque repressum ad vrinarios meatus translatum fuisse, vnde cruenta vrina subsequuta est: quæ cum astrigentibus cohibita fuisset, iterum ad gingiuas se contulit, nec fluxus cessauit, donec æger a morbo liberatus est. Amatus Lusitanus curatiõne 5. centur. 5. refert quibdam sanguinem est gingiuâ vtiliter effluxisse. eoque cohibito nonnulla sanatus incommoda prodidisse. Zacutus etiam Lusitanus ob. 26. lib. 1. praxi admittenda, refert aurilabrum quemdam, cum ex multo labore iuxta fornacem in ardentem febrem incidisset, & esset firmus ac fortis copiosum celibrasse phibotomiam, cuius vi ita leuatus est, vt in 7. die præcedente gingiuam prurire, & labij inferioris ingenti dolore, ex vena gingiæ inferioris rivuli sanguinei profluerent per tres continuos dies in tanta quantitate, vt libras amplius quæ excederet, & quanto plus sanguinis effluebat, tanto magis remittebatur febris, quæ omnino extincta, sanguis sponte sua cessauit omnino.

Symptomaticè vero sanguis est gingiuâ profluens, ob suam acrimoniam & vitiolem hepatitis aut lienis constitutionem. Sic in scorbutu familiaris est huiusmodi sanguinis est gingiuâ effluxus.

Interdum etiam sanguis copiose profluat ex dente auri, solacera tunc arteriola, quæ radici dentis inseritur, unde tanta interdum sanguinis copia emergit vt inde quibuscumque mors contingit.

Fluxus symptomatici curatio perficitur sanguinis detractione & purgatione, atque remedijs vicerum afflictorum vitia corrigentibus. Quibus succedat topica remedia, astrigendi vi prædita in gargarismatum, seu collutionum, puluerum, & linimentorum aut opiatarum formam redacta.

Si euulso dente copiosa accidat hamorrhagia, reuulsio primum instituenda est per venæ sectionem & cucurbitulas, & parti altringentia admouenda, quales est cataplasma ex bolo armena, terra sigillata, sang. dracon. alijsque altringentibus, albumine oui exceptis paratum. tum gypsum folium albumine oui exceptum, sanguinem fluentem potenter tuffimè cohibet. Quæ si non sufficiant, patientis digitus loco imponendus est, ex quo sanguis erumpit, & tandem detrahendus, donec sanguis supra osificum arteriæ coagulatus, non amplius effluat.

Si leuioribus huius sanguis coherere nequeat, quod sæpe contingit, ad potentiora veniendum est. Valerola *lib. 3. lib. 5.* refert, in vetula ex dente putrido, sine vlla vi, ac sine ferro euulso, sed solo digito apprehenso, & lenissimo concussu educto, ingentem sequutam fuisse hamorrhagiam ex arteria gingiue subdita. Quæm sanguinis fluxum cohibuit, cum leuiora fuisse non potuissent, chaoticide vlla imposita, quæ in sistendo sanguine mirificam vim obtinet; nam & vehementer altringit, & caulica virtute milar g. us fluorem omnem reprimat. Zacus Lusitanus *lib. 8. lib. 1. Præter Medice admiranda*, refert hamorrhagiam euulsam, qui cum dente dolore premetur immittitur, alium violento concussu, ferri ope educit. Extracto eo, ex iacata arteria gingiue subdita, copiosa sequuta est hamorrhagia; quæ cum venæ sectione, cucurbitulis, & altringentibus apollitis coherere non potuisset, neque digito vultui imposita, neque chaoticide vlla admotâ, tandem illius consilio, locus pulvere gummi Arabici impletus est, quod aulium ita profuit, vt post tres horas sanguis fuerit omnino restitutus, hoc enim gummi obstruendi, refrigerandi, glutinandi & exsiccandi vim habet. Idem Zacutus *lib. 8. lib. 1. eisdem libri*, refert militem quandam strenuissimum, cuius lassissimo cruciatiore dolore, ferro cum extra vixit violentia summa, vehementer passum esse sanguinis fluxum ex arteria, cui dens iniebat. Sanguine biduo vberum fluente, peritissimè Medi. omnis generis obstruenda extra apposuit, reuulsentia consuluit, arteriam candenti ferro inurit. At incalsum omniariam sanguis maiori impetu profusus, eum in statum morti valde propinquum, viribus pene exhaustis dederat. Vocatus Zacutus Galenicum emplastrum ex aloë, thure, & pilis leporinis exactissimè tritatis, & mixtis eum candido oui imposit, quo intra paucas horas sanguis fuit omnino suppressus, & æger à mortis faucibus ereptus. Hoc preciosisimo auxilio à se primum inuento gloriatur Gal. *lib. 5. meth. c. 7.* incalim in gibbero arteriam, fuisse conglutinatam, & cap. *4. eisdem libri*, tum etiam libro de curandi ratione per sang. *moj. cap. vltimo*, huius remedij præstantiam confirmat, & quibuldam historiis illustrat.

CAPVT V.

De oris & faucium vlceribus.

Leuia & superficialia oris vlcera, vulgò Aphthæ nominari solent, quamvis apud Hipp. & Galenum, interdum hoc nomen pro aliarum partium vlcibus vsurpatum reperitur, quæ verò profundius se demittant, oris, vel faucium vlcera absolute nominantur; qualia sunt ea, quæ luc venerea affectis contingere solent.

Hæc autem vlcera generari solent ab acerbis humoribus aut vaporibus à varijs partibus in fauces translatis. Sic in febribus malignis huiusmodi vlcera sæpiissime contingunt, & in iis qui calidiori hepatis, aut aliarum partium intermperie laborant, aut corruptorum humorum illius scateni vnde puerilis aphthæ sæpiissime contingunt, ex Hipp. *aph. 24. sect. 3.* tum ob lætū acrimoniæ, quæ in transitu partes illas molissimas exulcerat, vt docet Gal. in *comment. illius Aphorism.* tum quia lac in ventriculis puerulorum sæpe concurrit, & acres vapores ad os transmittit, vt idem Gal. *asserit 9. de comp. med. fec. loc. vltimo*.

Variæ autem sunt huiusmodi vlcum differentie, non solum quod alia leuiora alia deteriora sint, alia pueris, alia adultioribus insistent, sed etiam quod alia cum inflammatione coniuncta sint, alia vero minime. Hæc vlti gradus reperiunt, pro varietate humorum à quibus generantur. Vel

enim sunt à sanguine, vel à bile, vel pituita, vel melancholia, seu potius atra bile, quæ non solum exurent, sed etiam plerumque malignam qualitatem obinet, & vlcera *canosa* generare solet.

Hæc autem differentie propriis signis distinguuntur, siquidem vlcera rubiendiora à sanguine oriuntur, lauior à bile, albescientia à pituita, & liuida ab atra bile, testis præterea adesse significat.

Quod ad prognosim attinet, aphthæ proprie dictæ facillime curantur: vlcera verò profundiora, aut putredinem adeptæ, *visus* à Grecis appellata, difficilior curantur. Et in pueris illa periculosa sunt, tum propter carnis mollietatem, quam huiusmodi vlcera magis decalcantur; tum quia remedia potentiora, eo eandem carnis molliem ferre nequeunt. Vnde fit vt pueri interdum ex hoc afflicti intereant, si malignitatem & putredinem comitem habuerint.

Ratione causæ etiam minus periculosa sunt vlcera quæ à pituita, magis quæ à sanguine vel bile, maxime quæ ab atra bile generantur.

Vlcera nigra & crustulosa, pessima & lethalia sunt, præcipue in pueris.

Fauces exulceratæ cum febre, difficiles sunt, vt docet Hipp. *3. præg. quia*, vt Gal. explicat, humoris erodentis maligni indicant.

Curatio insituitur primum idonea vius ratione, quæ refrigeret & exsiccat, ac causæ antecedentes generationem impediatur. Præterea itaque, si à lætū vitio malum contrahit nutritia mutatio præcipiatur, aut proprie nutritia lac corrigatur cibo & potu laudabili, tum etiam venæ sectione & purgatione, si opus fuerit. Præsertim verò nutriticis præscribantur edulia refrigerantia & altringentia, qualia sunt cydonia, pyra, melpila, torbalactuca, & portulaca. In adultis eadem præscribantur, & vitentur acris, salsa & pipitata.

Deinde causæ antecedenti prospiciendum est, vniuersalibus euacuantibus, pro ætatis ratione vsurpatis. Ac primum phlebotomia humores ad partem fluentes potenter reuellet, eorumque acrimoniam temperat, totum corpus refrigerando.

Huic succedere debent cucurbitulæ scarificatæ, hirudines pone aures, & sub mento affixæ, vesicatorium posteriori cruci admotum.

Pollina de a venæ sectione purgatio præscribenda est humori peccanti, & ætati congrua.

Eodem tempore, nempe ab ipso curacionis principio, topica admittuntur: stomatica à Galeno appellata: eaqu ab initio mitiora sint, qualia sunt gargarismata, vel oris colutiones ex aquis plantaginis, matris, lue, peculi rosmari, syrupo de rosis siccis, & de moris paratis. Vel decocta ex folijs plantaginis, rubi, centinodii, balauftijs, santalo rubeo, & similibus, cum syrups prædictis. Et si inflammatio adfuerit, resiter addi poterunt iucci solani, semperui, portulacæ, & sal prunellæ, in ea quantitate, quæ acrimonia non feriat, vel illius loco alumen crudum in parua dosi admisceri poterit.

Si non sit inflammatio, vniuersum ac sanguinem remedium est spiritus vitrioli, aut sulphuris, qui in adultis parum ac putus vsu pariter poterit, intincto in eam gossipio bacilli apici alligato, eoque vlcis admoto, leuissimo contactu: si enim aphthæ simplices momento scire curantur. In pueris verò permiscetur diaphis (pituitæ cum melle rosaceo, ea proportione, vt accidat linguam leuiter feriat, & cum penicillo ex lineo, baculo alligato, aphthæ insistantur frequenter, & cito curantur.

Si admodum dolorifica sint vlcera, cum inflammatione coniuncta, lacte frequenter gargarizato demulcentur, vel lactis defecato, emulsionibus sem frigida, vel mucilag. sem. pilulæ, & cydon. cum aquis rosar. plantæ g. solani extractis.

Si denique dolor peritæx reuulsionibus propositus, & topicis non sedetur: fed ab illius vehementia copiosi humores acres continuo attrahantur, vnde vigilie continue exoriantur, & corporis consumptio sequitur, quæ vitæ summum periculum minatur, extremum remedium est ad narcotica consurgere, quæ dolorem sedant, & humorum influxu inhibent, eorumque dosi metiendæ est pro ætate & viribus.

Ergo

Ego aliquando puerum quatuor annorum ab orci lausibus Dei beneficio, liberaui, exhibito laudam græcum cum eius fauces & lingua profundius viceribus lacerent, cum tanta inflammatione, ut ne iulcula nec topica remedia ferre possent: tanto humorum acutum affluens, ut illi continuo ex ore, risuuli instar emanarent, & puer dies nocteque infomnes eluando transiret.

Si vicus fordidum ac putridum euaserit, abluatur primum decocto hordei & melle rosaceo, & in pueris lacte chalybeato, cum confersa rosarum agitato: mox ad lortiora transeundum est: & in primis mel rosaceum supra laudatum, & guttus aliquot spiritus vitrioli acidum redditum, multum coniecit.

Si hæc non sufficiant, aquis, vel decoctis supra descriptis addi poterit alumen vitium, collitium Lanfranci vel vnguentum ægyptiacum: maiori vel minori dosi, prout affectus vehementia postulare videbitur. Si denique a lue venerea laucium vicus procedat, non nisi lue sublata curari possit.

CAPVT VI.

De Vula relaxatione.

Vula relaxatio congit ab humore pituitoso la capite in eam delabente, cui non raro sanguinis quædam portio admiscetur, & tunc cum relaxatione inflammatio coniuncta est, quæ etiam tonsillis frequenter euenire solet: quarum tamen inflammationem curationem omittimus, cum ipsæ remedijs perfici valeat, quæ ad lingue inflammationem, & oris vicera cum inflammatione coniuncta propostæ sunt.

Humor igitur pituitosus in columellam delinens, eam humectat, emollit & relaxat, ut longius facta partem superiorem œsophagi tangat & nauseam pariat. Tum etiam laborantes bolum quendam in summo œsophago habere videntur, quem frustra deoratur conantur, ut hoc solo signo sine inspectione, vula relaxatio dignosci valeat.

Illius curatio primum ad causam antecedentem dirigenda est, sicque humores la capite fluentes euacuandi, reuelendi ac detrahendi ipsi remedijs, quæ in catarrhi curatione fuerit propostæ.

Topica verò in principio sint astringentia & repellentia quæ in gingiuarum & laucium vicibus ferre propostæ & in curatione Anginæ capite sequenti proponentur, quibus postmodum resolutiua & exsiccantia crunt admiscenda. Est licet gargarismata dictis locis propostæ, hic vitilia, sunt, tamen vbi nulla est inflammatio, puluerum vici efficator est, is enim vula relaxata potentius contrahitur, & exsiccatur. Atque ita primum ad mouebitur cortex granatorum subtilissime pulueratus, cui in progressu tantillum piperis admisceri poterit. Vel

¶ Rosæ rubæ balauit corticis granatæ ana ʒ. ss. rad. bistortæ, tormentillæ, galliarum immaturarum florent. ana ʒ. j. aluminis vbi ʒ. ii. Fiat puluis. Vultus Chirurgorum pipet longum pulueratum admovent, quod non vacat periculo; siquidem metuendum est, ne humores assatim a cerebro ad partem affectam attrahantur, & graue aliquid damnum afferant.

Modus autem huiusmodi pulueres adhibendi talis est. Lingua speculo oris depressa, mox spatula chirurgica, aut coëlicari perextiguo ad incinctorum, pulvis vulae admoventur: quod pluries in die repetendum est, donec humor columellæ imbutus prorsus absumptus sit. Vt autem pulvis vulae vndique alpergi atque insiliari possit, vici est instrumentum a Fabricio Hildano inuentum, & descriptum *lib. 21. centuriæ secundæ*, quod inde mutuari curiosus quisque poterit.

Denique si relaxata columella prædictis remedijs ad pristinum statum reduci non valeat, sed elongata permanens grauem conuulsio molestant inerat: vitium erit summum, cuius eius præcidere. In qua operatione quedam cautiones exhibende sunt. Prima desumitur ex Hippocrate *lib. 21. vbi, gurgulione*, inquit, cum periculo fecatur, & scissatur, & abstrahitur, quodammodo magnaque fuerint inflammatio

enim superuenit & sanguis fluat. Sed hoc oportet aliis modis, quibus extenuari erit per illud tempus. Vbi vero pensile fuerit omne id, quod vnam appellat, sique pars gurgulionis summa maneat ac incurbata, superior vero tenuior, per illud tempus ad molari manu tutum est. Sed præstas vbi album, subdextris, vbi chirurgi, si liceat per tempus, nec eger frangatur. Galenus in comm. huius loci verba Hipp. explicans, dicit gurgulionem inflammatione laborantem non esse præcidendum, aut scissandum, sed ea tantum sedata ita ut pars superior saltem gurgulionis extenuata sit.

Alteræ cautio desumitur ex Paulo Aegineta *lib. 6. cap. 31.* ut scilicet columella ferro non attingatur, quando labialis, aut subnigra est, neque malignitatis cuiusdam particeps, vel ad cancri naturam accedens. Sed ex eodem Paulo, in ipsa operatione tuto perfici potest, quæ reuocata sunt oblonga, alibicantes, & ut ait Hipp. in suprema parte immixta. Huius operationis feliciter peractæ exemplum habemus apud Amatum *lib. 2. cap. 3.* in quodam studioso, qui gurgulionem habebat fori modo oblongum, & exanguem, cui cum nulla remedia profuissent, portio eius superflua forcipibus præcisa est, & illico oleo vitrioli contacta, sicque eger ab eo incommodo liberatus est.

Tercia denique cautio in hac operatione adhibenda est, ne nimis gurgulionis quantitas abscindatur: inde enim vocis & respiratoris lesio nem eueniri docuit Galenus *1. de vici part. cap. 1.* & ex integra illius consumptione, ut in lue venerea aliquando contingit, tabes, & mors non raro subsequuta est.

CAPVT VII.

De Angina.

Angina nomen in genere sumptum, omnem faucium & gutturis affectionem significat, quæ respiratio & deglutitio impeditur, nullo existente in pulmone aut thorace vitio. Equæ duplex est, legitima & spuria.

Legitima fit ab inflammatione, quæ musculi faucium & laryngis tunnellæ, respiratoris & deglutitionis vias coarctat & angustiores redditur. Illa autem inflammatio vel larynginæ occupat, vel fauces quæ pharyngis nomine, enuciati consueverunt. Vtraque pars musculosa habet internos & externos. A licet ut plurimum pharynx & larynx propter viciniam & contiguitatem in Angina patiantur, modò tamen hic, modò ille magis afficitur: vnde non exigua symptomatum differentia emergit, quorum ratione, quatuor a Gal. 4. de loc. affect. cap. 5. propostæ sunt angine differentie, quæ recentiores Græci, qui paulo ante Galeni sæculum viuerunt, proprijs nominibus, omnis curiosi, (ut idem Galenus cenet,) verborum aucupio designarunt, vnam vocantes *συνέχου* alteram *σπασμωδικήν*, si inflammationem interiore propere quoque laryngis musculis occupet, *συνέχου* si interiores pharyngis musculos, *σπασμωδικήν* si exteriores laryngis musculos, *σπασμωδικήν*, ac denique si exteriores faucium musculos inuadat, *σπασμωδικήν* appellatur.

Non solum autem pharyngis faucium & laryngis musculi sunt inflammantur, ut antea dictum est, sed etiam interdum ad vicinas partes & ceruicem ipsam exteriorem inflammatione protenditur; ut in diagnosi & prognosi huius affectus dicatur.

In his omnibus speciebus, cum periculosior est morbus, deglutitione impedita, solent assumpta ad nares resister, præcipue liquidiora, quorum deglutitio difficilior est; propterea quod liquidiora, cum sefe larynx distendunt, non possunt ita facile a musculis comprehendi, ut ad œsophagum detendantur, eorumque maiori contractione indigent, quæ ob inflammationem sufficienter non fit: solida verò alimentia, cum magis corpulenta sint, superficialia tantum musculorum actione indigent, & leu eorum contractione deglutuntur. Contingit tamen aliquando, ut solida difficiliora, liquidiora vero facilius deglutiantur, quod ex partium affectum diuersitate dependet. Siquidem musculi laryngis non solum ad vocem efformandam, sed etiam cibum deuorandum destituti sunt, dum enim cibus in œsophagum impelli-

pellitur, latere cum lingua sursum effertur. Ad potum verò hauriendum magis lingua vitatur, quæ dum intus retrahitur, ex labijs liquorem ducit ad fauces. Si igitur musculi linguæ mouentes magis afficiantur, potus deglutitio difficilis est: si verò laryngis musculi magis lædantur, cibis difficile ingeritur.

Hic obiter annotandum. Hippocratem aliquando nomine Angina, laryngis tantum inflammationem intelligere, & sic magis stricte hoc nomen usurpare, cuius rei exemplum habetur 6. Epid. sect. 8. text. 1. ubi sic loquitur. *Quibusdam vero faucium inflammationem aderam, alijs anginae: ubi nomine anginae, musculorum laryngis inflammationem intelligit, & à faucium inflammatione distinguit.*

Spuria angina febris est, & duplex iterum statuitur. Prima & communissima est, quæ ab humore pituitoso proceditur, intus fauces & partes laryngis vicinas delabente. Altera verò fit à luxatione vertebrarum cervicis, quæ gule gutturæque introitus premittit & constringit.

Veræ angina causa, vix à laryngis inflammatione est, sanguis vel siccus vel biliosus, pituitosus aut melancholicus, qui è venarum ingulgarum ramis in dictas partes effunditur, & isque vel attractus à calore aut dolore illarum partium, vel transmissus aliunde, si partes illæ debiles aut laxæ, aut insipientium functionem idoneæ fuerint, tum si humorum copia adfluit in toto corpore, vel incipit, vel in partibus faucibus vicinis. Sanguis enim ut toto corpore redundans, vel pura qualitate affectus, dum ad caput transfertur, cerebrum vero robustum est, ab eo non recipitur, sed per easdem venas ad subiectas partes retrahitur: unde in ipsa variæ inflammationes sunt, parotides, ophthalmia, angina, & similes.

Iuvenes anginae magis obnoxij sunt, quam senes, quia multo biliosior quæ sanguine abundat, eam etiam qui habetur corporis sunt crasso, ac multo sanguine abundat, prestant in capite.

A nonnullis authoribus annotatum est, viris magis esse obnoxios angina, quam feminas, quod videtur Hipp. obiterasse 6. Epid. sect. 7. ubi epidemicam constitutionem describens, in qua angine, tussis, peripneumoniae vagabantur paucissimi homines ægrotasse affirmat. Cuius rei non aliam causam reicit, nisi quod minus in publicum prodibant, quam viri, & ita aeris externi in introitu sic non obiciebant. Quæ ratio propositioni vniuersali non conuenit, quod femine minus anginae sint obnoxie, quam viri. Verà autem ratio talis esse potest, quod lemne sanguinem frigidiores laryngem munere, & gutturis venas angustiores exaltateque habeant. Quorum ratione partes illæ fluxionem eam facili non recipiunt.

Ad causas internas reuocari possunt morbi præcedentes, ut febris continua, putridæ ardentes & imprimis epidemica: qualis illa fuit, quæ recensetur à Foresto obs. 2. lib. 6. quæ contingit anno 1517. In qua omnes laborantes grauissima faucium inflammatione corripiebantur, & intra sexdecim aut viginti horas moriebantur, nisi ante sex horas ab inuisione sanguis detraheretur. In hac autem angina febris symptomatica non est, sed potius essentialis, & angina illius veluti symptomata, quod materis morbosæ pars ad hunc locum propellitur. Hinc autem in febrilibus epidemicis aliquando anginae, alijs plurius, peripneumoniae, diffentiae, & similes affectus, ab occulta quadam vi & astutismo insillu, quo nunc hæc nunc illæ partes magis afficiunt.

Quodquid autem fluxiones humorum ad illas partes excitare potest, inter causas huius affectus externas recenseri debet, quales est aestiva consuetudo diuturna, iuxta Aph. Hipp. 16. sect. 3. *Morbi in plurimum multitudine magna ex parte sunt, febres longæ, alius profusa, putredines, morbi comales, plethoræ & anginae.* Ad hunc etiam affectum produciendum maxime facit temporis inequalitas, quando à calore larynx partes, & à frigore subito superueniente humores ad eas propelluntur: id præstat frigida refrigeratio ab incallescunt, à frigore porus potius candelit, tum etiam si caput pluribus tegumentis incalescat, vel nudi acri frigido exponatur.

Præter spuriæ angine speciei causam præponimus ob Hipp. 4. de vult. rat. in morbo acut. text. 39. ubi sic loquitur. *Senectus fit, eam hyeme, verique multo facilius & viciosa à capite ad genas irregulari descendit, cum autem frigida & glutinosa*

fuerit, à spuriæ obstruit permeationes.

Alterius denique spuriæ anginae speciei causam proponitur ab Hipp. 2. Epidem. sect. 2. tumor nempe, vel tuberculum iuxta vertebras cervicis obortum, ac præcipue illam, quæ dens seu dentiformis ab eodem Hipp. nominatur, à quo in more vertebræ ad interiora trahuntur, & cōsequenter cauitas in parte exteriori apparet. Hic autem tumor, vel ab humore pituitoso fit, copia sua vertebras à propria fide dimouente, vel à sanguine in musculis effuso, unde inflammatio fit, à qua musculi contracti vertebras ad anteriora trahunt: tunc verà est angina, ab inflammatione scilicet dictorum, muscularum oriunda. Potest etiam fieri luxatio vertebrarum ab humore pituitoso earum vincula laxante, & intermedia lubrica reddente, ac denique potest fieri à causis externis, casu scilicet vel percussione, quemadmodum talique omnium totius corporis articulorum luxationes.

Angina primò in genere dignoscitur ex illius signis pathognomonicis, respirandi nèpè, & deglutendi difficultate, abique aliquo thoracis aut pulmonum vitio; dolor præterea circa fauces & guttur percipitur? tum etiam in legitima angina rubor, calor & febris.

Differentiæ vero propriæ etiam signis distingui possunt. In larynge enim minor est respirandi difficultas deglutendi verò maxima, vel liquida vix transire possunt, sed potius sere per nares recipiuntur.

In Paralyse minor est respiratoris difficultas, imò per se iuxta, cum muscularum faucium externorum inflammatio parum respiratori officiat; dolor etiam & rubor foris in ceruice percipitur, cum inflammatio partes externas occupet.

In larynge maxima est respiratoris læsio ita vt stragulari videantur, & paucis etiam horis aliquando stragulentur, ac non nisi erecta dolente, & aperto ore spirare valeant. Fauces vehementer dolent nullus tamen rubor aut tumor, neque in faucibus intro, neque extra in ceruice apparet. Lingua luida est nigra, inflexa, vel teretior, ob summam venarum circa linguam repletionem. Acutissima etiam febris adeffe consuevit. Huius speciei descriptionem accuratè videre est apud Hipp. 3. de morbis. Hoc autem notatu dignissimè est, quod tamè à paucis animaduertimus, non tantum in hac specie musculos laryngis interiores affici, sed ipsi etiam pulmones, unde tanta respiratoris difficultas & suffocatio exortus, quod à Dodoneo luculenter observata est obs. medicinalium c. 18. Vbi relet huiusmodi causâ lationis, qui cum meritis ceruicis laryngem & fauces dolorem sensisset, & quandam in deglutendo cibo ac potu difficultatem, nocte stragulatiss interijt, huius corpore aperto inuenta est pulmonis substantia in pus conuersa. Alia explea annotatur anno 1565 in quo multi angina correpti apparente circa laryngem dolore, & tandem oesinente, in peripneumoniâ incidunt, siquæ defectus pulmones, vel putulentia fuere, vel abscessum habuerint, iuxta verò laryngem, aut eius musculos nihil occurrit, quod vel adeffe, vel adiuuere inflammationem ostenderet. Sit in his casibus senser laryngem non primariò, sed per consensum laborare, & verissime est, delibante humore à capite, à peram arteriam, & eiusque ramos impensè, atque diffundendo eodem ad alta vala transmissis, à peram arteriam & laryngem à dolore liberati, pulmones verò affici, & hoc modo est angina in peripneumoniâ permutacionem fieri. In hac autem angina pulmonem non ratò affici colligere possumus ex dictis Hippocr. quæ habentur 4. met. text. 30. & 31. ubi duas anginae speciei, proponit pro humoris diuersitate vnam, in qua fluxio pituitosa, hyeme & vere, ad venas singulares fertur, alteram, in qua humores biliosi insistant, quod estare & autumnio contingit. De hac angina posteriori sic loquitur. *Cum ex capite fluxus calida & viscosa fluxio, utpote acris, mordax, polcerat spiritum implet orthopneum, cum parvi siccitatemque multam.* Præterea quæ intus apparent, hanc quoqueque tumens videntur, tendens inque ceruicis posteriori contendantur, apparent quæ tam modo intendi, vix abru à spiritibus paruis spiritibus remissis frequens & violenta accedit, talibus arteria vicerat, ascendit quæ pulmo, neque externum acrum admittit intro genus. Hic Hippocrates. Dicit autem calidam & acrem fluxionem orthopneum parere, quia

mordet, vicerat, & spiritus implet; feruntur enim spiritus ad locum demouitum, hunc pulmones replent, unde ort horripa, cum non sit locus in quo externus aer admittatur, quantumque thorax dilataretur. Eandem sententiam confirmare videtur Hippocri, de morbis, ubi in curatione Angine dicit venam secandam esse sub mamma, nam pars constrictior ex pulmone spiritus calidus. Et paulo post inquit faciem, ut quidam citissime spuat, & pulmo gravior har; quia intumescit, plenus spiritus calido replente. Nonnulli namque autem est, cum spiritus ad partem aliquam deficiat magna copia, cum eo etiam sanguinem transferri, qui sita tampa affluit, ut a natura commodè regi nequeat, inflammationes & abscessus effluere solet; unde non mirum est, si in tali aetate pulmones parulenti euadant.

In paracynanche respiratio minus difficilis est, quam in cynanche; difficilior autem quam in synanche; rubor ac tumor aliquis in faucibus deprehenditur.

Angina spuria ex pituita dignoscitur ex febris carentia,
& humore pituitoso a quo magna copia confluente.

Spuria verò angusta exlaxatione genita cognoscitur ex motu capitis ac cervicis libro, & cautate quæ in ceruice preternaturaliter apparet, ob vertebrae intus depressam.

Caulum dignotio ex vniuersalibus humoris in toto corpore dominantis signis elicitur, tum etiam particularibus. Quando angina fit a fanguine, in facie calor & rubor apparet, & maior dilenfio in parte affecta. Quando fit a bile, dolor & calor maior elt, cum fitis, oris amaritudine, & acrimonia fenfu. Et fi a pituitoso fanguine fiat, dolor & rubor minor elt, & febris exigua.

A parte afflicta quædam etiam humoris peccantis diagnosis haberi potest. Sanguis enim biliosus pterumque in laryngi mucilosis potius inflammacionem facit; pituitosus fauces magis aggreditur. Cum enim exiles sint laryngis vena, non nisi sanguis tenuis ad eas penetrat: Fauces verò quæ laxæ & spongiosæ sunt, pituitosos humores facilius recipiunt.

Denique ex anni tempore humoris peccantis diagnofia delumi potest. Angina enim biliofa maxime æfiat, & ætumno proueniunt, quod in ællate bilis generatur, & in ætumno retinetur. Pituitofa uero hyeme & uere fiunt, propterea quod hyeme maximus fit pituitæ prouentus, tum ætate uere: quia collecti humores in hyeme, tunc temporis liquantur, & a capite in partes fubiectas decumbunt.

Quod ad prognosim attinet, angina vera morbus est acutissimus & valde periculosus, propter respirationem impeditam, & inflammationem, quæ non raro contingit à constrictione meatus per quem fit respiratio. Ideo quo maior fit constrictione, eo magis periculum; & sic prima species anginæ omnium periculossima est, quia inflammationi musculorum interiorum laryngis meatum magis præcludit. Vnde Hipp. ap. Gal. §. felf. i. loquitur. Σ φεβερὰ καὶ ἐνὶ τῷ σφαιρατέῳ ἵππερ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ ἐμφανέστερον ἐξιστάται ἐλπίδι. Quam leuiter enim conuenit in Cœcæ, & pinguiculis, bulgumque animas eadem die & x. & z. q. & z. q. & z. q.

Secunda species angine, licet admodum periculosa sit, paulo minus tamen lethalis est, quam prima; quia inflammatio musculorum exteriorum laryngis, tantam tamque ubi cum confectum non facit. De hac loquutus est Hipp. 3 *progn. text.* 17, his verbis: *Quicumque vero (id est angine) dixerit aliquis alteri finem inferunt, in faucibus vero tumorem & roborem extantem, tunc quidem lethalis (est), praecedentibus vero distinctum. O robur quid meretur.*

Tertia species minus periculosa est, quia in ea minus lædatur respiratio quam deglutitio ab inflammatione musculorum faucium interuenientia. Læsa autem deglutitio non ita periculosa est. De hac enim loquitur Hippoc^{us} ante citate, textu 18 bis verbis: *Si quibus vero fauces videntur et ceruix, be distrahuntur sunt, maxime vero eis feruunt, si ceruix ac pedibus ita trahi videntur, nec facilius ulla interuoluit.*

Quarta denique angina species, omnium leuissima est, & securissimaque inflammatio longitius gutture abest; hinc Hipp. Aph. 3, § 6. sic loquitur, Angina correptis si sumit in collo apparet, bonumque est, si enim vertitur morbus. Idem confirmat 3. prae. sect. 10 his verbis, Si vertitur vero si sumit, tunc est quamvis sine fovea detur.

Has omnes differentias unica sententiâ complexus esse visus est Hipp. 6. Epid. sect. 7 ubi de signis anginae Epidemicæ loquens, hæc habet. *In summa, qui solum deglutire non poterat his valde mites et tolerari faciles erant quædam vero has, quibus nimis spiritus subtilis erat.*

Si angine materiz in pulmonem transferatur, vel moriuntur ægri, vel in desipientiam aguntur, vel etypyci sunt, vt docet Hipp. Aph. 10. lib. 5. c. 3. prægn.

In angina valde virgente, si spuma circa os apparet, lethale est, ex Aph. 4. fecit. s. lumina enim cordis angustiam significat, seruo etemque intensissimum, a quo propria pulmonis humiditas exprimitur, & sibi ipsius formam in os transfertur.

Angina laborantes, nisi celeriter cocta expuant, sed pan-
ca-vilicida, crassa sputa reddant, male & lethaliter habent.
Hinc in Casus.

Tumores trachium in angina, sine viâ ratione repont euanefcentes, Jethales sunt, Hippocr. *Conca*. Sine viâ ratione, est, sine præcedente euacuatione per artem, vel crismâ, id est, significant enim materiem ad interiora recessus, vnde periculiosior morbus in partibus internis excitari potest: vel quod inter dum accidit, materia ad eandem partem iterum delata subito suffocationem inducit.

Angine cutatio ipſem indicationibus perficitur, quæ in omnium inflammationum curationibus obſervari conſuevit. Sicque humor ad partem confluens recollendus & repellendus eſt, qui iam fluxit, derivandus & reſolvendus, quod ſi reſolvi nequeat, conſequendus & ſuppurandus, quæ omnia ſequentibus præſidijs perfici poterunt.

Primo vitiata ratio inflicturn tenuissimam refrigerantem, & humectantem ex cremore hordii, iussus puluerum, aut capionum, herbis refrigerantibus alacris, & alijs huiusmodi. Si ophiophagi angustiam ab inflammatione contractam eger deficiat aequat, vt inde virium defectio & interitus metuitur: ab eo periculo liberari poterit immixto in ophiophagum cathetere, qui ftyngia abrasur per quam iussum in ventrem unum immitti poterit. Praeclari diuines nutritientes viurpant, quibus aliquid nutrimenti ad hepatis per venas melancolicas transferri potest. Potus fit aqua hordii, & reliqua in febribus acutis obferuari solita. Aer fit temperatus, & omnis illius excessus aueretur; frigidior sanguis mensus conftringit, calidior vero flauitern & inflammationem auget. Aer capite sublimi, & creta ceruce decumbat, vt facilius respiret somnus, vt in omnibus interius inflammationibus maxime ardens effluat vt docet Hipp. angustiam in fomo ad interiora recurrit, sique humorum confluxus ad partem afflicta augetur.

[illegible]

Si morbus non vehementer exacerbat, venæ sectioni præmittatur clyster laxans fin minus, & à venæ sectione injiciatur.

Quum iteratur phlebotomia eadem die, alie reuulſiones
fiunt per cucurbitulas, tum ſiecas, tum ſcarificatas ſcapulis
& lumbis ad moras, trictiones partium extremarum, & liga-
turas dolor ſiecas.

Detrahto sufficienter sanguine, ad purgationem venien-
dum est, quæ sequenti die viurpanda, non expectata humo-
rum

tum coitione, quia morbus non dat inducias; idque potione purgante, humori peccanti accommodato. Imo verò, si morbus admodum urgeat: vena lectio & purgatio eadem die celebranda est, vt le facillè refert. *Trallianus lib. 4. cap. 1. his verbis. Ego sane memini me cum vix valde viret, & vena manu epe suffraganeas vena lingua subiectas fecisse, & vespere cremitre ptyana extraxim. Scammonia extraxisse, quæ ita laqueum ex inflammatione obortum, vix potuisse dissolvere. Imo aliam quendam nos, me, postquam brachiorum dorsum vena in cubito secussim, vespere effluens die non exorta. Imo Potio autem purgans ex blandioribus esse debet, si a bile morbus originem duxerit, ne vehementius commoti humores ad partem affectam irruant. Tum etiam si sanguine lyncro producatur inflammatio, iofanius est a purgatione prius abstinere. Si verò pituitosa cacochymia concurrat, ad fortiora confugiendum; & cum lenia agari-cus & diaphenicum prædicti potell. Imò verò ad ea medicamenta, quæ vocantur excitantia, etiam satis vehementia, transgredere licet in angina pituitosa; & inter reliqua palma in obiecto in hoc casu aqua benedicta, quæ ad 3-j exhibita, miranda præstat, & morbum vltimum intra duas horas dissoluit. Adde quod nullo ingrato sapore prædita, facillè pituitum ingenti potell, quod in alijs medicamentis fieri non potell, quæ propter saporis ingratum rem non possunt, nisi vno humilitate ab agitris fortiori: ideo vltimum anginosi purgari nequeunt, donec ne etiam angulitia maiori parte sublata sit. Sed frequentibus clysteribus, purgandi indicationi aliquo modo satisfic. Atque ita quibus aqua benedicta non conuenit, propter inflammationis naturam, vel agri imbecillitatem (vires siquidem robulle in huius remedij via necessaria sunt) neque alia medicamenta exhiberi possunt; frequentibus clysteribus alius subducenda est, quæ satis acris, vt resulsio humorum ad inferiora fiat.*

Ad eandem resulsionem cucurbitula scarificata ceruici & capulis admoce, & frictions & ligaturæ partium inferiorum, & lotiones pedum ex aqua calida, plurimum conferre solent.

At potentius reuellit humores a capite defluentes vesicatoria posteriori parti ceruicis admotum; quod statim ab initio post sanguinis missionem admoendum est.

Resulsionibus sufficiens ac diligenter administratis, ad denudata veniendum est, quæ humores partu impactum euacuant: ac primum ramularum, seu venarum sub lingua apertio ab Hipp. Gal. & rectoribus commendatur quæ, sanguis inflammationem immediate efficiens educitur.

Antiqui in angina desperata vena singulas apertiebant; quod remedium, licet a rectorum plurimum esse etiam comprobatum, nostris licet temporibus obsoleuit, quod periculosum censetur, ob sanguinis fluxum, qui difficillè cohiberi potell, propter venarum amplitudinem. Vtrum experientia doceat, non ita periculosam esse hanc operationem, si debite administretur. Primum enim caput agrotantis ad latum in-erectum debet: quantum fieri potell, vt nouum humerum ferat attingat: mox vena apertenda sine ligatura angulo foramine, secundum illius longitudinem, sic enim facillè coalescit; & extracta sanguinis quantitate sufficiens, caput reclinendo ad situm naturalem, sanguis plerumque sponte cohibetur. At tamen vulnere statim admoendum est emplastrum a Gal. descriptum 5. *meth. cap. 4. c.* pilis leporinis, aloë, thure, & albumine oui confectum, siquæ fluxus sanguinis certò cohibetur. Refert Trallianus lib. 4. cap. 1. plures anginosos venarum jugularium apertione le curatos esse & Zacutus Lusitanus *obseruationes lib. 1. Præc. admir. refert* historem euulsum Hispani, qui huius auxilij beneficio, ab acutissima angina liberatus est.

Ad deuotionem etiam plurimum confert cucurbitula sub mento scarificata, cuius ope curatum fuisse mulierem angina caua laborantem, refert Zacutus Lusitanus *ob. lib. 1. Præc. admiranda.*

Non minoris efficacie sunt scarificationes sub maxillis & supra collum, autioribus plagis insculpe, quarum beneficio scribit Beniuensis lib. de *aditis morbis cap. 38.* Nicolaum Rotam a deplorata angina liberatum fuisse, cuius integram historiam transcripsit Scennerus *Præc. Ad. lib. 2. p. 14. 24.*

Dum prædicta remedia vlturpantur, topicis remedijs inflammato gutturi & faucium oppugnanda est, quæ varianda iuxta varietatem temporum, vt in alijs inflammationibusque in principio conuenienter repellentia, ad gargari-natas formam redacta, vt partem inflammatam immunde diatè attingere valeant.

1. Aquæ plantag. folani & caprifolijs an 3-ij. succi granato-ri 3-ij. diamori 3-ij. falis prunellæ 3-ij. Fiat gargari-na. Vel ex decocto in hunc modum.

2. Fol. plantag. acetosæ & summit rubian. M. 3. granor. fu-mach 3-6. meli granatù cñ cortice & granis contum. n. 1. rofar. rubr. P. 3. Fiat decocto ad 3-ij. In colatura dissolue dia-nor. & dianucan. 3-ij. falis prunellæ 3-ij. Fiat gargari-ma.

De gargari-natis hoc notandum, ea suspecta esse posse, quia gargari-zando partes inflammatæ commouentur, quæ quæte indigent. Sed hoc incommodum vitari potell, si gar-gari-nata in ore detineantur resupino corpore, extra viliam agitationem, vt partem affectam contingant.

Sine gargari-zatione vlturpari possunt spiritus acidi falis, sulphuris, aut vitrioli, qui aqua temperati vt eorum acida ferri valeat, paulatim forbendi sunt. Transicendum enim per partem affectam illius inflammationem temperant, & a ventriculo ad hepæ & venas transiit, sanguinis feruorem coercet. Quod remedium in faucium & consilium in-flammationibus esse etiam efficax.

Dum gargari-zando repellentia vlturpantur, lavantia & resolutiva linimenta exterius ceruici admoenda sunt, vt materia morbifica exterius euocetur, quæ in hunc mo-dum pari poterunt.

3. Olei chamomillæ & amygdal. dat. ana 5-3. axon-gie gallinæ & butyri recentis ana 5-3. croci 3-3. Fiat lini-mentum ceruici admoendum cum lana succida.

Hoc linimentum dolori leniendo etiam conferre poterit, qui si vehementer urgeat, demulcent vltimus poterit gar-gari-nate ex lacte parato, vel emulsione quatuor sem frigido-rior. maior vel mucilagibus liquidis ex sem. pilyli & cy-donior. cum aqua rolarum extractis, addito syrupo viola-ceo, vel diluto caffèz cum fero lactis, aut decocto thæcis at-thæz parato.

Transacto morbi principio, eoque ad augmentum & statu-m progrediente, in gargari-natas digerentia & resolu-tiva repellentibus admoenda sunt, quod secundo statim de faciendo, quia morbus acutissimus est.

4. Fol. hyssopi & plantag. ana M. liquiritiæ rase & passu-lar. mundat. an 3-3. carianum ping. an. xij. rofar. rubr. & hor-dei integri, an. P. 3. Fiat decocto ad 3-ij. In colatura dissolue melis rolar. & syrupo violac. an 3-3. Fiat gargari-na.

Nota, quædam viger inflammatio, resolutibus & ad-stringentibus aliquid repellentium semper esse admo-en-dum, ne pars sua natura mollis & laxa magis relaxetur, & fluxioni recipiende magis idonea reddatur.

Exterius verò magis resolutiva admoenda sunt, addito etiam nudo hirundinum, quem specifica proprietate huic afflicto conferre, omnino practico-rem edentium tantum est.

5. Pulueris nidi hirundinum, & stercoris canis iuuenio-macerati, ana 3-3. rad. res. Florent. & flor. chamom. puluerati ana 3-3. axungie gallinæ & olei illior. ana 3-3. cæz fæuz pa-rum fiat linimentum.

Vel forma cataplasmatis in hunc modum cõponi poterit.

6. Nidum hirund. 1. tol. maluz violac. an. M. 3. rad. althæe & lilior. ana 3-3. ficum ping. par. vi. flor. chamom. & melio-li. ana P. 3. Coquantur, & contendantur; deinde adde farinæ hordealem lim. & fonsug. ana 3-ij. croci 3-3. butyri recentis 3-3. olei chamom. & amygdal. dulc. ana q. l. Fiat cataplasma anteriori colli parti admoendum.

In erim etiam elegnata per intervalla vlturpanda, vt materia quæ a parte affecta exudat, vel a capite defluens ipsi adhære sit, semim obstergetur.

7. Pulv. elect. diacraganth. frig. 5-ij. diareos simpli 3-ij. f. chari candi & pendaci. ana 3-3. diamor. 3-3. syrupo iumb. q. l. Fiat iocch.

Si tumor discuti nequeat, & ad suppurationem vergat, quod plerumque quarto, vel quinto die solet accidere, ea admo-nuitur cataplasmate perficito, alijsq; emollientibus & suppurationibus. Simulque in ore frequenter erunt detinen-

Nimia linguae humiditas balbutiem efficit, qua affecti literarum R pronuntiare nequeunt; etque vel nativa est, ut si pueri, qui ob nimiam humiditatem hoc affectu laborant, ab eo quæ libera sit ætatis progressu, quo superflua illa humoris absumitur. In quibusdani vero intemperies humida tota vita pericratur, & illi perpetuo balbutiuntur, ut quibus agnus Hipp. Aph. 3. 1. sect. 1. his verbis *Balbutiuntur quibus duntaxat maxime caputur*. Gal. in comm. de nat. h. natura balbutiunt, quia cerebrum habere humiditatem aut naturalem, aut vitiosam, & a cerebro humido multas profluere linguas, quas in ventrem delabi par est, unde alio profluunt. Lingua vero admodum humida natura existeret, & ventriculorum tale esse par est, (ut qui alteram tantam communem habent cum lingua,) imbecillique ex humiditate. Ventriculi autem humidi propria passio est diuturnum profluuium.

Attamen Auenienna propofuit doctrinæ adferari videtur, dicens *Fen. 1. lib. 3. tract. 4. c. 18* balbos esse maxime dispostos ad melancholiam, cum rariem melancholia a frigore cerebri intra imperie procedat. Conclitatur tamen illa contrarietas, dicendo, per balbos, seu traulos Aueniennam intelligere, non balbos propriè dictos, qui literarum R pronuntiare nequeunt; sed eos qui linguae hæzicantia laborant, quos eandem syllabam nulli octies repetunt, antequam dicendum proferant hæc enim lingua hæzita est, ex calido & sicco cerebri temperamento oritur, in quo adeo promptè sunt cogitationes, ut linguam præterant, eiusque motum præcipitem, unde conturbatio ipsius atque hæzitantia exoritur. Prædicta autem balbuties a naturæ contraria incurabilis est.

In quibusdam vero balbuties accidentaria contingit a catarrhis, & copioso humoris pituitosi deluxu in fauces, & linguam, quæ euacuatione, ressolutione, & deriuatione humoris influentis, tum etiam capitis roboratione, & exsiccatione curatur. Cum autem remediis propofitis indicationes conueniant adimplenda, paralyti lingue iam delictibende conueniant, ex illius curatione erunt repetenda.

Ad linguam deferuntur duo neruorum paria, tertium, videlicet ad gustandi & sentiendi actionem exercendam; & septimum ad loquelam, & linguam variis modis mouentiam. Ex horum igitur neruorum, qui a septimo pari oriuntur, obliuiscuntur, & relaxatione paralyfis lingue procedit, quæ est priuatio, aut immutatio motus illius partis. Ea quæ succedere consequitur frequenter apoplexie, cerebri ipso secundum posteriorem partem humore pituitoso imbibito; & tunc alia quoque partes, & plerumque dimidia corporis pars, paralyti tentantur. Interdum tamen solitaria est, neruis tantum, aut muscularis linguam mouentibus, humore pituitoso imbibitis, & repletis. Ex præfatione etiam totum neruorum lingue paralyfis generari potest, cuius rei exemplum habetur apud Auic. *Fen. 6. lib. 3. tract. 1. cap. 12*, his verbis *Quidam homo iam ventosus fuit, & per caput effudit scilicet villas nerui in subfartia paniculis conuulsi cum lingua, quare mollificata est lingua*. Has autem cucurbitulas, in ceruice, & iuxta occiput admodum huius conueniendum est; cum enim nerui linguam mouentes a principio spinalis medullæ oriuntur, quæ est in occipito, ex profundiori scarificatione cucurbitularum illius rami præfationem contingit certissimum est.

Quamuis autem materia hunc affectum producat, pituitosa sit: interdum tamen crassior & frigidiore, interdum tenuior, & calidior esse consequitur pro ratione humorum in corpore predominantium, quorum diagnosi proponitur ab Auenienna *Fen. 6. lib. 3. tract. 1. cap. 6*, his verbis: *Et quandoque significat quod materia sit sanguinea, rubedo lin-*

gue, & caliditas eius. Et quandoque significat quod materia sit pituitosa, & aquosa. Multitudo corpus saluæ aquosæ, & panctus numerus ex ressolutione, & sanamentum ab eo, in quo est stypticitas.

Affectus iste, si a cerebri vitio dependet, & apoplexie sit coniectarius, ita ut alia quoque partes afficiantur, raro curationem recipit. præsertim si æger arate prodectione luerit: si vero simplex & solitarius fuerit, curationem recipit, idque nullo iacius, si æger in ætate florente consuetus fuerit.

Curatio Paralyfis lingue perficitur sublatione causæ antecedentis, humoris scilicet in cerebro redundantis; & discussionis ac resolutionis causæ coniunctæ, humoris scilicet neruis linguam inuenientibus impacti & imbibiti.

Causa antecedens eliminabitur ut remedium, quæ in frigide cerebri intemperie; curatione propofita sunt.

Ac primum purgatio inuenietur potius, aut pilulis dicto loco propofitis. Mox si languis redundare, & affectus causa principalis, vel aduocans esse videatur, detrabendus est ea quantitate, quæ vitibus & ætati conueniat. Polissimum apozema cephalicum exhibendum. Et si affectus communis esse videatur, ad dietam sudorificam transeundum est; quorum omnium formulæ dicto loco propofite sunt.

Potius vniuersales euacuationes, ad materie morbificæ deriuationem deueniendum est, per cucurbitulas & vesicatoria posteriori parti admoda; tum etiam cauterium occipitis multum. Auenienna cucurbitulam sub mento affigit, quod etiam a recentioribus præbatur.

Vena etiam sub lingua vultus aperitur, præmissis euacuationibus vniuersalibus ad deriuationem humoris muscularis lingue imbibiti.

Ad discutiendum vero, & extrahendum eundem humorem, gargarisma sequens frequenter vsurpabitur.

℞. Rad. iros Flor. 3. ss. fol. origani, saluæ, flor. chamæ. ros. limar. ana M. ss. cubebam 3. ii. iquirinæ 3. i. Coquantur in aqua partibus aquæ & vini albi sub finem additi ad 1/2. Ita colatura dissolue oxy-melitis scilicet 3. ii. Fiat gargarisma, quod si non lata efficaciter operetur, addi poterit decocto radix pyrethri ad 3. ss. vel iij. vel etiam semen sinapi pari quantitate. Ad di etiam potest calorem, nisi ægro nimium ingratum videatur.

Ad eundem vltim potest frequenter lingua confricari oxy-melitis scilicet solo, cui etiam semen sinapi addi poterit.

Succus saluæ ad linguam paralyticam multum commendatur, si eo lingua frequenter contineatur; cui etiam sicut in præcedenti sinapi addi poterit.

Pilule etiam sequentes supra linguam frequenter detinentur in eundem finem.

℞. Succ. betonicæ & liquoris, ana 3. ss. castorei, & asæ foetide, ana 3. ss. nucis molchate, & spica nardi ana 3. i. Incorporentur cum melle, & fiant formulæ instar lupinorum.

Hic etiam conferre poterunt gargarismata, masticatoria & certhine in frigide cerebri intemperie; curatione propofita.

Ad cerebrum vero roborandum, & humoris pituitosi in eo contenti reliquias discutendas, conuenient iustius, puluis capillis inaspergendus, & cucurbitula dicto loco propofita.

Ac denique, ad nouum pituitæ prouentum, quem cerebri intemperies, etiam potius vniuersales & particulares euacuationes solent efficere, vltima remedia præscribenda; nempe tyropus magistralis, aut pilule viles, quibus opiata roborans adiungenda est eorumque remediis delictipio a prædicta curatione desum potest.



PRAXEOS MEDICÆ

LIBER SEXTVS.

De affectibus dentium, gingivarum, faucium, vuvula, & laryngis.

PRAEFATIO.



PArtes in ore & faucibus contenta variis affectibus patiuntur, quorum praecipuos tantum describere animus est. & reliquos minoris momenti, quae a solo Chirurgo vix plurimum curari consueverunt, consilio praetermittere. Hic igitur liber septem concluditur capitulis. Primum erit de aul. re dentium. Secundum de dentium ingreditur, & erosione. Tertium gingivarum erosione, & excoriatione. Quartum de fluxu sanguinis ex gingivis. Quintum de oris & faucium ulceribus. Sextum de vuvula relaxatione. Septimum de angina.

CAPVT PRIMVM.

De dolore Dentium.

Dentes non solum secundum nervos eorum radicibus insertos, & membranis, dentis cavitate intus succingentem; sed etiam in propria substantia sentire docuit Galenus s. de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 8. & 16 de usu partium cap. 2. ubi dicit, dentes & ceteras oris particulas, una cum lingua, sapores percipere. Tum etiam lib. de ossibus, s. inquit, ex ossibus dentes tantummodo mollium cerebri nervorum esse participes, ob idque solos manifeste sentire. Dolor igitur non solum nervulis & membranis interioribus, sed etiam ipsi dentium substantia contigit.

Fit autem dolor dentium ab humorum influxu, qui vel frigidi & pituitosi sunt, & lerofalsi & acres, unde particularum diatarum distensio aut vellicatio contingit. Illi autem humores, vel in maxillarum, & dentium alveolorum membranas conflant, vel in nervulorum radici dentis inferunt; vel in ipsam dentis substantiam. Quamvis enim multi existant, dentes humorum affluxum ac distensionem in propria substantia recipere non possent, cum sint corpora densissima & durissima; id tamen docetur ab Aulicenna Fen. lib. 3. doctrina 1. cap. 5. & Fen. 7 lib. 4. tra. 1. cap. 4. Et quandoque, inquit, est materia apostemata dentem ipsum. Quam sententiam confirmat, ac perspicue dilatat Fen. lib. 3. tra. 3. cap. 1. his verbis. Non animus est quomodo modum quidam existimant medicorum, quod cerebrum ipsum non apostemat, sic rasciantes. Nam quod lenis est sicut cerebrum, & durum, sicut ossis extenditur, & quod non extenditur, non apostemat. Hic autem sermo est erronius, & illud ideo, quoniam lenis viscosum extenditur, & ossa etiam apostemat, & Galalud confusus est, & nos monstravimus sermone in capitulo dentium. Imo dicimus quod omne quod nutritur, extenditur, & augmentatur cum nutrimento. & semeliter est possibile, quod extendatur & augmentetur cum superfluitate, & illud est apostema. Hoc vero docet Aulicenna ex Galeni sententia, qui lib. 5. de compositione med. sec. loc. 8. Cum, inquit, impossibile sit dentes incrementum accipere extra nutrimentum, omnino duobus affectionibus, & his contrariis obnoxii erunt inopia videlicet, & redundantia alimentis, quod eis suspeditur. Inopia igitur aridiores & maciores, alimentumque non sentientes, & ob id temerose eos redentes: redundantia vero confusum in eis affectionem excitare potest, qualis est circa carnosas partes inflammatio. Hæc Galenus. Verisimile tamen est dolorem frequentius fieri (si modo ille valde intensus fuerit) in partibus illis et quicquid sensu donatis; nervulo nimirum & membrana alveolum siccæ n-

genre, dentiumque radices proxime ambiente. Quæ ab humoribus influentibus, non solum distensionem ac vellicationem, sed etiam interdum inflammationem patiuntur: si nempe sanguis cum aliis humoribus admisceatur: tunc enim dolor à duplici causa exoritur, distensione videlicet, & compressione, quæ fit à dentis duritie, quam ferre non potest sine dolore, membrana inflammata. Hanc autem membranae inflammationem comitatur vix plurimum gingivæ inflammatio, quæ ideo à Gal. & Aulic. inter causas doloris dentium recentior.

Fluant autem humores in dentes & partes adiacentes vix plurimum à capite: interdum tamen à partibus inferioribus promanant. Cum enim vixiosi aliqui humores præcipue lerofii in parte aliqua genitibus venis cumulantur, natura illorum onus excutere tentant, ad partes debiliores eos præcipitat. Et si dentes propter intemperiem, cariem, aut erosionem tales extiterint, ad eos præsertim fluxio decumbit. Huius rei experimentum proponit Carolus Piso (qui etiam existimat dolorem dentium à lerofio humore vix plurimum fieri) lib. de morbis ab illius lerofia ob. 7. vt relect. se ipsum dolore dentium per multos dies afflicto, ab assumpto medicamento purgante, post sequehoram, sinceram aquam ad th. & amplius evomuisse, tanto successu, vt postea vel decem annis ab huiusmodi dolore immunis profusus fuerit. Quo edoctus experimento simili affectu laborantibus, medicamenta lerofos humores educantia præcipit spici succedat. Præter hæc affectum à tali causa vix plurimum dependere, hoc signo probare nititur, quod assidua salvatio doloris dentium comes fere perpetua esse solet.

Præter causas enumeratas, vermes in dentibus cariosis geniti, doloris dentium causa esse possunt: itaque producuntur ex quolibet materia in illis causatibus recentia & putrefacta, siue ex crementis in situ siue ex alimentis putredini obnoxii, caribus præsertim & dulcioribus, quæ propter lentorem cautatibus dentium adhærescunt.

Nonnulli etiam existimant, dolorem dentium interdum fieri à spiritu staculento intra dentis ciuitatem, & nervulum includo, ac membranam interiorem violenter diuellens; unde dolor atrocissimus, ac penè intolerabilis excitari solet.

Causæ externæ & procatartice dolorem dentium producentes, sunt illæ omnes, quæ humorum fluxiones promovere solent, quarum præcipue sunt, aer frigidus, vel austrius, mora in sole ardente, aut in acre nocturno, crapula; omnes denique errores in victus ratione commissi. His adde easque partem debilitare, & fluxioni recipiende magis idoneam reddere valent, qualis est præsertim caries & perforatio dentis, per pertinaces non raro dentium dolores efficere consuevit.

Caularum diversitas variis signis dignoscitur. A calidis enim humoribus dolor oriundus intensior multo est, temperamentum calidius, etas florens, tempus æstivum, caliditatis sensus in parte percipitur, & sæpe gingivarum inflammatio contingit. A frigidis remediis iuvatur, leduntur autem à calidis. Si vero à frigido humor dolor oriatur, signa prædictis contraria apparere solent.

Si veritas causa doloris extiterit, dolor erit interpolatus, exiguis intervallis desinens ac rediens; tum motus verius parte aliquando percipitur.

A spiritu staculoso dolorem produci testatur illius atrocitas, & diuulsio sensus, qui in parte percipitur, quic exiguotempore desinit, ac difficilioribus remediis parti admotis faciliè curatur.

Pro:

Prognosis varia est pro causarum varietate. Dolor enim qui ab humore calido, tenui & secro acti & latio proceditur vehementior quidem est, sed citius desinit, ob humorem illius subitâ mutationem. Qui vero ab humore frigido & pituitoso excitatur, autior est, sed malò diuturnior.

Tumor in gingivis aut maxillis obortus, doloris dentium solutionem efficit, translatâ fluxione ad partes exteriores: ita ut, non amplius ad internam dentis causam referri debeat.

Curatio ad doloris causam auferendam, & ipsum dolorem mitigandum, dirigenda est. Licet enim anodynâ parum profint nisi fluxio auferatur: ita tamen non raro vrgit ut non solum anodynis propriè dictis, sed etiam interdum narcoticis ante causæ ablationem demulcendus sit Humor igitur qui ad dentes confluxit, repellentibus, evacuantibus & repellendis est: qui verò iam influxit, deriuandus & discutendus.

Primo igitur, si dolor ab humoribus calidis oriatur, venæ sectio celebranda est: brachio eundem lateris quæ illos humor plurimum reuoluit. Si vero dolor à frigida humoribus excitetur, manus venæ sectio conuenit, ratione tamen fluxionis etiam vlturpi poterit, cum inter reuolentia remedia principem locum teneat. Sed minor copia tunc temporis sanguis detrahendus, nisi plethorâ sit, liberalis venæ sectio influenda, iuxta præceptum Galeni, qui largam sanguinis detractionem plenitudinem respondentem, omnium dolorum promptissimum esse remedium asseruit; quod nos frequentissima experientia, tum in aliis doloribus tum præcipue in dolore dentium, verissimum esse comprobamus.

Sequenti die purgans medicamentum exhibeatur, humor peccanti accommodatum in forma, vel poronis, si humor peccans calidus extiterit, vel pilularum si frigidus, & pituitosis humor doloris causa fuerit.

Potissimum, periculi a dolore, emicubituræ lespulis cum sensificatione applicentur: vel cucurbitula magna inter scapulas sine scarificatione affigatur. Vescicatorum postremo parti ceruicis, vel ponè aure admodum, humores fluentes potissimè retrahit ad postiora.

Ad fluxionem etiam inhibendam, alstringentia temporibus vtiliter applicantur: qualia sunt emplastra ex gummi elemi, vel malthice sola, supra pannum sericum liquata, cum pulillo æneo calefacto, emplastrum de malthice officinatum, vel contra rupturam; vel tale in rem præsentem præscribitur.

Thuris, hypocistidani, ana 3*ss*. siccis, malthices ana 3*ss* op*ss* 3*ss*. olei lentuli q*l*. fiat massa emplastrum. Radix consolide maioris recens, costula & admoda temporis in formam emplastrum, fluxionem efficaciter intercipit.

Fir etiam emplastrum ex puluere aluminis & gallarum cum pice subactò, officinissimum.

Raueries Henrici magni Archiatris emplastrum sequens pro secreto habebat.

Nucum cupressi, rosar. rubr. feminis nasturti torrefactis malthices, terzæ sigillatæ, an 3*ss*. 3*ss*. Macerentur in aceto rosaceo per horas 24. postea fiantur, & adde op*ss* in aqua vitæ dissoluti 3*ss*. picis naualis, colophoniae ana 3*ss*. ceræ illæ in oleis expressis, nemum hyocyami, & papaueris alibiquatæ q*l*. fiat emplastrum, quod applicetur artens, vel etiam loco dolenti.

In aures quoque immittuntur medicamenta ad dolores dentium, quia venule, per quas fertur alimentum ad dentes, per illas partes excurrunt. Ideo misceatur oleum amygdalar. amar. in aurem vicinam denti dolenti, aut excipitur funis acetis, in quo plûgum aut origanum cocta sint.

Alia acetum in auram infundunt, quo fluxio cohibetur efficacissimè, & in fluxione calida præcipue confert.

In frigida vero fluxione, succus alii cum theriaca mixtus & in aurem tepidè infunditur, mirum in modum dolorem compescit. Idem præstat albulbus detractò cortice in formam lippostorij icillius, & in aurem intrusus.

Additæ etiam auri ipsi parti dolenti admoventur, in fluxionis principio, eaque refrigerantia si materia calida sit frigida verò existente, calida cum repellentibus sunt per-

missenda. In qualibet autem causa, si dolor vehemens fuerit, anodyna repellentibus erunt adiungenda. Materia vero huiusmodi visibus idonea talia esse poterit.

Rad. bullator. peritaphylli, tormentillæ ana 3*ss*. fol. verbenæ, plantag. & tapti basmati, ana M*ss*. nucum cupressi, gallarum & cal. cum glandum man. 3*ss*. fantali rubri, & crystalliorum ana 3*ss*. rosatum rubr. & balsamiorum ana P*ss*. fiat decoctio in vino hyptico, & aceto, qua ablatur pars dolens tepidè, frequenter. Hæc in fluxione calida viurpi poterit ab initio, in frigida vero adde poterunt radix cyperi cortex buxi, solas hæc de & similia.

Simplex medicamentum componitur ex aqua plantag. & rosar. cum aceti tantillo ac lotionem excreat.

Vel gaili decoquatur in aceto, quo abluantur dentes. Vel Rad. pentaph. li 3*ss*. fol. iulicis M*ss*. 3*ss*. gallarum 3*ss*. fiat decoctio in vino hyptico, qua collatur os. Hæc decoctio tilat fluxionem, & dolorem fedat.

Potissimum ea viurpanda erunt remedia, quæ dolorem fodant, cuiusque causam ciliant, quorum maxima apud aethiopes, o & apud vulgus numerus habetur. Nos efficaciora hæc proponimus; ex quibus eo iudicio delectus habendus est, ut que non solum resoluunt & discutunt, sed etiam fluxionem cohibent, alstringentium admixtione, in principio & augmento magis viurpentur; quæ vero tantum discutunt, in statu & declinatione.

Succi temperati & solani, ana 3*ss*. lactis vaccini, aut ouili 3*ss*. vini olei rosacei, op*ss* 3*ss*. 3*ss*. op*ss*. croci, an. gr. in. Nicotianæ, & linteæ excipis liquor maxillæ dentis dolentis tepidè applicetur frequenter.

Medallæ positorum dulcium coctorum 3*ss*. ii. furfuris acetò macerati 3*ss*. olei rosacei, op*ss* 3*ss*. 3*ss*. op*ss*. gr. i. Maltæ, fiat cataplasma parti dolenti applicandum.

Farinæ hordei & fabarum ana 3*ss*. olei rosati completi & amygdalar. dulc. an 3*ss*. 3*ss*. succi feniperui maioris 3*ss*. 3*ss*. lactis q*l*. fiat cataplasma parti dolenti applicandum tepidè frequenter.

Albumina ouum nonnisi Agitentur aqua rosacea, & excipiantur itupis canabibus, quæ aspergantur pipens puluerati 3*ss*. & parti dolenti applicentur, ut totam genæ sedem comprehendant.

Hæc tamen sedulo aduertendum, ne alstringentia maxillis applicentur, si tumor cas occupet, periculum enim est, ne humor ad fauces repellatur, & rumque suffocet. Cuius rei exemplum proponit Valerius de Taranta, cuiusdam medicodolore & et itum laborantis, cum maxillæ inflammatione, qui oleum rosaceum cum aceto admouit, unde incidit in anginam, & mortuus est.

Aliæ oris collutiones in morbi decursu parari poterunt in hunc modum.

Vini albi generosi 3*ss*. iv. radices hyoscyami albi 3*ss*. Bulliant ad consumptionem tertis partis. Colaturæ adde aceti 3*ss*. vernicis 3*ss*. iterumque bulliant vnica ebullitione. Colatura ablatur os frequenter.

Decoctum verbenæ simplex ad eundem vsum a quam plurimum commendatur.

Laudatur etiam decoctum guaiaci in aqua, vel vino paratum, cui sal interdum permisceri poterit. Vel

Fol. perfariz terzæ & coriæ rad. hyoscyami, ana partes æquales. Coquantur in aceto rosaceo, & hoc decoctum collatur os. Et si causa calida dolori producat, radix hyoscyami sola in aceto decoqui poterit.

Si perfariz acronomia offendat, illius quantitas minuenda est. Imo penitus omitti potest in fluxione a causa calida, & in illius loco iuberetur perfariz maculata, quæ refrigerandi & alstringendi facultate prædita est, cuiusque succus, aut decoctum ad omnes fluxiones acres & biliosas coerendas, per os tuto exhiberi possit. Folia etiam hyoscyami loco radices viurpi possunt.

Quidem totius hyoscyami, & perfariz maculata pro remedio magnetico videntur, eaque decoquantur in aceto, cocta comburant igne luculentos dentes aceto ablunt, & dolor emaneſcere ainit, quamprimum folia combusta sunt. Ego vero effectum aceto tribuere malim quo dentes abluntur.

In prædictis decoctis, si aceti acrimonia tanta sit, ut eam æger difficile ferre valeat, ex æquis partibus vini & aceti parari poterunt; imò verò in causa frigida vinum solum virescabitur.

Amatus Lusitanus sandaracham valde laudat in aceto & vino decoctam, hoc modo.

℞ Sandarachæ ʒ. i. vini & aceti ana lb. ʒ. Coquantur, & colatura calida teneatur die in ore.

Decoctum radices viticæ maioris, cum auxilio nucis moschate & croci in æquis partibus vini & aceti paratum, & calide in ore detentum, humores illapso mirabiliter extrahit. Ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulò post mitigatur.

Radix lapathi acuti, vere, ante germinationem collecta & exsiccata, denti dolenti admodum, specifice proprietate dolorem dentium tollit; quod confirmatur Forelli experimento; quod habetur ʒss. lb. ʒ. vbi etiam dictam radicem recentem in taleas concinam denti dolenti feliciter applicavit in puella quadam; quo etiam remedium in aliis quamplurimis, præcedentibus viucerialibus remediis, se feliciter vsum testatur.

Si corpus rite purgatum fuerit, caput pituita non sit admodum repletum, malicaria circa ad humores à parte affecta extrahendos, erant efficacissima, quæ parantur, vel ex pytho solo dentibus duo præmisso, vel liquore composi poterit.

℞ Malliches, pyrethri, & flaphlagriz ana ʒ. i. ʒ. hvoſcyami ʒ. ʒ. Puluerentur, & misceantur, ex illoque hant globuli in pannolino raro, quos duo mallicet, itrequenter evolvendo.

In vulgari vsu habetur oleum caryophyllorum, quo frustulum gossipii interdentium denti admoventur; & si erosus fuerit, cauo illius inferitur, sique humor parti adherens extrahitur, & illa roboratur.

Oleum camphoræ ad eandem vim mire efficitur. Vel in olei caryophyllorum ʒ. ʒ. solue camphoræ gr. viii. illique eodem modo vires.

Verum præ cæteris commendatur, & miris laudibus effertur oleum buxi, quod si gossipio per stilum excipiat, & in foramen dentis gutta vna, vel altera iniiciatur, illic dolorem tollit. Fit autem hoc oleum, concilio ligno buxi in multas particulas, deinde destillatur per descensum, duobus valis, altero infra terram, altero supra posito, & circa hoc apponitur ignis ex carbonibus validior, & oleum exillat in vas inferius.

Præter voca prædicta, Chymici etiam laudant oleum ligni, quod vocant, Heraclei, seu corylini, eodem modo virescunt.

Si dolor ita vehemens sit, ut prædictis remediis cedere non valeat, ad narcotica veniendum est, quæ sub variis formis à prædictis proponuntur, & denti dolenti admoventur, quorum tamen affectus, non nimis, quam cæterorum admodum incertus est. Verum eadem aliumque dolorem certò consopit. Inter cætera eademum opiatum principalem locum obtinet, quod non solum dolorem sedat, sed etiam fluxionem cohibet, & tuto exhiberi potest post remedia viucerialia ad gr. iij. vel iij. modo à perito artifice præparatum sit.

Topica vero remedia ex narcoticis parata multa circumferuntur. Sequentia duo nobis sint instar omnium.

℞ Opii, mvrthæ, & iadaniæ ana ʒ. i. Puluerentur, & cum vino albo decoquantur in formam linimenti, quod paulo gossipio exceptum denti applicetur.

Alterum est emplastrum Ruerni, Henrici magni Archiatræ supra descriptum.

Si vermes in dente fuerint, amaris enecandi sunt, & inter alia sequens conferte poterit.

℞ Aloes ʒ. i. camphoræ ʒ. ʒ. aquæ vitæ ʒ. ʒ. Misceantur & cum bombace denti admoventur.

Notandum est raro dentes dolere, nisi perforati fuerint, & erosio vique ad causam internam penetret, ac nervum tangat, ideo ut doloris sensus auferatur, nervus audirendus est cautio actuali, vel aqua forti, aut oleo vitrioli in causi dentis immisso, quod si frequenter iteretur, & dens valde corrosus fuerit, in fragmenta sensim rumpitur, & extrahitur.

Si hiis omnibus dolor dentium non cedit, & dens valde exesus fuerit, ferro extrahendus est; eoque extirpato dolor statim cessat, non amplius reuertitur. Cavendum tamen est, ne dens euellatur eo tempore, quo fluxio impetruit, aut caput dolet, aut tumet gingiva, aut dolor atrox sentitur. Ex monendus est Chirurgus, ne violentè & affiatim, vno scilicet iussu dentem euellat, ne violentam extractionem consequatur maxima cerebri commotio, & ossis maxillæ disruptionem, quam sæpe maxime hemorrhagia, febrius & interdentium mors consequitur. Euiusmodi dentes, ea pars à qua extrahendus est digitus vindiquaque comprimat, ut ad naturalem statum redeat; postmodum æger os collisat maxillæ tepido, caueatque ab aere frigido, ne noua fluxio in alios dentes delabatur. Si verò sanguis in tanta copia efflueret, ut vitæ columbæ possit, (quod interdum contingit, etiam sine maxillæ rupture, ex vena, vel arteria discessu, & refert Valerius historiam cuiusdam, qui dente, sine vlla vi & sine ferro, & ferè solis digitis extraxit, sanguinis tñ) vno impetu eiecit, & altero die ferè tantumdem ex arteria gingivæ (supposita) Silius vti plurimum ille sanguinis fluxus, appolito globulo solidiori ex linteo confectio, & digitus per horam vnam, aut alteram compressio. Quod si non succedat, vitriolum vsum admoventum est, & linteum in acetum maceratum superimponendum, idque digito comprimendum, donec cruenta indurata fuerit. Postremum remedium est cautium ignitum, quo sanguis erumpens statim cohibetur.

Si quis metallicus Chirurgi manum refugiat, & aliis remediis sibi dentem extrahi cupiat, ea tentanda sunt, quæ ab authoribus passim proponuntur, & dentis calum promouere celeriter; qualia sunt, pasta ex lacte tichymali, & thuris pulvere simul incorporata cum paulo amylo in cauum dentis immissa; radix renouicæ, cortex radicis moricinis vermium terrestrium, pyrethrum in aceto insiduum, radix cæcumeris ag restis in aceto insula, & similia. Sed præ cæteris efficacissimam vim obtinet ad dentium calum promouendum elleboraster, si eius folio contrito dens confricetur, sed diligenter cauendum est, ne alii dentes hoc remedium tangantur, eorum enim calum etiam promouetur. Quiddam rusticus cum dolorem dentium acerbissimè premeperit, alter vitæ elleborasti dentem confricauit; ille incautè hoc vtens remedium, maiorem partem dentium maxillæ afflicta confricauit, & intra paucas horas omnes propemodum deciderunt. Si quis igitur tamen vehemens remedium experiri cupierit; siue ferit, ut reliquos dentes cetera diligenter obducatur, ita vitæ illi euellendus est, nudus relinquatur, & adioni medicamenti pateat.

Quamuis tumor in maxillis obortus, vt plurimum doloris solutionem afferat, translata materia ad partes exteriores, vt tamen ille cito resoluiatur, quedam remedia virescunt, sunt, cui rei conferret sequens linimentum.

℞ Butyri recentis, & xanixæ gallinæ ana ʒ. i. pulueris trosc Florent. ʒ. i. croci ʒ. ʒ. ol. chamæmel. & amygdal. dulc. ana ʒ. ʒ. Fiat linimentum.

Promptius operatur cataplasma ex ficibus, pane & aceto.

Vitæ confusa maxillæ admodum cito dolorum soluit. Hæc est doloris dentium præsentis curatio. Si autem ille frequenter recurrere consueuerit, ut in multis huic affectui obnoxius contingit, prophylaxis adhibenda est, quæ in eo consistit, ut humorum ad partes istas fluentium generatio impediatur, & dentes ipsi roborentur, ne tam facile fluxionem excipiant. Si igitur ab humoribus calidis affectus producat, eadem curatio adhibenda est, quæ in calida hepatis intemperie & catarrho calido fuit propolita. Si verò à frigido, & pituitoso humoribus ducat originem frigida cerebri intemperie, & catarrhi frigidi curatio virescenda est, dentium verò roboratio ex sequenti capite erit desumenda.

CAPUT II

De dentium ingreditur & erosione.

Dentes non raro nigrum, liuidum, aut flauum colorem contrahunt, ab humoribus vitiosis, illorum superficie

fici adhaerentibus, qui longa mora eos tandem corrodunt, & carie afficiunt: Producentur etiam idem affectus à vaporibus terribiliter exhalantibus, qui ex prauis alimentis ingestis, aut à ventriculi intemperie cibos corruptente exoriantur. Plurimum ad dentes denigrandos confert hydragryum, siue toti corpori admotum, vt in lue venerea contingit, siue facies tantum eo illinatur. Vnde mulieres, quæ lucis ex mercurio videntur, dentes nigros, aut lædo colore infectos habere consueverunt.

Ad curationem, causa antecessa prius auferenda est, & si humores prauis in ventriculo redundantes hinc malo originem dederint, euacuari debent, & partium eos producentium intemperies corrigenda, optimaque victus ratio instituitur, & quæ alimenta eliminanda, quæ dentes corrumpentia sunt, præcipue verò dulcia.

Infinita propemodum ad dentes dealbandos proponuntur remedia apud autores, quæ vniuersique ex petri potest. Nobis vnicum saltem sufficere poterit, quod in instanti dentes dealbat, ab omni fordite liberat, & à carie præteruat, nempe spiritus sulphuris, aut vitrioli, in quo exiguus bacillus demergendus est, cuiusque extremo dentes confricandus, moxque limbo detergendus. In magna dentium fordite purum & putum oleum vlturpi poterit; alijs verò cum melle rosaceo permiscendum, aut aqua simpliciter temperandum erit, ne vlti frequenter gingiuas erodant. Montanus consil. 113. refert se id didicisse Romæ ex quadam muliere, quam Mariam Græcam appellabat: ad quam cum venisset admodum iuuenis, atque illa esset annorum 20. postea quinque annis in eodem refecti statu esse reperit; quæ formæ atque vitium integritatem oleo vitrioli acceptam tulisset, atque significasset, ex eius vlti dentes, quos in iuuentute pessimos habuerat, pulcherrimos habere & firmos, gingiuas etiam firmas, & addidisset, quod videretur sibi ob eius vlti tardius senescere. Vix erat autem singulis diebus vna aut altera guttula, gingiuas & dentes leuiter fricando.

Cinis tabaci ad dentes abstergendos & dealbandos est etiam mirè efficax.

Ad præuentionem verò, & dentes conservandos, primum hâc foribus, & cibi quot idie mundandi sunt dentalis capio ex ligno lentiscino, aut alia materia idonea; mox vino os colendum, dentes verò confricandi pulvere sequenti.

℞. Rad. bullior. galominis, & coralli albi ana ʒ. i. Fiat pulvis tenuissimus, quo dentes confricentur. Vel aqua sequenti abluantur.

℞. Aluminis vlti subtilissimè puluerati ʒ. i. cinamomi integri ʒ. i. aquæ fontis & rosarum ana ʒ. i. v. Bulliant in phiala vitrea supra cineres calidos, ad tertie partis consumptionem. Hoc liquore dentes confricentur manè, cum limbo in sp. maderfacto.

C A P V T III.

De Gingiuarum erosione & exulceratione.

Eroduntur gingiue & exulcerantur ab humoribus acerbis & erodentibus ad eas confluentibus. Partes autem mandantes sunt cerebrum, ventriculus, lien, & quæque partes. Lienosus præsertim viciatibus gingiuarum maxime obnoxius fuit, vnde in scorbutu magna earum partium exulceratio, & corruptio contingit. Interdum etiam ex lumbricis, aut corruptis humoribus ex quibus illi generantur, gingiuarum erosiones solent contingere, ita vt ille diu perleuerantes, lumbricorum intus latentium indicia esse soleant. Sic refert Fabricius Hildanus obf. 50. centur. 1. cuiusdam cuius Dufledorpenis puerum erosione gingiuarum à longo tempore grauissimè vexatum, cum varia multaque remedio tam interna, quam topica adhibita fuissent, tandem vitam cum morte commutasse. Et aperto corpore tantam inuentam esse vetuini copiam, vt aliquibus in locis intestina eroderent, multique in vacuo ventris reperi fuissent.

Curatio primum ad causas antecessas dirigenda est, & humores vitiosi vacuandi per venter sectionem & purgationem, acres & calidi temperandi per apozemata, aulepos, iuscula medicata & alia huiusmodi. Exordium humo-

rum fluxio auerenda per cucurbitulas & cauteria partibus idoneis admoda. Ac denique partis præcipue affectus vitia corrigenda.

Polimodum verò ad topica veniendum est, quæ pro magnitudine affectus varianda sunt: ita vt simplici erosioni ea tantum admoenda sint, quæ asfringendi & exsiccandi vi prædita sunt; atq; ita locis sequens præmi vlturpi poterit.

℞. Galliarum immaturarum, calycum glandium, & balsamiorum ana ʒ. i. prof. rub. P. aluminis crudi ʒ. i. Coquantur in aqua ferratæ partibus duabus, & vna vlti rubi auleptici decocto saepe gingiue abluantur.

Si hoc decocto non tollatur erosio, opiata sequens adiungenda est.

℞. Sang. drac. ʒ. i. ligni aloes rosar. rubr. (podii, cornu cerui ad albedin. m. vlti & nucum cupressi, ana ʒ. i. myrrhæ & cineris tabaci, ana ʒ. i. aluminis ʒ. i. Fiat omnium pulvis, qui excipitur melle, additis spiritibus vitrioli aut sulphuris guttis aliquot. Fiat opiata, quæ extendatur supra lenteola instilar lamellarum, gingiuis applicanda hora somni.

Spiritus sulphuris aut vitrioli, quemadmodum dentes mundificat & dealbat; sic etiam gingiuarum putredinem arceat solus vel cum aqua, aut melle rosaceo permixtus, vt superiori capite dictum est.

Si vlti profundum fuerit, aut fordidum, sequenti balsamo illinatur.

℞. Myrrhæ electæ, & sacchari candi, ana partes æquales. Puluerentur, isque impleatur album oui ad duritiem coctum, & per medium sectum, postea filo probè alligetur, & suspendatur in cella vniaria, supponendo vas vitreum, instillabit liquor seu balsamum, quo pars sapius in die illinatur.

Quod si prædictis remedijs ex parte administratis, affectus sit, ad illius auersionem veniendum est, & vlti citò curabitur, alioqui incurabile proflus remanebit.

C A P V T IV.

De fluxu sanguinis ex gingiuis.

Sanguis magna copia interdum è gingiuis fluere consuevit, idque vel criticè vel symptomaticè. Quamuis autem hæmorrhagia critica rarissimè per gingiuas fieri consueverit; id tamen interdum accidere docet experientia & authorum obseruationes. Sic refert Dodonæus obf. 114. cuiusdam Latome ethymatis laborantis sanguinem è gingiuis erupisse, eumque, repressum ad vrinarios meatus translatum fuisse, vnde cruenta vrina subleuata est; quæ cum asfringentibus cohibita fuisset, iterum ad gingiuas se contulit, nec fluxus cessauit, donec æger a morbo liberatus est. Amatus Lusitanus curatione 5. centur. 5. refert quibusdam sanguinem è gingiuis vltiter effluxisse, eoque cohibito nonnulla fauatis incommoda prodixisse. Zacutus etiam Lusitanus obf. 86. lib. 1. præxi aduertenda, refert aurilabrum quemdam, cum ex multo labore iuxta formacem in ardentem febrem incidisset, & ellet firmus ac fortis copiosam celebrasse phlebotomiam, cuius vi ita leuatus est, vt in 7. die præcedente gingiuarum pruritu, & labij inferioris ingenti dolore, ex vena gingiue inferioris riuuli sanguinei profluerent per tres continuos dies in tanta quantitate, vt libras amplius quinque excederent, & quanto plus sanguinis effluebat, tanto magis remittebatur febris, quæ omnino extincta, sanguis sponte iuxta fluxit omnino.

Si symptomaticè vero sanguis è gingiuis profluit, ob suam acrimoniam, & vitiosam hepatis, aut lienis conurbationem. Sic in scorbutu familiaris est huiusmodi sanguinis è gingiuis effluxus.

Interdum etiam sanguis copiose profluit ex dente aulfolacera, scilicet arteriola, quæ à radicis dentis inseritur, vnde tanta interdum sanguinis copia emergit, vt inde quibusdam mors contingit.

Fluxus symptomaticus curatio perficitur sanguinis detractione & purgatione, aliisque remedijs vt iterum affectu vicia corrigentibus. Quibus succedat topica remedia, asfringendi vi prædita in gargasmatum, seu collutionum, puluerum, & linimentorum aut opiatarum formam reducta.

Si euulso dente copiosa accidat hemorrhagia, reuulsio primum instituenda est: per venæ sectionem & cucurbitulas, & parti altringenda admouenda, quales est cataplasma ex bolo armena, terra sigillata, sang. dracon. alijque altringentibus. albumine oui exceptis paratum. gypsiu solum albumine oui exceptum, sanguinem fluentem potenter tamen cohibet. Quæ si non sufficiunt, patiens digitus loco imponendus est, ex quo sanguis erumpit, & tandem detenuus, donec sanguis supra ostium arteriæ coagulatus, non amplius effluat.

Siliculis huius sanguis cohiberi nequeat, quod fæpe contingit, ad potentiora veniendum est. Valerola *ob. 3. lib. 5.* refert, in vetula ex dente putrido, sine via, ac sine ferro euulso, sed solo digito apprehenso, & lenissimo concussu educto ingentem sequutam fuisse hamorrhagiam ex arteria gingivæ subdita. Opem sanguinis fluxum cohibuit, cum leuora sistere non possent, chalcide vita imposita, quæ in sistendo sanguine mirram vim obtinet; nam & vehementer altringit, & caulica virtute mitatq. in fluxorem omnem reprimat. Zacutus Lusitanus *ob. 83. lib. 3. Prætex. Medica admiranda*, refert historiam euulsam, qui cum dente, dolore premeretur immixta, ulum violento concussu, ferri ope eduxit. Extracto eo, ex lapide arteria gingivæ subdita, copiosa sequuta est hamorrhagia; quæ cum venæ sectione, cucurbitulis, & altringentibus apopsis cohiberi non possuisset, quæ digito vulneri imposita, neque chalcide vita admodum tandem illius coussio, locus pulvere gummi Arabici impletus est, quod aurum illi profuit. vt post tres horas sanguis fuerit omnino restrictus. hoc enim gummi obstruendi, refrigerandi, glutinandi & exciscandi vim habet. Idem Zacutus *ob. 85. eundem lib.*, refert militem quandam strenuum dentem, cuius iussuissimo cruciatiore dolore, ferro cum extra cisset violentia summa, vehementem passum esse sanguinis fluxum ex arteria, cui dens mitebatur. Sanguine biduo vberim fluente, peritissimo Medici, omnis generis obstruentia extra apposuit, reuelletur consultat, arteriam candenti ferro inurit: At incassum omnia, nam sanguis maiori impetu profusus, cum in statum morali vult propinquum, viribus pene exhaustis deduxit. Vocatus Zacutus Galenicum emplastrum ex aloë, thure, & pilis leporinis exactissime trisuratis, & mixtis cum caudico oui impositum, quo intra paucas horas sanguis fuit omnino suppressus, & æger à mortis faucibus ereptus. Hoc pretiosissimum auxilio à le primam inuento gloriatur Gal. *lib. 5. meth. c. 7.* incillam in gibbero arteriam, fuisse conglutinatam, & *cap. 4. eundem lib.*, tum etiam libro de curandis ratione per sang. miss. *cap. ultimum*, huius remedij præstantiam confirmat, & quibuldam historiis illustrat.

CAP. V.

De oris & faucium ulceribus.

LEUIS & superficialior oris vlcera, vulgò Aphthæ nominari solent, quamvis apud Hipp. & Galenum, interdum hoc nomen pro aliarum partium vicibus usurpatum reperitur, quæ verò profundius le demittunt, oris, vel faucium vlcera absolute nemiuntur; quæ sunt ea, quæ lue venerea affectis contingere solent.

Hæc autem vlcera generari solent ab acerbis humoribus aut vaporibus à variis partibus in fauces translatis. Sic in febribus malignis huiusmodi vlcera affissime contingunt, & in iis qui calidiori hepatis, aut aliarum partium temperie laborant, aut corruptorum humorum illius scæcenti vnde puerilis aphthæ æpissime contingunt, ex Hipp. *Apb. 24. sed. 3.* tum ob lætiss aerimoniam, quæ in transitu partes illas mollissimas excutit, vt docet Gal. in comment. *illius Apb. 30.* tum quia lac in ventriculis puerulorum sæpe corrumpitur, & acres vapores ad os transmittit, vt idem Gal. *affert 9. de comp. med. et. loc. 2. ultimum*.

Varie autem lue huiusmodi vlcærum differentie, non solum quod alia leuiora, alia deteriora sint; alia pueros, alia adulescentes infestant; sed etiam quod alia cum inflammatione coniuncta sint, alia verò minime. Hi vari gradus reperiuntur, pro varietate humorum à quibus generantur. Vel

enim sunt à sanguine, vel à bile, vel pituita, vel melancholia, seu potius atra bile, quæ non solum exurent, sed etiam plerumque malignam qualitatem obinet, & vlcera *maximè* generare solent.

Hæc autem differentie propriis signis distinguuntur, siquidem vlcera rubicundiora à sanguine oriuntur; flauiora à bile, albicentia à pituita, & liuida ab atra bile; testæ præterea addele significant.

Quod ad prognosim actinet, aphthæ proprie dictæ facillime curantur: vlcera verò profundiora, aut putredinem adeptæ, iuxta à Græcis appellata, difficilior curantur. Et in pueris illa periculosa sunt, tum propter carnis molliem, quam huiusmodi vlcera magis depauleant; itaque remedia potentiora, ob eandem carnis molliem ferre nequeunt. Vnde fit vt pueri interdum ex hoc affeetu intereant, si malignitatem & putredinem comitem habuerint.

Ratione causa etiam minus periculosa sunt vlcera quæ a putredine, magis quæ à sanguine vel bile, maxime quæ ab atra bile generantur.

Vlcera nigra & crustosa, pessima & lethalia sunt, præcipue in pueris.

Fauces ulcerate cum febre, difficiles sunt, vt docet Hipp. *3. præg. quia*, vt Gal. explicat, humoris erodentis malignitatem indicant.

Curatio inhiuitur primum idonea victus ratione, quæ refrigeret & excitet; ac causæ antecedentes generationem impediatur. Partis itaque, si à lætiss vitio malum contraxerint nutritica mutatio præcipitur, aut prope nutritica lac corrigatur cibo & potu laudabili; tum etiam venæ sectione & purgatione, si opus fuerit. Præsertim verò nutriticis præscriptis edula refrigerantia & altringentia, quæ lue vlcis clydonia, pyra, meipila, forbas lætusa, & portulaca. In adultis eadem præscribuntur, & vitentur acra, salsa & piprata.

Deinde causæ antecedenti prospiciendum est vniuersalibus euacuantiis, pro atatis ratione usurpatis. Ac primum phlebotomia humores ad partem fluentes potenter reuellet, eorumque acrimoniam temperat, totum corpus refrigerando.

Huic succedere debent cucurbitule (carificatae, hirudines pone aures, & sub mento affixæ, vesicatorium postiori ceruici admodum).

Postea de à venæ lætione purgatio præscribenda est humoris peccanti, & ætati congrua.

Eodem tempore, nempe ab ipso curationis principio, topica admihiuitur: topica à Galeno appellata: eaq. ab initio morbi sint, qualia sunt gargarismata, vel oris colutiones ex aquis plantaginis, matris lye, pecali rosarum, syrupo de rosis siccatæ & de moris paratæ. Vel decocta ex solis plantaginis, rubi, centinodæ, balauis, plantago rubro, & similibus, cum syrupo prædictis. Et si inflammatio adfuerit, vititer addi poterunt iucci solani, semperuiui, portulacæ, & sal prunellæ: in ea quantitate, quæ acrimoniam non feriat vel illius loco alumen crudum in parua dosi admisce-ri poterit.

Si non sit inflammatio, vniuersum ac summum remedium est spiritus vitrioli, aut sulphuris, qui in adultis perus ac putus vlcus potenter, intendo in eam gossipio bacilli apici alligato, eoque vlcis admo, leuissimo contactu: sic enim aphthæ simplices momento fere curantur. In pueris verò permiscetur dulcis spiritus cum melle rosaceo, ea proportionem, vt aciditas linguae leuiter feriat, & cum penicillo ex linteo, baculo alligato, aphthæ illinantur frequenter, & cito curantur.

Si admodum dolorifica sint vlcera, cum inflammatione coniuncta, lætæ frequenter gargarismo demulcentur, vel lactis desecta, emulsionibus sem frigida, vel mucilag. sem. psilli & cydon. cum aquis rosar. plantag. solani extractis.

Si denique dolor pertinax reuulsioibus propositis, & topicis non sedetur: sed ab illius vehementia copiosi humores acres continuo attrahantur, vnde vigilie continuæ exoriantur, & corporis consumptio sequitur, quæ vitæ lumen periculum minatur, extremum remedium est ad narcotica consurgere, quæ dolorem sedant, & humorum influxu inhibent, eorumque dosi auuenda est pro ætate & viribus.

Ergo

Ego aliquando puerum quatuor annorum ab orci faucibus, dei beneficio liberavi, ex hibito laudandi gr. cum eius fauces & lingua profundius viceribus cicerent, cum tanta inflammatione, ut ne iulcula nec topica remedia ferre posset, & tanto humore acrimia afflueret, vt illi continuè ex ore riuuli instilar emanarent, & puer dies nocteque incompes ciliando transigeret.

Si vicisfordum ac pituitum euaserit, abluatur primum decocto hordei & melle rosaceo, & in pueris lacte chalybeato, cum confersa rosarum agitato: mox ad iortiora transfundendum est: & in prius mel rosaceum super laudandum, & guttis aliquot spiritus vitrioli acidum reddendum, multum coniecit.

Si hæc non sufficiant, aquis, vel decoctis supra descriptis additi poterunt alumen vitum, collarium Lanfranci vel vnguentum ægyptiacum maiori vel minori dosi, prout affectus vehementia postulare videbitur. Si denique a lue venerea laucium vlcus procedat, non nisi lue sublata curari potest.

C A P V T VI.

De Vula relaxatiore.

Vula relaxatio congit ab humore pituitoso & capite in eam delabente, cui non raro sanguinis quedam portio admiscetur, & tunc cum relaxatione inflammatio coniuncta est, quæ etiam tonsillis frequenter euenire solet; quarum tamen inflammationum curationem omittimus, cum ipsæ remedijs perfici valeat, quæ ad lingue inflammationem, & oris vlcera cum inflammatione coniuncta propostia sunt.

Humor igitur pituitosus in columellam delinens, eam hæmectat, emollit & relaxat, vt longior sadia partem superiorem œsophagi tangat & nauseam pariat. Tum etiam laborantes bolum quendam in fumum œsophago habere videntur, quem frustra deuorare conantur, vt hoc solo signo sine inspectione, vula relaxatio dignosci valeat.

Illius curatio primum ad causam antecedentem dirigenda est, sicque humores a capite fluentes euacuandi, prout de ceteris ad deueniendi ijs remedijs, quæ in catarrhi curatione fuere propostia.

Topica verò in principio sint astringentia & repellentia, qualia in gingiuarum & laucium vlcibus fuere propostia & in curatione Anginæ capite sequenti proponuntur, quibus postmodum reuoluentia & exsiccantia erunt admiscenda. Et licet gargarismata dictis locis propostia, hic vtilia sint, tamen vbi ulla est inflammatio, puluerum vltus efficacior est, si enim vula relaxata potentius constringitur, & exsiccatur. Atque ita primum admovebitur cortex granatorum subtilissimè pulueratus, cui in progressu tantillum piperis admisceri poterit. Vel

℞. Rosæ rubræ balauit. corticis granat. ana ʒ. ʒ. rad. bistort. tormentillæ, gallarum immatur. rcor. Florent. ana ʒ. ʒ. aluminis vbi ʒ. ʒ. Fiat puluis. Vulgus Chirurgorum piper longum pulueratum admovent, quod non vacat periculo; siquidem metuendum est, ne humores afflati a cerebro ad partem affectam attrahantur, & graue aliquid damnum afferant.

Modus & autem huiusmodi pulueres adhibendi talis est. Lingua speculo oris depressa, mox spatula chirurgica, aut cochlear perexiguo ad id concinnato, puluis vulae admoveatur: quod pluries in die repetendum est, donec humor columellæ imbutus profus absumptus sit. Vt autem pulvis vulae indique aspergi, non infusari possit, videlicet instrumentum a Fabricio Hildano inuentum, & descriptum est 21. centuriæ secundæ, quod inde mutari curiosus quique poterit.

Denique si relaxata columella prædictis remedijs ad pristinum statum reduci non valeat, vel elongata permanens graue continuo molestim inferat; vltimum erit summata eius prædicione. In qua operatione quedam cautiones exhibende sunt. Prima delinatur ex Hipp. 3. progn. text. 21. vbi, gurgulione, inquit, cum periculo fecantur, & scissantur, & gurgulione, quod rariis magnique fuerint; inflammatio

enim superuenit & sanguis fluit. Sed hoc oportet alijs multis modis extenuare, vt per illud tempus. Vbi vero penitus fuerit omne id quod vnam appellat, sique pars gurgulionis summa maior ac cucurbitula, superior vero tenuior, per illud tempus admodum manus intromitti. Sed præstat vbi ab humore induratus, vt chirurgi, si liceat per tempus eger stranguere. Galenus in eodem, huius loci verba Hipp. explicans, dicit gurgulionem inflammatione laborantem non esse prædicendum, aut scissandum, sed ea tantum sedata ita vt pars superior saltem gurgulionis extenuata sit.

Alteræ cautio delinatur ex Paulo Aeginetæ lib. 6. cap. 31. vt scilicet columella ferro non attingatur, quando liuida, aut subnigra est, nempe malignitatis cuiusdam particeps, vel ad canceri naturam accedens. Sed ex eodem Paulo, in ipsa operatio tuto perfici potest, quæ tenues sunt, oblongæ, albicantes, & vt ait Hipp. in suprema parte immixta. Huius operationis speciem præcæ exemplum habemus apud Aretæum Lib. 1. obs. 5. cent. 3. in quodam studio, qui gurgulionem habebat lori modo oblongam, & exanguem: cui cum nulla remedia profuissent, portio eius superflua forcipibus præcisa est: & illico oleo vitrioli contacta scissæ egger ab eo incommodo liberatus est.

Tertia denique cautio in hac operatione adhibenda est, ne nimia gurgulionis quantitas abscidatur: inde enim vix & respiratio laesionem eorum docuit Galenus 11. de usu part. cap. 11. & ex integra illius consueptione, vt in lue venerea aliquando contingat, tabes, & mors non tarò subsequuta est.

C A P V T VII.

De Angina.

Anginæ notum in genere sumptum, omnem faucium & gutturis affectionem significat, quæ respiratio & deglutitio impeditur, nullo existent in pulmone aut thorace vitio. Eaque duplex est, legitima & spuria.

Legitima fit ab inflammatione, qua musculi faucium & laryngis, tum interius respirations & deglutitionis vias coarctant & angustiores reddunt. Illa autem inflammatio vel laryngicæ occupat, vel fauces, quæ pharyngis nomine, enuicari consueverunt. Vtraque pars musculis habet internos & externos. A licet vtriusque pharynx & larynx propter viciniam & conuenientiam in Angina patiatur, modo tamen hæc, modo illæ magis afficitur; vnde non exigua symptomatum differentia emergit, quorum ratione, quarum a Gal. 4. de loc. affect. cap. 5. propostæ sunt, anginæ differentie, quæ recentiores Græci, qui paulo ante Galeni sæculum viuerunt, proprijs nominibus, nimis curiosi, (vt idem Galenus censet,) verborum aucupio designarunt, vnam vocantes *ευνδύς*, alteram *ανωδύς*, tertiam *συνωδύς*, quartam *σπασμωδύς*. Si inflammatio interior, propriè loquendo laryngis musculis occupet, *συνωδύς* si interior pharyngis musculis, *ευνδύς*; si exterior pharyngis musculis, *σπασμωδύς*, ac denique si exterioris faucium musculis inuadat, *ανωδύς* appellatur.

Non longe autem pietumque laucium & laryngis musculi simul inflammantur: vt aures dictum est; sed etiam, interdum ad vicinas partes & ceruicem ipsam exteriori inflammatione protenditur; vt in diagnosi & prognosi huius affectus dicitur.

In his omnibus speciebus, cum periculosior est motus, deglutitione impedita, solent assumpta ad nares resistere, præcipue liquidiora, quorum deglutitio difficilior est; propterea quod huiusmodi se lateus distendant, non possunt ita facile a musculis comprehendere, vt ad œsophagum detendantur, eorumque maiori contractione indigent, quæ ob inflammationem sufficienter non fit: si solida vero alimenta, cum magis corpulenta sint, superficialia tantum, musculorum actione indigent, & leui eorum contractione deglutantur. Contingit tamen aliquando, vt solida difficilius, liquidiora vero facilius deglutiantur, quod ex partium affectum diuersitate deponit. Siquidem musculi laryngis non solum ad vocem efficiendam, sed etiam cibum deuorandum delinunt: sunt enim cibus in œsophagum impelli-

pellicula larvæ cum lingua sursum effertur. Ad potum verò hauriscendum magis lingua vitatur, quæ dum intus retrahitur, ex labijs liquorem ducit ad fauces. Si igitur musculi linguam moventes magis afficiantur, potus deglutitione difficilius est. Si verò laryngis musculi magis laedantur, cibis difficultius ingeritur.

Hic obiter annotandum. Hippocratem aliquando nomine Anginae, laryngis tantum inflammationem intelligere, & sic magis libere hoc nomen vitæ perire, cuius rei exempli habetur 6. Epid. lib. 3. text. 3. ubi sic loquitur. *Quibusdam verò faciem inflammationem advenit, alijs anginae* ubi nomine anginae, musculorum laryngis inflammationem intelligit, & à facium inflammatione distinguit.

Spuria angina febris est experta, & duplex iterum statuitur. Prima & communissima est, quæ ab humore pituitoso producit, in fauces & partes laryngis vicinas delabente. Altera verò fit à luxatione vertebrae cervicis, quæ gule gutturisque introitus premittit & coangustatur.

Veræ anginae causa, vi & aliarum inflammationum est sanguis vel sincerus vel biliosus, pituitosus aut melancholicus, qui è venarum ingulgarum ramis in dictas partes effunditur, & ique vel attractus à calore aut dolore aliarum partium vel transfusus aliunde, si partes illæ debiles aut laxæ, ad luescendum fluxionem idoneæ fuerint, cum si humoris copia adfuerit in toto corpore, vel incipiat, vel in partibus faucibus vicinis sanguis enim à toto corpore redundans, vel parva qualitate affectus, dum ad caput transierit, cerebrum vero robustum est ab eo non recipitur, sed per eas venas ad subiectas partes retrahitur, unde in his partibus inflammationes sunt, parotides, ophthalmia, angina, & similes.

Iuvens anginae magis obnoxia sunt, quam senes, quia multo biliosius sanguine abundant, cum etiam qui habita corporis sunt crassior, multo sanguine abundant, præsertim in capite.

A nonnullis authoribus annotatum est, viros magis esse obnoxios anginae, quam feminas, quod videtur Hipp. observasse 6. Epid. lib. 3. ubi epideum cum constitutionem describens, in qua angina, tussis, peripneumonia vagabantur paucissimas feminas ægrotasse affirmat. Cuius rei non aliam causam reiecit, nisi quod minus in puberibus prodibant, quam in viris, & ita acris externi injurijs seie non obnoxiebat. Quæ ratio propositioni universali non convenit, quod femine minus angine sint obnoxie, quam viri. Veræ autem ratio talis esse potest, quod iemine sanguinem frigidiores laryngem muorem, & gutturis venas angustiores exilioresque habeant. Quorum ratione partes illæ fluxionem tam facile non recipiunt.

Ad causas internas revocari possunt morbi præcedentes, vel febres continuæ, putridæ, ardentes & in primis epidemice: qualis fuit illa, quæ recensetur à Foreſio 1653. lib. 6. quæ contigit anno 1571. In qua omnes laborantes gravissima facium inflammatione corripiebantur, & intra sexdecim, aut viginti horas moriebantur, nisi autem sex horas ab invasione sanguis detraheretur. In hac autem angina febris lymphatica non est, sed potius essentialis, & angina illius veluti lymphatica, quod mater moribificæ pars ad hunc locum propellitur. Fuit autem in febribus epidemicis aliquando angina, alias pleuritides, peripneumoniae, dilenteriae, & similes affectus, ab occulta quadam vi & astrophorum influxu, quo nec hæc nec illæ partes magis afficiunt.

Quidquid autem fluxiones humorum ad illas partes excitare potest, inret causæ huius affectus externas recensere debemus, qualis est aëstiva constitutio diuturna, iuxta Aph. Hipp. lib. 3. text. 3. *Morbi in plurimum multitudine magna ex parte sunt febres longæ, alijs profusa, putredines, morbi constituti, suppurati & angina.* Ad hunc etiam affectum producentium maxime facit temporis inequalitas, quando à calore laxantur partes, & à frigore subito superueniente humores ad eas propelluntur. Id præstat luvina refrigeratio ad incalcentiam, frigida porus polli candem, tum etiam si caput pluribus requiritur incaleat, vel nudis arsi frigido exponatur.

Præter spuriæ anginae speciei causa præpositus ob Hipp. 4. de vit. rat. in morbo acut. text. 39 ubi sic loquitur. *Sin autem sit, cum hyeme verique multo aëre & viscosa à capite ad genas irregularis descendit, cum aëre frigida & glutinosa*

fuerit, spiritus obfruit permixtione.

Alterius denique speciei anginae speciei causa proponitur ab Hipp. 2. Epidem. lib. 3. tumor nempe, seu tuberculum iuxta vertebrae cervicis obortum, quod præcipuè illam, quæ dicitur febricitans ab eodem Hipp. nominatur, à quo timore vertebrae ad interiora trahuntur, & cōsequenter eas in parte exteriori apparet. Hic autem tumor, vel ab humore pituitoso fit, copia sua vertebrae à propria sed dimovente, vel à sanguine in musculis effuso, unde inflammatio fit, à qua musculi contracti vertebrae ad anteriora trahuntur: tunc veræ est angina, ab inflammatione scilicet dictorum, muscularum orunda. Possent etiam fieri luxatio vertebrae ab humore pituitoso earum vincula laxante, & intermedia lubrica reddente, ac denique potest fieri à causis externis, calu scilicet vel percussione, quemadmodum relique omnium totius corporis articulorum luxationes.

Angina primò in genere dignoscitur ex illius signis pathognomonicis, respirandi nempe & deglutendi difficultate, abique thoracis, aut pulmonum viro: dolor præterea circa fauces & guttur percipitur: tum etiam in legitima angina rubor, calor & febris.

Differentiæ verò propriæ etiam signis distinguunt possunt. In synanche enim minor est respirandi difficultas deglutendi verò maxima, vel liquida vix transire possunt, sed potius sere per nares rejiciuntur.

In Paralyanche minor est respiracionis difficultas imò peregrina cum muscularum facium exteriorum inflammatio parum respiracioni officiat, dolor etiam & rubor foris in ceruice percipitur, cum inflammatio partes internas occupet.

In synanche maxima est respiracionis læsio ita vt ægri stragulari videantur, & pauci etiam horis aliquando stragulentur, ac non nisi erecta ceruice, & aperto ore spirare valeant. Fauces vehementer dolent nullus tamen rubor aut tumor, neque in faucibus intus, neque extra in ceruice apparet. Lingua lauida est nigra, inflexa, vel retracta, ob summam venarum circa linguam repletionem. Acutissima etiam febris adesse consuevit. Huius speciei descriptionem accuratam videt & est apud Hipp. 3. de morbis. Hoc autem notatu dignissimū est, quod tam à paucis anima dursum, non tantum in hac specie multos laryngis interiores afficit sed ipsi etiam pulmonem, unde tanta respiracionis difficultas & suffocatio exoritur, quod à Dodonæo locustæ obfervatum est 1653. medicinalium c. 18. ubi refert historiam cuiusdā lanionis, qui cum meride circa laryngem & fauces dolore sensit, & quandam in deglutendo cibo ac potu difficultatem, nocte stragulatius interijt, huius corpore aperto innotat est pulmonis substantia in pus conversa. Alia exēpla annotant anno 1565 in quo multi angina correpti apparente circa laryngem dolore, & tandem desinentem peripneumoniam incidentes, ique defectis pulmones, vel putrescenti fuerit, vel abscessum habuerunt, iuxta verò laryngem, aut eius musculos nihil occurrit, quod vel adesse, vel adfuisse inflammationem ostenderet. Et in his casibus censeat laryngem non primario, sed per consensum laborare, & verisimile esse, delitantes humore à capite, alteram arteriam, & eiusque ramos impleant, quod dilatandem eodem ad alia vasa transmissi, alteram arteriam & laryngem à dolore liberati, pulmones verò affici, & hoc modo ex angina in peripneumoniam permutacionem fieri. In hac autem angina pulmonem non ratio affici colligere possumus ex dictis Hippocr. quæ habentur 4. acut. text. 30. & 31. ubi duas anginae speciei, proponit pro humoris diversitate vnam, in qua fluxio pituitosa, hinc è veræ, ad vena singulares fertur: alteram, in qua humoris biliosi insistent, quod efflate & tumore contingit. De hac autem posteriori sic loquitur.

Cum ex capite fluxerit calida & viscosa fluxio, viresque accitis, mordest, solent aut spiritus omnes artibusque pari siccitateque multari. Præterea quæ intus apparent, haudquaquam iumentia videntur, ut quæque ceruicis posteriores continentur, apparent quæ tam modo intus, vix abru à spiritus parvi spiritus, quæ remissio frequens & violenta accedit, talibus arteria vicerat, ascendit quæ pulmo, neque externum, acrum admittit intro quoniam. Hic Hippocrates. Dicit autem calidam & acrem fluxionem orthopneam parere, quia mor-

ram coctione, quia morbus non dat inducias; idque potione purgante, humoris peccanti accommodato. Imo verò, si morbus admodum vergeat: vix leuio & purgatio eadem die celebranda est, vt leuile refert Trallianus lib. 4. cap. 1. his verbis. *Ego sane memini me cum vixi valde vergeret, vix nam manus eius: nulle dubitate venas lingua subulsi scissile, & vespere ex tremore pisse extra lingam scissilem exhibuisse, acque ita laqueum ex inflammatione eborum, vix potuisse dissolvere. Imo alium quendam nos, me, postquam in brachium dextrum venas in cubito scissilem, vespere, sequens die non expressit in Potio autem purgans ex blandioribus esse debet, si abile morbus originem duxerit, ne vehementius commoti humores ad partem affectam irruant. Tum etiam si in sanguine sincero producat inflammationem, satis est si purgatione prius abstinere. Si vero pituitosa cacochymia concurrat, ad fortiora confugiendum; & cum fenna ageris & diaphenicum prescribi potest. Imò verò vt ea medicamenta, quae vomitum excitant, etiam satis vehementia, transcendere licet in angina pituitosa; & inter reliqua palmam obtinet in hoc casu aqua benedicta, quae ad 3-j exhibita, miranda praestat, & morbum vt plurimum intra duas horas dissoluit. Adde quod nullo ingratum sapore praedita, facili pituitando ingeri potest, quod in alijs medicamentis fieri non potest, quae propter laporis ingratiudinem non possunt, nisi vno haustu ab aegrotis forberi: ideo vt plurimum anginosi purgari nequeant, donec ne itum angustia maiori parte suppleta sit. Sed frequentibus clysteribus, purgandi indicatione aliquo modo satisfiat. Acque ita quibus aqua benedicta non conuenit, propter inflammationis naturam, vel aegri imbecillitatem (vires siquidem robore in huius remedij via necessariae sunt) neque alia medicamenta exhiberi possunt; frequentibus clysteribus alius subducenda est, sique satis acris, vt resilio humorum ad inferiora fiat.*

Ad eandem resolutionem cucurbitulae scarificatae ceruici & capitis admove, struiones & ligaturae partium inferiorum, & lotiones pedum ex aqua calida, plurimum conferre solent.

At potentius reuellit humores a capite desinentes vesicatorum posteriori parti ceruicis admotum, quod statim ab initio post sanguinis missionem admoendum est.

Resolutionibus sufficienter ac diligenter administratis, ad deriuatua veniendum est, quae humorem parti impactum euacuant: ac primum ranularum, seu venarum sublinguae apertio ab Hipp. Gal. & recentioribus commendatur, quia sanguinis inflammationem immediate efficiens educit.

Antiqui in angina desperata venas iugulares aperiebant; quod remedium, licet a recentiorum plurimum etiam comprobatur, nostris ferè temporibus obsoleuit, quod periculosum censetur, ob sanguinis fluxum, qui difficilè cohiberi potest, propter venarum amplitudinem. Verum experientia docuit, non ita periculosam esse hanc operationem, si debite administretur. Primum enim caput agrotantis ad latum torqueri debet, quantum fieri potest, vt ne autem humerum ferè attingat, vix aperienda sine ligatura angulo foramine, secundum illius longitudinem (sic enim facilius coalescit): 3-j extra de sanguinis quantitate sufficiens, caput reducendo ad situm naturalem, sanguis plerumque sponte cohibetur. Atramque vulneri statim admoendum est emplastrum a Gal. descriptum 5-j. meth. cap. 4. ex pilis leporinis, aloë, thure, & abamite oui confectum, siquae fluxus sanguinis certò cohibetur. Refert Trallianus lib. 4. cap. 1. plures anginosos venarum iugularium apertione a se curatos esse & Zacutus Lusitanus obseruatione 89. lib. 1. Prax. admod. refert historiam cuiusdam Hispani, qui huius auxilij beneficio, ab acutissima angina liberatus est.

Ad deriuationem etiam plurimum confer cucurbitulae vel mento scarificatae, cuius opo curatum fuisse mulierem angina canabula, refert Zacutus Lusitanus obser. 88. lib. 1. Prax. admod. ad miranda.

Non minores efficaciae sunt scarificationes sub maxillis & supra collum, auctoribus plagis indite, quarum beneficio critibi Benuenus lib. de abditis morbis, cap. 38. Nicolaus Rotam a deplorata angina liberatum fuisse, cuius integram historiam transcripsit Scenectus Praef. Med. lib. 2. p. 1. c. 34.

Dum praedicta remedia viurpantur, topicis remedijs inflammationem gutturis & faucium oppugnanda est, eaquarum da iuxta varietatem temporum, vt in alijs inflammationibusque in principio conuenient repellantur, ad gargarismata formam redacta, vt partem inflammatam immoderate attingere valeant.

1. Aquar. plantag. dolani & caprifolij an. 3-j. succi granator. 3-j. diamori 3-j. falis prunellae 3-j. f. fiat gargarisma. Vel ex decocto in hunc modum.

2. Fol. plantag. acetosae & summit. rubian. M-j. granor. simmach. 3-j. mell. granat. cii cortice & granis consulum n. 1. rosar. rubr. P-j. Fiat decocto ad 3-j. In colatura dissolue dianor. & dianoc. an. 3-j. f. falis prunellae 3-j. fiat gargarisma.

De gargarismatis hoc notandum, ea suspecta esse posse, quae gargarizandae partes inflammatae commouentur, quae quete indigent. Sed hoc incommodum vitari potest, si gargarismata in ore detineantur resapo corpore, citra viliam agitationem, vt partem affectam contingant.

Sine gargarizatione viurpantur possunt spiritus acidifalis, sulphuris, aur. vitrioli, qui aqua temperati vt eorum aciditas ferri valeat, paulatim loquendi sunt. Transcundo enim per partem affectam illius inflammationem temperant, & a ventriculo an hepae & venas translati, sanguinis feruorem coercunt. Quod remedium in faucium & tonsillarum inflammationibus est etiam efficax.

Dum gargarizanda repellentia viurpantur, laxantia & reuoluentia linimenta exterius ceruici admoenda sunt, vt materia morbosica exterius euocetur, eaque in hunc modum pari poterunt.

3. Olei chamomill. lilior. & amygdalar. duc. an. 3-j. axung. galinae & butyri recentis, an. 5-j. f. croci 3-j. fiat linimentum ceruici admoendum cum lana succida.

Hoc linimentum dolori leniendo etiam conferre poterit, qui si vehementer vergeat, demulceri vitruis poterit gargarizate ex lacte parato, vel emulsione quatuor sem. frigido. maior. vel maciaginis liquidi ex sem. pilyli & cydonior. cum aqua rosularum extractis, addito syrupo violaceo, vel diluto cassie cum sero lactis, aut decocto radice altheae parato.

Transacto morbi principio, eaque ad augmentum & statum progreddente, in gargarismata digerentia & reuoluentia repellentibus admoenda sunt; quod secundo statim die faciendum, quia morbus acutissimus est.

4. Fol. hydiopi & plantag. an. M. liquiritiae rase & passiflor. mundat. an. 3-j. caricarum ping. n. xi. fol. rubr. & hordei integri, an. P-j. Fiat decocto ad 3-j. In colatura dissolue mellis rosae & syrupo violac. an. 3-j. fiat gargarisma.

Nota, quamdiu viget inflammatio, reuoluentibus & adstringentibus aliquid repellentium semper esse admoendum, ne pars sua natura mollis & laxa magis relaxetur, & fluxioni recipienda magis idonea reddatur.

Exterius vero magis reuoluentia admoenda sunt, addito etiam nido humidorum, quem specifica proprietate huic affectui conferre, omnino practicum consilium iancum est.

5. Pulueris nidi humidorum, & stercoris canis ierisio maceratis, an. 3-j. rad. res. Florent. & hoc chamom. puluerat. an. 3-j. axung. galinae & olei lilior. an. 3-j. cere. flax. parum. fiat linimentum.

Vel forma cataplasmatis in hunc modum coponi poterit.

6. Nidum hirund. n. 1. fol. maluae violae an. M. rad. alhar. & lilior. an. 3-j. ficum ping. par. ulior. chamom. & meliloti, an. P-j. Coquantur, & contendantur; deinde adde farinam hordei semini & foug. an. 3-j. croci 3-j. butyri recentis 3-j. olei chamomill. & amygdalar. an. q. l. fiat cataplasma anteriori colli parti admoendum.

In erim etiam elegnata per intervalla viurpanda, vt materia quae a parte affecta exudat, vel a capite desiliens ipsi adheret, sensim obstergetur.

7. Pul. elect. diatragacanth. frig. 3-j. diaireos simpli 3-j. lachari candi & pseudaria, an. 3-j. dianoc. 3-j. syrupo subub. q. l. fiat looch.

Si tumor discuti nequeat, & ad suppuracionem vergeat, si quod plerumque quarto, vel quinto die solet accidere, ea aduocabitur cataplasmate praedicto, alijsq; emollientibus & suppurantibus. Simulque in ore frequenter erunt detine-

da, quæ dolori leniendo super propolaisimus. Vel

℞. Liquirit. rad. & pulvis mond. ana ʒ. ꝑ. cancarum ping. nu-
trientia, althææ & cydonior. ana ʒ. ꝑ. flor. chamom. ꝑ. ꝑ.
Coquantur in hydromelite. In colatura dissolue saps ʒ. ꝑ. Fiat
gargaria.

Vile etiam est medullam cassiæ recentem extractam ore
desinare, vt paulatim liquescens in gulam debeat, lenit
pene, resoluat & maturat.

Si tumor tandem suppuratus fuerit, quod ex symptoma-
tum remissione cognoscitur, nec tamen in sponte rupturari
æger, aut aliquis nuntius, quod in lauces immittit ab-
cessum rumpere conetur, quod si fieri non possit, ægri os
per speculum oris valde aperiat, & ubi apparuerit tumor
scalpelli incuruo, quod bistorium vocant, incidatur. Rupta
vulnus æger caput inclinet, ne pus in pulmones irruat, &
postmodum vlcus decocto hordii cum melle rosaceo, hy-
dromelite, aut cenomelite, detergeatur; detergum aqua
aluminosa exsicccandum, & ad cicatricem perducendum.

Alij candellam ceream oleo amygdal. dulc. afficiant in celo-
phagum immittunt, vt rumpatur abfcessus, quod si ob-
stinere non possit, cultro ligneo acuto, vel tandem scalpello
aperiunt.

Alij oleo vitrioli abfcessum attingunt, & mox plerumq;
rumpitur abfcessus. Arculanus cupide ferrea; ligno inha-
apertione abfcessus moritur, ne alias omnes partes attingat,
Idem renacuam probat Faucianus his verbis; Acci-
piat quum lignum subtilis rotundum, in cuius extremitate
apposuit ferrum acutum, cuius longitudo sit tanta quantitas,
quanti ægri mediæ digiti tendere ore aperto ponendo lignum,
extra dentes ægri, ut sic efficitur, frangendo deinde ponit candellam
illam cum ferro ad locum apfcessus, ac secunda: aperto apfces-
sus, prout declinat, & pus inferius parte aperto, vt exeat sanies.

Schenckius ex Douyneto, decocto agatice abfcessum
rumpi affleuat, & sequenti historia confirmat, ab eodem
Douyneto relata. *apologia lib. 3. c. 1. Illustris viri Gabriella
Geoffroy Demaria à Saville cum angina Autumali, omnium
periculossima detinuerit, venit in mentem legisse me apud
Aretium lib. 3. c. 6. agatice oculis abfcessus absorbere, vel
ferre materiam evacare, etiam in agatice in tollenda, concisam
in decocto rad. albi. et sic sumum cum melleo zuberis, &
quarta parte vini albi in aceto ad illud syrupum de alibis, po-
tissimum ægri a deo, monacho ne aliquid statim degluteret, sed
aliquid tempus in suis faucibus contineret, si hac potione viam
ibi rediret vellet. Obsequatur ægri, Interim dum cum illa
sermone conferebat, magna pars albi copie, iam putrida &
gravescentis ore reiecit, ut silia quæ ad matrem cum pulis ad-
stabat, exciperet, pueri ergo, nec opinato, prægravis si vis puris
fuisse, accideret animo; reliqui custodes magna corporis
contenance firas præperunt, iaccuerunt alia, gurgulenta detrahunt,
detergent, sifflant alia, vt intolerabilem graui odoris sedimen-
tem sifflum quodam depellerent: quæ subita ad ægriorem redy,
quam plane & vocis visus, & respiratio difficili, & graui do-
luisse, hæc febre lenius repert, & ab omni viâ periculo su-
tata, quæ tunc finit yncoloma.*

Si pusad putres externas quodammodo vergere videat,
tunc apertio externa molienda est; quod le felicitate presti-
tisse relet Laurentius, *Chirurgia maioris delicta 2. c. 3. 4. 5.*
his verbis. *Quoniam bona casum variat multum corroborat
operantem, quoniam hoc loco quid mihi accedit in curatio. At-
tendamus de quodam Demaria quægenaria quæta, quæ spon-
tanea phlegmatice patiebatur, quæ totum occupauit gulam,
tunc & externa quæ exierat tumor maximus apparebat, &
quæ non liquitur, nec poterat transigere. Cum esset
vocatus, ægri pusillum in vltima membris debilitate angoni lo-
cum corruptum, sensu materiam in profundo, & cæcæ quæ po-
tius suffocaretur, quam exterius apfcessum, vel interius rumpe-
retur. Tunc mihi præcepit raturarium, & locum pulvis cum
digitis, sanctis maturam materiam inde meum, & epiglot-
tum, pusillum in alio loco congregatam, & vultus ibi feci pro-
fundum per quod de corrupta & male sistente materia magna
parte in extraxi, magnamque partem dissimulam tunc enuclea-
re poteram, secundum rationem nobis, quam sicuti. Tunc ægri
lenioris habuit anhelum, pusillum quæ fuit fortissimum, Tunc ad-*

*ministrans os primum per vultus magna ipsius quantitas pfi-
bus tunc ingens, vt cum argentea cannula, quæ posita in quo
tunc vultus transibat, sua cura reciperet ad ipsius necessaria
instrumentum, aquam totam, & collum cum medicinis manduca-
cantibus, & refectum materia maturantibus, per cum dabam,
dentes extraxi de vultu, frustum magnum viscosa materia, &
sistentia, quæ fuerat sicut quoddam intestinum, longum vultus
miseri digitis quantitate, quæ quidem ma era calore fuerat ex-
traneo condensa. Quæ rimota, pferenti levis sine favore, &
ægri incepti maxime conuulsi. Tamen in ea continuam mon-
dificatam, & incarnatam, & cicatriculam vultus optime
sifflant, & ægri fuit saluta pferenti restituta.*

Huc referri potest historia Bennemii, cuius supra men-
tionem fecimus de quodam angimo, qui cum ab alijs Me-
dicis pro deplorato relictus fuisset; ab eo liberatus est pro-
fundius scarificandus sub maxillis & ipsa ceruice celebra-
tis, a quibus multa sanies effluit.

Si abfcessus intus in ore rumpatur, decocto hrdiei, aut
hydromelite, vt dictum est, detergitur. Verum aliquando vl-
cus lordidus redditur, & tunc ad potentiora remedia con-
surgendum est in hunc modum.

℞. Pol. cabiole & agrimon. ana M. ꝑ. nucum cupressi ʒ. ꝑ.
rad. iris Florent & arthol. rotund ana ʒ. ꝑ. myrrhæ ʒ. ꝑ. ro-
lar. rubr. ꝑ. ꝑ. Coquantur in hydromelite ad th. Colatura col-
luantur frequenter vt cerate patet.

Hoc decoctum vlceri lordido abstergendo plurimum
conferet; attamen si non sufficit, ad colluvium Lanfranci
consurgendum est, quod mirabilis est efficacitas.

Vlcere probe deterio, illius consolidatio, molienda est bo-
lo amena, cum melle rosaceo permixto ad formam ecleg-
matis, cui etiam tunc & myrrha vultus addi poterunt.

Fit autem interdum, vt deficiente inflammatione, tumor
neque resoluatur, nec suppuretur, sed durumque contrahatur;
quo in casu cataplasmati emollientibus, & retolentibus
curatio perficienda est, eaque in hunc modum componi
poterunt.

℞. Rad. althææ, bryoniæ, & cacumeris agrest. ana ʒ. ꝑ. fol.
maluæ parietariæ, origani, & centaurei min. ana M. ꝑ. carica-
tum ping. par. v. semini & fenugr. ana ʒ. ꝑ. Coquantur in pi-
stis, & per laticem traiciantur; deinde adde puluerem
hirundinum combullatum & stercore canis ossa rodentis,
ana ʒ. in pulueribus viui ʒ. ꝑ. butyri recentis, & axungie ana-
tina ʒ. ꝑ. olei anethi ʒ. ꝑ. Fiat cataplasma.

Pro coronide aliquid dicendum est de Laryngi-
tormia, quæ ad antiquis proponitur, & à necoter-
cis non paucis proponitur, & propterea experimentis
confirmatur. Cum nempe in angina desperata, quæ
agri suffocatio omnimoda præ foribus est, incisio fit
in alpera arteria, per quam æteri ingreditur datus in
pulmonem, & fuliginem ab eodem expirantem egreditur.
Hanc probat Auicenna. *Fen. lib. 3. cap. 1.* Paulus lib. 6. cap.
33. Rhazis 3. commentis. Alifharauus, Auenzoar, Albucasis,
& Halyabab capitibus propriis. Eandem potuit Galenus ex
Asclepiade in introductione, cap. 13. Ex recentioribus Bras-
lauolus commentis in lib. 4. *Expp. de vultus ratione in morbo
acuto, scilicet 3.* le propriis manibus hanc operationem scic-
ficet testatur cum felici successu. Rarissime tamen in vltum
reuocatur hæc operatio, propter metum infamie, quæ Me-
dicis & Chirurgis imponitur, dum æger post operatio-
nem occubuit, quod vltimum contingit, & mors ope-
rationi potius, quam morbo tribuitur, quantumvis Me-
dicis præmisio prognostico fecit aduersum calumniam mu-
nieri. Adde quod in angina valde periculosa pulmones plo-
rumque affecti sunt, & multis humoribus repleti, vnde pie-
rumque suffocatio contingit; & tunc incipio alperæ ar-
terie nihil suffocare potest. Quæ aduertere pericula Hæro-
nymus Fabricius ab Aquapendente, Chirurgus expertis-
simus, hæc operationem nunquam molitur esse, neq;
eam à vi temporis Chirurgicæ admittit fuisse tes-
tatur. Eam tamen potest in vltum reuocari fatetur, modò
pulmo & alij æra arterie colluunt non sit repleta; & operandi
modum exacte describit in operationibus Chirurgicis, ca-
pite proprio, quæ ad delineare quis poterit.

P R A X E O S M E D I C A E

L I B E R S E P T I M U S

D E M O R B I S T H O R A C I S.

P R A E F A T I O.



*H*oracis nomine comprehendimus eas tantum partes, quae respiratori inferuntur. Laet enim cor in thorace commotum illius tamen affectus peculiaris libro, quibus sequitur effectus expendi sunt. In hoc vero eos tantum exponemus qui respiracionem laedunt, & partes respiratorias inferentes frequentius inferant, quales sunt asthma, pleuritis, peripneumonia, emphysema, hydrops pectoris, haemoptoe, & phthisis quorum unicuique propria capiti destinamus.

C A P V T P R I M U M.

De Asthma.

Respiratio laeditur a variis causis tum sympathice, tum idopathice.

Idopathica a respiracionis lesio fit ex viciato pulmone, atque adeo omnes pulmonis motu actionem illius; qui quidem morbi vel in ipsa partis structura, vel in vasis illius resident.

In pulmonis substantia contingunt inflammationes, tubercula abscessus, ulcera, tum etiam internum ipsius partes exsiccatio & atrophia; internum & humor letosus ac pituitosus spongiosae pulmonis substantiae imbibitur, & liberam ipsius dilatationem impedit. Rarus scirrhus & calculi & grandes in eadem parte generantur.

La pulmonis vasis frequentissime sunt obstructions, quae liberum aeris commeatum impediunt difficultati faciunt respiracionem.

Sympathice laeditur respiratio ex consensu aliarum partium, non solum vicinarum sed etiam remotiorum. Sic inflammata membrana costalis succingente, vel diaphragmate, vel mediastino, respiratio laeditur. Sic corde in temperie calida laborante, ut in febribus, aucto respiracionis vi, magna & frequens respiratio eundem, contra vero eodem frigida in temperie laborante, ut in moribundis, imminuitur & tandem omnino cessat; idem contingit in syncope cessante actione cordis, & consequenter cessante respiracionis vi. Sic in emphyemate aut hydrope thoracis, pus aut aqua in capacitate thoracis collecta pulmonis dilatationem impedit & respiracionem laedit. Sic muscularum respiracioni inferentium lesio eandem actionem vitiat, ut in vulneribus ac tumoribus eorum contingitur praecipue in apoplexia, denegato influxu spiritus animalis ad eos musculos. Musculos etiam laryngis inflammatione spirandi difficultatem efficit in angina.

Affectus etiam hypochondriorum sympathice respiracionem laedunt, ut tumores hepatis, lienis, pancreatis, pondere suo diaphragma cuius annectuntur, vel ad inferiorem retrahunt, velque motum liberum impediunt. Sic etiam vapores, & frigus ab illis partibus elevati diaphragma comprimunt eiusque actionem laedunt, unde aliam statulentum exoritur. Idem contingit a fluxu vel serofi humoris copia in hypochondrium abdomine contenta & diaphragma comprimente. Ab utroque denique vapores elevati respiracionem vitiant, unde hic affectus insulatio hysterica nominatur.

Inter praedictas respiracionis lesiones asthma ab autoribus seorsim tractatur, quae reliquae ab alijs morbis dependent, suis locis explicantur.

Licet autem asthma interdum genericè & lata significacione usurpatum, omnem spirandi difficultatem comprehendatur: in specie tamen tam imprimis significat, quae a pulmonum infarctu & bronchiocum illius destructione exoriturque ex se & ratione propria essentis febre carere solet, licet interdum febris ei adungi valeat. Et merum in tres alias species subdividitur, quarum una Dyspnoea nominatur, secunda idem Asthmatis nomen, tertia vero Orthopnoea nuncupatur.

Dyspnoea est difficilis respiratio, in qua crebrior densiorque fit spiritus tractio infarctu pulmonum oriunda. Haec Asthmate & Orthopnoea minor est, & a minori materia obstruente copia oriunda, & magis ipsam pulmonis substantiam obstruit, quam bronchia, unde stertoris carentia, quae fit ab humoris in bronchijs pulmonis contenti commotione, & alisione cum aere per ea continuè oberrante.

Asthma est magna & frequens respiratio, in qua diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis violentemouentur, cum stertore & sibilo coniuncta. In vero enim & proprie dicto asthmate bronchia pulmonis humore pituitoso oppiuntur, quae ut dictum est ab aere commotus talem strepitum edat.

Orthopnoea vero est maxima spirandi difficultas, in qua egrotantes non nisi sedentes & erecti a ceruice respirare possunt; non solum musculi praedicti sed etiam superiores pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Dyspnoeae etiam & Orthopnoeae nomen, quemadmodum de asthmae diximus, communiter non raro in omni difficultate spirandi usurpatur, quae in pleuritide, peripneumonia, aliisque affectibus contingit. Idem dicendum est de apnoea, quae non depravatam, ut praedicta, sed immutatam vel absolutam respiracionem significat, eaque contingere solet in seropico, hysterico affectu, & apoplexia fortissima.

Humor asthma efficiens est ut plurimum pituita a capite in pulmonem defluens, cuiusque bronchia obstruens. Interdum tamen fit ab humoris crudis & serosis a venenoso genere per arteriam venosam in pulmonem translatis, & fit ad bronchorum canales profluant, verum asthma cum stertore producat; si vero in pulmonum substantiam, vel in latus arteriae subsistat, asthma spurium generant sine stertore.

Haec asthmae species, quae vulgaribus Medicis ignota est, (nullam enim aliam causam praeter fluxum a capite agnoscunt), confirmatur, non solum ex stertoris carentia, sed etiam ex eo, quod in eo vix agrotantium crassae & turbidae exco solent, praesertim in paroxysmo, quia humorum crassiorum & crudorum in venis agitantium portio ad renes & vesicam transmittitur. Et nonnulli asthmae vix difficultati obnoxii sunt, eaque vix esse ab asthma liberum sunt; asthma vero paroxysmo praesente cessat vix difficultas, ob materiam morbosam in venis contentam ad hanc vel illam partem decubutam. Vidimus etiam quosdam asthmae alius fluxu obnoxios, ita ut praesente alui fluxu ab asthma liberis essent; eo vero cessante asthmae paroxysmo redirent. Adde quod haec asthmae species, quae sine stertore fit, vix lectione, ita efficaciter oppugnatur, ut ea in paroxysmo celebrata, quam primum sanguis fluxu incipit, agri statim, melius spirare incipiant, & in fine illius aut post exiguum saltem intervallum paroxysmo penitus liberari appareant. Ac denique huiusmodi asthmae plenamque cachexia & pedum tumore edematoso laborant. Quod ostendit causam asthmae tunc temporis ab hepate proficisci, & in venis contineri, ita ut tandem in plenae hydrops

non sequatur. Inde Aretæus inter signa asthmae imminentiæ iatus in præcordiis & fluctationes præter rationem enumerat: quæ proculdubio à materia cruda in præcordiis exagitata procedunt.

Illa tamen fluctuata materia primò, & per se aliam asthmae speciem interdum producit, quæ asthma fluctuans seu hypochondriaci nominatur: quando scilicet flatus crassi & copiosi ab hypochondriis eleuati diaphragma comprimunt, eoque notum inopinatè vnde lumina respirandi difficultas sine ictu procedit.

Diagnosis huius affectus, & speciem illius, ex propofitis innotescit.

In dyspœa enim spiritus est densus citra sonum & anhelationem inuicem inuicem molesta.

In asthma grauitas pectoris est maior, spiritus crebrior & densior, cum anhelatione, siccitate, ac sibilo.

Orthopœa verò non nisi erecta ceruice respirare permittit, & cumbentibus suffocationem minatur.

Signa causarum in hunc modum se habent.

Sia crassus humoribus in pulmone collatis asthma generetur, difficultas spirandi sensim & paulatim accrescit, eaque continua est & insensibilis.

Si verò humores aliunde in pulmones per intervalla affluant, difficultas respiratio continua non elidit per intervalla recurrit. Licet enim asthma quod à materia in pulmone contenta excitatur, exacerbari plerumque soleat à causis externis, ut nimirum, ære austro, & similibus. In asthma tamen quod à materia aliunde affluente producit exacerbatum illa longè manifestior est. Si asthma materia à cerebro deliuat, catarrhus pectoris adiungit. Si uero nulla catarrhi indicia appareat, per venas materiam affluere conijciendum est. Hepatis affecti & partis mandantis rationem habentes indicium est tumor pedum & cachexia.

Si humor crassus in bronchiis pulmoneum continetur, respiratio fit cum sonitu & tussu, tum pituita per tussim excreta cessat vel immittitur affectus.

Si humor in venis aut substantia pulmonis hæreat, nullus adeit sonitus & raro aliquid per tussim excremitur.

Quod ad prognosin attinet, asthma chronicum est affectus, & curati difficilissimum, sæpeque in cachexiam & hydropem degenerat. Iuuenes aliquando liberantur sed & non sine magno labore, senes uero nunquam. Infantes, nisi maturè curentur, superveniente catarrho suffocant, intereunt.

Qui ex asthma, vel tussu gibbi euadunt, ante pubertatem innotant, quia gibbositatis conueniens pectoris incrementum impedit pulmoni nihilominus, debitam magnitudinem ac quiescent, non habet sufficientem spatium, in quo dilatari commodè possit ad liberam respirationem, vnde calor cordis non sufficiens ventilitas marcescit, & hominem ad interitum perducit.

Asthmati pleuritis aut peripneumonia supervenientis lethalis. Quia pulmo à longo morbo debilitatus non potest grauissimo modo supervenienti resistere, & materiam morbificam expellere.

Asthmatis curatio duplex instituitur, una in paroxysmo, altera extra paroxysmum.

In paroxysmo statim vna secunda est, præmissio clysteris si sanguis mediocriter abundare videtur, autem depletus sanguine venis liberor erit respiratio. Quod si affectus sit antiquior, pluriusque sanguis licet detractus, satius est à pleurotomia abstinere, quia calorem natium immutatio, maiorem promouet pituitæ copiam.

Secundo nialico præstat est, præcipue in affectu sympathico.

Poli venæ sectionem, vel etiam ea omissa si non videatur idonea, purgans phlegmagogum erit exhibendum, ex ijs que in frigida crebre, interpersa curatione descriptæ sunt, adiectis perpetuo quibusdam thoracis, quantum remedium forma permittere poterit.

Vomitiva verò, licet à nonnullis improbenentur in hoc affectu, tamen conuenientissima sunt, vt frequens experientia docuit, & non raro hoc solo remedio paroxysmus soluitur.

Inter alia autem vomitoria principem locum obtinet aqua nicotianæ, exhibita ad ʒ. i. reduci potest in syrupum

cum saccharo Dosis cochlearia iij. In cuius penuria vsurpari potest sal vitrioli, vel aqua benedicta. Ratio autem cur vomitoria in hoc affectu tantopere proficere legantissima est. Quia dum pituita tenuior à capite defluens, in asperam arteriam, & pulmonis bronchia leue infuscat, & asperam arteriam portio in ventriculum delabitur, alii que parietibus ita aliguitur, vt ægeritum aëlli possit. Interim verò dum calor illius debilis materiam aliam exagitat, sicciores crassiores producunt, qui ventriculum inflantes diaphragma comprimunt, & difficultem respirationem efficiunt. Vnde fit vt vacuo ventriculo cesset paroxysmus, aut mirum in modum remittatur. Adde quod asthma interdum (imò frequentissimè) iuxta Sennertii sententiam, à humoribus crudis generatur circa hepar, & in venis collectis, qui per venam arteriosam ad pulmones feruntur & bronchia comprimentes asthmae causa sunt. Hic autem humoribus purgandis, & à pulmone reuocandis maxime conuenit vomitoria. Quibus etiam huius causæ ratione remedia, quæ per inferiora humores expurgant, conuenientissima sicut.

Vomitur etiam in hoc affectu leuiter mouet, simulque per inferiora purgat succus ieros nostratus ad ʒ. ʒ. & vini hippocratis ʒ. i. quem leuissimum cum succello vsurpare relet Platerus in obseruationibus.

Poteit augeri ducti succi ieros nostratus ad ʒ. i. si minori exhibitus sufficiens operatus non fuerit.

Clysteres etiam actiores frequenter inijci poterunt reuulsiones gratæ. Eorum tamen quantitas sit exigua, ne infestina admodum replendo diaphragma comprimant.

Tum etiam frictions in paribus inferioribus celebrandæ, si modo que curabitur plures attingendæ, tum etiam ceruicæ. Postmodum humores crassi liquandi & attenuandi status ab ijsdem humoribus excitati resoluendi atque discutendi. In quem vsum valiter exhibetur aqua cinamomi ex cochleari per se vel cum syrupo violæ mixta, vt.

ʒ. Aquæ cinam. ʒ. i. v. Traiçantur per manicam Hippocratis. Loca syrupo violæ, oxymeli, admisceri poterit, ad lentos humores potentius discutendos.

Vtile etiam est ol. saluie, rosina, vel anisi æter chymica extractum ad guttulas ii. vel iij. cum vino exhibitum. Vel his alpergantur tabellæ diatræag. frig. quas eger deglutiat.

Alij commendant croci ʒ. i. cum vino cochleari exhibitum. Vtilis etiam est aqua clareta, in hunc modum composita.

ʒ. Aquæ vitæ ʒ. i. v. Aquæ tussilag. & scabiol. ana ʒ. i. v. acchari ʒ. i. cinam. ʒ. i. v. Traiçantur per manicam Hippocratis. Capiat eger ʒ. i. vel ii.

Humus nicotianæ per tubulum haustus paroxysmum cohibet. Idem præstat eadem nicotiana lingue tantum adanotidem quoque præstat fumus caryophyllorum per tubulum haustus.

Interim expectorantia vsurpanda sunt, quæ crassiores materiam per anacardium educant.

ʒ. Syrup. de praffio, & squirit. & de tussilag. ana ʒ. i. oxymel. simp. ʒ. i. Misce, vtatur ex cochleari sensim lambendo.

ʒ. cerebint. clar. ʒ. i. ammoniaci ʒ. i. v. Borum sulphuris ʒ. i. Misce, siant puluiz molles, quarum vna singula dasbus horis deglutatur cum syrupo de hyslopo ʒ. i.

ʒ. Ol. amygd. dulc. recentis sine igne expressi ʒ. v. sacchari candi ʒ. i. Misce, capiat sensim lambendo.

ʒ. Rad. enulæ cap. saccharo condit. ʒ. i. v. sacchari candi ʒ. i. v. syrupo de hyslopo & de praffio, ana ʒ. i. gummi ammoniac. aqua vitæ dissoluti ʒ. i. Misce, diat looch. Vel

ʒ. Conifer. violæ & rad. enulæ cap. ana ʒ. i. v. pulu. elect. diatræaganthi frig. & diatræas Salomonis, ana ʒ. i. v. syrupo violæ & capill. ven. ana q. i. Fiat looch.

ʒ. Rad. calidæ ʒ. i. v. rad. enulæ cap. ʒ. i. v. cydoniorum, vel eorum loco carnis cydonior. condit. ʒ. x. v. Bulliant in aqua ad exsiccationem. Contundantur: traiçantur per sectaculum addendo mellis ʒ. i. Coquantur leuiter extrahæ ab igne, & adde cinam. ʒ. i. flor. sulphuris ʒ. i. v. iuric. cum moscho & aqua rosæ aromatizet. ʒ. i. v. Fiat electuarium molle, de quo teneat in ore ad magnitudinem cucullæ per incurrula. Vtilissimum etiam extra paroxysmum, si de eo tumatur ʒ. ʒ. manè & sero.

Externus etiam pectori admouenda vnguentæ & linimenta laxantia & discutientia, in hunc modum composita.

aur gallos; decoquantur donec caro ab ossibus secedat, in multa aqua, vale amplissime opus sit nouam affundere. Deam eam colaro, & in 76. x. adde mellis depurati 76. x. ne cito corrumpatur. Capiat fontellam vna manū, in qua dissolue manna; & cassie recentis, ana ʒ. ʒ. continuando ad multos dies, vt mensiem, & amplius. Quod ex melius uiaabit, si mox etiam cerebithi ʒ. ʒ. cum piculidj in forma boli, aut aliter assumat.

Ludovicus Septralius. in *causa aduersus febres præfata*, hæc iura galli veteris damna, tanquam inutilia, vel potius noxia. Ratione illius sunt, quod experientie non respondeant & irritu succellu a ʒ. & alijs Medicis Mediolanensibus fuerint usurpata. Quod ex longa ebullitione nitroſa illæ partes, quibus maxime prodire iura illa creduntur, subſident, atque in percolatione reſiciuntur: viscidæ autem glutinosæ, crassæ, tum & perpingues ex cute, pedibus alarum extremis, muculosis, & necuſi partibus permanentes maxime remaneant. Vnde crassior reddatur inateria morboſica, & ex expectorationis mīſtj idonea. Purgantia verò, & alterantia longa ebullitione vires ſua amittunt.

Verum non debet Septrali experientia, tot tantorumque celeberrum Medicorum, tum antiquorum, tum recentiorum à quibus hoc genus remēdj maxime commendatur, experientie præferri. Si enim quibuldam ægrotantibus à ſe, alijsque curatis non conſentient, multa alia obſtare poterunt: nempe vel praua ægrotantium diſpoſitio, morboſque contumacia, vel cætera ad curationem ſpectantia non bene adminiſtrata, vel ipſum remedium malè preparatum. Quod vero dicit nitroſas partes longa ebullitione ſubſidere, & in percolatione reſci, ridiculum eſt: ſubſident enim tantum partes terreſtiores. Nitroſa verò ſubſtantia in liquore ſimul recepta nunquam ſeparatur. Vnde fit vt iuſcula, quo diutius coquantur, eo ſaltior euadant. Salſedo autem illa incidit, attenuat, & obſtruit, tantum abell, vt iuſculum ſalſedine illa produm increſcere poſſit materiam morboſicam. Neque habent carnes, aliæque partes gallorum, ſubſtantiam ita glutinola, vt illæ ſinglæ, qualis forſe in vinulorum pedibus, aliorumque animalium reperitur; ſed potius attenuantur, cum nitroſa ſubſtantia maxime reſerte ſint. Ac denique purgantia, & alterantia, ſi iuxta Pharmacie præcepta, & ſecundum artem decoquantur, vt res ſuas integras in decocto relinquunt, cum quotidiana apud nos experientia conſit, huiusmodi iuſcula galli veteris perbellè purgare. Et ſi experientia noſtram Septrali experientie opponere liceat, bona fide teſtari poſſumus nos ex huiusmodi decoctis mirabiles effeſtus in aſthmatis affectibus, & doloris colicis diuturnis ac contumaciſſimis percepſiſſe. Hoc tamen in horum iuſculorum præparatione obſeruari ſolemus, quod nimirum pro vna tantum doſi ſingulis diebus iteranda præſcribimus: inuenietis ſcilicet ne ad plures dies aſſeruata corrumpantur, aut ſaltem deteriora ſiant. Formulæ autem à nobis præſcriptæ ſolite in aſthmaticis curatione exemplum tale erit.

ʒ. Rad. enulae camp. & iros Florent. ana ʒ. ʒ. fol. hyſſopi, & niſſilaginis ana M. i. liquore ſal. & paſſul. mundat. ana ʒ. i. ſiccum pingulum in i. v. lenne mundat. ʒ. ii. polypod. quer. c. & ſem. carthami in i. v. lenne mundat. ʒ. ʒ. ii. Coquantur cum tertio, vel quarta parte galli veteris ſecundum artem, & fiat iuſculum, quod capiat æger per xi. vel xv. dies.

Vino purgante infra deſcribendo. Platerus mulierem, curauit dyſpnoea laborantem, & ad hydropem niſſantem.

ʒ. Rad. iſidis ʒ. i. rad. enulae, ſcilla præparat ana ʒ. ʒ. marubij M. i. cortic. ſambuci, & ebuli ana ʒ. ʒ. lenne ʒ. ʒ. ii. acacie ʒ. ii. anizib. ʒ. i. Coquantur omnia, & adde vini ʒ. i. v. Coquantur parum in duplici vase. Bibet cibum iura hauſculum per dies ſex, ceſſauit dyſpnoea, & tumor euaiuit, paucique curata ſunt.

Notandum autem eſt, purgantia in hoc affectu eſſe iteranda, idque ſub vasis formulis, ne vni eidemque remedio natura afficiat. Sic etiam remedia detergentia, incidenda, & expectorantia, aliæque per vicia immutanda ſunt, propter eandem cauſam.

Pleuritis alia vera & legitima eſt, alia notha ſeu ſpuria. Vera pleuritis eſt inflammatio membranz coltas ſuocingentis vel muſculorum intercoſtialium interuorum.

Notha verò eſt inflammatio muſculorum intercoſtialium exteruorum.

Dantur etiam alij lateris alarumque thoracis partium dolores, qui ad notham pleuritidem an ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. referuntur, quando nimirum mediſtinnam inflammatur, pulmo coltis agglutinetur, humores ſerofi vel purioſi à capite in thoracis muſculos deſcendant, ſtans eodem modo uos aut thoracis membranas diuellunt, & vapores à ventre inferiori eleuati eadem partes vellicant aut diſtendunt, vt in lumbricis ſæpe contingit.

Diximus in vera pleuritide non ſolū pleuram, ſed etiam muſculos meſopleuricos internos inflammari, quia impoſſibile eſt qua inflammatio membranz muſculis contiguſ communicetur. Nonnulli præter ea pulmonem etiam in omni pleuritide inflammari conſentunt, & ſententiam ſuam autoritate, ratione, & experientia conſirmat. Autoritas eſt Hipp. *lib. de ſitu v. humores*, vbi dicit, vtraque pulmonis parte inflammata ſieri Peripneumoniam ſi verò altera tantum pulmonis pars inflammetur, eſſe, pleuritidem. Idipſum ratio conuincere videtur. Si quidem ſigna pleuritidis iuxta etiam ſigna peripneumoniz, iuſtis numeris, febres continuæ, reſpirandi difficultas, & ſputum cruentū, Prognosis etiā & curatio eadē eſt in vtroque aſſectu. Aſſerunt denique ſibi experientia compertum eſſe, in aperta pleuritide corum cadaueribus pulmonem inflammatum ſemper apparuiſſe. Verum concedendum quidem eſt in plurimis pleuritis pulmonem cum pleura ſimul affectum eſſe, facile enim fluxio in vtramque partem decumbit, cum pulmo pleuræ ſuperiori parte alligetur. Aſſerendum tamen, ſolam pleuram ſæpiſſime inflammatione affici, illæ pulmonem, aut ſaltem ita leuiter afficere, vt morbus, alius partis affectus dici nequeat. Auctoritas verò Hypocritæ à nonnullis reſicitur tanquam ſpuria, & alijs quamplurimis contraria, in quibus Hippocritæ ſolam pleuram tanquam partem à ſelectam agnoſcit, præſentem *lib. 1. de morbis*, vbi pluries repetit, blem & puritatem ad latus aſſigi, & dolorem vehementem excitare.

Martianus vero eam ita conciliat, dicens, Hippocritæ eo in loco agere de peripneumonia quæ fit à deſluſione à capite, cuius portio deſcendit in pleuram, & ea ratione vt diſtinguat eam que viam tantum pulmonis partem afficit, ab ea que vtramque, pleuritidis nomine eam afficere. Similitudinem vero ſymptomatum in pleuritide, & peripneumonia facit morbi vtriuſque natura eadem, que à inflammatione conſiſtit, & parum aſſectum vicinia.

Quod vero in plurimis ex pleuritide ſubſatis palmo affectus inueniatur, inde concludendum non eſt, ſemper ita contingere; nam pleuritides vehementiores, que mortem inducere conſueſcunt, in peripneumonia vt plurimum degenerant. Sed plurius teſtimonijs, & nobis etiam experientia compertum eſt, in multis pleuritide corum cadaueribus ſolam pleuram corruptam, tuptam & putrefactā inueniri.

Dubitare licet cor pleuræ frequentius quam aliz membranz, inflammatione afficiatur? Reſponſio vero deſumitur ab Hippocritæ *lib. de morbis* 12. i. iuxta Salii diuiſionem, vbi dicit, latus eſſe partem vnam debilem, quia carne nudum eſt præ reliquis corporis partibus, & non habet aliud quod reſiſtat, ideo communis humoribus ab aliqua cauſa procrataſtica aſſicere & eſcalacit, eorum deſectus in illam partem facile concitantur.

Materia pleuritidis efficiens eſt vt plurimum ſanguis bilioſus, qui facilius denſam membranam penetrat: & Aulicæ de pleuritide loquens, in *membranæ*, inquit, non penetrat, niſi humor tenuis & cholericus. Alij tamen humores hunc affectum producere valent, modo humorem ſeroſum aut bilioſum pro vehiculo ſecum admittit habeant; alios humores dico, non excrementitios, ſed naturales, qui ſub ſorma ſanguinis continentur, & vel ſanguis propriè di-

ctus.

Aut, vel sanguis punitollis, aut melancholeus nominatur. Obſervandum tamen eſt, humores tenuiores veram pleuritidem magis effluere, craſſiores verò nothari.

Ille autem ſanguis per vala thoracem nutriticia, venam præteritum aſſilare, & æz ygon deſertur, & ſi quantitate, vel qualitate, vel motu peccet, in membranam, & mucoſos vicinos effunditur.

Pleuritidis differentiæ à loco affectos, & cauſis deſumuntur. Ratione loci vel ſitus doloris, diſtinditur à Hippocrate. 1. acutus, in aſcendentem, cum dolor ad iugulum magis tendit, & deſcendentem, cum verſus hypochoſtria vergit. Nonnumquam etiam verſus doriſmagis extenditur, cuius mentionem facit Hipp. 3. de morbis; interdum etiam magis verſus anteriora deliſcit.

Ratione cauſe ſeu humoris peccantis, alia dicitur ſanguinea, alia biliola, alia pituitola, alia melancholica.

Inſignis alia differentia proponitur ab Hippocrate 1. acutus, quæ pleuritidis diſtinditur in ſiccam & humidam. Siccæ dicitur in ea in qua nihil vel perexiguum expuitur, non ſolum in morbi principio, ſed etiam in progreſſu illius. Cuius rei variz poſſunt eſſe cauſe, nempe materiæ morbiſicæ cruditæ, craſſiſſimæ, & viſciditæ, vel ſiſcultatæ imbecillitæ, vel bronchiorum obſtrictio, vel doloris vehementia. Humida verò eſt in qua ſputum ab ipſo morbi initio ſatis copioſum apparere incipit.

Diagnofis huius morbi per ſigna pathognomonica ſtabilitur à Gal. 5. de loc. aff. cap. 8. alius in locis, quæ numero quintario comprehenduntur, nempe 1. Dolor lateris punctorius. 2. Febris acuta continua. 3. Difficilis reſpiratio. 4. Pulſus durus & ferratilis. 5. Tuſſis frequens, & moleſta. Dolor punctorius eſt membranis proprius, præcipuè à materiâ biliſola proveniens. Ille autem dolor lateris occupat ad vicinas partes ſe extendit, & nunc ad iugulum, nunc ad hypochoſtria, & perſurgit per continuitatem membranz, quæ totam thoracis cauſitatem inſeſtit. Hoc ſignis pleuritidis à peripneumonia diſtinguitur, quia nullus aut perexiguus lateris dolor apparet, niſi cum pleuritide complicata ſit.

Febris acuta continua ex phlegmona in parte cordi vicina ducit originem, atque adeò ſymptomatica eſt: quamvis interdum febris eſſentialis pleuritidi coniuſta ſit; ionò verò illi primam originem dedit. Contingit etiam ſæpè in principio febrim continuam, vel ſanguis in venis ebulliens expellatur à natura in partem receptioni illius magis idoneam, quales ſunt partes laterales, & inſam matronem pariet. Huius rei indicium eſt, quod febris primam ægotantem inuadat, non ſecundo tantum, vel tertio die lateris dolor appareat. Quando verò febris eſt ſymptomatica, tunc dolor lateris ab initio ægotantè corripit, febris verò paulo poſt aut eodem tempore apparet.

Reſpiratio difficilis in hoc affectu neceſſario contingit, cum partes inflammatz diſtendi ſufficiunt non valeant magnam aeris copiam attrahendam, quæ ad cordis aſſiſtantiam refrigerant neceſſaria ſit.

Pulſus durus fit ob membranam affectam illiſque tenſionem, quæ arterias etiam diſtendit, & ille propter eandem tenſionem, cum pulſus differentiam efficiunt, quæ ferratilis nominatur, quando ſcilicet, dum plures digiti arterie admoventur, una illius pars magis attolli, quam alia, videtur, ut ſecum hoc modo aliquatenus repræſentet.

Tuſſis moleſta in pleuritide contingit, quia natura continuo rem poſſibilem eſt parte affecta expellere nititur: tum etiam ex illa aliquid in pulmones reſtat, quod eius ſiſcultatem expulſitricem commouet, unde tuſſis exoritur.

Propoſita ſignis adiungitur ſputum cruentum, quod quidem neque in omnibus pleuritidibus, neque in omnibus morbis temporibus apparet, & id inter ſigna pathognomonica non reſertitur. Qui pulmonem perpetuo affici in pleuritide diſtindunt ſputum cruentum à pulmone afferti aſſertionibus, à membrana coſſas luſcigente ad pulmonem tranſire poſſe negant, cum membrana denſiſſima ſit, tum etiam membrana pulmonem inuolvens ſit eiſdem naturæ quæ à ſanguine illo extranſato penetrari non poſſit.

Verum hos Galenus maniſeſte redarguit 5. de loc. aff. 5. cap. 3. ubi primum oſtendit, materiæ in thorace cauſitate

contentam tranſumi in pulmonem, & per anacathemum expurgari, duobus exemplis luculentis: Vnum eſt eorum qui vultus in thorace acceperunt, in cauſitate illius penetrans. Si enim muſſa in cauſitate pedoris iniciatur, & vultus coſſitum occidatur, paruo interſectio tempore, muſſa per os cum tuſſi eicietur, & æger muſſæ ſaporem in ore percipiet. Alterum exemplum deſumitur ex obſiſſa fractura, quæ fit illæ cute. In ea enim dum callus coſſit, & oſta fracta conſtituta incipiunt, portio ſanguinis qui ad partem affectam confluxit, ad cutem deſertur, eamque perſuadit, ita ut vitæ ſalutis quæ membro obduſſas iriget, & conſpiciat. Docet etiam modum Galenus quo ſanguis, pus aut alia quævis materia in cauſitate thoracis contenta à pulmone tranſumi ſoleat, oſimur per oriſſia, extrema bronchiorum ſive ramorum alperæ arteriæ, qui per pulmonem diſperguntur, & ad illius ſuperficiem deſcunt. Quamvis enim venæ arteriæ, & arteriæ venoſe oriſſia ad pulmonis ſuperficiem etiam deſcendant bronchiorum tamen oriſſia reliquis ampliora, & potentiora ſunt. Quanto enim alperæ arteriæ ratione caudicis maior eſt caudicæ venæ arteriæ, aut arteriæ venoſæ, tanto hæc maiores ſunt ramis, & oriſſia oriſſis, cum omnia hæc vala æquali quadam diſpoſitione ſeſtendantur, quo in vultum pulmonis corpus diſtribuantur. Deinde alperæ, & arteriæ bronchiorum eius ſubſtantia cartilaginea eſt, unde fit ut non ita conueniat ac concidere valeant, ut reliqua vala, eorumque oriſſia magis aperta maneant, ſicque materiæ in thoracis cauſitate coactam facilius excipere.

Ille autem tranſiſſum materiz in thorace contentæ ſit, docente Galeno, in conſtrictione thoracis, dum expiratio perſicitur: tum enim thorax quæ in ſua cauſitate continetur, premit verſus pulmonem, & in ipſum impellit; ut portio ſaltem eorum in bronchiorum oriſſio exprimat. Neque obſtat pulmonis mollietas quæ compreſſionem cedit, atque ita materiæ ad cum impuſſam recipere non cogitur. Hæc enim mollietas facit quidem, ut tota materia impuſſa non recipiatur non impedit tamen, quin portio quadam illius in partem ſubſtantiam ſeſe inſinuare valeat, quamvis maxima pars in cauſitate remaneat in mollietate prædictam.

Addamus & nos huic Galeni doctriæ admirabilem naturæ providentiam, quæ paſſim inuenit vias non ſolum maniſeſtas, ſed etiam incognitas & ſæpè incomprehenſibiles, per quas res noxiæ, & moleſtæ expurgantur conſuevit, de ſane in fractura dictum eſt, quæ per poros inſenſiles muſculorum & ipſius cutis expurgatur.

Spuria pleuritis à legitima diſtinguitur, quod in hac dolor exacerbatur dum æger decumbit in lateris oppoſitum; tunc enim pars inflammata pondere ſuo diuelli maoremque partem diſtentionem, in illa verò muſculi externi inflammantur comprimentur quando ſupra lateris affectum æger decumbit.

Tempora huius morbi ſequentibus ſignis indicantur. In principio omnia ſymptomata pathognomonica debitorum ſunt, dolor, & febris exigua, tuſſis ſicca vel certe ſputum exiguum & crudum. In augmento febris, & doloris incrementum adeſt, ſputum copioſius. In ſtatu proſtrata vehementiora, inquietudo, delirium dolor capitis, & ſi non orbis ſalutatis ſit, ſputum concoctum, liberum, & copioſum. In declinatione ſputum peſſetæ coctum, libera anacathariſi omniſque ſymptomatum remiſſio.

Signa cauſarum diagnosticæ generaliter deſumuntur ex temperamento ægotantis, anni tempore, regione, victus ratione, aliſque communibus. Specialiter vero à ſanguine puro ſicæ pleuritidem oſtendunt: Sputum rubrum & ſanguinolentum, dolor tenſius cum pinguetio mixtus; venarum plenitudo præſertim circa tempora & frontem, rubor faciei totius, pulſus plenus, vrina rubra & craſſa, cum corona interdum luſcente.

Bilioſum ſanguinem oſtendunt ſputum ſaſium, ſubris ardentior, ſitis vehementior, pulſus durior & velocior, dolor pungens acutus, vigilæ & inquietudines maiores, oris amaritudo, vrina tenuis, & intente illa.

Pituitolum ſanguinem demonſtrant, ſputum album viſcidum aut ſpumolum, dulce, & tardè crampens, levis remiſſio.

remissa, fitis paucæ, salivæ & excretio multa, dolor remissior & grauior, locus maior, pulsus parvus & minor durus, urina pallida & crassa.

Sanguinem melancholicum ostendunt sputum nigricans, tenax & tardè erumpens, febris & dolor remissior, urina rubra, obfusca, tussis siccior, lingua nigricans, & alperæ alius adstricta.

Prognosis primum ex symptomatum remissione aut vehementia desumitur. Si enim dolor, spirandi difficultas & febris non multum molesterint morbum remissiore significat, si verò dolor vehemens fuerit & tussis magna, in qua nihil eximitur, febris item valida & anhelus difficultas maxima, periculosa pleuritide exultare oportet.

Pulsus in pleuritide parvus, frequens, & valde durus mortem prænotant. Et ex eo nulum sanatum esse affirmat Gal. *lib. 2. de progn. ex puls. cap. 5.*

Pleuritis exquisita, in qua nihil expuitur, aut in qua sputum postquam apparere incipit, iterum supprellum est, dolore lateris & pectoris grauius superfluit, periculossima est. Crudissimum enim morbum significat, qui aut breui hominē ingulat, vel non nisi longo temporis spatio finit.

Sputum mitio & intra certum diem u. apparens, breuius morbum significat: sin vero postea sit, longum Hippocr. *aph. 1. sect. 12.*

Flava bilis pituitæ vel pauco sanguine valde permixta, cum satis copioso sputo in principio morbi apparente, salutis iudicium.

Sputum valde sanguinolentum periculosa est; venarum enim aut carnis runctionem significat, unde suppurationis expectanda est. Paucus verò sanguis per resolutionem effluere consuevit.

Sputum album, ac glutinosum rotandum, malum est. Lentor enim & visciditas ab igneo calore materiam adunatæ proficiscitur.

Sputum viride, & æruginosum, malum, nigrum verò pessimum. Somnam enim adulescentem vel caloris nativi extinctionem significat.

Anacatharsis copiosa, quæ doloris malæque symptomata non sedat, mala. Magnam enim materiam copiam arguit.

Pleuritis in senibus, mulieribus vero gerentibus, alihæmaticis & iis quibus terree huius morbum passim sunt, perniciofa.

Quicumque laterali morbo laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur, empyrei sunt. *Aph. 8. sect. 5.* Alij ad vigesimam diem & purgationem extendunt.

Diarrhœa pleuritidis aut peripneumonie superueniens, mala *Aph. 16. sect. 6.* Quod intelligendum est de pleuritide, in qua tanta est inflammatio, ut hepar & ventriculus inconuenienter trahatur, aut quando prostratis à morbo viribus retentæ facultates ferè abolitæ est. Si verò pleuritidis adeo magna non sit, & in corpore contingat multa cacochymia laborante, alui fluxus interdum salutaris esse solet, præsertim si quædam concoctio signa præcefferint.

Vomitibus biliofus & copiosis in principio pleuritidis, salutem prænotant. Levata enim natura ab illa euacuatione biliofa cacochymia, morbum facilius superat.

Pleuritidis peripneumonia superuenit, malum, ex *Aph. 11. sect. 7.* Fit enim translatio materie ad partem nobiliorem. Si pleuritidis dolor cum sputi biliofo sine ratione cæuerit, ægri in delirium incidunt. *Hipp. 3. Præterea.* Humor enim biliofus sursum ad caput rapitur, & tunc etiam vires tenues & albe apparent.

Pleuritis quæ diuturno morbo succedit, aut in corpore cachectico accedit, periculosa.

Densa & exercitatiōe debita edidit copiosa citius ex pleuritide & peripneumonia interire. *Hipp. 10. Cæc.* Et quotiāna docet experientia, febres pleuritide correptos, omnes propemodum interire. Quia robusta illa corpora non nisi ex grauiuscula causa in morbos incidunt, & propter densitatem non facili transigunt, ut morbi resolutio fieri non possit.

Quibus in morbo laterali plurius ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculique auriginosi sunt, & caliginè obducti, in his morbis expectanda est. *Hipp. 10. Cæc.*

Quibus pleuritidis lingua circa initia biliofa est, hi intra

septimum iudicantur; quibus verò tertio aut quarto die, circa nonum.

Ad pleuritidis curationem primo humor illum committens, reuellendus, deriuandus & discutendus est. Ac si totus diffusi nequeat, concoquendus, maturandus, & ex pecturandus. Tum febris quæ non raro essentialis in pleuritide, non semper symptomatica est, propriis remedijs succurrendum. Quæ omnia sequentibus aut illis perfici poterit.

Et quidem ab initio sanguis detrahendus est & basica ciuilem lateris præmissio clystere si affectus non valde urgeat; alioqui post phlebotomiam ille possumus inueni.

Mitti autem debet sanguis singulis diebus, donec dolor, & febris multò minores euaserint. Imo verò interdum bis in die, cum peracuta pleuritide est.

Hipp. *2. de rat. puls. in acutis, sect. 10.* Infigem regulam & in prævi vestimenti pollicem ita tradidit ut mittatur sanguis vique ad coloris mutationem. Si nimium penitus, aut leunda phlebotomia sanguis apparet erubescens, purior, aut aequalis; continuanda singulis diebus, aut bis 10 die vacuatio, donec sanguis detractus appareat rubicundus, vel lusciescens. Si vero in principio appareat ruber, iteranda toties phlebotomia, donec luscus, aut niger appareat. Significatur enim linguam illum pollicem ad partem affectam, aut venis ipsi vicinis effluere, qui quidem à calore parvis illam alterat, & ex crudioribus factus, vel ex rubro niger, aut luscus per aditionem.

Licet autem huius præcepti obseruatio in præsertim plurimum optime succedat, aliquando tamen coloris illa mutatio pertinaciter expectanda non est; sed prius à sanguinis missione desistendum; eum videlicet, aut vires sunt debiles, aut æger habuit raro, aut valde resolutus pendens, aut tempus anni calidissimum.

Quantus autem sanguis missio in principio morbi præcipue consuevit; si tamen ea fuerit omnia, aut insulsi fuerint celebrata, etiam post septimum, nonnumquam vnde cumque, venam secare licet, exemplo Hipp. qui 3. *Epidem.* Anaximæ vocem fecit octaua die, vel quod citius non fuerit vocatus; vel quod in pleuritide crudissima, quæ vnde decimo die vix loqui cepit, morbus induratus deducit.

Cum verò anacatharsis libera, & liberalis iuxta incipit, tunc temporis à phlebotomia abstinendum, quia anacatharsis suppurationem, & æger in vires ductionem concitat.

Ad hoc autem necessaria est venæ sectio in humis affectus principio, ut nunquam omitti debeat; nedum in senibus, pueris, grauidis mulieribus, pauperis, & mentibus purgationis patientibus: quibus omnibus experientia docuit phlebotomiam, prætere hoc affectu, fuisse vtilissimam. Cautiones autem in venæ sectione obseruandæ in mulieribus puerperis, aut menstruis purgationis patientibus, videantur infra *lib. 15. cap. vltimo*, in morborum acutorum, puerperarum curatione.

Ab ipso etiam morbi initio, bis aut ter in die exhibendi sunt iulepi refrigerantes, humoris ardorem, & caliditatem cohibentes, & fluxionem sistentes, in hunc modum compositi.

℞. Aque papauæ rhœad. 3. iij. srupti violæ. vel eiusdem papauæ 3. i. lais prunellæ 5. 0. Fiat iulepi.

Post primam phlebotomiam inungatur lateri dolens sequenti linimento, paritè postea terendo illa succida lineto insula.

℞. Ol. liuor. chamæz. & amygdal. dulc. ana 3. i. butyri recentis & axungæ gallinæ, ana 3. i. 1/2. Fiat linimentum.

Multi addunt ceram huiusmodi linimentis, quæ tamen non conueniunt, quia obstruit poros: ut neque mucilagines, quæ emplatricæ sunt, quæ reirrigant & allungunt.

In pleuritide maligna, & pelliculosa, vultus additur huiusmodi linimentis olei scorp. Marcholi, vel theriaci modici.

Post iteratam venæ sectionem si locus admodum eductus est, in sequentem modum compositus.

℞. Radic. althææ, & liuor. ana 3. i. fol. malax. viol. parietar. ana M. i. feniculi, & conseru. ana 3. i. storac. chamæz. melilot. sambuci, violar. ana P. j. Fiat onunum decoctio, quæ fouetur lateri dolens, cum vesica iuncta.

Post locum admodum in linimentum prædictum, cui in progressu morbi addit poterant, olea in aqua resoluta ut anethum, itinum: tum etiam puluæ urosæ & crocus. Imo

verò ipsi fomento addi poterunt herbe discutientes, ut origanum, calamintum, hyssopus, & femina valde discutientia.

Multa alia topica, pleuritidis curationi valde proficua, ab auctoribus usurpantur, quorum præcipua hæc sunt.

Prius inungatur pars vnguento de althea, postea cumini pulvis inspergatur. Vel post inunctionem brassicæ folium ad ignem calefactum, & annuntum admoveatur.

Fasciuntur misceat vnguentum de althea cum ol. amygd. post inunctionem aspergitur pulv. cumini, & superimponit solium caulis, & miræ laudibus efficit.

Item cataplasma sequens vtilissimum est.

℞. Residuum decocti pro lotu supra descripti. Contundatur in mortario marmoreo, addendo ol. amygd. dulc. lilior. & chamemel. ana ʒ. ii. pinguis galinæ ʒ. j. farinæ hord. tabar. ana q. l. Fiat cataplasma.

Item gallina vivas per ipsum scd. pulvere areos Florent. coniperia, & admodum potenter prodicit.

Omentum veterius recenct ab animalis extractum, vel in aqua calida calefactum, omentum citi anodynum. At pulmo eiusdem animalis idem efficacius præstat.

Oleum cere arte chymica extractum, inmentis admixtum dolore lenit, & materiam morbificam potenter discutit.

Panis recens è furno extractus, per medium focum, & in butyro recenti liq. uato madefactus, & admodum, materiæ lateri impactam potenter resolvit.

Possit tres aut quatuor doses iulepæ prædictæ, usurpari poterunt iulepæ pectorales, in hunc modum compositi.

℞. Hord. integri ʒ. j. liquor. rai. & pulv. mundat. ana ʒ. j. misur. par. xx. sem. quatuor frig. mai. an. ʒ. iii. flor. buglossi & violar. ana ʒ. j. Coquantur ad quartam v. in coar. dissolue syrup. violac. & nubibus ana ʒ. i. Fiat iulep. pro quatuor dosibus, mane, & sero sumendis.

Vel si febris valde acuta sit, cum vigiliis coniuncta, emulsiones usurpæ poterunt in sequentem modum.

℞. Amygd. dulc. excoriatæ, & in aqua frig. macerat. ʒ. i. quatuor sem. frig. maior. ana ʒ. ss. sem. iuduc. & papav. albi ana ʒ. ii. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo decocti hord. & liquor. m. i. ss. In colatura dissolue syrup. violac. ʒ. iii. Fiat emulsiõ pro iii. dosibus mane & sero sumendis.

Quidam præctici virgulentis vigiliis audent exhibere, narcotica, ut syrup. de papav. philonium roman. & laudanum opiatum. Quæ tamen in hoc affectu perniciofa sunt, spiritum enim retinent, & pectus coarctant. Vnde non raro præceptis exanim consequuntur.

Quod tamen intelligendum est de integra narcoticorum dosi, nam in perenigra quantitate exhibita prodesse possunt in dolore vehementissimo, tussis molesta, & inani, & valde tenui humore oriunda, & vigiliis assiduis. In quibus casibus sæpe laudat gr. s. talici cum succellu exhibui, & plures quando iterat. Sed illius vius præcipue in principio morbi convenit; tunc enim humor illius in partem cohiberi potest, & non ibi incrementum impedit.

Quando tussis importuna est, & natura incipit per angustiam aliquid euacare, & tenet æger frequenter in ore saccharum rosaceum, candum, aut peniditum, vel tabellam diarragæ anthi frigidam. Tum vtatur syrup. viol. vel nubibus ex cochleari frequenter. Vel vtatur elegans sequenti.

℞. Sacchari candidi pendiat. an. ʒ. i. pulv. electæ. diarragæ. frigidæ ʒ. ii. syrup. violac. & nubibus ana q. l. Fiat iocch, quo vtatur frequenter cum baculo liquor. lenissimi lambendo. Vel fiat elegans ex butyro, melis, & sacchari æquibilibus portionibus.

Oleum sem. lini vel amygd. dulc. recenct sine igne extractum, cum saccharo mixtum, & exhibitum, cgregie tussim lenit, & dolorem pleuriticum demulcet. Præteritum si cum iusculo, aut also decocto affatim bibatur.

Si putra crassiora sint, quando incidentia, & attenuantia erunt permiscenda, ut syrup. de tussilag. de liquor. oxy-meli simplex. pulvis diarragæ, & alia huiusmodi.

Elegmata, autem lupino corpore sumenda, quia sic melius pulmonem subeunt.

Progreddente morbo, ad corroboracionem virium conditum restat vtatur usurpatione.

℞. Conseru. flor. violar. ʒ. i. conseru. flor. borrag. & rad.

buglossi ana ʒ. ss. confectio. alchermes ʒ. ii. pulv. electæ. diamarg. frig. & diarragæ. frigidæ, ana ʒ. i. sacchari rosati ad pondus omnium. Fiat conditum auro coopertum, quo vtatur frequenter ex cochleari.

Purgatio in pleuritide vera non convenit, nisi omnino ad declinationem pervenerit; & tunc sequenti medicamento illa potest instari.

℞. Senæ mundat. ʒ. ss. sem. anisi ʒ. i. fol. buglossi & capill. ven. ana M. ss. liquor. rai. & pulv. mundat. ana ʒ. iii. flor. buglossi & violar. ana ʒ. i. Coquantur ad ʒ. iii. In colat. dissolue rhab. in aqua scabiose cum saleo citrino infusi ʒ. iiii. manne granat. & syrup. rosac. an. ʒ. i. Fiat potio.

Toto morbi decursu vtatur æger pro potu ordinario decocto hordei, & liquiritiæ, vel decocto papav. rhoad. cum syrup. capill. ven. Potus verò non sit actu frigidus, quia pectori noceret. Vinum in hoc affectu merum esse venenum, quemadmodum acida omnia, quæ tussim excitant, & costringendo anacathartism impediunt.

In declinatione post purgacionem, & febrem valde immutatam, si dolor petierit, & admodum potenter ipsi parti dolenti cucurbitula cum scarificatione. Immo & sequenti die iterum applicari ad sanguinem donò extrahendum. Possunt etiam applicari ante declinationem post iteratam phlebotomiam, bus aut ter. Et si dolor vena, vel redcat post aliquod tempus iterum secabitur, & post iterum cucurbitula applicabitur.

Zacutus Lusitanus locis scarificatis detracta cucurbitula, lacerantes lex admodum testici lacerat, ut ipse testatur, obfer. 104. lib. 1. prætaxi admodum.

In eundem finem, ad reliquias materiæ morbificæ discutendas, tentatis prius fomentis, & inmentis potenter discutientibus, vltimè parti applicabitur emplastrum de sulphure, vel de bacis lauri.

Præter remedia vulgaria huic morbo valde proficua, alia quædam usurpant posant propria & specifica: nempe ratura dentes apri, cinis priapi, tauri vel cerui; flores papaveris rubri corallus præparatus.

Quercetanus in Pharmacopoea laudat pomum extractum, & thuris malicæ ʒ. i. repetitum, & ad ignem coctum, quod æger deglutat, superbibendo aque card. bened. ʒ. ii. polica vero bene coctus iudet. Hoc remedium potenter morbi diem vltimum esse valde coque multos aliter fuisse restitutos.

Flores buxi adeo sanguinem purgare feruntur, ut si eorum pulvis ʒ. i. cum aqua papaveris rhoad. exhibita, sanguis post horam mutetur, floridus in manet.

Stercus equinum in aqua card. bened. dissolutum, & colatum pleuriticum dorem, & humorem illum producentem potenter discutit.

Idem præstat lictus albam gallinæ, ad ʒ. i. cum eadem aqua exhibitum.

Stercora illa multum habent salis volatilis, qui maxima penetrandi ac discutendi vi præditus est.

Ex duobus illis stercorebus potest fieri potio efficax in hunc modum.

℞. sem. cannabæ ʒ. ii. Contundantur in mortario, deinde adde stercoreis albi gallinæ, & stercore equini, an. ʒ. ss. Dissolvantur in aque card. bened. ʒ. v. Colentur per linteam, & exhibeantur.

Sanguis hirci (sylvæstri ad gr. v. exhibitus cum aqua prædicta, potenter discutit pleuritidem. In illius delictu sanguis hirci domesticus usurpari potest. Sed cum vires illius sint infirmiores, ad ʒ. i. exhibendus. Eius autem præparatio in hunc modum se habet.

Hircum suspende cornibus, & crura posteriora resedat ad cornus, testes abscide, & sanguinem fluentem excope in vase amplo, & effusa in sole, si ætas sit, vel retrò sursum pistoris. Longissime distat ab hircino sanguine officinarum. Fuligo camini ad ʒ. i. exhibitâ multum confert, sed multo magis spiritus fuliginis, ab Hartmanno descriptus in praxi medica.

In pleuritide epidemica sudorifica, aut diaphoretica medicamenta usurpanda sunt, quæ in febribus malignis præscribi solent, quæ tamen hunc morbum quantum heri potest, peculiariter debent respicere.

Diar-

Diarrhoea pleuritidis superueniens periculosa est. Ideo temperari debet syrupo myrrino, qui cam filit, & nihilominus expellat: atque ita cum alijs syrups permiscendus est. Venter & renes altissimè tunc munganur, ut in omni diarrhoea fieri solet. Glysteres iniiciendi, ex decocto hordei excocti, quod, ut Galen. docet, refrigerat, & altingit, additis rosâ rubris, & eo dissoluendo ouorum vitellos.

CAPVT III.

De Peripneumonia.

Peripneumonia eandem habet cum pleuritide essentiam, & parte affecta tantum distinguitur, quod illa sit pulmonis inflammatio, hæc verò membranam colitis lucingentis. Materia etiam aliquatenus differt. Siquidem pleuritidis frequentius fit à bile: peripneumonia frequentius à pituita; quamvis omnes humores, (ut de pleuritide dictum, hunc affectum producere valeant, humores, inquam, massam sanguinis constituentes, & sub forma sanguinis contenti. Quenadmodum enim humores casti denique pleuræ membranam difficile penetrant, tenues verò & biliosi eam faciliè perueniunt. Sic contra pituitosi & crassi in mollem, & raram pulmonis substantiam faciliè transferuntur, eique tena citè adherent; biliosi vero & tenues faciliè præterlabuntur. Hoc tamen non impedit, quin sanguis biliosus interdum pulmonis inflammationem efficere valeat: quenadmodum Hipp. 1. de morbis, Erypelas pulmonis describit.

Fit autem inflammatio erysipelatosa ex sanguine bilioso à dextro cordis sinu per venam arterialem in pulmonem delato. Oedematosa verò ex sanguine pituitoso per viam fluxionis à capite in subiectas partes irruente. Sola tamen pituita excrementitia per viam cathartici à cerebro deliens peripneumoniam efficere potius est, quatenus in pulmone putrescens sanguinem attrahit, ex cuius admixtione inflammatio oritur, & hæc læpissimè in senibus contingit.

Melior tamen peripneumonia magis fieri à bile afferitur, quia pulmo sanguine bilioso nutritur, qui magna copia affluit per viam patentissimam, nempe venam arterialem.

Respondemus, sanguinem floridum, tennem, & vaporolum in dextro cordis sinu elaboratum fieri in pulmone qui propter puritatem faciliè regitur à natura, & per arteriam venosam ad finistram cordis ventriculum transmittitur, ideoque raro tantum subire à naturali fluxu recessum qui peripneumoniam efficere natus sit. Contra verò fluxionem à capite irruentem, & per vias amplissimas ad bronchia delatam, si ibi putrescat, sanguinem accerere & peripneumoniam excitare.

Generatur verò peripneumonia interdum primario sine alterius morbi interuentu: interdum verò alijs morbis succedit, ut angina, & pleuritide Gal. in comm. 11. fol. 7. Apher. docet, duobus modis peripneumoniam pleuritidis succedere: vel quando morbus lateralis in peripneumoniam transmutatur, vel quando morbo laterali pulmonis inflammatio superuenit. Hæc autem transmutatio fit, quando priore cessante morbo aduenit alter; superuenit autem quando altero manente, alter adicitur.

Causa igitur interna & immediata peripneumoniz sanguis est, frequenter pituitosus, acrius biliosus, rarissimè melancholicus. Qui vel à toto sunt corporis plethorico vel cacochymico; vel ab aliqua parte similitè repleta aut præter naturam affecta.

Causæ externæ peripneumoniz, & pleuritidis eadem omnino sunt, quæcumque videlicet fluxiones ad eas partes commouere possunt, quarum præcipua sunt. Primò motus corporis & exercitium vehemens, præsertim post magnam quietem & multas epulas: tunc enim humores ex ciborum multitudine alluati, & præcedenti quiete intus detenti, superueniente exercitio laxantur, atque pinguantur, & incalidescunt ac postmodum ad partes debilio-

res & fluxioni eorum recipiendæ magis idoneas propellantur: inter quas thorax & pulmo præcipuum locum obtinet, quia validò exercitio anhelitus magnus & creber efficitur, sicque partes prædictæ maxime fatigantur, & pulmonis substantia mollis, & laxa humorem influentem faciliè recipere potest.

Secundo inter causas externas efficaciores ponitur aer frigidus & aquilonius austrius & tepido subito succedens: à tepidulo siquidem aer perorilaxatur, & humores fluidiores euadunt, qui adueniente aere frigido comprimentur & ad partes debiles exprimuntur.

Denique ex Hipp. lib. de aeris, locis, & aquis, vias aquarum lacustrinum & stagnantium peripneumoniam generare idoneus est. Dicit enim diuus Senex in regionibus lacubus & paludosis frequentes pulmonias observari.

Signa etiam peripneumoniz cum signis pleuritidis maiori parte conueniunt. Duo præsertim eadem, febris acuta, & tussis, quæ aliquando sicca, aliquando humida est, seu cum spūto magis pituitoso colorato ex bile aut sanguine imò & in progressu ipsa sunt purulenta, materia morbifica à calore cocta & maturata, quod sit plerumque illa substantia pulmonis substantia, alioqui enim, ea euoluerat, phthisis succederet. Sic passim videmus in oculis ophthalmia laborantibus & pure foetidis humores in pus conuersti, non suppurata neque vicerata partes substantia.

Reliqua signa differunt ratione partæ affectæ. Difficultas spirandi maior est quam in pleuritide, ob angustiam, intrinsecum inflammati, ut agri suffocari videantur, & non nisi erecti respirare valeant. Pars enim ob tensionem, & repletionem comprimi nequit, neque amphius dilatari, quamvis magna adsit pulmonis dilatatio, paucum tamen aërem capere celer & frequens est respiratio cum stertore. Augetur necessitas ex febre, cum effusione calidioris (pituitus, & aeris frigidi desiderio).

Pulsus magnus, languidus, mollis, ob pituitam, & pulmonis laxitatem: alia interdum durities ex bile, & sanguine; inæqualis, ob compressionem arteria prope cor, in crassis humoribus magis; interdum vero intermittens, in teretibus, vndulos, vermicularis cum ex immunda humiditate pulmo computrit.

Dolor grauius & profundus ex imo ad pectus & spinam pertingens. Quandoque inter scapulas, quandoque sub vna tantum scapula dolor percipitur & sigulo ac mamma commutatur, præsertim in tussu. Quandoque dolorem non sentiunt, nisi cum tussire inceperint, quandoque etiam dolor apparet punctioris in latere, cum pleuræ diu consuetudo est peripneumonia quod læpissimè contingit. Licet autem membra ana pulmonem inuestiens sit eiusdem nature cum membranis colitis succingentes, ut docuit Galen. 4. de loc. aff. cap. 5. dolor tamen ita iurens non percipitur in peripneumonia, quenadmodum in pleuritide, propter duplicem differentiam, quæ ab eodem Galeno proponitur loco citat. Prima est, quod ncri, qui seruatur ad membranam pulmonis, sunt pauci, & exigui, qui vero ad pleuram, plures, & insignes. Altera est, quod thorax constat ossibus & carne, quæ resiliunt tensioni, unde maior dolor; pulmo vero mollis cedit tensioni, unde minor dolor.

Rubor genarum apparet ob vapores calidos ad caput exhalantes, & tenuiorem sanguinem secum rapientes, cuius color in malis præsertim efflorescit, quia earum cutis tenuior est.

Propositis signis accedunt anxietas, impotentia, iactatio cum caloris ingentis sensu in toto corpore. Color lingue flauus, & denique processu temporis rubescens, sitis ingens, oolorum extumescencia, & venarum temporum eleuatio. Delirium, quando peripneumonia fit ab humore bilioso; & coma, si ab humore pituitoso generetur.

Si à sanguine bilioso morbus oriatur, ipsa erunt flauis, æstus maior, & sitis: maior repletionis angustia cum noui gravitate, expiratus aer calidior, febris ardentissima, cum pulsu creberrimo, delirium ingens, vitia tenece, cæca & pellucida. Aetate anni tempus, regio, vitæ præcedens bali attestantur.

Si pituita, (quod frequentius est,) morbum producat, ipsam

pulmo grauior redditur, bronchiæque à pure imbibito obstruuntur, respiratio redditur difficilis. Ex illa etiam potius in pulmonis, & bronchia transmissio (spum purulentum) exoritur, quod etiam factum empyema significat, non semper tamen puris excretio hi propter illius crassitatem: ob quam ad bronchia peruenire non potest.

Disturniorem verò ac confirmatam affectionem significant febris lenta continuo infansilis quæ partem putrida partem hecetica videtur, interdum minor, noctu vero vehementior sudores multi, uocis præsertim adueniens, stilis si freques, & molesta, temporis verò processu maxillæ ruborem contrahunt, oculi concavi redduntur, vngues incuruantur, pedes intumescunt, & pulsus circa pectus erumpunt, acriore puris parte ad extremam vique curam penetrant.

Latus afflicti distinguatur ex ipso quæ habetur apud Hippocr. 2. *Prognost.* text. 2. 1. Si empyema (inquit) in altera tantum parte existat, huius convertere ad alteram oportet docuerunt in altera latere, & an alteram alteri calidius sit at, quæ contentum supra solum latus interrumpit, an videatur si huius aliquid de super suspensum. Si enim ita est, in quodam quæ latus potius sit, in altero suppuratio existit. Quomodo modum sit utriusque calor, & pondus sentitur, in tota thoracis cavitate puri continetur. Addit Aueniennas etiam coniecturam quam deprompsit ex Hipp. 3. de mor. reb. Applicetur (inquit) lintum thoracis madefactum, & secundum utramque partem, dextram, & sinistram, etiam enim excelsabitur illud, quod supra partem puri continetur appositum est. Aliud denique signum ab experientia nostra decumptum proponere liceat, quod ab authoribus non fuit animadvertum, i quod nimirum in latere afflicto tumor vltimum eade maiorem apparet, ex tenuiore materia collectæ portione in thoracis musculos relinquent. Et quando, in luspicione empyematis, huiusmodi tumor, aut citius inflatio in altero latere appareat, certò pronuntiare licet, empyema in utro latere, & aperto latere tutò fieri posse.

Signa prognostica præcipua proponuntur ab Hipp. insigni contextu, qui habetur 2. *Prog.* 1. 63. his verbis, Suppuratum est potissimum suppuratum, quod febris eadem diem durat post rupturam, ac cibum citius appetunt, & sitis liberatur, & venter cæcæ ac consistente deorsum; & pus album, laue, concolorque est, & vacans, & purus, & absque dolore ac tunda rursus expurgatur, itaque optime quidem sic ac celeriter iudicatur, sin minus, quibus ad hæc proxime accedunt. Adversum verò si quæ febris non desinit, aut eam videretur deferere, deinde recedens innotescit, & sitis nec cibum appetunt, alius humoris est, puri viride, lividumque spum, vel puris solum spumumque. Perens si huius desinit omnia. At quibus alia veniunt, alia non horum quædam intereunt, quædam in multo tempore incolumes evadunt. His & nos sequentia, Prognostica adiungimus.

Empyici, quibus ob magnam puris copiam totus thorax in respiratione attollitur, celerissime iudicantur, ex Gal. 4. de loc. aff. 67.

Empyema si 40 dierum spatio per spum non repurgetur, in tabem degenerat, quæ mortem accersit, ex Hippoc. *Aph.* 15. scilicet 1.

Suppuratio quæ utramque thoracis partem occupat, periculosior est quam quæ vnicam. Item quæ sinistram, occupat periculosior est quam quæ dextram, propter viciniam sinistri cordis ventriculi qui a pure, in illa parte collecto, grauius afficitur.

Quicumque suppurati videntur vel fecantur, si pus purum fluxerit, & album, eundem: Si vero turbidum, seculum ac lœdum pereunt. *Aph.* 46. scilicet 7.

Si pus Empyicorum per album & vnam, validis viribus existensibus, latus copiose expurgetur, salutem portendit. Licet rara sit pura hæc per album aut vnam evacuationio: illa tamen à Galeno, Paulo & Aetio proponitur, tum viæ, per quæ fit, à Galeno proponitur 3. de loc. aff. cap. 4. & comm. *Aph.* 30. scilicet 7. In priori sic loquitur: Hæc sunt Erasistrati scilicet aiores non parum virges, quippe qui purum solum spiritum in arterias continent. Nobis vero nihil difficultatis in offerre, utipote intelligimus quod istas arterias pulmonis, quæ totum puri ex raptâ vena suscipiunt, id in sinistram, & dextram sinum deferre possent, quod iude per arteriam ma-

gnam in vena fuit. In posteriori loco dicit, materiam in pulmone contentam primùm ad ventriculos cordis pervenire, & inde vel ad arteriam magnam: vel per causam venâ ad gliba hepatis, deinde illinc ad causâ, & ita per portas ad intestina. Ex quibus facit parent viæ per quas empyema album & vinas expurgari possit.

Empyici melius habentes, & qui scire expurgari videntur, si ipsum fortissimum exerceant, cum recedens intereunt. Hipp. in *Cocis*.

Quibus speculum à pure, velut ab igne coloratur, si ferè moriuntur. Hipp. in *Cocis*.

Pro huius afflicti curatione. Primùm si materie in thorace collectæ suppuratio prohiberi nequeat, adiuvanda est cataplasmatibus convenientibus.

1. Rad. altheæ 3 iiii. ficum pinguium n. x. passul. mundat. 3. i. florum chamæ & melilot. ana P. j. Coquantur omnia perfecte, deinde confundantur, & per cribrum trajiciantur. Postea adde larnæ mell. lani. lœmurg. & testici, ana 3. i. ol. litor. amygdal. butyri recent. & cerebini. an. Vnc. i. Fiat cataplasma.

Ad concoctionem, & maturationem intus etiam adiuva.

2. Rad. altheæ, & symphyti maior. ana Vnc. i. foliorum agrimoniz, iustitiz. scabioriz. capill. ven. ana M. j. quatuor sem. trig. maior. ana Vnc. i. sem. anisi 3. i. aliquid raf. & passul. mundat. ana Vnc. i. flor. trium cord. & chamæ. ana P. j. Fiat decoctio ad th. i. sem. In colat. dissolue syrup. de tussis de liquirit. sacchari candi, ana Vnc. i. Fiat apozema, aromatizat. pulv. rad. ieros Florent. 3. i. pro v. dosibus maturati.

In eundem finem vtiatur ecl. egmate sequenti.

3. Pulv. ficum pinguium Vnc. i. butyri recentis Vnc. ii. ol. amygd. dulc. recentier sine igne extrahi Vnc. i. sacchari candi Vnc. ii. amyli 3. i. Fiat lictor, capiat la bibendo.

Terebinthina Veneta aqua hordei colata, ad 3. i. exhibita cum pulvere liquiritæ: & multum prodest ad maturandum, discutendum, & exurgendum.

Si denique per anacatharism empyema solui non posse videatur (quemadmodum vltimum purum non fit) ad latera apertione veniendum est, quæ fit inter quædam, & quintam costam ab inferioribus & notis incipiendo, multis causis nobis adhibitis: quæ apud Chirurgiæ scriptores, & præsertim apud Hieronymum Fabricium ab Aquapendente, in libro de operationibus Chirurgicis eleganter delineatæ reperiuntur. At vero multo vtilius est abscessum, qui pleuritidis succedit aperire, antequam dirumpatur, & pus in thoracis capacitate effluat. Quod dignoscitur ex tumore, qui iuxta suppuratæ locum eleuatur, aliisque signis empyematis omnia communibus. Tum vero apertio molenda est, non in parte thoracis inferiori, & inter quædam, & quintam costam, quia aperto foramine longè ab abscessu pus nullum exiret: sed in medio tumore, adnoto prius caustico. Si vero nullus tumor appareat, difficillimum est apertione tentare, ante abscessus rupcionem.

Si tamen eam quæ aggradi voluerit, eligere debet locum in quo æger dolorem & pondus percipit, & qui maior calore pollet. Fieri autem debet apertio inter duas costas, supra partem collæ superiore, quia inferiori adiacet & vena arteria. Quod in omni empyematis apertione obseruandum est. Dum pus, apertio thoracis, per intervalla eductur, vtiatur æger bis in die posione vulneraria, quæ sanguinem expurget, vicera deiergat, & putredinem inhibeat.

4. Sanicula, bugla, scabiosa, betonica, hyperici, card. benedicti, pilosella, pimpinella, vince perunæ agrimon plantag. ana M. j. sem. h. perici, card. bened. ana 3. i. sem. flor. cordi ana P. j. Coquantur in hydromel ad th. i. sem cuius capiat Vnc. i. singulis vicibus.

Hoc eodem decocto poterunt fieri iniectiones in thoracis causum.

Pro potu vtiatur hydromel, vel aqua hordei saccharata, vel saccharata simpliciter.

Si apertio thoracis pus debite non fluat, sequenti emplastro, eliciendum est, quod ex omnibus abscessibus potentissimè pus attrahit, & ioraducit.

5. Resine pini recentis claræ, & odoratæ th. s. ol. laurini, & tere-

& cerebintina. ana 3*℥*.i. gummi elemi 3*℥*.ii. Primo refina-
& gummi in igne liqueant, deinde simul miscantur. Po-
stea addit cerebintina, & oleum. omniaque simul bulliant
tantillum, & per linteum craffius tranſcolentur. Maſ-
ſe iſtus iſporſo extendatur ſuper alutam, & fiat empla-
ſtrum, quod muret ſemel in die tantum hyemis tempo-
re; his autem in die aritate. Perforetur in medio duabus
aut tribus inciſuris oblongis, vt ar tractum eſſiat.

CAPVT V.

De Hydrope pectoris.

Emphyemati ſimilimus eſt hydrope pectoris, qui fit
in ſeroſo humore in pectoris capacitate collecto. Præcu-
torum vulgus hunc modum non deſcribit, licet ab Hippo-
craticè deſignatus ſit 2. de morbis ſub nomine hydropis
pulmonis, in hunc modum, *Febres & tuſſis tenet, & acer-
natum, reſperas, & pedes tument, & vngues contrahuntur,
& patitur talia. quæ ſi quis ſupparatus eſt, ſed debilis
& diſtenuis, Eſt qui inſanſus, aut ſotum aut ſuſſum
adhibeat, per non ſequitur. Atque ex hoc ſane cognoueris, non
per, ſed aquam intus eſſe. Eſt multo tempore, ante ad late-
ra adhibeat, audire tentaueris, et ubi intus velus accutus. Et
hoc quidem aliquando paſſus, poſſit erumpit ad alvum, &
ſicam quidem ſanus eſſe videtur ac morbo liberatus. Verum
progreſſu temporis alius incenditur, eademque ſila paſſus, &
ad hoc amplius. Alius etiam intus morſus ventris, ſeroto, &
facie. Hæc Hippo.*

Hic morbus rariffime contingit, frequentior tamen eſt,
quam vulgo creditur: ſed plerumque non agnoſcitur. Plu-
res illius hiſtorie à Schenchio collectæ ſunt, ex quibus pa-
tet, cum non, niſi poſt diſſecta cadauera ex hoc morbo de-
ſectorum, innotuiſſet. Ideo exactè deſcribendus eſt, vt
Medici curantem peritiam non ſubterfugiat.

Seroſus iſte humor vel in ipſo pulmone gigni poteſt,
proprio ipſius vicio, ſed ſcilicet proprio alimentum,
non bene concoquitur, ſed illud in ſeroſum humorem con-
uertitur, qui ſenſim ad thoracis cauitatem tranſmittitur;
quod etiam fieri poteſt verſiculis hydatidibus in pulmone
excitatis diſruptis, quæ ab Hippocrate receſſiſſe ſunt lib.
de internis affectibus. & à quibudam autoribus obſer-
uatur. Vel aliunde in thoracem tranſmittitur, præſertim
ab hypochoſtris, quando ſcilicet hepar aut lien intem-
perat, ſcirrho, aut alio graui morbo afficitur, vnde ſeroſi
humoris copia generatur. Seroſus iſte humor vel per ve-
nas ad pulmonem natura aut caſu debilem tranſmittitur,
vel à cauitate abdominis ad thoracem per cæca ſpiracula
tranſfertur. Facilem autem eſſe illam ſeroſi humoris ab
vno ventre in alium tranſmiſſione, docetur experientia,
quandoquidem hydrope pectoris in hydrope abdominis
tandem degenerat, & vice verſa, humor in Aſciticorum
abdomine contentus, in thoracem ſepiſſimè tranſfertur,
vnde illi ſubito & ex improbu ſuſcitari poterunt.

Diagnos huius affectus, (ſicut antea dictum) difficil-
lima eſt, & omnia ſere ſigna cum aliis thoracis morbis com-
mune ſunt. Hoc tamen illi & emphyemati tantum peculia-
re, mutum ſcilicet aque ſtuetuans, quod intra pectus
exaudi poteſt, corpus ſuſcitum ac deorsum tranſferimque
commoueat, vel à valido homine ſcapulis apprehen-
ſum agitur.

Omnia verò ſigna ex Hippocrate ſuprà reſcenſita, collecti-
uè ſumpta diagnofiſis ſatis certam ſtabilitate poſſunt. Qui-
bus hoc vnicum addere licet tanquam pathognomonium,
& quod ſolo hydrope pectoris à cæteris difficultatis
reſpirandi ſpeciebus diſtinguitur. Quando ſimul ſpirandi
difficultas primo quoque ſomni tempore inuadit,
cumque interceptæ per noctem magis vt gets procedat
vero die ſenſim leniteſcit.

His accedit interdum brachij alterius, vel humeri do-
lor, vt paralyſis quæ fit ab humore à capite in pectus dela-
bente, curſus porſio in brachium vicinum deſiit: vel ſero
in pectore contentum, & ad brachia per venas axillares
exundante: vel à frigoratione muſculorum intercoſtalium
à quibus ad brachia nerui deriuantur, vel alia quauis ſym-

pathia vicinis lege oborta. Hanc enim pectoris, & bra-
chiorum lymphaticam notauit Hippo. in Cœcus, his verbis
*Si vehementer inflammetur appendentes vtrique quatuor
partes, vt in latu incubas, reſoluantur ea partes corporis.*

Græuiffimus eſt affectus, & difficillime curatioem ſuſ-
cipit. In iis enim qui eo laborant, calor natus admodum
debilis eſt, viresque naturales languide ex graui aliquo vi-
ſcerum affectu: vocè ſit, vt quamvis collectus humor in
thorace remediis idoneis euacuetur, (quod tamen difficil-
limum eſt) nouus ſubindè fiat nouo materię affluus; vi-
dè morbus non ſolum ſouetur, ſed etiam deterior in dies
euidit, ita vt tandem in hydrope acutem incidant, mul-
tiplicata materia & in abdominis cauitatem tranſſa. In
principio tamen, antequam viſcera in ſignem leſionem
ſuſceperint, curatioem interdum admittite poteſt.

Ad curatioem huius morbi due indicationes ante oculos
proponende ſunt, vt ſcilicet materia in thorace con-
tenta euacuetur, & noua illius generatio impediatur.

Materie in thorace contentæ euacuatio difficillima eſt,
quia non ſunt viæ patentiores, per quas educi poſſit. Ideò
Hippocr. lateris apertione præcipit, quam tamen, quia
in vium reuocatum non vidimus, neque ſcilicet illius luc-
cellum apud vlium autorem legimus, probare abſolute
non poſſumus: Et de ea idem dici poteſt, quod de para-
centeſi in hydrope acuto, capite proprio diximus.

Satius ergo illi hydrogogis medicamentis humoris illius
euacuationem tentare. Cui rei conſentit ea omnia quæ
in hydropis curatioe à nobis propoſita ſunt. Vbi tamen
diligenter obſeruandum, quod ſi morbo iam confirmato,
& multa ſeroſi humoris copia in thorace collecta, purgans
validius exhibeatur, humores illi valdè exagitantur, vnde
ſuſcitatio ingens ægrotanti contingit, que illum ſubito de
medio tollit. Ideò caute agendum eſt, & in minori doſi,
atque iteratis vicibus medicamenta exhibenda ſunt, eaque
cum potentiorebus aperientibus ac diureticis miſcenda,
vt ſimul viæ aperiantur, & ſeroſæ materie portio ad
vrinæ vias deducatur.

Inter hydrogoga, ea quæ et mineralibus deſumuntur,
in hoc affectu maximè conueniunt, qualiæ ſunt mercurius
dulcis, & mercurius vitæ, ita correctus vt per inferiora
tantum euacuet.

Diuretica etiam ſola frequenter viſcipata multum con-
ferre poſſunt, quia materiam antecedentem ad thoracem
conſiſtenter avertunt, & per vias euacuant; tum etiam
conſequente quædam ab ipſo thorace educunt.

Sudorifica etiam ad ſeroſam illam materiam educendam
vtiliſſima ſunt, & nos vidimus virum ſexagenarium vſu
decocci ſudorifici ex guaiaco, & ſaliſa parato per 15. dies,
ſudores excitando cum vapore ſpiritus vini vſum liberari.

Ad eandem ſeroſi humoris à thorace auerſionem plu-
rimum conſentire cauteria cruribus aut tibis admoda.

Generatio verò illius ſeroſæ materie impeditur, vitæ
corrigendo eorum partium, quæ hanc materiam ſuppeditant.
Sic pulmone ipſo laborante, illi remedia appropriata
erunt viſcipanda. Si hepar aut lien intemperat, ſcirrho
affectus, ſcirrho, aut alio quopiam viti laboris illorum,
affectus curationes ex proprijs capitibus erunt repetende.

Vniuerſaliter vero ea quæ partes vitales, & naturales
roborant, ſemper conuenire poterunt, qualiæ in virum im-
becillitate, & hydrope & fluxus hepaticæ curatioe deſci-
pia ſunt.

CAPVT VI.

De Hemoptyi, ſeu ſanguinis ſputo.

Liçet vulgò hemoptyiſis omnem ſanguinem per os excre-
tionem ſignificet, à quacunque parte procedat, ſive à
thorace pulmone, alpera arteria, ſive à ſciſcibus, gingiuis
palato, columella, cerebro, ventriculo, hepate, & licet
propriè tamen à Gal. 1. de cryſt. 5. hæmoptiſis nomen
pro ea ſanguinis expuitione ſumitur, quæ à partibus vita-
libus thorace nimirum pulmone, & alpera arteria procedit.

Eſt ſympſoma in excretis eorum quæ ſunt toto genere
præter naturam.

M m 2 Cum i

Cum autem omne symptomata pendat à morbo tanquam causa proxima, & immediata; huius causa erit morbus organicus vel communis. Organicus duplex est: valium a pectore, quæ dicitur Græcis dicitur, & ræfæctio, *fractura* appellatur. Communis etiam duplex est: eorundem valorum ruptio, quæ *fractura* nominatur, & etiam *fractura* appellatur.

Causæ internæ istos morbos immediate producentes sunt sanguinis quantitas, vel qualitas excedens.

Sanguinis quantitate peccans venas rumpere aut officia illarum appetere potest est; atque ita rhexin aut anastomosis efficiere.

Idem vero qualitate peccans, si nimium calidior tempereturque fit, per anastomosis effluere potest, quæ calor critica dicitur, & tempestè efficit ut facilius effluere possit. Existent qualitates diaped effluem efficiunt; calor enim ræfæctio tuncas valorum, tuncas vero sanguinis efficit, ut per poros earum tuncarum finibus transire possit.

Sanguinis etiam acrimonia venarum tuncas erodit & excoriat, ac diabrosim parit. Ad ipsum præstare possunt humores acres vel salii à capite delibantes, vel aliquid ad pulmonem confluentes.

Causæ etiam externæ ad horum morborum productionem concurrunt mediate, vel immediate. Immediate id præstant: letus, calidus; velotus; & alia in genus. Mediate vero operantur; quæcumque sanguinem multiplicare, calcificare, aut attenuare possunt, ut vitus plenior aut calidior, mensium sui hæmorrhoidum suppreffio, exercitatio agens, clamor ingens, ætus, longa in sole mora, & alia quæ plurima.

Idem etiam eternam valorum disraptionem potest admovere, eorum punctas duplores, & ad tensionem diffusi, ræfæctio, & ad hoc tam concurrere debet motus ræfæctio, aut humorum abundantia.

Diagnosis huius affectus, atque difficilis est ratione partis mandantis, quam tamen Gali, paucis absolute, *de locis affectis cap. 6* quod nimium sanguis è gula & ventriculo excurrat vocatione, ex spiritalibus partibus tuffi, ex faucibus & gurgulione creaturæ ore simplici expulsi. Que quidem clariora explicatio indiget. Si quidem sanguis è capite ad gurgulionis partes internas, & ad fauces affluens intrinsece suffunditur, & sicque ab eo partibus spiritalibus efficitur, hoc talen signo non distinguitur.

Præterea cum sanguis è pulmone, & à thorace promans tuffi educatur, alia signa necessaria sunt, quibus hæ partes officie muicem distinguantur.

Primo igitur à capite profusus sanguis, licet tuffim interdum moveat, maior tamen illius portio ferat in efferatur, & titillatio percutitur in palato, qualis ex catharro solet contingere; tum etiam palatum impletum sordidatum apparet, & cruentum. Ac denique omnimodum certitudinem facit, si eodem tempore aliquid sanguinis stillet è naribus.

A pulmone prodians sanguis, ab eo qui à thorace, distinguitur ex Gali *de crasso, ex eo quod à pulmone est (phloem) maior copia, & sine colore; à thorace verò nigricans, paucior, & cum dolore.*

Obviæ tamen potest, quod sanguis è thorace prodians per pulmonem feratur, ac per consequens spumofus est, quia cum aere inspirato permiscetur, quemadmodum ille qui à pulmone immediate defertur, fit. Auctoria dixit ex thorace sanguinem spumescere. Respondendum est aliud esse nonnulli spumæ permixtum educt, aliud ex toto spumescere, quod folius substantia pulmonem proprium est. Ita tres spumæ gradus in concreto sanguine notari possunt. Aut enim ex toto spumans est è pulmonis carne, cuius indit similitudinem, est enim pulmo conculcata spuma; aut plurimum spumans è pulmonis vas; aut spuma permixtus ex thorace.

Verum certissimum thoracis affecti indicium defumitur ex dolore, qui fitus est, & præterea iuxta alium locum in quo est solitus contineri.

Ad attendendum verò est sanguinem interdum ab hepate, liene, vtero aliisque partibus in pulmonem transire, & per ipsum exire: ita ut pedus locum alium tumens, non

primario afficiatur, Cuius rei diagnosi perquam difficilis est. Illam tamen coniectura affoci poterimus, si nuntium aliquo prædictarum partium dolore, inflammatione aut alio affectu labore, & nullum aliud in pectore, vtrum adiacent, aut præcedit.

Signa casuum ex his quæ superius dicta sunt elici possunt. Si enim per anastomosis venarum languis feratur, causæ valorum critica aperientes præcederunt, & sanguis egredietur mediocri quantitate, & sine dolore. Per Diapedim verò effluus sanguis copiosus est, paucus & sine dolore.

Per rhexin etiam copiosus est, si plethora præcessit, vel causa aliqua externa rupturem valorum efficere valeat.

Si denique per *fracturam* seu venarum erosionem sanguis profluxerit, silete vel acres à capite delibationes præcederunt, sanguis salledus, vel acrimonia princeps percipitur, & magis coloratus apparet, & præcesserit causæ humores acres generantes. In principio sanguis paucus expulitur, in progressu verò, auda effusio, copiosior, tandemque purus sputum consequtur.

Prognosis huius affectus Hippocrates generationi insinuat *Ap. 15, sect. 4, 5* & *Quinta superne quidem æstus, quæstioneque fit malum.* Quam enim valorum effusio, quæ sanguinem effluere facit, periculosa est, præcipue in pulmones de qua in primis audienda est aphorismus. Fit tamen interdum ut talis sanguinis excretio in nonne constet, natura morte quondam critico sanguinem superfluum per illas expurgans, & obcuratum est, quidam mulieres suppreffione mensium laborantes certis periodis sanguinem ex pulmone per illas venarum anastomosis innotat excurrat.

Ratione casuum, diapedesis minus periculosa est: anastomosis magis: rhexis adhuc periculosa; nulli enim intra tertium, vel quantum diem consoquatur, inflammationem inducit, quæ in supurationem vertit, vicus producit, id quo phthisis consequtur; vide *Ap. 15, §. 16, sect. 7. A (sanguis) spumæ parva spumæ a parva spumæ plethora.* Diabrosi verò omnium periculosissima est & Galenus eam incurabilem pronuntiat, propter viciniam sanabile quod illam consequtur.

Hæmoptoes curatio periculosa reuolendo sanguinem à pulmone, malum illius qualitatem corrigendo, & venam apertam obturando, asstringendo & conglutinando.

Primo igitur asstringenda vena lecta, ex brachio illius lateris, in quo grauitas, aut punctio percipitur in paucis quantitate, & per intervalla repetita ad maiorem reuolunt.

Post sectionem venæ brachii, in pede etiam aperienda est: sicque fiat reuulsio ad distantiam. Adhuc multo magis conducit, si allicius, ex suppreffione animum traxerit originem.

Si æger sit obnoxius hæmorrhoidibus, vti etiam aperientur, ad moris huiusmodi.

Cucurbitule etiam scarificæ adhibebuntur scapulis, & dorso, vel cucurbitule sine ferro hypochondriis, & inguinibus. Frictiones & ligatura partium externarum esleberent, ac pulcritum cucurbitule hypochondriis, per intervalla repetantur roro curatioms decurie.

Interim aliquos sequens ab iusto termin die reperiuntur. Aqueæ plantag. & papav. rhexid. ana 3. i. syrupi de rosæ siccas 3. j. salis prunellæ 3. i. Micele per iulep.

Denique humorem lerosi & biliosi, sanguinem tenuem & fluidiorem efficientes, repurgandi medicamentis asstringendi vi prædictis, & eo nomine humores minime commouentibus, in hunc modum.

3. Rhab. elect. 3. i. myrob. citrin 3. 4. tamarind. 3. i. infundantur in aqua plantag. Expreffione facta dissolue rhab. puluerat. 3. i. liqurp. de rosæ siccas Vnc 3. Fiat potio.

Denique ex hibernæ medicamentis, quæ cicula rrefocta occludunt vi emplastra, & asstringente: ita tamen, ne nimia asstringentem sanguinem in pectore retineant. Qui potius ad internum percolantur, quæ sanguinem extrahant, & concretum dissolvant, & expectorent.

Ex omnibus, quæ ad hanc rem maxime faciunt, sequentia præstantissima sunt.

3. Boli armenæ rre & sigillatæ coralli vtriusque, & liqurp. hamatana 3. 6. scaphari ponic 3. i. cum album, qui, cum aqua rosarum,

posarum fortiter agitantur n. j. Fiat looch, quo vtatur ex cochleari frequenter.

¶ Vel gultu grauius & parati facile in hunc modum componi poterit.

¶ Liqueoris aluminis oui fortiter agitantur 3. ii. facchari rosar. Vnc. 4. am. v. 3. ii. Misce fiat looch.

¶ Conferuz rosar. & semphiti maior. ana 3. i. boli armenae, terre sigillatae, ana 3. i. Cum syrup. rosar. siccat. fiat opuscula, teneat in ore frequenter & sensim deglutat.

¶ Conferuz rosar. siccat. trochisc. de carabe, & de terra sigillata. ana 3. sem. margarit. præp. 3. i. facchari rosar. ad pondus omnium. Fiat coaditum, capiat cochlear vniui, hora vna ante passum.

¶ Succ. portulacæ 3. vii. facchari Vnc. vii. Coquantur in syrupum, quo vtatur leue pueri sensim ianbendo. Hoc syrupus in hæmopteyi præ caeteris excelsit. In portulacæ defectu, ex succo plantag. componi poterit.

Ad idem fumie et efficitur tyrtupus ex tymphyto Fernelij a Bauderono descriptus.

¶ Millefolij flore albo, & flore luteo, ana M. ii. radice tormentillæ recentis & cum lolijs, si haberi possit, si minus sicca Vnc. 3. pimpinellæ maioris M. i. conferuz rosar. rubr. th. aquæ fontis th. vi. Pasantur in olla vitreata, quæ cum suo op. recto diligenter luteatur 3. vt vapores non exirent. Coquantur pulcra in B. M. bulliente per horas xvi. Colatura struetur in vase vitreo, de qua capiat Vnc. vi. mane & meridie & vespere.

¶ Crochisc. de carabe 3. i. aquæ plantag. & rosar. ana Vnc. 4. sem. tyrtup. myrtini & de rosis siccis, ana Vnc. 4. sem. Misco, fiat iulep.

¶ Spirit. vitrioli 3. fem. aquæ plant. vnc. 4. Misco fiat portulacæ subito sicut sanguinem tussiv. vomitu reiectum.

Syrupus cotallorum ad cochlear. n. singulis diebus exhibitus, omni sanguinis fluxui conuenientissimus est. At tinctura eiusdem, cum succo limonum recentis extracta, potentius operatur.

Quercetanus in Pharmacopœa sequentem aquam descriptam ad hæmopteym quæ est magnarum virtutum.

¶ Rad. bistortæ, tymphyti maior. tormentillæ, ana vnc. 3. herbar. centenod. millefolij, veronicæ, pyrolæ, saniculi, burse pastoris cum rad. ana M. i. immittat. rubi lentifici, ana M. sem. gran. fumach. myrtill. fem. plantag. berberis, papaueris albi, ana 3. vi. florum nymphæ, cucurbitæ, cydon. rosar. rubr. ana Pij. Contusis & commixtis omnibus, mactentur per quadrantum ad ignem balnei, in succor. deputatorum plantag. portulacæ, acetosæ, agrimoniz, ana th. 3. Dein fortiter exprimitur. His adde acaciæ, h. pocalid. ana 3. ii. terre sigillatæ, boli armen. veri, ana Vnc. 8. electarij diatriag. trug. 3. ii. Mactentur demum per quadrantum, dein per cineres ad siccitatem destillentur. Huius aquæ capiat æger cochlearia duo vel tria, per se, aut cum syrupo conuenienti.

Oleum de carabe th. micæ extractum potentissimè penetrat, asfringit, & siccat, si guttæ duæ in potu dentur cum aqua plantag. vt docet Celsipianus in speculo artis Medici.

Mercurialis in con. ad tussim, & ad commendat semen papaueris albi, vel hyoscyami albi singulo manè, si eius capiat æger 3. i. plus minus, cum saccharo rosar. & syrupo portulacæ mixtum. Sic etiam diacodium album, in cura phrenetidis deliripum, vtiliter vsurpatur poterit.

Anarius Lusitanus succum vitæ nure prædicat, his verbis, *Qui sanguinem ex pectore vertit nure, & Albedus tanquam deplorati sunt habuit, solo vitæ succo tormal venent. Post multa autem machinata remedia, nullum ita conatus vsusque cohiberet, ac vitæ succus, quem ad 3. vel 6. dies ebib. runt, singulis seductis diebus quatuor vinctus seuino stomacho, lmo & ipsam vitæ incoctam inter pulv. & vitæ sepe comedeat.*

Sanguis draconis omnem venarum apertionem internam nure conglutinat, ad 3. 8. cum aqua plantag. aut alio liquore conuenienti exhibitis, vel cum alijs medicamentis permixtus.

Pulv. sublinguales vsitatis timæ sunt, & in sequentem modum componi possunt.

¶ Musac. gum. arab. & tragac. & tract. cum aqua plant.

3. ii. mumiz, malthes, ana 3. i. facchari rosati q. 4. Fiat pulv. sublinguales, quarum vnam teneat in ore perpetuo.

In iusculis etiam pulvis sequens permisceri poterit.

¶ Coralli rubri, margar. præparat. ana 3. 8. gummi arabici, tragacanthæ. ana 3. i. Fiat pulvis.

Vel in iusculis femina papaueris albi & samach. in pan. lineo ligata, decoquantur.

Narcotica in hoc affectu multum præstant, & quæ in hunc modum vsurpanda sunt.

¶ Syrup. de papau. rub. & de rosis siccis, ana 3. 4. Capiat cochlear. 3. hora somni. Vel

¶ Syrup. de papau. & portulacæ, ana 3. 4. terre sigillatæ 3. 8. aquæ portulacæ, & plantag. ana 3. i. Fiat potio, detur hora somni, Vel

¶ Syrup. myrtini, & de papau. an. 3. i. boli armeniz 3. 8. Misco, vtatur noctu ex cochleari.

Vel etiam interdum theriaca recens quatuor mensium, vt docet Gal 3. method. cap. 13. phlionum tomanum, aut laudanum opiatum vsurpatur poterunt.

Refert Platerus, se hæmoptico cum curasse sola exhibitione trochiscorum alkengis, cum opio in lacte caprimo dissolut. per aliquot noctes. Idem mulierem simili affectu laborantem curauit purgatione, ex manna 3. 4. cum iusculo, vnae sectione, & visu sequentium tabellarum per multos dies manè, & sero continuato.

¶ Sem. hyoscyami albi subtilissimi puluerati 3. ii. coralli rubri 3. 8. gummi arabici 3. 4. violas recentes q. x. succi berberis 3. ii. facchari in aqua rosar. & plantag. dissoluti 3. 4. Fiant tabellæ.

Trallianus lib. 7. cap. 1. mitum in modum commendat lapidem hæmaritem, quo dicit se multos hæmopticos curasse: exhibendo ad 3. iiii. cum succo mali punet, aut polygoni, is qui copiosum sanguinem spurcant. In quibus verò sanguis non copiosè euacuatur, cum aqua parâ tepida. Ad frugandum esse curiosè monet, vt sit æreus & vento perfusus, tum frequenter exhibendum, vt commodius distribuitur, & in vino etiam insusum exhibet ad præcautionem.

Antonius Valerius exercitat, ad cap. 27. lib. 1. *Holleri de morbis internis*, refert, quendam hæmoptico cum, qui alternis temporibus multum sanguinis reiecerat, neque vili remedijs sanescere poterat vii. sequentibus puluicis a Iulio Scaligero flos præscripti, breui conualuisse.

¶ Spodi rosar. rubr. boli armeniz, terre sigillatæ, lapid. hæmar. an. 3. 8. coralli rubri, carabes, margant. non perorat. ana 3. ii. 8. gummi arabici, tragacanthæ, ana 3. i. feminis portulacæ, maluz, amoglossæ, sem. rosar. rubr. cornu cerui vili amyli trochiscati, ana 3. ii. Fiat pulvis tenuiss. Dosis 3. iii. cum aqua pluviali. Hunc puluerem Scaliger mutatus fuerat ad Serapione, qui eum tradit cap. de sputo sanguinis, tanquam remedium expertum; quem etiam valde laudat Valescus. Ex eo etiam possunt fieri tabellæ, cum saccharo in aqua plant. & ros. dissoluto.

Ad hunc puluerem quadam tenus accedit, sed paratu facilis electarij Hasside ad hæmopt. fin. in Germaniz, olim celeberrimum, & a Gelsino, Iralio, & Cratone commendatum, quod hic habet.

¶ Sem. hyoscyami & papau. albi an. 3. x. terre sigillatæ, coralli rubri, an. 3. v. facchari rosar. antiquissimi q. 4. Fiat electarium, cuius dosi 3. ii. manè & sero, præmissis vniuersalibus.

Quia vero asfringentium vili spurcum supprimitur, & difficultas spirandi exoritur, per intervalla recurrendum, est ad ea quæ præcis leniunt & nihilominus sanguinis sputum cohibent. Quia sunt ea quæ componuntur ex gummi arabico, tragacanthæ, amylo, & syrupo de rosis siccis, cydon. myrtill. iuibino, de succo portulacæ, aut plantag.

Dum asfringentia remedia in vium reuocantur, si alius non procedat, elythere subducatur, vel purgante medicamento asfrictionem aliquam relinquente.

In toto cotationis decursu si sanguinis concretio, in thorace contenti suspicio sit, dissoluenda erit oxycrato. Quod vt Gal docet 3. method. in hoc casu ita componendum erit, vt potu sit iucundum nec ob acetum copiosius tussim excitet: ita enim sanguinem soluit, & leuiter asfringit.

multas familiās videmus incurrat ab illi fato, huius morbi fecit ē medio lubitas.

Hæc autem visioſa pulmonum conſtitutio, non in primis qualitatibus ſita eſt ſed malignam quandam ac venenatam qualitatē agnoſcit cuius ratione contagioſa eſt.

Quoniam negandum non ſit molliorem & laxiorem pulmonum lubilitatem, atque adeo corruptioni magis paratam ad huius morbi generationem plurimum conferre.

Hæc autem pulmonum viſioſa conſtitutio eſt ita interdu, vt nulla præcedente deſtillatione, nullo præeſſente inflammatorio affectu, aut alia cauſa eſſente, ægri in tabem incidentes ſolo partis vicio proprium alimentum corruptum.

A tuberculo etiam in pulmone genito ſuppurato & diſrupto phthiſis interdum generari ſolet. Eſt autem tuberculum pulmonis, tumor cingens in quadam illius particula collectus.

Duplex illius genus ab Hippocr. conſtituitur. 1. de morbis, quorum vnum crudum tuberculum ab eo nominatur, quod nunquam ad ſuppuratorem venit, ſed ſenſim increſcens ſpiritus vias præcludit, & tandem ægrotaſentem interimit.

Alterum eſt quod ad ſuppuratorem venit, & vnicuique pulmonum nominatur. Sunt autem dupliciter per fluxionem vel congeſtionem & materia collecta vel in eſſente concluditur, ſine veficula in ipſa parte lubitanti. Veficulæ illius denſitas ſæpè facit, vt huiusmodi vomica per multos annos in pulmone geſtetur, nullis ſignis indicata, & nulla alia corpori nota communicata, vnde Hipp. Aph. 1. ſect. 6. Quibus ſuppuratio in corpore exiſtens non innotet, ita ut cras ſitidantur pars aut loci non innotet, ita vt multi omnia corporis munia ritè & verceter, rupia deſerunt vomica e medio ſubſiti ſunt, quorum exempla aliquot proponuntur. A Femore lib. 5. de part. morb. & ſympt. 1. & quorum numero fuerunt, quod medici qui nullis ſignis impendens periculum prævidere poterant.

Si pars eſt rupta vomica effluens in cordis ventriculo ſeratur, ægri lubito intereunt, ſi verò ad venicula tranſmutatur per anacathariſm expurgari poſſet, ſi corpus fit validum, & materie quantitas exigua, vtrumque tamen reſectio vice-re in pulmone phthiſis inde exoritur.

Cauſæ etiam exteriæ ad huius affectus generationem concurrere poſſunt inter quas principium locum obtinet contagium, hic enim morbus eſt valde contagioſus, ita vt videamus vtrumque viros maris phthiſis affictiſſimo inſeruentem, eodem affectu corripi, & vice verſa. Vt etiam liberi euſdem familiæ ex eodem affectu ſigillatim intereunt, non ſolum propter impetralam labem a ſemine parentum, ſed etiam propter frequentationem illius qui primus hoc affectu actu laboratur.

Inter conſanguineos enim familiis, & propriis communicatur huiusmodi contagium: vt tutum non ſit fratribus, aut ſororibus fratribus, aut ſororibus phthiſis laborantibus, cubiculum ingredi. Siquidem interdu, a dia, que a phthiſico- rum pulmonibus exhalant, & cubuli totius aerem inficiunt, ab alijs, (præcipue diſpoſitionem aliquam ad hunc morbum habentibus, in pulmonem attractaſimilem in eo diſpoſitionem generant.

Aliæ verò cauſæ exteriæ ſunt primò aer impenſe calidus aut frigidus; calidus enim humores aëris in capite contentos ſoluit, & liquat, & in pulmonem præcipitat. Frigus conſtringendo & comprimendo euſdem humoris deſluxum promouet. Sed maxime noxiuſ eſt aer in primis autumn aſ, qui inæqualitate frigoris & caloris acres & falſas deſtillationes concitat, vnde apud Hipp. Aph. 1. ſect. 3. Autumnus ſubtilis malus. Secundò ad phthiſim produendam maxime conſentit cibi potuique acres & ſalti, & qui caput vaporibus humidiſſimo replent, ac denique omnes aliæ cauſæ tam internæ quam exteriæ, que hæmoptoe inducere ſolent, cū ea perueniunt in phthiſim degenerant.

Inter cauſas antecedentes præcipue recentiorum humorum viſioſi in toto corpore collecti, qui vbi à cauſis exteriſ commouentur, ad cerebrum tranſmittuntur, & inde in pulmonem confluunt. Huc pertinet menſtru, hæmorrhoidum, aut alterius euacuationis conſuetudo ſuppreſſio, que maſtæ tam catarrhis & fluxionibus ſuppeditat.

Pædiſtæ cauſæ hunc affectum inducunt, præcipue in diſpoſitis qui & dicitur & videri ab Hipp. nominantur, a qui habent pechus anguſtum & depreſſum, collum oblongum, & ſcapulas alatas, quibus ſi pulmonis mollicies & hereditaria diſpoſitio accedat, inſeſtabili fato, eos ex hoc morbo concidere neceſſarium eſt. Sunt etiam ad phthiſim diſpoſiti qui caput habent debile, quod facile ſuperfluis humoribus impletur, poſtque ad ſpiritus organa deſcendit.

Veræ & propriæ dictæ phthiſeos differentie aliæ non ſunt quam quæ à cauſarum varietate deſumuntur. Hipp. tamen plures tabis ſpecies proponit notatu digniſſi ſas, quæ non ad veram phthiſim, ſed ad tabem generaliter ſumptam reduci debent, & ſine pulmonis exulceratione contingunt. At primū lib. 6. epid. ſect. 8. text. 47. tabem ex gonorrhœa proponit hiſtoria ſequenti. Sæpius in Thab cognomente præp. lopez cum eſſet annorum circiter viginti quinque, ſemper per ſonitum eſſet ſapi, & interdum quique ſapi eſſe prædixit, cum autem ad creſcentiam perueniſſet, ſubſiti phthiſis & mortuus eſt. Ex continua autem & ſuperflua leuiniſ proluſione corporis alimentum ſurripitur, vnde partes ſolidæ abſumuntur & exſiccantur, ac tandem in tabem incidunt.

Alia tabis ſpecies proponitur ab Hippocr. 2. de morbis, tabis doriſis appellata, que fit ex nimia venere corporis habitum vniuerſum abſorbente, ſolidiſque partibus alimentum ſubripiente. hæc recentior ſponſa effrenate libidini dedita ſolet conſurgere, & eſt præcipue tabis doriſis ſpecies, quatuor enim illius ſpecies in Hippocr. ſcriptis reperiuntur. Prima eſt iam deſcripta ex immoſſa venere oranda. Secunda deſcribitur lib. 3. de internis affectibus text. 13. pendens à nimia languis, & nimietati copia in medullam ſpinali irruente, quæ quæ calor ænis immoſſat ac ſciuitates omnes obſtruitur, & ſublocatur. A languinis autè copia enaſciari corpus docuit Hip. 5. in hiſtoria vna in Ceneadi, qui cū ab alimentis non reſtauraretur, ſed in die magis contabefceret, vena ſecta in vtraque manu, ſanguineque extraſſo quouique exanguiſ redderetur, hoc loco remedio perficte liberatus eſt, cum omnia inſcalum antea tentata fuiſſent. Tertia ſpecies loco citato propoſita eſt, quando ſpinalis medulla reſiccatur, & inde totum corpus areſcit & contabefcit.

Alia autem exſiccationis cauſæ in Hippocratiſ doctrina duæ inueniuntur. Vna eſt obſtructio venarum, quæ ſi ſpina tendunt, quarum humor eſt nutritio, eoque deſiciente, reſiccatur. Altera eſt bilis influxus a capite in ſpinam, quem Hipp. lib. de locis in homine proponit.

Quarta deſcribitur in libro de locis in homine, quæ fit ex diſtillatione in medullam ſpinali irruente, his verbis: Perro cum retro in ſpinam fluxio proceſſiſſet, tabes ſi ſine mediis huiusmodi, & interuerti capitis partes vacuæ videntur, ſi eſſe. In eodem etiam libro numero 18. hæc habentur. Cum vero in medullam fluxio conſpiciſſet, tabes occulta ac inſperſa exoritur. Occulta eam dixit, quoniam hinc languente corpore morbi cauſa non ita facile patet. Inſperſa autem, quia nec deſtillationis, nec tabis nomenclatur, deſtillatione in medulla ſpinali firmata, & non ultra progrediente emiſſus clare deprehenditur. Deſinit tamen eſſe occulta & inſperſa, ſi fluxio non in ſola ſpinali medulla firmetur, ſed ultra progrediens in os ſacrum, & conſcendens irruat. Tum enī, euidentior apparet diſtillatio, & dolores, ac motus impedimenta cum ſumma animi diſſolutione, procedunt.

Hæc ab eodem Hippocrate clariùs explicantur li. de glandulis numero 10. his verbis: Alius morbus oritur ex deſtillatione capitis per venas in ſpinali medullam: inde autem in ſacrum impetum facit, quo medulla ipſa fluxione producta, & in excedendum accendit, ſine ſanctis deſponit, & ſi tabem ſperet homo morietur, ita que hoc modo conſueſcit & vixit non expectat. Statum enim ſcapulis dolent ambigere pedes, ac crura conſequuntur, & ſemper eandem peruenit multo tempore curata. Sic deſcribitur huiusmodi morbus. Hæc tabis ſpecies à Medicis obſeruanda eſt, quæ aliquando in praxi occurrat, & ut præcipue contingit, quibus nerui languidi & vabeſcit, huiusmodi flexiones facile recipiunt.

Ad tabis ſpecies etiam reſert poſſet tabes ex inedia & fame, cuius mentionem facit Gal. lib. de Marajmo, cum dicit.

Quintum signum est, quod magna pituitae copia descendat a cerebro in pulmonem, quod indicat Hippocr. causam referens magni illius defluxus, quoniam scilicet pulmo a calore ad se trahit pituitam ex toto corpore. Hanc patet humores in toto corpore consentes fieri materiam liquorem continuam & copiosam, quae phthisicos infestat. Pulmo ex putredine concepta caliditate contrahit, cuius visumilior pituitam attrahit a cerebro, cerebrum verò à toto corpore: & hoc est vis ex præcipuis extensionibus & consumptionibus sociis corporis causis. Humores enim omnes tum præsum tum laudabiles ad alias partes delinuntur, sicque totum corpus exhaustur.

Sextum signum est, quod æger pituitam putrescentem, subcrassam expuit; quandoquidem materiativa iam putredinem concepit, & superfluentem vivere, necessario pus ex eo exerit, ut idcirco putrescentem spumam crearet. Est autem pituita subcrassa, ad eam inter crassam, & tenuem medietatem; quæ cum ex mora quam facit in pulmone crassificam acquirat, immixtione tanquam ex vixere pulmonis immutatur, immoritur enim; atque ad eo medicorum quandam crassam atque vitæ unius ratione subcrassata ab Hippocrate nominatur.

Prædictis signis ab Hipp. propofitis hoc tanquam certissimum adiungendum est, nempe corporis & ignavio cum febre lenta & continua. Nam præter febres putidas supra enumeratas quæ per vices accedunt, & recedunt, & ex humores in vasis putredinebus oriuntur, ad eam temper febris lenta, & adhaerens ex vaporibus ab vixere ad eo continuo translati, quæ nutritionem in toto corpore consumit, enj; calidum licetquam intemperem in ipso nat, videtur ratione necesse consequntur.

His etiam adiungendi sunt sudores nocturni, quibus vitulium phthisici vixati consueverunt, huiusque continuo corripuntur. Per ionem enim calor concentratur de pulmonis inflammatione auget; ex calore autem nimis augescit magna fit evaporatione quæ in cute condensatur, & in sudorem vertitur.

Addi etiam possunt rigores frequentes nullum typum servantes, qui ex puris acrimonia membranas velluntur oriuntur.

Ac denique addi potest spumæ dulcedo, quæ in pitre incipiente generari solet, siquidem illa est principium lactidinis.

Facile denique ac confirmata phthiseos signa proponuntur ab Hippocrate lib. prædicto textu prædicto his verbis.
Quanto vera magis tempus progreditur, tanto magis pus sincerum expuit, febris acutior fit, & tussis frequens ac fortis, & inedia vexat, & tamen alius infirmus turbatur; Turbatur autem à putredine quæ vera de capite descendit. Hic cum ad hoc pariter gerit, his dictis quæ signa confirmata phthiseos commentur.

Primum signum est, quod spumam redditur magis purulentam, atque pus sincerum expuitur.

Secundum signum est, quod febres sunt vehementiores, & acutiores, putredine letuper vixere procedente, & vice magis lamellosa, ac putredine reddito.

Tertium signum est, tussis frequens ac fortis; id est, frequentior ac fortior quam antea fuerit. Frequentior quidem quoniam plurima est irritatio, pauca vero expurgatio; unde natura metatis viciis perficere conatur, quod vix non potest. Fortior autem est tussis non solum quia maior puris acrimonia facultatem expultricem acutus stimulat; sed etiam quia emaciatos solidos partibus, thorax quo ad catuatiem amplior factus est, unde fit tussis quando rauca, & resonans, ut in illis rebus contingit quæ ex cavo & recondito loco resonant.

Quartum signum est, media seu inappetentia, quæ agrotantes vexat, & maiorem corporis extensionem inducit. Fit autem illa inappetentia ex eo quod distillatio à capite defluxit, non solum ad ipsius membra descendit, sed etiam naturalibus partibus communicatur, ventriculo præsertim, cuius orichium inde labellatam, functionem propriam cumam appetentiam amittit. Adde quod ex putridis exhalationibus, quæ partim ratione febrium putridarum, partim ratione putridæ pulmonum adfectionis, ori-

ventriculi communicatur, appetitricis facultatis robur defluatur.

Quintum & vltimum signum est alio fluxus, qui à pituita ex capite defluente produciuntur, unde succella temporis ventriculum, & intestina labellantur, ac faculas reterit debilitatur, hincque alius fluxus exoritur, qui ad intestinum agrotantem deducit ut in prognostico huius dicitur.

His signis ab Hippocr. propofitis adiungenda sunt alia. Primum est lumina totius corporis extensio, ita ut in illo itatu caro macilicula vixata absumpta fit, & ossa omnia se prodant, sola cute contexta, hinc vixque incurantur absumpta carne, quæ in fumum digis exalbat, vixque defleat.

His etiam addenda est respiratio difficilis, tum quia facultas est debilis, tum quia bronchia pulmonis, à materia putrida & purulenta obstruuntur; tum quod ipsum vix maiori parte consumitur & putrelatum, aerem sufficientem non trahit ad cordis refrigerium; ita ut quod vix respiratio præstare non potest pluribus atque iteratis perficere conatur.

Ac denique addendum est quod in phthisi confirmata, & moritum vergente capiti delinunt, male hincunt, nisi quod potest cibum elevatus latus vaporibus rubescunt; pediculi magna copia generantur, & pedes intumescunt.

Neque tamen in eo itatu tanta signorum speculatione opus est. Si quis enim vel plebicus (inquit Aretæus) hominem vident pallentem, in bacilli tumentem, macie collectum, hinc vera phthiseos laborare pronuntiat.

Avertendum tamen est aligeret, quod in præxi maxime est usum, catarrhum concutientem in pulmone defluentem lapte vixati phthisim ementiri; siquidem pituita putrida pus annua per tussim excutitur, hinc ex putredine sunt febres, ac corporis extensio consequitur; ita tamen ita affecti cibum curatio adhibere scilicet liberat. Ideo attente distinguendos est hic affectus à vera phthisi, quod fit præcipue distinctione pituitæ putridæ à vero puris, quæ distinctio hæc præcipue signis peritur; quod videlicet puris coloris est chertus & minus album quam pituita, & interdum varicoloris, & in aquam tepidam proletem, tumidum perit in eaque dissolvitur. Pituita verò aque immat, & propter viscositatem coheret ac maxime dissolvitur vero ipsa porcio dissolvatur, alia vero vixum, tale spumam fit ex pure cum pituita mixto, quod viximum in phthisi conatur.

Quod ad prognosim attinet recentis viceris pulmonis fatatio difficilissima est, insuerat omnino impossibile, quia vix continuo pulmonis motu, & tussis magis laceratur, tantum abest ut coalescere valeat. Tum medicamentorum via longo tractu lere exolefit & perdidit pulmonem substantia nulla arte resarci potest. Adde quod vix, spiritum, febris & macies contraria remedia expolunt. Illa enim quæ vix exsiccat, spiritum impedit, vixem augent, & maciem humant, ita verò quæ febris & macies obstant, vix locidus chertunt. Interdum tamen quibusdam vix fatum videtur, crusta superinducta, quæ tamen levi occasione decidens, morbum renouat, ægrumque ad priorum statum reducit.

Phthisis quæ ab vixere paruo & non diuturno proveniat, licet curatu difficilissima sit, non est tamen omnino incurabilis, curatio idonea mature adhibeatur & non pauca curatio phthisicorum exempla aliquid observationum probatores reperimus. Spem autem aliquam curationis præbere possunt, vix robusti, spiritum alium, aequale, vixis colidus quod facile expectoratur. Si huius à capite deflatus ad nates conuertatur, indeque febris remittatur: si appetitus viget affis ab illi quæ quotidie compædiant, absumptis concomitantia deponat. Si æger bono habitu præditus, ita itate puerili, aut pectus habeat amplum & hincunt.

Quibus phthisis spiritum grauior extitit, aut alius fluxus superuenit, aut spiritum superuenit, aut facies Hippocrateæ appareat, mors in propinquum est, docente Hippocrate lib. 1. & 12. lib. 5. & 16. lib. 7.

Phthisis acuto morbo superueniens, breui interimit, Ab aliis vero causis genita chronica interdum eadit, & ad multos annos peritetur. Revertetur Autem illa in malorem phthisin.

phificam vidisse quæ per 33. annos vixerit & Matthæus de Gradi dicit aliam mulierem phthificam quæ circa furnum & ignem quotidie occupabatur, plus viginti octo annis vixit.

Curatio huius affectus, ut antea dictum est, plurimum impossibilis est. Si nimirum affectus altiores egerit radices; quia tamen incipiens, affectus interdum curari potest, & multo facilius, innumens in his scilicet qui ex dispositione hereditaria in phthidem incidere proclives sunt; nondum tamen in eam inciderunt. Ideo prophylactica curatio prius proponenda est. pollicæ verò affectus iam geniti cura erit insulsa.

Ad corrigendam igitur pravam illam in tabem propensionem, conuenit victus refrigerans & humectans; & ea omnia quæ sanguinem corrigere eumque mitem ac blandum reddere possunt, omnemque illius acrimoniæ & falsedinem corrigere, quæ sunt aquarum dulcium balnea, lactis visus & cibaria similes naturæ. Tum etiam decoctum radicis chinæ in potu ordinario exhibitur. Sed multo efficacius erit decoctum fanalorum, quod non solum in curatione tabis insantis, vel incipientis; sed etiam in distillationibus falsis, præcipue autem tenuibus, in diuturnis sanguinis fluxibus ab illius ardore productis, miranda præstat: & sic si mihi omnino ratione, si quo gauiat decoctum componi solet, idque vel in aqua stillantia, modo addita portioni vini vel aibi, vel rubripotio ratione affectus. Paratur autem decoctum fanalorum vt gauiat decoctum, cum primarium, tum secundarium, eodem modo exhibetur. His addenda est mutatio aeris, quæ ad innumens affectus præcautionem, incipientis curationem plurimum potest. Ac denique illa conuenient remedia quæ in morbi iam facti curatione primo loco viurpanda proponere agredimur.

Tota igitur iam lactæ & confirmata phthificos curatio veritatem in victris abstrahione & cogitatione, cauterium productum, vel fouentium ablatione, febris lentæ & hæcæ oppugnatione, ac consumptionis reitauratio.

Primo igitur, quæ cacochymia redundans in corpore vltus pulmonis fouere, & augere solet, blandis purgantibus auerenda est, per interualla repetitis, quando corpus non est valde consumptum. Eæque purgationes componantur ex rhabbarina & cassia, aut syrupo, rosæ in hunc modum.

℞. Hordei integri ꝑ.℞. liquiriæ, & palli. mudat. ana 3.ij. iunbar. ꝑ. ij. flor. buglos. & violar. ꝑ. femis. Coquantur ad 3.ij. in colat dissolue rhab. in aqua scabot cum fantalo citrino infusi scrup. iij. manne 3. j. syrupo, rosæ 3. femis. Fiat potio.

Vel manne 3. ij. cum iuleulo pulli, aut communi exhiberi poterunt.

Vel parati potest bolus ex cassiæ 3. j. cum puluer. liquiriæ. scrup.

In principio phthificos valentia etiam purgantia viurpari possunt, ad catarrhum acrim. & falsum, præcipuum vltus causam, potentius reuelendum; qualia in catarrho calido propostia sunt.

In eodem etiam phthificos principio, æqualem corpus fit emaciatum, conuenit venæ sectio, ad febrem temperandam, & humoris acrimoniæ demulcendam.

Ab ipso etiam curationis initio catarrhus, si affectum istum foueat, sitidens, & a pectore auertens est: alioqui frustra ceteris remedijs pugnatur, Huius autem negotio conferunt ea omnia, quæ in catarrhi calidi curatione propostia sunt.

Ac præter illa remedia setaceum ceruici admotum summè est efficax. Refertque Fabricius Hildanus, se nonnullos phthificos hoc præcipuo remedio curasse.

Tandem ad victris ipsius curationem veniendum est. Cui vltus maxime conferunt, quæ absterunt, consolidant, & expectorant. Ad hanc rem infinita viurpari solent medicamenta. Efficacissima verò sunt quæ sequuntur.

Lac omnes intentiones ad phthificorum curationem, propostas adimplere. Abstergit, serosa sua parte, conglutinat, calefacta, corpus nutrit & reficit butyrolam. Cùm autem varia sint lactis genera, omnibus præferendum est muliebre, vt pote naturæ nostræ magis familiare, vltimque erit si ex ipso vltus ligatur, si quis vltus se aliquot resistentis vidisse

testatur Platerus ex ipsoque vnum non solum consumuisse, sed etiam tantas vires recepisse, vt ne lac sibi in postero deficeret, nutricem de nouo impregnaret.

At quia multi ab eo lacte abhorrent, vltimatus est asinum. Quod quia valde ierosum est, facile venas penetrat, & vltus optimè detergit. Huius verò succedit caprillum. A fine nutritur vltus planta, rubi, vitis, polygoni, gramine, hordeo & fecali Lac autem recentissime multum, & adhuc caleens hauriatur. Idcirco inducta propè cubiculum asina, in vas calefactum mulgeatur. Assumatur primum in parua quantitate ad 3.ij. vel iv. vt ventriculus illi assuecat, quantitate illius sensim augendo vltus ad 3. vj. x. & b. j. Ne vero accit, aut coaguletur in ventriculo, vtque pulmonem magis fiat amicum, laccharum rosaceum ei permiscetur ea proportione, vt ad lactis 3. vij. sit sacchari 3. Post assumptum lac non dormiat æger, sed deambulatione per cubiculum se exerceat. Non præstat, donec lac bene coctum a ventriculo secesserit, & peger sime promouetur ad cibum. Vt denique lac commode viurpari possit, non debet adesse magna febris, aut dolor capitis, aut hypochondriacorum tumor, aut biliosus alii fluxus, iuxta Aph. Hipp. 64. ell. 5.

Viulgò sumitur lac semel tantum in die; sed melius est bis in die lumere. Et adhuc melius æget solo lacte nutritur. Nam præterquam quod in maiori copia sumptum, maiores exercit effectus; magnum vltus incommodum, quod ex iuleulo & carnis cum lacte permixti exoritur, facile enim putrescit. Si ergo in morbo desperato curatio tentanda sit, exhibeatur lac, præmis purgatione, sexta quæ hora addita manu Christi perata, & corallata. Et ne vires deficiant, per interualla potionibus lactis intermedia capiat distillantem reitaurans; & continuatur hæc methodus, donec vires recti videantur.

Saccharum rosatum phthificis vtilissimum est, tum etiam conserua rosar. Cuius vi resert Auicenna quendam mulierem phthificam, & desperatam, illa curatam fuisse, vt non solum sanas, sed etiam pinguis redderetur.

Eadem reitatur Melius multos fuisse restitutos; præcipue vt conserua rosar, recens sit, non excedens vnum annum, magna quantitate, & frequenter assumatur, cum medicamentis, cibis & potibus, tum etiam per se omni hora. Prius tamen mundificanda viurpatur, quia materiam putrescentiam & excrementum in pulmonem retinet.

Quoties vero contingat reitringi anhelum, aut spumam suppressam pectorantia vt syrupo de hyssopo, de suffragia, eclegmata & similia viurpentur.

Si denique contingat calefactio propter deficcationem, detur syrupo, violacæ, anabinus, mucilago seminis psylli, cydoniorum & similia.

Saccharo rosacæ, quæ quodam vidisse curatos, testantur Montanus, Valeriola & Forellus, quo egi in maxima quantitate vltus. Quidam Pharmacoposus phthificis nobis notus, ingentem sacchari rosacæ quantitatem sibi ipsi præparabat, idque perpetuo comedebat, & hoc solo remedio sanatus est.

Phthificis etiam maxime conserua infusum ex millefolio, & pimpinellæ, & conserua rosar. in B. M. paratum, & in capde ipso sanguinis descriptum, si per 22 dies illius vltus continetur.

Decoctum bugule in iuleulo veracis, phthisi & internis vltibus mire potest ipsarum & clementer ventrem laxat, contra naturam consolidatum.

Trallianus l. 7. c. 1. se multos phthificos curasse gloriantur vi lapidis hematitis. Cuius præparationem & vtendi modum propostum in curatione ipsi laudant.

Syrupus ex succo bedere terrestris commendatur a Quercetano, cuiusque descriptio talis est.

℞. Succo bedere terrestris lb. ij. 3. Digeratur vt purificetur ad ignem B. M. Huic succo pericete deputato adde sacchari rosar. lb. 3. pendat 3. vj. Coquantur in syrupo, quo vltus æget ex coactat.

Huic etiam syrupo idem Quercetanus flores sulphuris adiunxit, ad consistentiam looch, de quo exhibet quatuor in die, eoque le multos phthificos desperatos, & proclamatos restituisse gloriantur.

Syrupus ex florib. hyperici per infusionem præparatur in B. M.

enim vires herbarum recta via ad pulmonem feruntur. Omnes autem pulmonis appropriatæ & vicibus curandis idoneæ viâri: potius prædictæ formula pro exemplo habetur.

ʒ. Tussilag. viridis M. viij. flopi Maj. Incidantur, & includentur in olla, cum castule aque; luteum operculum perforatum in immunitate, ita tamen ut iocumen sit etiam lutum. Immittatur olla in chalybea circa medium coctiois panis, cum extraheatur denatur olla, & aperto foramine imponatur infundibulum, a quo na per os attrahatur fumus in pulmones, per nates reijciendus. Mirabiliter moiet expulsiorem.

Externus v. r. linimentum refrigerans, & leniens pectori admoendum est mane & sero.

ʒ. Gummi tragacanth. & arabici, ana ʒ. iij. Infundantur in aqua rosacea per diem & noctem; adde olei violæ. Vnc. ʒ.

fem. butyri recentis Voc. sem. falis prunelle ʒ. ij. camphoræ ʒ. iij. lactis muliebri q. l. Miceantur in mortario, & fiat vaguentum.

Ad consensionem repandam, aut saltem impediendam, vel retardandam, præter victum analepticum, ad quem præcipue referuntur hordæata, amygdalata, pincata, oryzata, auenata, & insistantia varii generis, quæ passim apud auctores inveniuntur, maxime conveniunt lac ab initio laudatum, & balneum aque repide, vel ex decocto hordei mundati, & amygdal. contusulum. Quod tamen præsentia catarrho non convenit, aut quando febris putredinis particeps effluaciatur, aut quando pulmo multis scaret crementis.

Potus sit aqua saccharata, decoctum hordei, & liquor infusum liquirit. hydromel tenue, vel, leue chinæ decoctum.

PRAXEOS MEDICÆ

LIBER OCTAVVS.

DE AFFECTIBVS CORDIS.

PRAEFATIO.



Or variis patitur morbus, similes, & organicos & communes, cum tamen paucissimi sint, qui affectus curantur datione, & adjuvantur, quandoque tamen nobilissimum graues affectus diu ferre non possunt, quin homo confestim de medio tollatur, sique nullus remedijs locus relinquatur, & tunc qui omnes labores, & ad vim actus conferre tam diu consistimus, res tantum cordis affectus explicare depreceamus, quæ frequentius in prædicta occurrunt, & multum remedium apparatu cognoscere possunt. Atque adeo tria illius capita designamus, quorum primum erit de syncope, Secundum de palpitacione, Tertium denique de virtutis imbecillitate.

CAPVT PRIMVM.

De syncope.

Syncope definitur à Galeno *merk. c. 5.* præceptis omnium virium lapsus. Licet enim in ea solum cor patiat, & sola facultas vitalis interceptatur, tamen collabente ceteris perire necesse est, cum ab ea continuum, & necessarium influxum recipiant.

Dicitur præceptis omnium virium lapsus, vt ab aliis affectibus distingatur, in quibus vires paulatim deficiunt, donec mors subsequatur, neque obstat doctrina Auicennæ *sen. 1 lib. 3. tract. 2. cap. 3.* propoens signa (synopes paulatim, adueniens, licet enim causæ spiritus dissoluentes aliquando sentiant, & paulatim operentur, attamen ingrauescentes subitò syncope efficiunt, & idè Auicenna proponit potius signa antecedentia syncope, quam ipsam syncope præseientem.

Demum hæc definitio videtur etiam apoplexie competere, in qua contingit præceptis omnium virium lapsus, quod tamen non est veritati consentaneum, siquidem vires cordis in apoplexia permanent, & pulvis plurimum magnus ac plenus reperitur. Adde quod respiratio infixa, quæ in apoplexia insignis reperitur etiam vt plurimum cum illores, maiorem eam a syncope distinguit, in qua respiratio nullo modo laeditur.

Queritur cur cessante actione cordis, actio cerebri statim cesset, cum spiritus animalis ex vitali genere ut per viam, eoditionis, & in cerebro aliquandiu manere debeat, licet vitalis continuò non influat. Respondemus cerebrum vt & alias omnes partes, ad actiones suas persiciendas indigere continuo affluxu caloris influentis, quo cessante illa statim cessant. Calor autem influens per spiritus vitales defertur.

Alii dantur affectus ad syncope maxime accedentes & ab ea tantum secundum magis & minus differentes, nempe *ελαστος, διανοητικός, & ασπής, & αλυσος* leue est animi deliquium, *καταστροφή* seu *καταστροφή* seu *καταστροφή* grauius a syncope grauius, quæ fit eos vique denunciat vt in totum corpore pulsatio abolatur, *απνοή* a nominatur, quæ proximus ad mortem gradus est.

Apud Hippocratem & Græcos antiquiores vox ista *επνοή* a vitata non fuit, qui affectum hunc lipothymiam a lipopychiam & alphyxiam appellauerunt. Sed paulo ante Galeni tempora hæc vox inuenta, & in medium adducta est, & in speciem grauiori malo tribuitur, quam fit lipothymia, & lipopychia sit apud *Gal. 1. ad Glau. c. 14.* lipothymia est syncope semper præcedit.

Ex prædictis patet partem affectum in syncope esse cor spirituum vitalium officinam, quorum influxu infusus singularium partium calor ac spiritus in actum deducitur, idè cessante illa actione ob prohibuit spirituum vitalium influxum, omnium partium vires collabi actioneque cessare necesse est.

Causa huius affectus proxima & immediata est spirituum vitalium defectus, non totalis, mortem enim subito tunc affert, sed tantum vt natura cogatur (ne vires cordis penitus exoluantur) spiritus ab alijs partibus ad ipsum cor retrahere, vnde illæ a functionibus suis seriatim cognoscunt.

Ille autem spirituum defectus quatuor modis potissimum contingere solet. Vel qui sufficienti copia non generantur, vel qui geniti dissipantur, & euacuantur; vel qui præter naturam alterantur, & corrumpuntur. Vel denique quia fluctuant, & obreuerant: non generantur vito fluctuant, vel materia. Facultas spirituum generatrix leditur, vel proprio cordis affectu, vel per consensum.

Morbi proprii cordi insigniores sunt intemperies magnæ naturæ temperiem euertentes, aut substantiam partium, & caloris natui depalcantes. Quales sunt febres (synops), acutæ & malignæ, *hysterice* hoc colluquens, pestilentes, hæctica, marasmodi, his accedunt morbi organici, vt consensio, & dilatacio nimia, & continuæ solutiones quæ ad ventriculum cordis pertransientes citissime interficiunt.

Per consensum facultas cordis laeditur a reliquis principijs cerebro & hepate, quæ maximam cum corde sympathiam habent: sapissime etiam ab ore ventriculi, ob viciniam sensumque exquisitum, vnde orta est diuisio synopes in cardiacam & stomachicam. Cardia est illa quæ fit corde primario affecto. Stomachica vero quæ per consensum stomachi produciuntur. Non raro etiam ab vtero exoritur, ex terris vaporibus ab ea parte ad cor transmissis, vnde viti præfectio, apnea & syncope hysterica præficiuntur, præ-

vt vapores illi pulmonem, diaphragma, aut cor impetunt, & inuadunt.

Vitium materie est defectus, vel corruptio aeris & sanguinis, quibus spiritus vitales generantur. Aeris defectus contingit ex respiratione, vel transpiratione laesa; sanguinis vero defectus ex leui nutritione. Vt vitiis corruptio accidit cum alienam qualitatem induunt, sic aer inquinatus in confluxione pellitulis liposis, miam & lyncopem non raro inferre solet: Sic tetro odore nonnullis eundem effectum præstat, immo vero suaves mulieribus quibuldamque ex prauis calibus corruptus interitum sanguis generat.

Spiritus dissipant euacuationes nimæ, tum seniles, tum infeniles. Seniles sunt primò ipsius sanguinis per os, nares, vterum, aluum, hæmorrhoides, phlebotomiam, aliaque vicia: nera infigniora fecundum aliorum humorum, qui licet excrementis sint, maiori tamen copia excreti maximam spirituum dissipationem faciunt, & lyncopem inferunt. Tales autem humores excreti solent per vomitum, aluum, urinas, sudores, magni ab cellis apertionem præcipue incorsam, vt empyema istam etiam extorruunt, vt in hydrope, apertio vmbilico contingit.

Infeniles euacuationes sunt ex nimia cutis raritate & contentorum tenuitate, & acrimonia immo dico xili, balneo, vel lacrimico calidiori, immo dico labore. Dissipant etiam vigiliæ per noctem inedia longa, effrenata venustas, ieiunium vehemens, acutudines longæ & acutius adde ingentes dolores cordis, ventriculi, intestinorum, renium, aurium, dentium, & partium omnium nervosarum.

Spiritus alterant & corruptunt praua vitærum dispositio, & quæcunque malignam cordi inimicam qualitatem obtinent, vt aer, & halitus igneus, venenosus, & pellens respiratione, vel transpiratione attractus: vel in corpore ex putredine humorum generatus. Idem præstat venenum assumptum, vel admotum, vel motu animalium venenatorum communicatum.

Denique suffocant & obstruunt spiritus vitales sanguinis, & spiritus ad cor vehementer refluus, copiosa fuligum prauorum circa cor & membra vicina congregatio: nimia sanguinis frigida & crassi circa cor, euulue venas, & arterias & membra vicina reducantia.

Syncope grauiissima quam moris repentina sublequuta est à sanguinis & spirituum libere refluxo ad cor, nuper vidimus in nobili virgine: quæ ab incunte ætate huic symptomati erat valde obnoxia, vt ex quous animi pathemate, etiam leuioni in lypothymia aut lyncopem incideret. Cum autem egregio adolescenti: qui illam ardentem deperibat matrimonio iungeretur, factio celebri parentum consanguineorum, affinium, & amicorum conuentu, postquam ipsi penna à tabellione tradita fuisset, vt nuptialem contractum subfcriberet, vix dimidia syngraphi sui partem exsterauerat, cum illa lubio in terram conuulsi exanimis, & omnino demortua, vidè facili fuit coniecere: ex vehementi animi pathemate, maximam & lubitanam sanguinis & spirituum retractionem, ad cor factam fuisse, quæ calorem naturalem, & spirituum infusum suffocauit, vide moris repentina sublequuta est.

A sanguine vero frigido & crasso copiose circa cor & in maioribus vasis congregato lyncopem oriundum vidit Petrus Salus Duercus, vt ipse scribit lib. de affectibus particulatibus cap. 4 in puella quartum decimum annum agente, quæ cum per diem capitis grauatam, vertiginem, & anxietatem passa esset, die sequenti lubitò extincta est. Secto post mortem cadaueri in arteria magna, & in vena & aua totus sanguis concretus apparuit: vt apprehensio illius altero principio, ita integer ex vena & arteria educeretur ac gladius è vagina extrahi solet. Quare iudicatum fuit lubitum hanc mortem à sola interfectione venarum, & occlusionè à sanguine concreto, causatam fuisse. Causa iste rarus est, eum sanguinis concretio in venis in cadaueribus quidem contingere solet; tanta enim est venarum sanguinis continentia proprietates, velut proprium illius conceptaculum, vt etiam post mortem illam illud conseruet, qui in omnibus alijs locis illud concretis. Huius autem extraordinariæ coactionis rationem delinuit Salus ex analogia sangui-

nis exsualati, qui simul atque refrigeratur, statim concretus, quod magis ei admixti sunt humores frigidiore, crassiores, & viscidiores, pituitosi nimirum & melancholici, quorum ratione intemperem confluxus frigidiorem ad concretandum maiorem aptitudinem, & promptitudinem recipit. Simile quippiam euenire potest sanguini intra venas coarctato, qui vitiosis abundans succis, crassioribus & frigidioribus venas maiores adeo prestat, vt spiritus intercipiens, & penetrare non permittens eos in extinctionem ducat, quique ex tunc sanguis refrigeretur ac concretus, propter humores frigidos & coactionis idoneos illi admixtos qui præstito non fuissent, sanguis liquidus & incorruptus permansisset. Spargitur hunc effectum referent ad spirituum quendam coagulatum & congelantem, ex peculiari & extraordinaria humorum diathesi genitum, quæ cum rarissime contingat, rarissimus etiam solet ille tunc affectus. Et certe simplex refrigeratio concretionem illam efficere non potest, alioquin vi delinctorum cadaueribus hyemis tempore præsertim, sanguis in venis perpetuo concretus, cum tamen omni tempore fluidus reperiatur. Spiritum autem hunc congelantem vi præditum, existimare potius simile esse illi, qui catalepticum inducit, in qua membra frigida & congelata redduntur vt inflecti nullo modo valeant. Spiritus humilior fixantes, & congelantes Chymici in multis animalibus, vegetabilibus & mineralibus agnoscunt: tales etiam è terra inderum luscituri docent histonæ quorundam hominum & brutorum, à terris vaporibus in terræ motibus, aut etiam è cauernis quibuldam erumpentibus congelatorum, vt repente corpora illorum rigida laeta fuerint, tales denique spiritus fulminibus miseri docent Cardanus huiusmodi octo melliorum lubi quercu conantium, qui fulmine percussis, rigidi omnino facti sunt, & in eadem specie permanserunt vsque vnos comedere, alter manum poculo ad mouere, alius bibere videretur.

Signa huius affectus diagnostica, vel respiciunt subiectum, ad illud recipiendum magis idoneum, vel paroxysmum immanentem vel eundem præsentem, vel denique causas illum producentes.

Subiecta magis ad lyncopem disposita sunt homines debilitate quadam natua, vel aduicinia à morbo, aut alio casu prædicti, pulsanones, femine potius quam vires, virgines menitrua patientes, mulieres grauidæ, tum etiam illi qui sunt rari texture, icterici, splenici & melancholici.

Syncope imminet signant in illis præsertim qui illi obnoxii sunt, improvisa antea, animi perturbatio capitis grauitas, vertigo, aleni & varior coloris, viridis, & flauis obuerfatio, coloris faciei, tum etiam & palpis frequens, & labusta mutatio.

In lypothymia præsentia prædicta etiam signa reperiuntur, sed paulo grauiora, quibus non raro sudor frigidus adiungitur, tum ægrotautes (quod præcipuum est) de animi defensione conuerfuntur.

Præsentem vero lyncopem demonstrant, præceptis omnium virium lapsus, pulsus rarissimus, formicans, obcurus, tandem quælibet, color faciei summo pallore, aut luore suffusus, totius corporis præsertim extremitatum frigiditas, sudor frigidus, hyposticus ideo dictus, præcipue in temporibus collo & thorace.

Signa causarum maiori ex parte per se manifesta sunt. Febris enim maligna, acuta, lyncopalps, lyncæticæ, lyncopem idiopathice efficientes, per se facili conspicue lunc; cause etiam terrene, reperiuntur lyncopem inducentes, sensu obuii sunt: vt ira & gaudium immo dicam, terror subitus & repentinus odores retri, hæmorrhagia largæ, aliaque euacuationes copiosæ, vigilie, pertinaçes, media longa, clizmata venis dolores atrocissimi.

Humores tenuiores, & corporis raritatem significant, nates acutæ, oculi concaui, collapsa tempora. Flauis bilis abundantiam ostendunt, morfus oris ventriculi, anxietas, vellicatio, calor & dolor insignis.

Humorum ctudorum copiam significant, totius corporis moles amplior præcordiorum tumor, color faciei albidus, nigricans aut læueller, pulsus minor, obcurus & inæqualis.

Syncope vero lymphatica ex aliarum partium vitio produci, ex eademdem partium affectuum signis innoscitur: fit ex affectu ventriculi, si proenatur, eundem partis affectus præcellunt ut nausea, vomitus, ventriculi morbus oris amaror sitis, & similia. Idem de alijs partibus eho iudicium. Si vero nullum alium partis affectum iudicium apparet, ex primario cordis affectu lymphæ exoritur indicio est.

Ab alijs affectibus syncope proprijs etiam signis distinguitur. Ab epilepsia quidem quod in ea fit convulsio, non autem in lyncopese; apoplexia, quod in ea insigniter lædatur respiratio, etiam ut plurimum cum tætere, & pulsus non admodum immutatur, nisi in morti proximis. In syncope vero pulsus fere abolitur, & respiratio libera permanet. Ab utriusque suffocatione distinguitur, quod in ea partes spiritales ut plurimum maxime afficiuntur, & grotantes singulati videntur, pulsus tamen non valde immutatur, neque facies color, qui statum naturalem servat, imò frequenter rubicundior apparet: in syncope vero respiratio non lædatur, pulsus fere abolitur est, & facies admodum palliet. Aliquando tamen lyncopese cum utriusque suffocatione coniungitur, & tunc pulsus interdum non peritur.

Prognosis huius affectus ex Hippocrati primùm definitur. *Alphab. sect. 2.* Quæ frequenter at fortiter sine causa manifesta desinit animi, deperit moritur. Quia ut ante dictum est lyncopese grauior vires cordis penitus opprimat, vel exoluit, unde mors consequitur.

Syncope id quæ homo non restituitur post irrotationem, facies cum aqua rosacea, polsi vini exhibitionem, & sternutatoria naribus immixta, lethalis.

Cum quæ à lyncopese incipiat, non statim salus promittenda est. Si enim pulsus non restituitur, & color viuidus non redit, ægerque irigidus semper manet, in lyncopem citò relabatur, ex qua periculum impendit.

Quæ ab immoedici euacuationibus timore, tristitia aut alia eademdem causa lyncopese exoritur, minis periculosa est, quam quæ ab interna causa procedit.

Quod ad curationem spectat; cum lyncopese à varijs causis dependat, illarum ratione duarum curandi modum desiderat.

A quacumque tamen fiat causa, urgente paroxysmo, sequentia conueniunt: Supinus decubitus, iniectio aque frigide in faciem, sternutamentis concitatio vini generosi, aquæ cinamini periculis, ut ælethi & similia in os immixtio. A diuino prope naribus panis est fumo calentes vociferatio & ægri agitatio, natium compressio, & digitorum confectio, pliorum auxilio, frictions, ligaturæ, & cucurbitulæ.

At ratione causarum duarum curatio varianda est in sequenti modum.

Si ex defectu alimenti ducit originem; vino generoso assumpito reparatur, & crusta panis in eodem madefacta & assumptum; etiam alimentis (orbibus, & valde nutritibus, ut iulculis, delictatis restaurantibus & similibus.

Inter alia plurimum valet ferculum ex ouis, saccharo, vino & cinamomo sequenti capite deleripimus.

Si ab humorum tenuitate, quæ spiritus facili exhalant; odoramenta & cibi boni succi incassant eoque exhibentur: cutis pori constringantur ol. rosaceo; maneant in ære frigido.

Si ab hysterico affectu, remedia illi appropriata adhibeantur.

Si maligna qualitate cardiaca, & alexipharmaca usurpentur, qualia in febrium malignarum curatione præscribi solet.

Si à veneno hausto; venenum illud euacuetur, & tum manifestis qualitatibus, tum peculiari proprietate oppugnantia propinquantur. Ideoque vomitus statim prouocetur, postmodum theiaca exhibeatur. Deinde si lenitior ardor, vel erosio ventriculi, vel butyrum accipiat, vel iulcula pinguis, aut potiones cardiacas refrigerantes.

Si ab immodica euacuatione, æger odoribus, cibo, potu, somno & quæte reficiendus.

Si à nimia profusione sanguinis; ponatur æger supra lectum, capite declinato, aqua frigida facies irroretur, detur parum vini aqua frigida diluti.

Si à superpagatione, detur theiaca recens, vel in eius

defectu antiqua, cum opij gr. ij. in vino dissoluta; vel quod melius est laudani gr. ij. Totus ventris oleis sequentibus inungatur.

1. Ol. myrtum, & cydonan. Vnc. Memis. ol. abinthij Vnc. 3. aceti tolar. partium. Mifce, fiat inunctio frequenter.

Insciatut dyllier ex lacte chalybeato, addendo vitellos ouium n. iij. pilonij romani 3. j.

Fiant frictions brachiorum, & partium superiorum.

Mica panis vino madefacta, aut etiam vinum ipsum exhibeatur.

Ac denique euacuatio quævis, siue sanguinis fit per nares veterum, aliaque partes: siue aliorum humorum per vomitum, aut alui fluxum: remedijs, proprijs capitibus describendis, erit cohibenda.

Quæ à sudore nimio exoritur lyncopese, curatur remedijs sudorem coercentibus, ut aqua frigida, vel rosacea, sola, aut cum modico aceto, in faciem & natus affatum coniecta. Aet eorum prædictis aquis, & libellatione refrigeretur. Epithemata frigida cordi adhibeantur ex aqua rolar. aceto: 1. borrag. & pulu. diamarg. ligidi, cum tantillo vini penetrationis gratia.

Iulepi etiam refrigerantes ex syrupo acetoso, violaceo, de pomis, aut de limonibus, cum aquis refrigerantibus, & sale prunelle frequenter exhibendi. Oblituantur pori inunctioibus cutis ex ol. olivæ myrtino, malicichino. A viro eger abstineat. Nullo pacto frictus, sed sepe locum mutet, & se iter opentur. Lecti sequenti pulvere sinapiet.

1. Hor. nymphae & tolar. an. 3. iij. laudani puri 3. g. Syrac. 3. j. myrtill. & granor. sumach. ana 3. j. Fiat pulvis.

Si ex suffocatione spirituum: ad amburum corporis illi reuocandi sunt frictions, ligaturæ, cucurbitulæ, & similibus remedijs. At si plene induit oratur suffocatio, sanguis copiose, sed per intervalla detrahendus est.

Si à terrore & metu: sanguinis missio etiam usurpanda est, ne ex affluxu sanguinis, obstructio aliqua vel inflammatio excutitur.

C A P U T II.

De Palpitatione cordis.

UT in syncope motus cordis imminuitur, sic in palpitatione est deprauiatus. Male à quibusdam tremor cordis nominatur, cum tremor fit passio motus animalis & voluntarij, & non nisi partibus voluntario motu prædictis completur.

Gal lib. de tremore palpi. & comul. dicit palpitationem à solo morbo fieri, nempe à sola causa morbica partem atolitente: de deprimente, siue vilo facultatis contritus tremorem verò partim à morbo, partim à facultate. Hinc multi palpitationis vocabulum cordi, & alijs partibus vniuocè tribuunt, eodem modo fieri existimant in corde, ac in cute & musculis in quibus palpatione contingit à spiritu laxato, ad eas partes violenter impulsio. Si enim ab eodem spiritu impletum, atque iterum euacuationem cot moueat, utris inflat, (in quo tale aliquid à liquoze violenter infuso, vel spiritu inflato & rursus compresso contingit) palpitationem parti existimant. Verum dispar admodum est ratio: cum enim musculi non habent naturalem lese dilatandi, ac contrahendi vim, sed tantum à causa morbica motum illum acquirunt. Cor verò cum naturalem habeat dilatandi lese ac contrahendi facultatem: Palpitatio cordis sine motu illius fieri non potest. Est frustra à nonnullis multa loca congruentia ex Galeno, quibus præpare conatur, palpitationem cordis non fieri à natura, sed à morbo, vel potius causa morbica. Galenus enim in omnibus locis, agit tantum de palpitatione quæ in cute & in alijs partibus extetris fit, non verò de palpitatione cordis, quæ alterius nature est. Ipsi Gal. de sympt. caus. 2. palpitationem cordis, & arteriarum ab alium partium palpitatione discernit.

Est igitur cordis palpitatione immoderata & præternaturalis illius partis confusio, vehementer dilataio, ac lythorice molitæque tanta interdum est, ut (docente Fernelio) sepe fit animaduertitur thor. cum vicinas cistæ effragile; & sepe & eas, quæ supra mammæ sunt de propria lide depulsi, sepe etiam auctra foras dilatasse in aneurysina contracti pugni magni

quidē. in quo & mētē. & visu conspicua erat pulsatio :

Fit autem immo dera illa cordis concussio, & facultate pulsificata fluminali, & irritata a re molesta, & visu illius plurimum aucto.

Hic obijci potest, in febribus hæc omnia reperiri. Immoderata enim fit systole, & diastole, facultas irritata a remota, vel visu aucto ob calorem immo dera cordis improprium.

Respondemus motum cordis in febribus distingui à palpitatione tantum per magis & minus, & motum cordis deprauatum dici palpitationem quando insignis, & vehemens effluuii vero tantam vehementiam non habet, pulsus frequens, magnus, velox, aut celer nominatur, ad aliaque pulsus immutata & præternaturalia differentia refertur.

Causæ igitur palpitationem cordis efficientes ad tria capita reduci possunt. Vel enim est res molestant & irritans, vel refrigerationis necessitas, vel spirituum defectus: quæ duæ causæ posteriores ad ylam auctum referri possunt.

Causa molestant omnium frequentissima est, ita ut quæ plurimi auctores hanc vnicam agnoscerent, reliquæ vero rariores. Illa autem causa molestant vel plurimum est vapor, vel status qui quantitate, vel qualitate, vel utraque, cordi molestant parit. Qualitas autem vel manifesta est vel occulta.

Vapor manifesta qualitate molestant, vel in ipso corde est, & partibus vicinis; vel aliunde ab alijs partibus remotioribus transmittitur; sique subito in abditi cordis sinus ingressus, expulsiorem videretur fluminali, quod luminis robore naturaliter prædium, poterit insurgere, & vehementiori rursu hollē expellere nititur.

In corde aut partibus vicinis, potissimum pericardio humores frigidi & crassi interdum colliguntur, & quibus vapores eleuantur, & ad cordis ventriculos transferuntur, ubi palpitationem efficiunt.

Ab alijs vero partibus remotioribus vapores & status ad cordis ventriculos eleuantur, puta ventriculis, & ceteris, & in ventre inferiori contentis.

Vapor occulta qualitate molestant cor non raro afficit in febribus malignis, pestilentibus, in venenis assumptis, & aliquando vermes putrefcentes, sanguis menstruus retentus, semenque corruptum, aliaque putrida materia, vapores malignos ad cor mittunt, qui facultatem illius vehementer irritant.

Humores varij cordi molestant exhibent, quantitate, vel qualitate peccantes: sic sanguis nimia quantitate venas, & arterias tum, & cordis ventriculos grauans, vt libere moueri nequeant, cordis palpitationem efficiunt, motum illius liberum impediens, quem defectum vt refarcit facultas violentius mouet. Sic aqua in pericardio contenta nimia copia luxurians, cordis substantiam comprimit, illiusque ventriculos vt libere dilatari non valeant, præ illis humores confertum ad cor affluentes vt fit aliquando in vlucribus, formidine, ac terrore.

Humores qualitate peccantes cordi infensi sunt, eique molestant affertur, si venenis, putridis, corruptis, acris, & calidi nimis fuerint, cuiusmodi est præcipue bilis torrida & exulta in cordis substantiam impetum faciens, aliaque vim expultricem irritans.

Tumores etiam multo rarij, huiusmodi affectum excitant, vt inflammation cordis, abscessus, tuberculum in arterijs pulmonum propè cor exortum: quod Antipater medico cognosse refert Gal. 4. de loc. aff. vnde post pulsum inæqualem in palpitationem, & Althina incidit, ex quo subito interit. Sic refert Dodoneus le calium in arteria magna, loco cordi proximo obstruente, vnde palpitatione orta erat, multis annis perleuerans.

Tumores etiam in pericardio excitati, siue humoris ex parte, & scabiosi, siue humorum in se continent, vt sunt pustule hydatides in corde ipso calculi, officula, & carnis frustula interdam generantur, quæ palpitationem efficiunt. Sic refert Platerus in quodam diuturna cordis palpitatione versato, & tandem à medio sublato, ossium quidam in corde deprehensum fuisse. Schenckius vero refert in sacerdote quodam, qui è teneris annis, vixit ad annum 42. quo è vita discessit, cordis palpitatione laborauerat in cordis basi car-

nis excrecentiam repertam fuisse, quæ set drachmas, pendebat, & alterum corculum representabat.

Secunda palpitationis causa supra proposita fuit refrigerationis necessitas, quæ tum præcipue ad delictum caloris præternaturalis in corde augetur, à quo spiritus intus accenduntur, ac propterea motus cordis, & arteriarum augetur, vt quod abijciuntur restituantur, & calor refrigeretur. Id quod fieri solet interdum à causis internis, quod tamen rarissimum est, vt antea diximus, frequentius vero ab externalibus, & excitatione vehementi, & similibus. Quemadmodum obiectum Platerus iuuenem quemdam admodum calentem, cum in ludo parue pilei ira corperetur, siquæ duæ causæ coniungerentur, palpitatione cordis adeo vehementi correptum fuisse, vt inde mors conlequuta fit.

Tertia causa fuit spirituum defectus, qui fit per inefficaciam vigiliam, gaudium, metum, pudorem: morbus vehementes, aliaque causas subito & copiose spiritus dissipantes, quem spirituum defectum cor relaxare contendens, vt illos promptius & copiosius regeneret, & ad totum corpus celerius transmittat, motum suum intendit, ac celeriores efficit.

Notandum est pericardio, palpitationem cordis longè frequentiores esse, quæ fit per consensum aliarum partium quam ipso corne pensari assido. Habet enim cor cum omnibus corporis partibus consensum per arterias, & venas per quas vapores, status, & humores transmittuntur. Quæ omnia suo loco in diagnosi iam proponenda clarius innotescunt.

Diagnosis huius affectus vel ad ipsam affectum, vel ad causas illum producentes.

Affectus ipse lentus conspicuus est, æger enim manifeste palpitationem in se percipit, & distantes manuum regionis cordis admoventes motum illum vehementem percipiunt. Inò vero visui etiam & interdum auditui fide obijciuntur, enim ætatem motus præcipue in singulo, visu deprehenditur, aliquando etiam auditu testatur Forcibus exemplo iuuenis cuiusdam, cuius cor adeo palpitabat, vt præterea cubiculi clauis autem admoventes, clare exaudirent.

Causæ palpitationem producentes suis etiam signis distinguuntur, calida intemperies dignoscitur, ex pulsi magnitudine, celeritate, & crebriate, febre, & calore thoracis, magna, & frequenti respiratio, & frigidior appetitus.

Si a vapore aut statu generetur cordis palpitatio, cito fit, & cito desinit, a leui corporis motu excitatur, respiratio interdum difficilis est, interdum etiam terrore genitum contumacitatem calorem tenebrarum, sonitus aurium, & dolor non raro alicuius partis subito euadens, cuius autem naturæ, & qualitatē fit vapor aut status palpitationem commouens, ex signis humoris in corpore aut partibus quibuscumque redundantes colligitur cum vapores, & status ab humoribus perpetuo eleuari solent.

Si ab humoribus cordis palpitatio generetur, affectus non ita subito inuadit, & diutius perleuat, qualis autem humor causa huius mali fit, ex signis humoris in toto corpore redundantes facile internosci potest. Ac præcipue sanguinis copia, à qua frequentius motum ab alijs humoribus hic affectus generatur; cognoscitur ex pulsu vario & inæquali, ita vt nunc magnus, nunc parvus, tardus iterumque velox exilat, cui etiam respiratio proportionem reipondet, cor ægroianti contrahit, & opprimitur videtur, idiplum testantur calor excedens, dilatio vna, rubor faciei, tempus verum ætatis, regio, & victus ratio sanguinem multum tipicans.

Quæ per consensum aliarum partium palpitatio exoritur, ex proprijs aliarum partium affectuum signis innotescit. Sic ventriculi consensum indicat, inappetentia, nausea, humorum pestilimorum vomitus, & stomachi morbus. Molestia circa pancreas aut lienem pulsatio, aut alius lienis affectus, materiam in ijs partibus latentem significat, à qua vapores, & status, ad cor transmittuntur; hic mensium superfluitas, & affectiones bystericæ, ab vtero malum exoriri significant.

Aqua in Pericardio redundans difficilis cognoscitur, concitata tamen cum suspicari possumus, si pulsi molles,

& languidus fit. & æger coqueretur sibi, cor, velut in aqua immaturæ, & suffocari. Si malum fit continuum, & in atrophiam vel hecicam de genere.

Si liquores maligni & venenati huic affectui originem dederint, magna in pulsu varietas apparet, virum maximam deiectionem, & interdum lipothymiam, & aque malignitatis signa conspiciuntur.

Si a tumore palpitatio oriatur, notabilis in pulsu apparet varietas, & motus cordis a naturali valde recedit, admodum inæqualis & inordinatus est, & si humor fit calidus, ingens in corpore erit inflammatio, sive magna, & difficilis respiratio, sicut lipothymia, & tamen mori consequitur. Si verò tumor durus sit in pericardio, aut etiam est continuus, & æger sensim & sine causa manifestè contumescit. Si caro vel quidpiam aliud foetidius cordi adhaerent, palpitatio à morbo principio vsque ad mortem continuo hoc minime infestat.

Denique spirituum delectus cordis palpitacionem excitans cognoscitur ex causis præcedentibus, à quibus magna spirituum exolutio fieri potuit, tum etiam ex pulso crebro, celeri & parvo; & quod ex quouis labore etiam lenissimam palpitacionem contingit. Similiter enim quippiam consensientibus accidit, quibus ex deambulatione, aut quavis alia corporis agitatione, etiam leuiores pulsus inuicem fit facis insignis & palpitacioni analogæ.

Prognosis huius affectus ita influenda est, vt periculosus exillat, job isiam eritis motum, quo vta confuari debet, & frequenter ad syncopen de ducatur, tandemque hominem de medio tollat. Vtissimum enim est obseruare à Gal. proposita comm. Aph. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. de loc. aff. cap. 2. omnes qui iuuenes aut declinantes ætate cordis palpitacioni maxime obnoxij ierant, ante senectutem mortuos esse. Frequens enim palpitatio signum erat facultatem vitalem admodum debilem fuisse.

Palpitatio idiopathica est sympathica periculosa, imò vt plerumque lethalis. Tum etiam illa que ab interna causa fit periculosa est illa que ab externa producit, nisi magna sit externa causa vehemens, vt venenæ vel alius vultus insignioris.

Si à cordis tumore, vel soluta vinitate palpitatio procedat insanabilis est & deplorata.

Curatio palpitacionis cordis varia esse debet pro varietate effectuum, à quibus dependet, ac primum ea que à peculiari affectu cordis aut pericardij curationem non recipit, idcirco tota practicum curatio ad sympathicam dirigitur, quæ à varijs partium inferiorum affectibus dependet, quorum curatio à proprijs locis deprehenda est.

At præter illa remedia, quæ causæ supradictam respiciunt, vitanda etiam sunt, quæ symptomatum sedationi, aut lenitioni consentiunt, cor rehendendo, roborendoque, nec non flatibus & vaporibus humoribus melancholicis, aut crudis, & pituitosis eleuatis discutendo. Qualia sunt iulepi cardiales, opiata, epithemata, & odoramenta in virum, imbecillitatis curatione descibenda, tum etiam frequentia.

Y. Conferre melissæ, anthos, flor. borrag. & caryophylli nobilissimorum 3. confect. alterum 3. & thesaur. vet. an. 3. pulu. elect. diambæ, & diamboli dulcis ana 3. Cum syrup. d. e. cortice citri, fiat opiata, quæ vtiatur frequenter.

Y. Aquar. buglossi, rosar. & flor. arantiorum, ana 3. j. syrup. caryoph. nobilissimorum 3. j. flor. aqua cinam. 3. j. spiritus rosar. 3. j. confect. alk. qm. 3. Misce. dentur cochlear. 4. per interualla.

Liquor frequens ad imitationem succi ex cordibus, frequent. cap. descibend. erit vtilissimus.

Y. Corda porci, aut venæcum minus iij. cinam. & caryoph. ana 3. Item acetosæ, & lactucæ ana 3. Item vini albi Vne ii. aquar. borrag. scabios. & rosar. Vne j. Item confect. alterum 3. j. Bulliant omnia inter duo vasa. De hoc liquore capiat cohib. 4. mane & vespert.

Y. Rosar. rubr. & flor. rosarum an. 5. flor. laudulæ Drach. sem. angelicæ, cortic. citri, caryophylli cinamom. macis ana 2. flor. croci Scrup. i. mol. chamber. an. gr. vi. Cum sindone rubra fiat sacculus, qui irroretur vino albo, & aqua rosar. & applicetur ipse regione cordis.

Y. Vnguenti tofar. 3. olei cinam. & caryophyll. an. gutt. vj. mocha, ambra, ana gr. iij. Misce, fiat linimentum, quo illustratur regio cordis.

Civiles purgantes, & carminantes frequenter inieciunt flatuolam materiam poterunt euacuare & discutire.

Sed venæ sectio omnibus remedijs præstat in hoc affectu, virgente parox. yfeno. Et Gal. testatur 5. de loc. affectus, cap. 2. se nunquam inuicem venam secuisse in palpitacione cordis.

Quidam prædici admovent thoracici cucurbitulas fuscificatione, quibus magnam vim tribuunt discutendis ac digerendis flatibus spiritibus, qui in partibus internis incluli continentur. Alii hypochondria admovent, quando in his locis mali minera residet.

A. Zacutus Lusitanus cucurbitulam fuscificationem regioni cordis admovent cum micro successu, vt videre est in huius ab eo descriptis in Praxcos Medica admodum obscura 133. 1. 2.

Alii verò commendant thiopiconem verum ad 3. in cum vino exhibitam, aut vinum in quo eadem radix macerata fuerit.

C A P V T III.

De imbecillitate virium.

ET si virium imbecillitas, omnium adionum, scilicet animalium, vitalium & naturalium lesiones generatim comprehendat, tamen & peculiariter vitales significat, quæ pulsu debili, & infirmo denotantur, illa autem virium imbecillitas in omnibus morbis grauius, in quibus natura vel succumbit, vel ægermet recedit, causæ morbi tunc repenti solet.

Quam admodum igitur in palpitacione, actio cordis, nimirum pulsatio est deprauata, sic in virium debilitate est immutata, in quæ quidem cum syncope coincidit. Ab ea tamen differt, quod pulsus immutatur in syncope tanta est, vt ille sit ferè abolitus, & ægermet percipitur: at in debilitate virium, pulsus manifestus est, & conspicuus, neque adeo immutatus quemadmodum in syncope.

In hac perpetuè facultas animalis etiam offenditur, videlicet motus impotentia consequitur, quæ sine vilo cerebri, nervorum, aut musculorum vitio contingit: sed tantum procedit à spirituum vitalium defectu, qui sufficienter cerebro non comunicantur, vt ex his spiritus animales generentur.

Causa proxima virium imbecillitatis est calor is nationis, & spirituum defectus, à quibus vita, & robur partium dependet. Contingit autem ille defectus in singulis partibus, ex defectu spirituum vitalium calor influens à corde. Deficiunt autem spiritus vitales, vel quod sufficienti copia non generantur, vel quod geniti dissipantur, corrumpuntur, aut suffocantur, quemadmodum in syncope fieri diximus. Vbi tamen hæc differentia reperitur, quod in syncope causæ defectum spirituum producentes, subito & de repente effectum suum producant, virium autem imbecillitate sensim & paulatim operantur. Atque adeo in syncope & lipothymia spiritus vitales penè toti & subito deficiunt, & in virium imbecillitate, pauciores, quam debebant, singulis partibus communicantur.

Præterea cum calor naturalis, non solum calore influente, sed etiam humido primigenio, tanquam pabulo indigeat, si humidum istud dehiat, & imminuat, etiam calorem naturam debilitari, & vires labefactari necesse est.

Causæ autem efficientes, vt spiritus non generentur, vel dissipantur, vel corrumpantur, vel suffocantur in syncope theoria propofita sunt.

Diagnosis huius affectus nulla explicatione indiget, si quidem malum per se patet, & ægri ipsorum de virium imbecillitate conueniunt. Signa verò ipsorum in syncope fuere propofita.

Prognosis etiam ex varia causarum dispositione dependet, propterea enim causæ virium imbecillitatem producentes, leuiiores, aut grauiores sunt, manus vel manus inde periculum emergit.

Curatio huius affectus ad duo dirigenda est, ad causarum subtractionem, & cordis ac spirituum vitalium instauracionem.

Causæ

Causa sunt omnes fere morbi graves, in quibus vel natura succumbit vel ægeritine resistit casus morboſice. Ergo caularum imbecillitatem omnium ſecum morborum curationes reſpiciunt, quæ a suis locis erunt deſumende.

Cordis vero torbatio, & ſpiritus vitalium inflammation ſerſim militanda eſt: imò interdiu caularum morboſicarum curationi præſtenda, cum mortis periculum impendit, cum de tamon periculis, & vires reſcindo cauſas morboſicas augeamus. Aque adeo in calido in morbo cordica magis temperata, in frigido calidiora potius viſurpentur.

Primo igitur in alimentis cordicæ permixta ſunt, vt conſectio alkermeſis, vel de hyacintho cum ſuſculo, vel etiam cum vino odorifero, aut aqua cinam. ſilumina ſit imbecillitas.

In ſuſculo etiam decoquatur inter duas patinas fruſtulum coxæ veruſcinæ, detractis membranis & pinguedine. Poſtea colatum in ſuſculo capiat æger, vno haſtulo. Vel

Caro caponis, detracta pelle & pinguedine, in fruſta diuiſa, ponatur in olla vitreata bene luſta, & maneat in B. M. bulliente per quatuor horas. Tum liquoris inde manantis capiat æger cochlii, vel in cum ſingulis ſuſculis.

Vel poterit fieri deſtillatum reſtaurans in hunc modum.

Caponem vel gallinam, detracta pelle & pinguedine, ac in fruſta diuide. Deinde aſſunde aquar. bugloſſi, borrag. acetofi, roſar. & ſlor. arant. ana th. ſi. pulu. aromat. rolar. maſtal. & cinam. elect. an. ſi. ſi. laſtal. citrin. ʒ. ʒ. limones incisos num. ʒ. Fiat deſtillatum ſecundum artem, quæ deſur ex cochliis omni hora.

Succus catinis veruſcinæ ſolus ac ſimplex in viſu eſt frequentillimo. Coxa veruſcina in veru aſſatur, & inter aſſatum cum ſum ſemicocta eſt, mucronato caltro pangitur. Expreſſus ſuccus parum adhuc in patina coquitur, & exhibetur per ſe, vel cum ſuſculo, aut vitellis ouorum permixtus.

Valeriola ſuccum ex cordibus veruſcinis extractum miris eſſent laudibus. ſit Zacutus Luſtratus propria experientia confirmat, dicitque ſe hoc remedio per menſem exhibitum, diuitum quandam virum liberacæ, qui frequenter in ſyncopis incidere ex debilitate facultatis vitalis, ſanguinis, & ſpiritus reſolutione: cum multa alia remedia ante ſuſcepta nihil profeſſentur. Extrahendi huius ſucci hæc eſt ratio. Acepto veruſcinæ cordæ aut hodi, ſinditur medium, & probe aqua eluuntur, & vitimo aqua roſacea ſouetur, in taleolas oblongas diſſecatur, inque vitreato vaſe teſtaceo, cum caryophyllis aliquot imponitur, ſine viſco liquore. Probe operculato vaſe, paſſa vel luto ſapientis, in calentem furnum extracto pane ſecatur, quoad calore contabefeſcit in ſuccum eliquatur. Inde poſt extrahatur, & aperto vaſe luſatur inuentus in vaſe luſcoſo, & ægro propinatur.

Itali in viſu habent ſorbitionem ex vitellis ouorum, vino, ſaccharo, & cinamomo paratam, quæ optima & valde reſiciens eſt.

Zacutus Luſtratus ex viginti ouorum vitellis ſercalum parat, vt videre eſt *Obſerua. 107 lib. 2. Præſci aduſanda.*

Poterunt etiam fieri iulepi cordiaci in ſequentem modum.

Aque bugloſſi, roſar. & ſlor. arant. ana ʒ. ʒ. ſyrup. de pomis, & de limonibus ʒ. ʒ. conſectio. alkermeſis, aquæ cinam. ʒ. ʒ. Fiat iulep.

Vel paretur mixtura ſequens.

ʒ. Sacchari albi ʒ. ʒ. Huiusmodi etiam cum aqua cinam. optima, & nonnihil ſilumina reddatur ſaccharum. Deinde adde

ſpiritus vitrioli q. ſ. ad manifeſtam aciditatem, eſſentia cinam. gutt. iv. eſſentia macis, nucis moſchat. ʒ. an. an. gutt. ʒ. ʒ. eſſentia caryophyllor. gutt. ʒ. ʒ. Mice, viatur per ſe, & in ſuſculo.

Parari etiam poterit opiata reſtaurans in ſequentem modum.

ʒ. Conſerue roſar. bugloſſi, borrag. & caryophylli noſt. ana ʒ. ʒ. cortic. citri condit. & nucis moſchat. condit. ana. ʒ. ʒ. myrobal. condit. num. ʒ. conſect. alkermeſis, ʒ. ʒ. ſpiritus roſar. & eſſentia citri, ana Drach. ſem. eſſentia cinam. gutt. vi. Cum ſyrup. de pomis, ſit opiata, quæ viatur frequenter.

Aqua ſequens preſtantiffima eſt.

ʒ. Gelatinæ cornu cerui cum vino albo extractæ th. ʒ. ſanguinis agni, & vituli manibus agitatæ ab omnibus fibris liberatæ ana th. ʒ. vini moſcatellini, canarini, aut malualic. th. ʒ. Corda vituli per fruſta ſecta, & valde recentia numer. ʒ. mæce panis albiſſimi recentis, lacte vaccino inſtriatæ th. ʒ. ſem. locci meliſſæ recenter expreſſi th. ʒ. ſem. aque roſar. fragrantis, & ſlor. arant. iorum ana th. ʒ. mala citria, maiorana in taleolas lecta numero ʒ. cinam. opt. ʒ. ʒ. macis Vnc. ʒ. Ponantur in alembico vitreo capaci, & deſtillantur in B. M. Aque dimidia pars, quæ prima prodibit ſeruetur ad viam.

Liquor cardiacus excellens, & pretioſus in hunc modum componi poterit.

ʒ. Ambre grise Drach. ʒ. moſchi opt. ſcrup. ʒ. ligni aloes ʒ. ʒ. ſem. partis albe belzoni puriſſimi ʒ. ʒ. conſuſi & ſimal. martis aſſunde ſpiritu vini, vt quatuor digitis ſuperneget, & ad leniſſimum calorem extrahatur tinctura ſaturata, fiatque liquoris tincta per chartam empetrii am colatur: & euocetur dimidia pars ſpiritus in cineribus lentiffimo igne per alembicum. Liquor in cucurbita reſtans ſeruetur in ampulla vitrea ſorti optimæ obturata ſubere cerato, & vefica. Cuius guttæ ii. ʒ. ʒ. poterunt ſumi cum ſuſculo, viſco, iulepis, aliisque liquoribus prædictis, vel cum ſyrupo ſequenti.

Aque cinam. Vnc. iv. aque ſlor. arantiorum fragrantiffime, aque roſar. admodum odoratæ, an. vnc. ʒ. ʒ. Malce, & in his diſſolue ſacchari candi quantum diſſolui poterit, & fiat ſine viſco calore reſui ſyrupus, cuius cochleari vni permulceantur guttæ iv. liquoris cardiaci prædicti.

Et magnate reſiduo illius liquoris, addito pari pondere roſarum damasceranarum, & quadruplo benzoini, poterunt fieri paſſili valde ſuaves pro luſtini cubiculi.

Cordi applicentur epithemata tum liq. ʒ. ʒ. tum ſolida, & pulu. columbini per medium ſecti & pulueribus cardiacis conſperſi.

Ventriculo admoveantur ſacculi ex aromatibus, in vino madefacti. Teſtes & pudenda ſoucantur conſectioe alkermeſis in vino diſſoluta.

Arteris temporum, manuum & pedum eadem conſectio, illinantur, addendo tantulum aque cinam.

Odoramenta offerantur naribus, in ſequentem modum compoſita.

ʒ. Fol. meliſſæ, ocymi, & maiorana, an. Drach. ʒ. cortic. citri laſtal. cinam. caryophyll. ana Drach. ʒ. croci ſcrup. ſem. ambre grise, gr. ʒ. ʒ. moſchi gr. ʒ. ʒ. Ligentur in nodulo, & irrorentur aqua cinam. & roſar. ac Naribus frequenter offerantur.

Vel ex prædictis olei diſtillatis ex nuc. moſch. cinam. & caryophyllis, cum tantillo cere ſiant baſſama, quibus nares illinantur.

P R A X E O S M E D I C A E

LIBER NONO.

DE AFFECTIBVS VENTRICVLIS.

P R A E F A T I O.



*V*entriculi varia sunt affectus, sic varia etiam lesiones diversis affectibus constituent. Cum enim illa pars eorum colligitur, & chylus confectum destinata sit, ad illud opus perfectiendum prima lesio est cibi & potus appetentia, quae immutatur, aboletur, & depravatur. Aboliui ciborum appetentiam, anorexia, & apoplexia nominatur. Immutatur, inappetentia & cibi fastidium. Depravata vero carum sanem, & putam, ac maliciam constituent. Numa potus appetentia sibi morbosa nominatur. Vitis praedicta astrictum facultatem respiciunt. Ea vero quae ad ciborum concoctionem spectant proci immutatur, aboletur, aut depravatur, vincto lesa concoctionis nomine comprehenduntur. Retentio & expulso lesa in vomitu & singultu versitur. Pocius tamen varia sunt species pro diversa materia quae extermittur a natura, & condicione. Quia vero ventriculus sensu talis exquisitus praeditus est, propter aerum quem a secula coniugatione recipit suis insignem doloribus idcirco, quoadmodum alia partes sensibiles, obnoxius est. Ad demque amores, quoadmodum alia partes, praefertim inflammatione, quae etiam absterfus, & vicia pari constituit.

Præter omnes ventriculi affectus, qui frequentius in praxi adfectus occurrunt, in hac sectione explicamus, etiam praeter vnde concludimus capitibus. Quorum primus erit de inappetentia, & cibi fastidio. Secundus de sanem carum. Tertius de poci malicia. Quartus de sibi morbosa. Quintus de concoctione lesa. Sextus de singultu. Septimus de vomitu. Octavus de vomitu, quodvis. Nonum de cholera morbo. Decimum de dolore ventriculi. Undecimum de ventriculi inflammatione, absterfu, & vicia.

C A P V T P R I M V M.

De inappetentia, & cibi fastidio.

Inappetentia, & cibi fastidium actionem ventriculi abolitam & imminutam comprehendit. Aboliui vocatur anorexia, & anorexia. Immutatur vero anorexia. Vitis tamen obtinuit, ut anorexia, & anorexia pro inmutata & abolita appetentia usurpentur.

Cause huius affectus variae sunt, atque multiplices, quae ut in ordinem quandam redigantur consideranda sunt cause naturales, quae immutatur appetitum naturalem efficiunt. Illae autem a Gal. 1. de sympt. caus. cap. 7. symptomata improprie nominantur, & quoniam numero comprehenduntur. Quarum prima est immutatio partium. Secunda est inmutatio partium appetentia naturalis, & tractio alimenti ad iecore, & vena, vique ad ventriculum continuata. Tertia est venarum melancolicarum (ad quas omnium partium attractio terminatur) iustio & attractio ab intestinis & ventriculo. Quarta est lectronis lenis in ventriculo. Quinta appetentia animalis, quae sensu talis officio stomachi implorato per nerium insignem a cerebro communicato perficitur. Hanc etiam actionem non partium adiuuat humor melancolicus a hene in ventriculo transmissus, qui accidit ad finem, & allectionem tunicae interiore ventriculi vellicat, & corrugat, utque illi instat acetur ad extendendam appetentiam secundum naturam se habeat, omnes istas causas bene constitutas esse necesse est. Si vero aliquid vitium

in qualibet eorum contigerit, inde appetentia lesio exoritur.

Prima ergo causa, quae est partium inmutatio, si quocunque de causa defuerit, non fit ab illis attractio ab alijs partibus, & ventriculo, sicque appetentia non excitatur. Deficit autem illa partium inmutatio, vel quando replete sunt crodorum succorum copia, ob crispulum & ingluviem; vel ob intermissas exercitationes, aut euacuationes conuersas, vel quando tanta est pinguedinis moles ut partibus ipsis ad alimentoniam sufficiat. Impedit etiam partium inmutacionem, pororum cutis congestio magna vel ingens caloris narium embecillitas, ut vili sit periculi substantia partium dissipare valeat; vel eiusdem caloris ad morbosae cuiusdam materiam pepulim revocatio, neglecta interim partium nutritione, ut in febribus fieri consuevit.

Secunda causa erat appetentia naturalis, & tractio alimenti vique ad ventriculum producta. Illa autem vitatur quando partes illae inane sunt non trahunt tamen a vena ob exolutum illarum robur, sed vel efficit, ac moras sui oblate languens & feriantur; ut solet contingere in febribus acutis malignis, pestilentialibus, syncreticis, & hepticis. Idem contingit in immodicis ac diuturnis euacuationibus, velle fluxu hepatico, vixino, haemorrhoidibus, haemorrhagia & naribus, sudore diaphoretico, vena effluata, inedia longa, & similibus.

Tertia causa erat, tractio, quae fit ad ventriculum per venas melancolicas, quae vicia solet per obstructions menses illarum venarum quantum ratione partes inane non possunt materia in chylorum attrahere, neque officio ventriculi divisionis sensum inferre. Sic videmus saepe pueros firmos laborantes cum alio fluxu chylis, & eoque diuturno sensum contabescere, & ad matrem deduci: propter quod in ijs vniuersum intestinum glandula repleta est, quae venas alius obstruunt, & chylis ad iecur committant impediunt, unde fit ut ille semicongestus per alium excludatur, sicque partes alimento necessario priuentur.

Quarta, & quinta causa quae sunt iustionis sensus, & appetentia animalis bonam ventriculi, cerebri, & nervorum dispositionem requirunt. Ideo quocunque istas dispositiones euertere possint, appetentiam quoque deicere valent. Si quocunque intemperies ventriculi valde excedens appetentiam vitiat, praecipue calida & frigida. Calor enim ingens humicam ventriculi substantiam dissipando, appetentiam auferit. Frigus etiam, valde intensum appetentiam vitiat, non solum positum, quando nimirum viscera ab exteriori aere, aqua, gela, & ne, & similibus ita refrigerantur ut in narcolini incident, fed etiam priuatum ab exhausto colore natio, quod Galenus Narcolini appellat, ut per longas haemorrhagias, febres ardentes, & similia: quibus exhauritur ventriculi, & aliarum partium robur. Sic etiam humores praui & excrementatij tum calidi, tum frigidi, inappetentiam excitare solent, Calidi quidem ut biliosi, & aduli, putridi aut virulenti, siue in ventriculo ob viciatum coctionem generentur, siue ex alijs partibus male affectis transierant. Frigida vero, & pituitosi, viscidis, ac leni in ventriculo collectis, ex male concoctis alimentis; vel alapsis ex toto corpore, ut in illis qui per vomitiones conuersas, aliarum partium impuritates in ventriculo allicere conueuerunt; vel ex cerebro per cartharos in quibus frequenter ventriculus ab humore pituitoso grauati conueit, suppressis mensibus, aut haemorrhoidibus calorem suffocando, appetentiam impingit.

Cerebri etiam & nervorum vicia faciunt in stomacho functiones sensus non percipiunt, in quibus scilicet facultas animalis concidit, vel depravata est, atque adeo is mens egrotat, ut in apoplexia, lethargo, phrenetia, mania, & similibus contingit: quemadmodum etiam in paralyti, propter obstructionem nervi fectae coniugationis, qui ad ventriculum deferunt, vel propter eandem obstructionem ex via refrigerantium, & narcoticorum contrahitur.

Diagnosin huius affectus per se satis innotebit, aeger enim ipse de appetentia decedit, & alimentorum auriore latius conquiretur. At signa caularum partium conspicua sunt, partim vero artificiose elicienda.

Ac primum illae quae inanitionis defectum pariunt, cognoscuntur, ex vitiis liberaliori praegressis, corpore admodum repleto, intermissis exercitationibus, aut cautationibus, somno longiore, & aliis causis crudorum succorum copiam congerere idoneis: tum etiam si corpus obelum, & vnde diluente appareant. Eundem inanitionis defectum significat cutis densitas, quae humoris alimentarii dissipationem impedit, tum etiam morbus acrius grauis, peculiariter membrum obfusus: a quo facta est caloris natui dissipatione in toto corpore, ita ut lumina debilitas illius non possit attrahere ad partes alimentum sufficienter conficere, cuiusque penuriam interire.

Secundae causae signa fatis conspicua sunt, nimirum febres acutae, malignae, pestilentes, aut syncopicae, vel evacuationes immodicae, atque causae, a quibus magna caloris natui exoluto prodeat: est in partibus, ut non possint necessarium alimentum attrahere.

Tertiae causae signa ad obstructiones praesertim referuntur, quarum signa in hepatis, lienis, & mesenterii affectibus innotebunt.

Quartae & quintae causae signa maiori indagine opus habent. Ac primum calidam ventriculi intemperiem, & biliosi humoris redundantiam, significant, ritus in praecedentibus ac praesertim in regione ventriculi, in lingua, & faucibus ariditas, & amaror, ibi interdum aditus, & si ab alia parte humoris calidi & biliosi influant: illius partis affectus innotebit, ut hepatis inflammationis, aut alterius partis. Si vero nulla alia pars laborare videatur, in ipso ventriculo intemperiem residere conueniendum est, aut vitioforum alimentorum visu praecedente. His ut plurimum accedunt, cardialgia, nausea, vomitus, vel alui fluxus, & ab eorum quae excutuntur qualitatibus, humoris peccantis natura innotebit. Frigida intemperies & pituitosorum humorum copia, ex causis refrigerantibus praegressis, vel natium calorem indignantem dissipantibus, & extinguentibus innotebit, tum etiam ex grauitatis sensu in regione stomachi, ructu acidus, humoris viscidus & crassus, per os aut per alium excreto. Idem etiam significat catarrhis frequens, aut diuturnus, & affectus aluius partis quae humorem pituitosum, aut melancholicum ad ventriculum transmittere potest, ut lienis, vteri, & similium. Cerebri denique & nervorum vicia per propria indicia erunt distinguenda.

Quod ad prognosin spectat, quemadmodum bona appetentia in omnibus morbis laudabilis, ut docuit Hipp. *lib. 3, sect. 3*. Mente constare & bene se habere ad ea quae offeruntur bonam: sic etiam inappetentia, malum omen esse conuenit. Malignam enim a flatu naturali peruerfionem significat: origitur, ut docet Gal. *comm. in 3. Epid.* aut a prauis malignique humoribus ventriculi officium occupantibus, aut ab ipsius facultatis extinctione, cuius munus erat alimentis indigentiam sentire, idque consequenter appetere. Sic Hipp. *in 1. Epid.* de tabidis in Epidemica constitutio mortuus, ait: *cibus totius perpetuo fastidiabatur, non sivebatur*. Sic etiam Gal. *comm. in 3. Epid.* multos se vidisse affirmat in quadam pestilenti constitutione, qui nihil quicquam cibum aluerant, & de medio tollabantur. Quidam tamen, ut ipse ait, iociores quippe, qui vix sibi ipsi afferentes, cibum oblatus assumpserunt, superstitibus fuerunt. Iti apud Hipp. *3. Epid. sect. 1. Aeg. 3. Hermetrae*, qui die 27. mortuus est, cibum aduerfatur tota morbi tempore, & vltimis diebus non desistit quidem potare: *Et hoc 2. caput libri Aeg. 6. Euryanaz*, qui a bilio-

rebus omnes cibos toto tempore, neque appetebat quicquam sibi fieri, neque aliquid bibulis effudit dignum; ex quo morbo interit post diem duodecimam.

Aduertendum tamen est, cibi fastidium esse quidem signum, si a caloris natui exolutione prodeat: sed non esse ita perniciosum si ab humorum prauorum redundantia, & cacochymia oriat, ut videtur est apud Hipp. 7. *Epid.* ut Cleomenes filio cibi fastidio citra febrem totos duos menses laborante ex pituita crude, & viscida copia, quae tandem vomitu copioso fuit exclusa. Sic in morborum ac febrium praecipue mitis non est adeo periculosa inappetentia, quia tunc natura putrescentium humorum pepalino intenta, minus appetit alimentum, quod illam ab inhibito loco reuocaret. Postmodum enim sedata febre, & humoribus morbis excludis, sponte sua munus suum reperit intermissum.

In paucis inappetentia grauior est, quam in alia aetate, propter humidam valde, & dissipabilem substantiam, quae praedita sunt, & quae maiori relaxatione indigent visu alimentorum, quibus priuantur per inappetentiam.

In consuetudine, cibi fastidium reciduum minatur, propter reliquias materiae morbosae inappetentiam producentes.

In morbo diuturno cibi fastidium, & deiectiones synecrae, malum. *Hipp. Aph. 6, sect. 3*. cibi fastidium per seipsum, prauum est signum in morbis diuturnis: in his enim qui a talibus morbus fuit euasuri, contrarius affectus solet accidere, vehementer scilicet ciborum appetentia. Ad deiectiones synecrae, ut superuenientes deterius multo praesagium efficitur; quandoquidem per synecrae deiectiones intelligit Hippocritus impermixtas aequale humiditatem, quando solus humor ferro suo delitatus eiecitur, fluxus in biliosus fit, siue melancholicus. Nam deiectiones humilioris vultu esse omnem humiditatem natuiam significant a calore febrili.

In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium, majus, & cum febre peius Hipp. *Aph. 3, sect. 6*. quando in dysenteria profundiora & putrida vlcera sunt, ventriculus ipsis compatiens non bene coocquit, quae offensio, magis ac magis ad superiora peruenit, quando os ventriculi vna afficitur, tum a grotantes cibi fastidio laborant. Sunt quidem dysenterici non raro ab initio morbi cibum fastidientes, ob prauos humores ab hepate confluentes; pars enim eorum superfluitans, ad os ventriculi effertur, quod tamen non est perpetuo periculolum. Sed in longis difficultatibus intestinum cum his casus adueniunt, duorum alterum est, vel putredo aliqua circa vlcera, vel magna inflammatio, quorum vtrumque admodum est exitiosum.

Cutatio huius affectus si ab aliarum partium vicio dependeat ab eorum curatione desumenda est. Si vero ex proprio ventriculi vicio contingat ad calidam vel frigidam illius intemperiem cum materia coniunctam reducenda est.

Calida intemperies curanda est primum humoris biliosi si ex purgatione, blandè, & frequenter repetita. Eaque componi poterit ex thab-myrob tamarind syrupo-rolae vel de cichorio composit. cum rheo. Aut si aeger fit ad vomitum proclius, blandis vomitoriis prouocandus fuerit.

Idem humor alterabitur iulepis, aut iulepis refrigerantibus, in quibus non omittendus est spiritus vitrioli, aut sulphuris. Quandoquidem acida omnia, praeterquam quod bilem valde contemperant, appetitum etiam maxime excitare valet. Vnde sic ut acetaria zylatis tempore ad excitandum appetentiam frequenter videntur.

Vel simul, & semel humor ille biliosus alterari, & expurgari poterit apotemate conuenienti, cui ratione ventriculi addi poterant abstinij pontici Melenmyrob. cat. Vac. tem.

Post purgationem ad ventriculum roborandum conueniunt mixta cydoniorum, aut cydoniarum ipsum, vel syrupo cydon. cum syrupo de abfincho pontic. mixtus, tabellae diamarag. ling. vel triaental. vel etiam diarrhod. abbat. si quoniam obstructionis suspicio fuerit. Vel opista sequen.

4. Condisurte lactuce, & cucurbitae, ana Vnc. i. conseruat.

ferat acetosæ, rosæ, flor. & cichori & buglossi, ana ʒ. sem. feniculi rubri, corall. preparat. & margarit. præp. ana ʒ. sem. trochisc. de spodio, & sem. acetosæ, ana ʒ. i. Cum syrupo limon. fiat opiatum, cuius capiat ad magnitudinem callaneæ manæ & sero, superbibendo parum vini dulcissimi.

Exterius verò sequenti unguen to regio ventriculi inungatur.

ʒ. Ol. rosat. myrtini, & cydonior. acetosæ, lotor. ana ʒ. i. i. lantol. omnium, coralli rubri, corandri præp. corall. rubr. ana ʒ. i. gran. permes. & spodi, ana ʒ. ʒ. ceræ alba q. l. Fiat linimentum quo subterpido, & in vola manus tantum calefacto inungatur dicta regio bis, aut ter in die, addendo etiam acetosæ rosæ, parum vinisulis tempore.

Vel idem parti admoveantur placenta rosæ, acetosæ imerata, aut in eodem parum mactram, quæ remouenda erit priusquam incalcet.

Denique in persequente affectu plurimum proderit balneum, vel semicupium refrigerans, & humidans, bis aut ter repetitum. Quo maxime recreantur conualescentes, & in priorem statum appetitum sepe restituantur.

In almentsis acetum, & acida omnia etiam vitilissima.

A frigida intemperie produciuntur inappetentia, quando humores pituitosi, & melancholici in ventriculo collecti, functionem illius destruant; vel aliunde illi si a toto corpore, vt in illis, qui pæcassuetas vomitiones allicere solent aliarum partium impatiens in ventriculo: aut à cerebro, hinc, vtero, alijsque partibus. Illiusque curatio prius respiciere debet intemperiem partium mandantium, quæ corrigenda est remedijs, è proprijs capitibus desumendis.

Ipsi verò ventriculi medicatio adhibenda est, per evacuationem humoris morbifici, & partis corroboratiōem.

Vacuatio potest fieri per vomitum, & feculentum.

Per vomitum quidem, si æger sit naufragabundus, & facile vomat, medicamentis citando vomitus deſtinatis.

Si vero illis humores crassi sint, & tuncis ventriculi impatiens, ægerque conuulsus non sit affectus; peculium deturbandi sunt, pilulis præcipue, quæ hic magis conueniunt, quia diutius in ventriculo morantur, vt docet Gal. cap. 7. lib. 4. de ſententiæ tuenda. Qui etiam valde commendat pilulas de hieca, quæ æ hiebi totius ad ʒ. i. vel ʒ. i. manè duabus horis ante passum, vel receter in hunc modum, componi possunt.

ʒ. Aloes electæ, succo abſinthij diligenter nutritæ ʒ. i. agarici trochisc. ʒ. ii. thab. puluerat. & vino albo irrorat. ʒ. i. Nucis mosch. & spicæ nard. ana ʒ. ʒ. salis tartar. malthic. & cinnam. ana ʒ. i. Cum syrupo de abſinthio, fiat massa pilulor. de cuius ʒ. i. formentur pilule vi. desuratz. Capiat summo mane, si velis integrè purgare, vel sumat ʒ. ʒ. horis duabus ante prandium, bis, aut ter in septimana. Possunt acui diagrydio si validius purgare volueris.

Simetus sit calidioris rectoris, poterunt misceri quædam refrigerantia, vt rose rubra, lantala, pulu. diamarg. Et fiet massa cum syrupo, de ciccho composita.

Validiores pilule non conueniunt, quia humores ab alijs partibus ad ventriculum allicunt.

Si pilule decurari non possint, hieca propinanda est cum decocto conuenienti. Vel si portio videtur ingrata, fiat infusio sol. semina, myrobolan. rhei, & agarici, in vino abſinthine, vel decocto stomachico: dissoluendo tantillum electæ de ciccho solutius; si magis purgans medicamentum compoſere sit animus.

Si d. pituita admodum lenta viciādeſcitur hic affectus, ante purgationem dissoluenda est viſi melius ros. oxymel. syrupo de hyſſopo, alijsque cum decocto incident. & abſtergent. Vel sequenti apozemate vtrumque simul præſtari poterit.

ʒ. Rad. acori vulgaris, cyperi, & calami aromati. ana Vnc. i. cortic. citri sicchi, & rad. falsæ par. ana Drach. vi. fol. abſinthij pontic. menthe, maioranæ, chamæd. chamæp. ana M. sem. citri & anisi, ana Drach. i. sem. milindat. Vnc. i. sem. carthami contusi Vnc. i. agarici trochiscat. Drach. i. sem. cathartici sol. salinis, anthos & luendule, ana P. i. Fiat decocto ad ʒ. i. ii. In qua dissolu syrupo de abſinthio pontic. & conſequat. coſecut. ana ʒ. i. ii. Fiat apozema clarum,

& aromat. pauco cinnam. & pulu. electarij aromati. rosat. pro iv. doſibus manutinus. In purgatione prima & vltima diſ. solui possunt, ad vbiorem purgationem electar. de ciccho solut. ʒ. i. ii. cum thab. puluerat. ʒ. i. i.

Terebinthina vsu potiusſimum est, quia viscera omnia commodè repurgat; maxime si ex ea & thab. pilulas coſecras.

Venzæ ſectio in hoc affectu non conuenit, nisi iecur, sic calidius.

Post purgationem (ſufficientem ad roborationem venientem est, rari interna, quæ externa; quæ in ſequentem.) modum præſcribi poterunt.

ʒ. Syrup. de abſinthio pontic. ʒ. i. Capiat manè ieiunio ſtomacho per aliquot dies. Vel illius loco vinum abſinthie ſubſtitui poterit.

ʒ. Conſerua anthos, menthe, cort. citri conſecti, & nucis moschatæ conſecti ana ʒ. ʒ. ii. myrobolan. conſect. num. j. conſect. alchem. ʒ. ii. tunicar. interior. ventriculo. galline præparat. ʒ. i. cinnam. & pulu. aromati. rosat. ana Drach. i. Cum syrupo de mentha fiat opiatum: vel cum saccharo rosat. fiat conſectum. Vtatur manè, superbibendo parum vini generosi.

Dictus remedijs vtiliter additur ſal abſinthij, vel ol. de mentha arte Chymica extractum.

Vel ſal abſinthij, & cortic. arantior. vel alterutrum ad Drach. ſem. in vino, vel ſulculo diſſolutum eſt habitus.

Sequens etiam ſyrup. efficaſſimus eſt.

ʒ. Syrup. cydonior. & conſect. cort. citri, ana Vnc. ii. aque cinnam. Vnc. i. ol. ſulphur. gutt. xij. Miſce capiat coſeclear. i. per interualla.

Aqua clareta frequentiffimo in vſu apud multos habetur, cuius compoſitio talis eſt.

ʒ. Cinnam. craſſiſſimæ triti Vnc. ii. Macerentur in m. d. aque vitæ per ſe in vaſe vitreo, in alio vaſe vitreo per ſe, & ſecotim macerentur ſacchari albiſſi. Vnc. vi. aque rosat. ʒ. ʒ. Stent hæc omnia ſecotim in infuſione per duos aut tres dies, agitando quolibet dies pluries hæc duo vaſa. Tandem ſimul miſceantur materiz in iſſis conſectæ, & per manicam tranſmittantur. Colatura ſeruetur in vaſe vitreo bene obſcurato, ſomat cochl. i. aut ii. ieiunio ſtomacho.

Apud Pariſienſes maximo in prelio habetur ſyrupus de abſinthio Penz. Cuius deſcriptio in hunc modum eſt habet.

ʒ. Cort. citri. ſaccharo conſectum, & in calcolas diſſecti ʒ. ʒ. ſem. Coquantur in aquis partibus aque ci horij & agrivonij vique ad putrilagineum. Expreſſioni ſortiter ſacæ adde ſucci cydon. & aque ſſilat. abſinthij, pont. ana ʒ. ʒ. i. Quibus ſimul mixtis infunde per quatuordecim ſchenanth. Vnc. iv. in vaſe bene clauſo, vireatro. ſupra cineres calidos. In expreſſione ſortiter ſacæ diſſolue ſacchari albiſſi, q. l. Coquantur poſtea in ſyrupum perfectum, in quo calente diſſolue ambra cineriz Drach. i. Seruetur poſtea in vaſe vitreo bene clauſo.

In maxima frigideſcente ventriculi aqua cinnam. ſola præſtantiffima eſt. Sin minus cum alijs medicamentis permixta v. g. cum ſyrupo de abſinthio, de mentha, corallor. quibus etiam ambra grif. vtiliter addi poterit.

Non minoris eſt efficacie ſyrupus cinam. cum aqua viſi coſectus, prout deſcribitur à Quercetano in Pharmacopœ.

Aqua cinnam. cum ſucco cydon. deſtillata præſtantiffima eſt.

Ad idem præſtat ſpiritus malthices, in hunc modum, compoſitus.

ʒ. Malthices Vnc. iii. galangæ Vnc. i. ſpiritus vini i. ſem. Digerantur ac deſtillentur.

Vtile eſt etiam elixir proprietatis à Crollio deſcriptum: Cuius guttæ xij. aut xv. cum vino exhibitz, mire ſtomachum roborant.

Tabellæ etiam ad eundem vſum componi poterunt in, hunc modum.

ʒ. Palpæ cortic. arantior. recent. & pulu. aromati. rosat. ana Drach. ii. ſacchari albi in aqua ſſor. arantior. diſſolui Vnc. iv. Fiant tabellæ.

Eandem vſum præſtant tabellæ aromati. rosat. opiatæ Salomonis, & theriacæ vetus.

In affectu inueterato plurimum cōducit decoctum ligni guai.

guazet, aut fuffas, in plures dies fumptum, cum leni fudore, aut fine ovi debilitior.

Aque etiam themales fuphure, & nitrofe; quales nolit Belluacina, magna copia per plures dies fumptæ, craffos & mucilaginosos humores, omnemque ventriculi & intestinorum villum poterit absterguere, & euacuare. Fol. agrim. centaureior. & abfinth. vulgaris ana. Mism. Coquantur ad 1/2 sem. Dissolve sacchari Vnci. Fiat potio prestans, & in causa frigida, & calida efficit.

Hartmannus zedairæ vsum valde commendat, his verbis: Frequens vitz zedairæ ventriculum male afflitum adus reuertit, vt nihil supra. Ideoque vsum eius rases comprobant magnificare licet, cum nullum non effectus confectur perit. Sæpius autem zedaira est commendanda.

Cortex vini calidi vsum prædicat in sequentem modum. In potu radicans vsum calidum robustum ventriculi imbecillitas atque corrigit. Non infrequens enim est observatio eorum, quæ cum ventriculi flatus, diutiusque ad malam conditionem perpetuo temperantur, ubi calida potu vitz capere, omni perit. Eiusmodi molossus soluto, molorem multo sanum, vitz vitz vitz.

Cum vino aqua potus ordinarii permiscenda est, quæ prius cum semine coriandri parum bulliet.

Notandum autem est diligenter, si cum frigida ventriculi in temperie calida hepatis concurret, vt tunc fit calida, medicamenta esse caute adhibenda, & temperatiora potius vienda.

Zechus in sequentem bolum his verbis commendat. Per fustas modernæ calefactæ, vitz exsiccatæ paulum ex interius vitz vitz hoc prædicat vitz vitz.

1. Terbinth. clare 3. ii. matich. pulv. 3. sem. pulv. aromat. rosat. 3. sem. Fiat bolus, quibus horis ante cibum dandus.

Pulvis digestivus, ad concoctionem ventriculi adiuvandam, in frequenti vitz esse consuevit.

2. Coriandri præp. Vnci. 1/2. sem. feniculi dulc. & anisi ana. 3. ii. cinam. caryophyllana Drachm. sem. sacchari ad pondus omnium duplem, fiat pulvis, de quo capiat. coch. 1. post singulos passus, nihil dispens concedendo vel habendo.

Balsamus Peruvianus ad roborandum ventriculum præstans & efficit remedium, si eius gutt. & aliquot, cum vino hippocraeo, vel alo; hora vitz ante pulum exhibeantur.

Vel balsami Peruviani gutta vna aut altera, cum saccharo permixta in formam pilularum sumatur per multos dies.

Magis familiaria medicamenta ventriculo roborando, & calefaciendo idonea sunt, vinum hippocraicum; bochetum ex decocto anisi & coriandri, cum saccharo, & cinam. paratum pro potu ordinario. Pulvis dulcis vulgò dictus, ex duobus sacchari partibus, & vna cinam. constitutus omnibus alimentis imperius. Sal ad condiendos cibos conieciunt ex pulvere coriandri, anisi, piperis longi, galangæ, & nuc. molchat. mixto cum pari portione talis communi. Piperis grana aliquot integra vel confusa, ventriculo reuino sumpta. Nucis iuglandis caryophyllis, & cinam. transita, & saccharo condite. Cortex citri, & arantior. pariter conditus. Semina anisi, feniculi, coriandri, & frustula cinam. saccharo in crustata. Que omnia agrotantes ad libitum viupare poterunt.

Ex prædictis cortex citri gustui gratissimus est. Sed quia sæpe ab exsiccatione diutius contrahit, vt dentibus facile comminui non possit; cogitur non raro cum in mortario marmoreo comminere cum aqua rosarum, in aqua formam optare.

Myrobalani condit. & nuc. molch. condit. in eundem finem viupari possunt, si opus fuerit eodem modo contudi, quæ minus reupurum sufficientem molliem obnoiant.

Existent anisi, cinam. cortic. citri, nuc. molchat. & caryophyll. ad ventriculum roborandum efficacissime sunt. Eamque vitz erit, quæ modum supra in affectibus cordis propofitus est.

Ex alimentis talia appetentiam plurimum excitant Ino vitz & acida viupari poterunt in parva quantitate, cum alio permixta, ne ventriculum refrigerent.

Victus vero adiuuancant samenta, limonata, & em-

plastra, in sequentem modum composita.

1. Rad. cyperi, galangæ, ieros Florent. & cort. citri siccat. ana vnci. fol. mentha. h. flopi. lains, rosmari. & maior. ana Mism. anisibaccat. lauri, nucis molchat. caryophyll. & cinam. ana Drachm. iij. fol. scorod. schomant. & rorun. ana Pa. Incidenda incidentur, & contemenda contemantur, vt artis est, includantur duobus sacculis interpositis, qui macerentur in vino generoso, & applicentur regioni stomachi calide vitzidm.

2. Oleo abfinthio. de mentha, & anardi, ana 3. ii. ole. nucis molchat. 3. ii. ligni aloes. macis. cinam. ana 3. ii. Coque parum, fiat linimentum. Quod præstantius euadet, si addideris olei caryophyll. gutt. vi. molchi, & ambre grat. ana 7. ii.

Linimentum est et. nucis molchat. & balsamo Peruviano; vel et oleo abfinth. molchi, & balsamo Peruviano.

3. Masse emplastræ de mastiche 3. ii. pulv. aromat. ros. 3. ii. oleus molchat. q. s. Fiat emplastr. scutellione, applicandum regioni stomachi.

Crato sequens emplastrum miris laudibus effert.

1. Ladani 3. ii. ceræ 3. ii. olei nucis molchat. 3. ii. Fiat emplastr. massa ad vitzum.

Admonet Galei 7. meth. huiusmodi emplastrum diutius non esse in parte descendenda, quia tantè calorem dissolvunt.

Multa prædicti huiusmodi remedia admovent, non solum parti anteriori supra cartilagem xipoidem; sed etiam posteriorem supra 43. vertebra; quæ omni cum ventriculi superius ad posteriores fertur. Attamen tanta est crassities vertebrae, & musculorum eius subiectionem vt vires medicamentorum eas partes penetrare nequeant, & de ad ventriculum desierint.

2. Rad. galangæ, & calami aromat. ana Drachm. iij. mastiche & caryophyll. ana Drac. iij. nuc. molchat. & cor. citri siccat. vnc. 1/2. anisi Drachm. 1/2. Ex his contritis fiat scallum inter punctum cum sindone rubra, & canone molchat. per petuo gestandus supra regionem stomachi.

Ad idem valde laudantur pelles vulturn preparate, & supra regionem ventriculi gestatæ, eorum delicta pelles leporum, aut pannus scariatus viupari potest.

CAPITULUM II

De Fame canina.

Cum superiori capite de appetentia imminuta, & abolica actum fit, ordinis ratio postulat, vt de prædicta explicetur. Depressatur autem appetentia duobus modis; quando scilicet vel quantitate, vel qualitate peccat. Quantitate peccat dum maiori copia alimentæ expetitur quam naturalis ordo requirit, & ille affectus, famæ seu famæ canina nominatur qualitate vero, cum cibi absurdus, aut ea que extra rationem alimentis sunt, expelluntur, & pica seu *miris* appellatur. De priori hoc capite, de altero vero capite sequenti agendum est.

Nomen igitur famæ caninæ, vt *Peruviani* deducunt, quia si particula alius vocibus addita significatorem augeat, ac si bonis magnitudinem connotat. Vocatur etiam *peruviana*, quod nomen viceribus quoque tribuitur, quæ carnem evadunt, & continuum incrementum capiunt; eaque idè autores vicia *peruviana* id est depulcrata nominant. Famæ etiam causa nominatur, quoniam sic affectu vehementi appetitum canum more in cibos feruntur.

Notandum autem est hæc duo nomina, nempe boulimiam, & famem caninam interdum confundi, & pro vno & eodem viupari; interdum verò distingui, & famæ canina dicatur, quando post nimiam assumptionem alimentum vomitus consequitur; & ita agroti canum more afficiantur, qui cibos nimia quantitate assumptos vomitu reiecit solent. Quibusdam tamen alius vitz potus quam vomitus accidit, natura copiam illam alimentis, quam ventriculus concoquere non potest, per alium detrudente. In boulimia verò vomitus non accidit, sed cum interdum hypothyria comitatur. Sicut etiam quidam, qui in febribus concedendi desiderio premanet, non tamen vomitus, & alui fluxu tenetur, sed vomitus cibos ingestis prode quæ

capient, & nisi mox alium sumant, male habent. Quemadmodum narrat Sennertus de quodam falsidolo, nigro corporis habitu prædito, qui non solum die, sed noctu etiam comedeat: Cibum namque quem fumerat, sine vomitu còcoquebat; imò vero cibus delicatus latori non poterat, sed crassos expectabat, unde nec panem à pulvisore confectum, sed à rullis in vicinis pagis emptum, vt solidiorem, comedeat; sæpe manè tempore affluo pastinacæ satiaz radices tot quot lex nummis emittant, crudas sine damno comedat.

Ex his patet hunc affectum esse symptomata actionis, degenaræ, respectu quantitatis, quæ actio iusta nominatur nempe appetitua modum naturalem excedens. Pars afflicta præcipua est os ventriculi laperius. Causa continens est lenis fuctionis & vellicationis rebeniens, & immodicus appetitum lubinde irritans.

Galenus 3. de sympt. caus. cap. 7. causas huius affectus proximas ad duo genera reducit, his verbis. *Vitiosa appetitua, quæ modum in quanti ate excedunt, vocanturque à quibusdam canina, tum existunt, cum vel a doctis quiesce totius siccitas ventriculi mordet, vel totum corpus immodice digestum in ipsi alimenti redditur. Vt si quis namque succus, qui frigidi est, simul et subito morum inferi; appetitum vero præternaturalem afflicti simulandine. Causa igitur præternaturalis præter naturam appetitum iuxta Galeni mentem, est primò humor viscosus & frigidus in ventriculo herens, secundo alimentum indigens, ob nimiam digestionem.*

Humores viscosi in ventriculo herentes famem immodicam excitant, quatenus nimia sua frigidityte, aciditate, & austeritate orificium ventriculi contrahunt, corrugant & vellicant, adeoque sensum naturalem fuctionis similes, & spiritum famem inferunt. Talis humor est, vel pituita acida in ventriculo relictissima, vel vtpotissimum melancholia si hære in ventriculo transiit, quæ in statu naturali existens, & moderata quantitate, & qualitate prædita, naturalem & moderatam excitat appetentiam; si vero præternaturalem se habeat, & in prædictis excedat, eam intensiorem ac præternaturalem efficit.

Alimenti indigentia, quæ quam vane contioùs ex ventriculo surgit, v. l. à nimio oritur euacuationibus, per hæmorrhagias alui fluxum, vomitum, sudorem & similia; vel ex nimia subtilitate alimentaria consumptione, ob calorem partium immoderatam; aut humorum tenuitatem, corporis rationem, & pororum laxitatem, vigilias, balnea exercitia immodica, venereis effrenatis; quæ omnia huic præternaturali famem maxime dissoluunt: ab iniqua facta inanitione, & alimenti penuria, cibus citius quam debebat à ventriculo absorbitur.

À lumbricis etiam chyli depascientibus potest fieri famis canina; quemadmodum refert Trallianus lib. 7. cap. 4. de quadam muliere boulinia laborante; quæ ab vñ huc venem duodecim cubitos longum excreuit, & liberam est.

Hermetici aliam huius stupendi appetus causam statuunt: nempe spiritum quemdam dissoluentem in corpore generum, qui insita proprietate quidquid ciborum ingeritur, tum promptè consumit, & reholuit. vt legitimum, & necessarium nutritioni terminum naturæ non concedat. Hunc spiritum vocant famelicum, elurium, voracem, salinum, acidum, & vtricolatum. Quemadmodum enim inquitur ex variis libris, vtricolo, nitro, sale communi, ammoniaco, & similibus, spiritus seu liqores, quos aquas fortes vocant, arte chymica efficiuntur, qui lapides durissimos, & durissima metalla, breui temporis spacio in liquorem reholuunt: ita vt aurum, quod nec igne quidem fortissimo intra mensis spatium dissoluitur, attamen intra horæ quadrantem in aqua regia soluitur, & in liquorem, aque ipsi perissimè conuertatur.

Hæc doctrina diligenter examini digna est. Sicut enim digestio ventriculi naturaliter se habens sedulis rerum naturalium iodagatoribus quippeam mirabile, & stupendum ostentare videtur: sic eadem immoderata, & præternaturalis redditur, quippeam habet admiratione dignissimum. Hoc autem adiuuabile est in digestionem ventriculi naturalem: quod ubi durissimum in eo dissoluitur, & triuin vel quatuor horarum spacio in liquorem chylosum conuertatur,

in tenuem, vt per angustissimos venarum ladeorum ramos transcolari, ac veluti litari valeant: quod canes ossa durissima in eundem liquorem conuertant; hoc certe calori intensiori valde consequenti tribui non potest, cum ubi in ollis igne quantumvis luculento, extra 24 hora ac plures dies in similem lacum conuertantur. Dicunt Galensci à faculare ventriculi illud dependere. Sed facultas non agit fine instrumeto, quod etiam assignatur idiosyncrasi partis: quæ tamen idiosyncrasi, si est certa partium qualitatem proportionem, vt vulgò circumstunt, præcipua illius actio erit à calore, frigiditas enim, humiditas, & siccitas, nihil faciunt ad eamdem illam ciborum liquationem, calor autem, vt dictum est, non habet illam efficaciam. Est igitur illa idiosyncrasi, aliquid aliud ignotum, & inexplicabile. Læcet ergo illud inquirere per ea quæ sunt in macrocosmo, quorum analogia quædam esse potest in microcosmo. Et ideo dicunt Hermetici à caniores, spiritum quemdam seu liqorem acidum transudi à hene in ventriculum, qui solidiora alimenta dissoluit, & in liquorem chylosum breui tempore conuertit: ita vt spiritus ille seu liquor acidus fit præcipuum digestiuis instrumentum. Et quædam huius rei coniectura ex eo elici potest, quod aues, quæ durissima alimenta conficiunt, herem habent, ventriculum videlicetque ambientem, raro enim illa quæ ventriculis aurum circumdanda reperiunt, lenis fidditiam omnino reperiunt: unde nobiliorem leniorem tribuunt, quem qui ab antiquis est traditus, qui cum, solummodo limole sanguinis patri expurgandæ dicarum consuevit: cum alimentorum concoctioni, iuxta nouam hanc doctrinam maxime inferuiat. Si iuxta spiritus, aut liquor ille acidus à hene promanens naturaliter se habens, digestionem naturalem & moderatam perficiat: ille idem spiritus à naturali statu deiectus, & vitulos redditus, acutior nempe, & nimia dissoluit vi prædita, solida alimenta promptius liquabit & conficiet: inque dissolutis, & à ventriculo confectis decurbaris, noua famis, & que immodica exurgit. Nouam hanc doctrinam certam, & indubiam non statimimus, sed eam tantum proponimus, vt à solidioribus ingenis sedulo examinetur. Eamque inferius iterum discutiamus, dum læle concoctionis causas inquiremus.

Signa huius affectus diagnostica satis manifesta sunt. Per se enim ægrotantibus à alantibus apparet appetentia depauperata, & excedens: quæ plures cibos assuere cogit; qui tamen postmodum nimium grauantes per vomitum reijciuntur, & illi famis canina: vel si vomitus non sublequatur, animi deliquium adit cum extremorum refrigeratione, & tunc est boulinia.

Signa causarum ex antecedentibus, comitatibus, & consequentibus, tacile deduci possunt. Frigida intemperies, & humorum acidorum in ventriculo reliquantia signa sunt, ructus & vomitus acidi deiectionis crude, sitis crassa, & causæ externæ refrigerantes prægressæ. Si à defectu alimenti dependeat, ægri emaciantur, & causæ humiles corporis dissoluentes adiunt, vel præcellunt, ac denique lumbricorum signa ex proprio capite erunt delinenda.

Prognosis huius affectus ita instituenda est, vt si à causis externis omnino dependeat, periculosus non sit; modo illæ cito auerantur; à lumbricis etiam orundus parum, inter periculi, quia illis subtilis affectus etiam tollitur.

Collicæ autem periculosus est illi ingentes euacuationes, quæ coactiones corporis consequuntur: præcipue si post ingestum alimentum, & ventriculo adhuc pleno existente, animi deliquia contingant, quando enim ea quæ maxime iuuare debent, inutilia evadunt, magnam significant ventriculi atoniam.

Sic etiam canina appetentia, cum vomitu aut crebra deiectione periculis periculosa est, in hac etiam enim hydrope, lienteria, marcoris, alioque lethales affectus degenerare solet.

Quod ad curantionem spectat, quia vtpotissimum famis canina ab humoribus melancholicis aut pituitosis, ventriculi tuncis impactis, & imbibitis, dicitur originem; ad eorum præsertim remedia dirigenda sunt, quæ tum humorum pec-

caus

antis euacuationem, & alterationem; tum partis laborantis roborationem respiciunt.

Euacuatio instauranda est per vomitum, vel secessum, remedia supra in curatione inappetentie a frigida causa ore propofita. Licet enim hi duo affectus inuicem contrarii sint ab idem tamen humoribus, sed frigiditatis gradu, & secundis qualitatibus, admodum diuersis, ac ventriculi diuersimodis affectibus produci solent.

Remedia etiam ventriculi calefactione, & roborantia, tam interna, quam externa, ibidem propofita, maxime conueniunt. Quæ non solum conferunt frigidam intemperiem corrigendo, led etiam efficiendo & firmo inducendo, At virgine fici famem inminuunt.

Præterea vinum meracum satis copiose sumptum famem potentissimè resoluat, iuxta Aph. Hippoc. 2. *sest.* 2. Idque potentius adhuc præstat alius spiritus, aqua vite vulgo iuncupatus.

Famem illam peculiariter obtundunt, quæ ventriculum potenter humectant & relaxant, humoribus aciditatem leniunt. Quales sunt pinguis omnia, & oleaginosa, vt adiposæ olea, extenuitates animalium. Quemadmodum Valianianus relinquit, quendam hoc affectu percipiunt, panem calentem amuræ olei imbutum, comesside: & mulierem bouis liquatum adipem, cum pari calentis olei quantitate, duabus vicibus bibile, & in tantum cibi fastidium vtrumque mediale, vt nihil per quinque dies comederit, & d priori affectu liberari sine.

Narcotica medicamenta sensum ventriculi nimis exquirunt obtundendo, famem illam canisum possunt inminuere. Et inter alia theriaca recens magis ex vi est. Quæ præter vim narcoticam, humorum etiam malignam qualitatibus, quæ d nonnullis in hoc affectu subesse creditur, virtute alexiteria corrigere valet.

Quæ verò narcotica raro, & non nisi summa virgente, necessitate vsurpanda sunt; alijs temporibus theriaca antiqua, propter rationem dictam, tum etiam roborationis causa erit vsurpanda.

Ambra græca ad gr. v. vel vi. cum obo forbiti sumpta, non solum ventriculum roborat, led etiam proprietate, specifica huic affectui prodesse creditur.

C A P V T I I I.

De Pica, & Malacia.

Pica & malacia est appetitus deprauatus quo ægrotantes res absurdas, inutilis, & noxias appetere conueuerunt.

Pica siue pica nominatur, a pica aue, siue ob varietatem coloris quo donata est, siue quod tetra globos cistat; mulieres autem hoc affectu laborantes, terram, gypsum, & similia, plerumque comedere solent. Malacia etiam, ex Plinio appellatur; quia mulieres huiusmodi præ animi impotentia, & mollitie, ad recto & naturali alimentorum appetitu deficiunt.

Producit hic affectus ad præis, & certo modo corruptis humoribus, qui in ventriculo ob lasam illius coditionem colliguntur, vel ab alijs partibus in eum transferuntur.

Ad hunc autem humorum productionem maxime disposita sunt corpora pituitosa, & melancholica, præsertim verò mulieres, quibus hic affectus proprius & peculiaris esse videtur, quamvis pueri interdum, imò etiam viri, sed rarius, eo affligantur. Ad hanc rem maxime faciunt prætorum edulcorum visus, suppreffa aliquæ euacuatio naturalis præcipue mensurorum, animi morores, hepatis, & lienis intemperies, obstructions & imbecillitates, vteri affectus varij & similia.

Illi autem humores vixiosi pro varijs intemperierum, aliarumque dispositionum gradibus, variam & dissimilem naturam obinent, vnde variæ rerum absurdarum appetentia oriuntur. Cum enim huiusmodi humores alias crudi & incocti, alias exulsi & præaliti existant; sic quorundam appetitus ad res acidas, austeras, acerbæ & valde frigidas feruntur, ita vt fructuum immaturorum, acetum, pomphacii, succi humorum, granatorum, & arantiorum,

aque frigide, niuis, glaciei, & similiarum visum assiduo & copioso delibentur; alij terrea, sicca, & exusta appetunt, vt garyophylos, cinamomum, nucem moschatam aliaque aromata, sal cineres, gypsum, & similia.

Familiaris est hic appetitus virginibus chloroti laborantibus, & grauidis mulieribus ob suppreffionem mensurorum, quæ in corpore moram trahentia, vitiosam induunt qualitatem, ad partes superiores delata, ventriculum inficiunt prauo illo succo, à quo actiones illius deprauantur, & appetitus in primis statu naturali maxime delicitur. Pueri interdum hoc affectu detinentur, præcipue qui à matre chloroti laborante oriundi sunt. Neque viri ad eo omnimò immunes sunt, quamvis rarius id contingat, & præsertim illi obnoxij sunt, qui melancholico temperamento præditi sunt, obstructions laborant, aut fluxus hæmorrhoidum conuulsi suppreffionem patiuntur.

Apud aetiores maxime controuertitur in appetitus deprauatus feratur ad ea quæ diathesi ventriculi præternaturali similia sunt, an vero ad contraria. Dubitandi aniam dedit Gal. cap. 3. *artus parua*, vbi docet ventriculum præternaturam habentem appetere contraria, & in statu naturali appetere similia. Quam doctrinam sequitur Auisen. *sen. 13. lib. 3. tract. 2. cap. 10.* sic loquitur. *Quando in stomacho aggregatur humor malus diuersus à consuetudine in qualitate sua naturali, tunc requirit aliquid sibi contrarium. Quapropter incidit quibusdam appetitus latus, imò carboem, & terra, & cyffis, & rerum horum genera; propter qualitatem quam eis est, efficiantem, aut incidendum, contrarium qualitatis humorum.* Saniorum tamen iudicium eo dirigitur, vt similia potius quam contraria appetantur. Cum enim ad appetentiam excitant phantasia maxime concurrat, quæ à dispositione corporis maxime excitatur, verisimile est dominante in humore ad similia appetitum phantasia mouere. Sicut enim biliosi in statu tum sano tum morbo, ignis, & irarum infornia pariuntur, piruosi, niuium, glaciei, & aquarum; quarum rerum phantasmata ab humore in corpore predominantem excitantur, sic etiam affecta sede appetent humores vitiosi in ea diu stagnantes, sui speciem phantasia imprimunt, quæ ab ea obiecta, similia appetentiam excitat, etiam ratione repugnante, quæ à vehementi illa imaginationis vi superatur. Adde quod si contraria morbo aut illius cause appetentur, continuato illorum visum, morbus tandem curaretur, cum tamen ab his deterior in dies reddatur. Huic sententia quotidiana experientia suffragari videtur, quæ docet virgines chloroti laborantes, & prægnantes mulieres ea plerumque appetere, quæ illarum temperamento & præfenti cacochymia consentanea sunt; vt scilicet illæ quibus salis & adusti insunt humores, carbones, salem, aromata, & similia expetant; quibus verò melancholia, aut acida pituita dominatur, ad acetum, fructus immaturos & similia ferantur.

Quod ad Galeni auctoritatem spectat, quidam penitus eam reiciunt; dicentes quod si verum esset morbois dispositiones contraria appetere, ægrotantes omnes, conualescentes, & reliqui cacochymia laborantes, cibos eucharum expererent, quod tamen veritati non est consentaneum. Videmus enim sæpe ægrotantes, & conualescentes præuis cibos appetere, laudabiles vero respicere. Videmus etiam corpora exaltata siue in statu præternaturali, vt in febribus siue in naturali, vt per exercitia immodica, refrigerationem experere.

Alij vero hanc Galeni sententiam conciliare nituntur dicentes, in pica intemperiem ventriculi impressam esse veluti habitualem, & conaturalem, & ideo facere appetentiam bilem naturalem, quæ est ad similia. Quod in hunc modum explicari potest, dicendo, omnem temperiem naturalem appetere similia: præternaturale vero contrarias intelligendum esse, postremum de intemperiebus, quæ sunt sine luci redundantia. Quæ enim sunt cum luci redundantia, quando succi admodum imbibiti sunt in tunica ventriculi, appetunt potius ipsi succi, quam madent, similia, quia humor qui totas tunicas iam penetrat, quantum noxius sit inolefiam non infert. Contra vero quando humor partem tantum aliquam ventriculi occupat, vel quod solum in cauitate, ventriculus appetit contrarium ei quod

fiti noxiū est. Si autem humor totum ventriculum occupet, illiusque tunicis imbibitus sit, tunc facultas illius naturalis obstruitur, & ita immutatur, vt non appetat nisi similia humori imbibito. Et ita redde dicit potest, illum humorem factum fuisse veluti connaturalē dicit.

Platerus & Sennertus ab huius difficultatibus faciliē lecepediunt, ad qualitatē occultam confingentes huiusque, perfigurati occasionem querunt, ex eo quod si huiusmodi ægrotantes appetere similia causā morbificā, ex eorum viū & copioſo maxime augetur affectus, cum tamen videamus pica laborantes, gvpio, calce, carbonibus, aliisque rebus noxiſſimis seſe inuagitare, & iſque leuiffimā noxam percipere, à quibus bene ſani ad interuentionē, vique laederentur. Præterea dicunt prægnantes mulieres humores ſalſos & acidos ſapē reſicere cum tamen ſalſa, & acida non appetant, ſed toto genere diuerſa. Ac denique nullam eſſe inter carbonē, calcem, carnes crudas, aliaque cum humoribus conuenientiam conſtanter aſſueuerant; atque idcō in qualitatibus manifeſtis non eſſe acqueſcendum cenſent; ex ipſaque ſymptomatis huius, & appetentiæ mirabilis cauſam delumi non poſſet: ſed ad qualitatē, quandam occultam, & inexplicabilem eſſe conſueſcendum.

Fateetur tamen Sennertus probabile eſſe à ſimili potius quam contraria qualitate appetentiam iſſam deprauatam provenire. Quamvis verò ſit illa qualitas, & explicari non poſſet, cum res que appetuntur nullam cum humoribus, vel dulcibus vel ſaliſis, vel acidis, in manifeſtis qualitatibus vel plurimum conuenientiam habeant.

Hæc omnia conciliare poſſumus dicentes, rerum abſurdam appetentiam ab humoribus ſimili natura & tempore prædictis ex citari, ſed illis humores, præter naturam, temperiem, vitio quodam peculiariter corruptela quadam oriundo, eſſe prædictos, quod vitium etiam diſerte explicari nequeat, ad qualitatē occultam reuocari potell.

Diagnos huius affectus per le ſatis facilis eſt, & ſola enim ægrotantis relatione innoteſcit. Partem præcipuè affectam eſſe oriſcium ventriculi noxiſſimum eſt, cum illud ſit ſedes appetentiæ. Cauſa etiam ex ſuppoſita ſimilium appetentiæ, conſectura indagari poſſet. Si enim appetant carbonēs, ſalem & ſimilia, colligere poſſumus, ab humoribus ſaliſis, & cauiſis affectum dependere: que omnia clariſſimè innoteſcent, ſi humorum prædictorum portio per vomitum vel alium reſiciatur; ſi rudiſ acidu vel nidoroſi ſapor amarus, acidus, vel ſaliſus aſſueat.

Quod ad prognofin ſpectat, chloroticus eſt iſte affectus; non tamen admodum periculofus, ſi natura vel æte corporis ad priſtinum ſtatum reuocetur, quod non valde difficile contingit. Excluditur enim ſapē luſceſſu temporis humor noxiſſus crebris vomitionibus, vel medicamentis conuenientibus euacuatur, & ſuppreſſæ menſium aut hæmorrhoidum euacuationes que huius malo anſam præbent, cum tempore reſtituuntur. Que tamen ſi negligantur, & natura oneri ſuccumbat, grauiſſimi morbi ſuccedere poſſunt. Vitiata enim prima coſione, necelle eſt ſecundam & tertiam eorumpi, vnde graues obſtructiones, cachexiæ & hydropes contingunt. Vel etiam ſi humor maior copia in ventriculum ſeruat, & maioris malignitatis participes ſiccardialgias inſignes interuū producat, quib. lipothymia & ſyncope, & nonnunquam mors ſuccedere ſolet.

Si mulieres hoc affectu laborantes ab edulys præuis abſtinerent incipient, & laudabilibus vt cū minimi ſaliſido, proxime ſalutis & curationis incipientis ſignum eſt ceſſuſi.

Grauidæ mulieres à malicia vtplurimum liberari ſolent circa quartum geſtationis menſem, quia ſætus grandior ſaliſus, maiorque humorum copia abſumit, & ipſa mater crebris vomitionibus iſtam illiuiem excluſit. Quod ſi malum viterius progrediatur, periculofum eſt. Significat enim altius impreſſi non fuiſſe prædictam iſtam diatheſim, que difficili negotio exterminari valet.

Melius eſt hoc affectu laborantes, acida & acuta appetere ſires planè à natura alienas exoptent, vt docet Auic. ſen. 3. lib. 3. trakt. 2. cap. 20. Maiorem enim ſignificat à ſtatu naturali reſceſſum, qui difficilius emendari valet.

Critico huius affectus varia inſtituenda eſt, pro varietate corporum ægrotantium.

Itu æuidis enim mulieribus pica celebrantur remedia ob ſubiecti ineptitudinem, & abortus periculū. In illis tamen leuora viurpari poſſunt, & benigniora, ex iſis que ad ventriculum euacuandū, & roborandū in curatione inapetitur ſuere propoſita. Neque omittenda erit veniſectio, quæ parca manu celebrata, & frequenter, (ſi opus fuerit,) repetita maximum ad huius affectus curationem momentum habet.

In virginibus autem chloroſi laborantibus curatur iſte affectus iſdem remedijs, quæ ad ipſius chloroſis curationem ſuo loco propoſuerunt.

Quæ verò pica contingit in viris, quod tamen rariffimum eſt, cum ab obſtructionibus hepatis & lienis dependeat, earum curatione ſuis locis propoſenda diſtinguuntur.

C A P V T I V.

De ſitis morboſa.

Sitis ſeu potus appetentia non minus ac fames tripliciter lædi potell immutari, aboliri, & deprauari. Innaturatur non raro à dulci, & inſipido humore, ventriculi tunicas irrigantes, vel ab humiditate nimia in toto corpore dominante, vnde ſit vt partes potulentam materiam à ventriculo non trahant. Abolitur verò in morbis acutis propter interceſſionem primi ſenſorius, quando mens ægrotantis aut qua concidit omnino facultas naturalis, extinguitur propemodum calore natiuo; vnde Hippocri. *In cauſa ſi iſtera non ſiſſit, malum*, cum tamen ſitis inmutata ab iſdem cauſis pendeat; à quibus inapetentia ciborum produciatur. Abolita verò morborum acutorum ſit conſectari, & earum ratio peculiaris huc habenda non eſt. Sed ſufficit nobis de ſiti deprauata, tanquam frequentiori ſpecialius agere. Quæ quidem ſitis deprauata etiam bifariam diuidi poſſet, quænamadmodum famēs, vt vna potulentorum varia genera ſeruat; altera verò ſit auſta, & potus quantitate ac frequentiam reſiciens. Que potus genera abſurda reſpicit, ad picam ſeſertur, quando ſibiſcit ægrotantes appetunt acetum, luccum limonum, vel aquam ſaliſam. Superſtigit igitur vt ſiſim auſtam contempnunt, quod ſymptoma frequentioriſſimum eſſe conſueſcit, dum appetus humiditatis quantitate peccat, & potus inmodice expetitur.

Cauſa illius proxima eſt deſectus alimenti humiditatis & ſiccitas ventriculi, aliarumque partium que ſtomacho penuriam ſuam communicare valent.

Ita autem ſiccitas, vel humoris penuria etoriri ſolet vel omnibus iſis que roridam humiditatem ventriculi totiusque corporis abſumere, & exſiccare valent; que omnia ad caleſcencia & exſiccata referuntur. Exſiccata par le, & primario exſiccata, caleſcencia ſecundario, humidū aborboſo.

Eſt autem ſitis hæc morboſa idiopathica vel ſympathica. Idiopathica ſit cum innata ventriculi humiditas alteratur, & exhauritur ab inæquali intemperie ſicca, vel calida, vel vtraque; interdum & rariſ ſimplici; ſicquentius cum materia coniuſta cum humore ſcilicet, acri ſaliſo, aut putrido, ventriculi tunici impaſſo, vel in illius cauitate putrido. Sympathica verò ſit ex conſenſu totius corporis vel aliquarum partium, quarum vne exhalſio humido, à ventriculo ſugunt; vt in febris contigit, hepatis, pulmonis, & aliarum partium inflammationibus, tum etiam intemperiebus calidis & ſiccis, præcipue rariſ, vt videtur eſt in diabete, que co nomine diſcipus nominatur, propter ſicim ingentem, que illam conſumit.

Cauſæ externæ ſunt quæcunque inſipide & caleſcencia vel exſicare valent, vt aer valde calidus, & ſiccus, diuturna in ſole vel ad ignem mora, viſus ciborum ſaliſorum acrum & aromatibus conditorum viſus copioſus viſi antiqui, & generoſi, vigilie, nimia corporis euacuatio, præque per medicamenta purgantia.

Hermetici ſiſim inmodicam & præternaturalem à ſpiritibus quibdaſm ſubſubſtant, ex impuritatibus ſulphureis genitiſ exoriri contendunt, qui non ſiſim reſrigeratione & humidatione; ſed ſpiritibus alijs ſibi analogs ſatiari volunt, quemadmodum videmus in ſcribum accenſionibus ſiſim interſum multo aquæ potu parum imbibere.

quæ

que tamen spiritibus acidis vitrioli, sulphuris, salis, & similibus cum oleo in minoris quae quantitate permixtis, acilius cedat.

Diagnosin nihil habet difficile. Ictus enim acri de sui virgine consequuntur. Causae etiam proprias signis, dignoscuntur, ut calida, & sicca intemperies ventriculi, aut aius paribus inhærentem humores acres, salivæ aut auriarum, potius interdum excluditur, vel saltem similes in ore representant. Si in ventriculo continetur, vel si per consensum aliarum partium fitis excitetur, adeo cum totumdem signa seipos prodent.

Quod ad prognosin attinet, fitis quæ a causis procatur, diu excitarit tutissima cibus potu assumpto facile sedatur. Quæ verò a causis internis procedit, pro aliarum, varietate, magis vel minus periculosa exitus.

Satis quæ in febribus contingit aliisque affectibus curata, iaculis, cum eorum solutione ipsoque evanescit. Si verò a grauius morbus, & periculosus dependeat, valde periculosa, ut in hydropoe contingant, quo fitis potu non sedatur, sed potius magis intenditur.

Curatio fitis morbose frequentius occurrit in febribus, & quædam parum inflammationibus, quæ tamen iactantes descripta est in methobo nostra curandum locum fuit, a sepe.

Si vero fitis sicca ventriculi intemperie ex immoderata evacuationibus, aliisque causis contracta sit illius curatio peritior, vacuantes illas lupprimendo, tunc partes inanas restitendo remedia humectantibus.

Instituto igitur prisæ victu analeptico, qualis in febre hectica, phthisi, & marasmo concedi solet, & omnium præstantissima erant duo remedia. 1. Gal. proposita 7 meth. scilicet Iac. & balneum. Quantum enim Hipp. Aph. 6, secl. 5. Iac. Iaculis interdicta, tamen intelligendum est de his, qui ob biosi, putridæ, humoris copiam sitis afficiuntur, in quibus Iac. facillime corruptur non de his, qui sitis ex siccatate, & consumptione laborant. Lactis vltim in curatione phthisicos edocuit.

Balneum verò hat ex decocto rad. alchæ, & lilior. fol. malus, violarum, vel ex decocto tapini, pedum, & intellimorum, utitur aut butyrum recens, vel oleum violaceum, in qua tepida diluatur pro balneo, quod tepidum esse debet, & frequenter usurpare.

In exitu balnei inungatur lumbi, dorsum, & ventriculus, ut vntic. modulla cruris vntic, & similibus, in quibus tumefecerat lactis malicibus, aut capillis, quantum eboreere possent.

Vtatur interea ager syrupo, & tabellis instaurantibus, aliisque remedijs, quæ in icibus hectice curatione latius proponuntur.

Sequens etiam opiata erit vtilissima.

℞. conferuat. eryngij, & buglioli, ana 3. j. confer. fior. violar. & borrag. ana 3. j. confect. alkalermes 3. j. dispendij sine speciebus recentior preparati 3. j. Cum syrupo de pomis rosol. fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem castaneæ fitis tempore, superbibendo parum aque butraginis.

CAPUT V.

De ventriculi concoctione laesa.

Ventriculi concoctio chylosis appellata, quemadmodum, & relique omnium partium actiones, tripliciter leditur, immutatur, abolitur, & deprauatur. Immutata concoctio, si sit, ut dicitur, abolita, si non sit, deprauata, si sit, ut quæ omnes differentie vntic cruditas nomine comprehenduntur. Hæc autem cruditas duplex conuenit, nedoria scilicet, & acida, cruditas quidam est, quando alimentum in nidorolam, & vltim quasi materiam mutatur, ut per eructationem odor oorum, & pulem corruptor, in, vel olei ita effluat, qui rectus nidorosus in calidis, ac biosis naturis frequentius contingunt. Acida verò cruditas fit, cum cibi in acidum maturam mutantur, & ructus acidi excluduntur, & hæc a frigida intemperie procedit. His & tertia addi potest cruditas differentia, quando ob calorem debentibus imperfecit coquitur, & in purcolam

quandam materiam mutatur, citra tamen accidit rem.

Causæ ventriculi concoctionem ledentes ad tria capita redacti possunt, vntic scilicet organi obiecti, & rerum exterranarum, seu extrinsecus aduenientium.

Organi vntic omnes ventriculi morbos complectitur, siue similes siue siue organici, siue communes, qui omnes illius actionem euertere possunt. Intemperies tamen frequentissima est læte concoctionis causa. Cum cum concoctio a moderato calore recte, & secundum naturam se habent, perficitur, si ille a debita moderata non recessit, concoctionis lætis contingit. Sic frigida ventriculi intemperies, quæ caloris immutationem facit, si remissior fuerit, concoctionem immutat, & bradypepsiam parit. Si vero intensior, concoctionem abolit, & apesiam producit. Calida verò intemperies concoctionem deprauat, & dyspepsiam genera. Illæ autem intemperies interdum simplices sunt, in ipsi quoque calore debili, & ventriculi imbecillitate præditi sunt, & vel calorem acrem, & exurentem obtinent, ut plurimum autem cum materia coniungitur, vnde in melancholia hypocondriaci, pituitæ copia, & fermentatione nigri humoris, cruditates flatus, inflationes, fluctuationes, & cunctique acidos excitant solent.

Vntic obiecti, alimenti scilicet, quod est ventriculi proprium obiectum, multis modis contingit læsi, scilicet peccat in substantia, quantitate, qualitate, & tempore, & ordine alimendi.

Vtiosa sunt alimenta ratione substantiæ, quæ duriora sunt, & concocti dalsculora, ut carnes ceruicæ, leporina, præcipue ventriculosi, sale vel humo indurata, panis furfuraceus cubera, radices, legumina, & similia, quæ dyspepsia nominantur.

Quantitate peccant alimenta, quæ nimia copia assumuntur, & eo nomine a calore vntic & superari nequeunt, vnde eructantes oriuntur, illis maxime familiares, quæ genio, & crapulæ indulgent. Minor etiam quæ pat sit alimentum, quæque, si peccent quandam cruditatem inducere possent, quando cibi pauciores, in ventriculo, in primis biliofo, exantur, & præstantur.

Qualitate peccant alimenta, quæ nimis frigida, & humidissima, quæ exillunt, vel quæ calidiora tenuioris chyli portionem exantur, & in nidorolos vapores conuertunt.

Au hoc genus reducenda est concoctio, & condendi ratio, varij enim elixodi, aliandi, & condimentorum modi, nouas alimentis dispositiones inducunt, propter quas concocti faciliora, vel calidiora redeunt.

Isupus de orio alimentum præpotenter concoctionem etiam vitare possunt, ut si quis horam cibandi consuetam omittens nocte inuempit, & immoderate ante somnum cibis illic nactum repleat, vel si post solidum, & ad strigentum, vel calidum, cibum, cydonorum, & similiarum alimentorum, quidam postmodum, & corruptione obnoxia iugaret.

Res denique externe concoctionem vitare possunt, si immoderate sint, atque ita aer trigidior, & ab antiquis minime obcurdosis debitor fuerit, vel calidior, unde eadem calorem dissipando, concoctionem euertere potest, tum etiam exercitationes immodicæ, perlectum a pultu, calorem naturam, exercendo a ventriculo ad partes exteriores, quem præter modum dissipando, nec non chylium alicuius imperfectionem præcipitando versus intestina. Alij autem aliorum incrementorum lupprellio, aut fluxus immodicus, vigile immoderate, & omnes cunctasque animi pathemata grauiora, præcipue necrotæ, & profunda medicatio Ictum a pultu, & similia, causæ externæ, ventriculi actionem non parum vitare possunt.

Præter causas enumeratas Hermetici nonnulli recentiores aliam adducunt minus tritam, & ab antiquis minime peripetam, quæ quidem ab ipsi peripetice non demonstratur, quiquidam tamen coniecturis minime contentendis stabilitur, cuius etiam supra in sanis sanis causis explicandis mentionem fecimus. Primum itaque statuitur concoctionem ventriculi naturalem a solo calore non perfici, sed promptam illam ciborum solidorum liquationem, & dissolutionem, quæ in chylium conuertuntur, ab alia causa

O o de pen.

dependere; cum experientia doceat cibos in olla bullientes igne luculentos, etiam per plures dies continuato, sumquam talem dissolutionem pati, acum tamen ossa in ventriculis, canibus breui temporis spacio dissoluantur, & in chylo liquorem conuertantur: cum in ventriculis piscium pullo calore actuali præditis, cibi quilibet ingesti, eodem modo dissoluantur & conuolvantur. Causam atque præcipuum huiusmodi liquoris esse statuit spiritum quendam aut liquorem acidum a liene in ventriculo transfusum, qui eximiam dissolventi acuitatem habeat. Quam sententiam ex Galenicorum doctrina eliciunt, qui sancti est huius rei melancholicum a liene in ventriculo transfusum ex citare appetitumque vel contrahendo, ac contrahendo, unicuique interiore ventriculi; vel acuitate, sua vellicando. Quod quidem impugari potest ex eo quod si contrahendo id faceret omnia ac utringentia idem præstare possent; & vellicando, acra quilibet potentius quam acida appetitum excitarent. Probabilis igitur existimatur humorem alium appetentiam & citare per accidens, penuriam scilicet alimenti interfecundo, per dissolutionem illius quod ingellum est, ex qua penuria appetitus excitatur. Atque ita longe nobilioris lieni vim tribuunt, quam qui ab antiquis fuit propolitus; nempe ventriculo subministrandi præcipuum coctionis instrumentum. Huius rei conjectura satis valida est, quibus elicitur, quod durissima plantarum, scilicet dissoluantur, & lieni habent ventriculo videlicetque circumdantia, ut potentius spiritum illum dissolventem inspiraret, vel liquorem acidum commodius commisceret. Videndum autem ausibus inesse acidum illius spiritum ostendit Helmontius proprio experimento; refert enim le in iocera cum pulvere aler et ipsi aliquando linguam obducit, quam ille ruitro apprehendens deglutire conabatur, se vero lingue apice passera guttur continenter, maximum in eo aciditatem percipit. De spiritu vero dissolvente aium ventriculis inhaerente probatur ex praxi medica, in qua gallinarum ventriculi ad iuvandum coctionem passim præferebantur in polueribus digestis; quos hunc effectum præstare credibile est, ciborum dissolutionem adiuvando, cum idem gallinarum ventriculi calculosis etiam præferantur, quibus calculorum dissolutionem molari possit. Ex vulgò notissimum est ex lalibus dissolventibus, puta vitriolo, nitro, ammoniaco, & sale communis spiritus elici, longe efficaciori dissolventi vi præditos.

Ille igitur spiritus, seu liquor a liene in ventriculo transfusus, dum secundum naturam se habet, bonam ac laudabilem ciborum coctionem efficaciter verò a situ naturali recedat, ventriculi actionem evertente potius est. Si autem antea dictum fuit ex hisce præsuppositis, causam appetitum excitare, quando spiritus ille seu liquor acidus nimis actiuam, & potentem dissolventi vim obtinet. Sic etiam ex aduerso, si vis illa dissolvens debilius efficiatur, aut omnino deficiat, coctio ventriculi immutatur, aut abortiva sequitur. Hinc dicit Helmontius Aphorismum Hippocraticum primum lect. 6. qui habet, *In lingua sancti huius interieram si rutilus acidus superueniat, qui prius non erat signum bonum, si interpretandum est; si velicit rutilus acidus superueniens significat fermentum illud acidum, quod a morbo fuerat deperditum, restitutum incipere.*

Falsitatis & nos novam hanc doctrinam proprio experimento. Cum enim aium præterito 1668 alui lusu pituitoso & melancholico per quatuor menses integros, adhuc fuerimus, & ab eo ad extremam maciem, & veluti marcoram perducti; quandoquidem omnia alimenta in putrefactum & molissimum substantiam conuertebantur, ex debilitate ventriculi ea perfecte concoquere nequeunt, post multa remedia per totum illud tempus usurpata, quorum maxima pars parum aut nihil proficiendam aceti acerrimi visu sit, quocumque paucos dies, a tempore illius affectu inte-

grè liberati fumus, omnia equidem aceti viscidum illud naturale ponere deperdimus, plurimum autem omnia vellicantur fuisse concoque possumus. Vis autem aceti fuit in partibus cum omni indurata, quæ frustulatum dissolvunt, ut intelligamus & per aliquid hoc hoc solo edulo in omnibus partibus utebamur. Tum hoc manifestè percipiebamus, quod si acetum non esset validum acra, exiguum ventriculo adsumptum ferebat.

Diagnos huius affectus iuxta leise coctionis differentias varia est. At primum appropinquat bradypepsia, idem in signis indicantur, per magis & minus tantum differentibus illa autem signa sunt, rutilus acidus, alimentum incoctum, vel semicocctum per os aut alium reiectio, scilicet ventriculi refrigerantes prægressi, grauitas, rutilus, inflatio in regione stomachi, leisis a frigoris assumptione venæ tenues, & aquosæ & doctores. Interdum tamen vinæ crasse & rubre appetunt, ex luso impuro ac feculentum, qui ob primæ coctionis imperfectiorem a chylo sufficientes separari non possunt, sed ad renes vias transfusæ cum lero humore; imputat etiam vias reddit, quales interdum a melancholicis præteritis, & leucobus excreta solent. Fusorem huius vias explicationem vide apud Sennertum *lib. 3. præf. med. par. 2. sect. 4. cap. 7.* Dysepseum verò seu depravatam coctionem ostendunt, rutilus odorosus, sapor similis aut putredinosus in ore, & alitatis insensu calida assumptione leisis.

Si idiopathicè ventriculi laboret, propria eiusdem morbo le dispositio signa aderunt. Si vero sympathice afficiatur, a propria partu affectum signa, illa sympathice est dicenda. Si verò ex errore causarum extenuatur, vel obiecti vitio symptomata dependant, ex eorum præsentia aut prægressa constitutione, argui vel aliam rem latere innolescet.

Prognosis huius affectus ita inferenda est. Coctiois vitium quod a causis externis excitatur, facile corrigitur, causis illis sublati, & idonea viis ratione instituta.

Facilius etiam curatur leisis coctio, ex humoribus ab aliis partibus in ventriculo transfusis; quam dum a proprio ventriculi vitio exoritur. Humoribus enim illis expurgatis, antequam morbum aliquem in ventriculo exacerent, coctionis officium restituitur.

Abolita ventriculi coctio omnium deteriora est, quia totius corporis nutritio frustratur, unde morbi lethaliissimi, ut lienteria, hydrops, atrophica, & similes, consequuntur.

Coctio immutata via etiam parit incommoda, ut colicæ dolores, cachexiæ, ac tandem hydrops variis speciebus.

Depravata coctio multorum etiam maiorum causis est, puta obstructione, febri, februm, & similia.

Curatio præfertur lubatione casualium externarum, intercedentium, & coniunctarum, quæ affectum istum eliciunt, augent vel consentant.

Ac primum advertendum erit, utrum ab alijs partibus ad ventriculum humores transferantur in hoc casu, humores illi erunt evacuandi ac revellendi, partem mandantis affectus corrigendæ, & ventriculi roborandus. Affectum aliarum partium occasionem ex proprijs capitibus erit delumenda. Ventriculi verò roboratio ex inappetentia ex actione defuit poterit.

Quæ verò ex proprio ventriculi vitio coctionis leisis contingit, ea vtiplurimum ab humoribus frigidis aut calidis dicitur originemque adeo causam curationem obtinet, quæ pro inappetentia a similibus causis oriunda sunt propolita, quam hac frustra repetere non opus est.

Si denique Hermetico-cura causa peculiaris supra propolita animadvertens digna sit, proutendum erit, primo huius pravam diathesin corrigendo, & spiritui dissolventi restituendo substantiam quædam acida causæ generi sunt spiritus sulphuris, vitrioli, & succi liuorum & ranarum, acantorum, & acetum.

C A P V T V I

De singulis.

Singultus est motus ventriculi depravatus, quo rem sibi noxiam expellere conatur.

A vomitu distinguitur ex eo quod materia quæ vomitu reicitur in ventriculi cauitate continetur, & ille totus inuertitur, vt materiam illam excludat: in singultu vero materia peccans, tunicis eiusdem infixa est, ideo ventriculus sese contrahit ac fibras suas concutit, vt eam excludat. Et vt nauisam quoque in hac diffinitione comprehendamus, dicimus motus ventriculi expulsiuos tripliciter fieri: vel enim natura quandoque vult insurgere ad expellendum, & non potest; aut non sufficienter ad hunc motum irritatur, & tunc nausea fit aliquando insurgit, & expellit, & fit vomitus; vel denique singultus, vt expellat, sed non potest expellere, & tunc fit singultus.

Ille autem motus consuetudines est, non autem vera consuetudo, quæ solis musculis competi, & paribus voluntario motu donatis.

Causæ singultus immediatæ proponuntur ab Hippocrate *Aph. 39. sect. 6.* inanitis, & repleti, sicut & Consuultio. Galenus & Auenenna tertiam addunt, nempe irritationem à materia acti. Alij anxie laborant, vt materiam irritantem de repletionis genus trahant, quod sententiam Hippocratis illam taceant. Verum vbi res ipsa loquitur periculis, non opus est rerum euidentias propter Auditorum, verba confundere & obscurare. Quid enim clarius est, quam singultum fieri à facultate, & pulsione irritata? Quæcumque igitur irritationem illam efficiere possunt, erunt causæ proximæ singultus. Iam vero humores & vapores quantitate vel qualitate peccantes, ventriculum irritare possunt ad expulsiorem, & sic repleti, & acrimonia erunt causæ diætales toto genere distinctæ. Inanitis vero quomodo singultum excitare possunt, non est facile explicare. Cum enim illius silentia consistit in defectu nemo dixerit naturam insurgere ad defectum expellendum, quoniam potius mouebitur ad illum reuocandum ac reparandum, quæ attractio, potius, quam expulsiore facultatem mouebit. Si vero interdum singultus magnas euacuationes sequatur, vt in acutis, & malignis febribus, & purgatione ex helioboro contingit, non euacuationis simpliciter tribuendum, sed potius malignæ cuiusdam qualitatis à morbo, vel medicamento ventriculo impetis.

Materia autem in singultum efficiens, vel in ipso ventriculo colligitur, vel aliunde ab hepate, liene, intestinis, alijsque partibus, vel etiam toto corpore communicatur. Sic alimenta vel medicamenta acriora, & humores acres aut lumbicis mordentes in ventriculo contenti, singultum idiopathicum producant. Sympathicum vero insensit vicinorum partium inflammationes transmissæ ad ventriculum ichore, aut vapore aëreum etiam quod tumor, hepate præsertim inf ammato, ventriculum comprimit, videlicet facultas expulsiua assidue irritatur. Denique à toto corpore possunt transferri ad ventriculum humores, vel vapores acres in febribus acutis & malignis contingit.

Diagnosin huius affectus per se conspicua est. Causæ vero singultus ita distinguenda sunt, vt idiopathice contingat, affectus magis continuus sit, & humorum in ventriculo contentorum signa appareant, & affectio vomitus sedetur. Humor vero peccans in ventriculo collectus, vomitus, aut ructus, aut oris sapore, alijsque signis internosci poterit. Si denique ab alietus cuiusdam partis morbo oriatur, eiusdem signa ex proprijs capitis erunt defensenda.

Quod ad prognosin attinet, singultus qui à causa aliqua procaciter, vt cibo, potui, aut frigore exoritur, periculosus non est, tum etiam ille qui crum per vomitum interdum antecedit, sed tunc reliqua signa in bonum consentiunt, & salutaria esse debent.

Si quis in laboriosa febre singultus, morbo laborat pessimo Hippocrati *Cancer* fit enim ille singultus ab humoribus acerbis & malignis, tunicam ventriculi interiorem vellentibus, & facultatem illius expulsiuam stimulantibus. Et dicit Vallesius de nullum vidisse leuatum, in extenuatis aut febre ardente, vel maligna correptis, cui singultus superuenit. Sic apud Hipp. 3. *Epid. sect. 2. Ager* 12. Mulier quæ iam Mendacium foro habitabat, die 13. frequenter singultus patiebatur, & 14. interit. Obseruauit etiam Placerus singultum in febribus ardentibus superuenientem, & perseueran-

templentique mortis esse prænuntium, eundem etiam in dysenteria esse lethalem.

A vomitu singultus, & oculorum rubor, malum, Hippocrati *Aph. 3. sect. 7.* duo hæc signa fit vomitus superuenient in morbis acutis, & ad aliud tempus perferant, ideo lethalia habenda sunt, qui inflammationem cerebri, aut ventriculi denuntiant: quæ inflammatio non modo ipsius singultus ac ruboris oculorum causa fit, sed etiam vomitus, ut citaretur ab acerbis humoribus os ventriculi cuiusque tunicas mordentibus: exeretis per vomitum illis humoribus, cessaret vomitus & singultus; nec à vomitu vilius vapor acer ad oculos deferretur, qui oculos rubros efficiet: At cum vomitus non solum non proferat, sed etiam post se singultum & oculorum ruborem inuexit, et cessat, tum est illa tria vomitus, singultus, & oculorum ruborem ab inflammatione cerebri, aut ventriculi dependente. Cerebrum enim inflammatum sanguinem ad oculorum venulas eximit præ copia, & in extremam oculi tunicam effundit, videlicet oculorum rubor, cui ventriculus consentiens per ueruos sextæ coniugationis admodum à fissi, quæ ab cerebri inflammatione facili in vomitum, & singultum impellitur. Ventriculus quoque inflammatum vomitum, & à vomitu singultum, & vna cum singultu ruborem oculorum inuexit. Ideo concurso sanguinis leuandis ad oculos propter maximum contentum, qui inter illas partes intercedat, quæ facili ostendunt suffusionem initia, inagnumque ante oculos appetitioneque plerumque vitiatu ventriculo contingit: unde merito Hippocrates *In libro de locis in homine*, à vomito oculis maxime lædi affertur.

A iecoris inflammatione singultus, malum, Hippocrati *Aph. 17. sect. 7.* singultus tum iecoris inflammationis superuenit, vt docet Galienus commentus *Aphorismi*, quando inflammatio auditor, & deterior efficitur, tunc enim magna inflammatio in hepate ob vique accreuit, vt vehementer superos ventriculo incumbat, & singultum inducat, unde vero affluente materia nonnihil inflammatio aut erysipelas gignitur in ipso ventriculo. Sin minus, ab ea ventriculi tunicis imbuta, moris excitatur.

Curatio huius affectus ad illius causas dirigitur, quæ: vt antea dictum est, vel sympathice hunc affectum producant vel idiopathice. Sympathice afflictes causæ sunt aliarum partium affectus, quibus curatus singultus etiam auferatur, quæuis ea remedia quæ symptomata demulcent, Ideonea sunt, interim viis præ valeant, quæ inferius proponuntur. Idiopathicus vero affectus fit, à pituita, flatibus, bile, alioue humore acris, aut maligne qualitates paritæ.

Qui fit ab humore pituitoso, tunicis ventriculi imbutis curatur remedijs humorum illi incidentibus, detergentibus, expurgantibus, ac ventriculum roborantibus, quæ in curatione inappetentiæ à frigida causa oriendæ fuerint propostæ, quibus sequentiæ, velut affectus magis appropriata, adicienda sunt.

4. Callores 3. i. succi menthe 3. iv. Milce, capiat æger cochl. j. vel ij. virgine singultu. Eodemque remedio potest inungi ventriculus calide, bis aut ter in die.

Accetum scilicet lumi potest frequenter, ad materiam tunicis ventriculi impactam incidendam & resoluendum, vel alius loco oxymel scilicet.

Caryophylli in ore frequenter detesti non parum iuuant. Vtile est etiam elixir propteritatis à Crolio descriptum. Seminis anethi 3. ii. vel iii. decoquantur leuiter in vini generosi 3. vii. de quibus 3. i. capiat æger, manè & sero, idem semen inclinum linteolo variis frequenter obducatur.

In affectu cōtumaci pilula sequentes erunt efficacissimæ. 4. Callores 3. i. melleæ 3. ii. i. lalis gemmæ 3. ii. diadrye, & malliches, an 3. i. agarici receter trochisc. 3. iii. aloes electæ ad pondus omnium. Excipiantur succo menthe, & fiat pilularum massa de curus Drachi i. formentur pilule vi. deauratæ. Capiat ii. vel iii. manè duabus horis ante cibum bis in septimana.

Simpliciores pilulæ non parum efficaces fieri possunt ex puluere hieræ cum oxymelite; quatum Drachi exhiberi poterit.

Intermedijs verò diebus vtatur puluere frequenti.
 y. Sem anethi ʒ. Rad. coriæ. ligni aloes. nuc. mol. char. car-
 ryophylli pulu. diambre. an. Drach. j. Capiat manè ʒ. iij. cum
 pauco vino odorisero. Vel adde lalis communis ʒ. iij. vtatur
 pro condimento ciborum ordinariorum.

Ventriculo admodum letens cataplasma.
 y. Rad. anilolochongæ. ʒ. iij. Florent. baccat. lani. fol.
 rute & mentha facit an. Drach. ʒ. iij. calicellæ & myrrhæ. an.
 Drach. ʒ. iij. carophylli & hypocistidis. an. Drach. ʒ. iij. Cum melle
 antholio hat cataplasma.

Tandem in affectu contumaci decoctum guaiaci & the-
 mar. sulphurearum vsum, tanquam remedia generosissima
 coniungendum erit.

Quia & statibus producit, isdem remedijs curatur, qui-
 bus adduntur llatos discutientia. Admoueantur etiam cu-
 curbitale regioni ventriculi, quæ insular miraculi, flatulen-
 tiosi infimi ventri affectus repente mitigant & tollunt.

Qui ab humore acri & buloso oritur, præter ea remedia,
 quæ pro inappetentiâ à calida insensibile genita fuerunt pro-
 posita, hunc etiam affectum committentia, curari debet
 phlebotomia (si plethorâ adiecta) vomitione, aut purgatio-
 ne blanda, tertio quoque die repetita in hunc modum.

y. Rad. elecl. puluerat. & aqua endiuæ donec mollescat
 irrorari ʒ. ʒ. pulpa tamarind. ʒ. iij. sem. endiuæ, portulac. &
 spodi. an. ʒ. iij. laniati citreus. & diagrydij. an. ʒ. ʒ. Cum lyp.
 de limon. hat massa pulular. de cuius ʒ. ʒ. formentur pilule
 ʒ. iij. vel ʒ. ʒ. dentur manè, vt dictum est.

Alijs vero diebus lumar conficit. rosar. & borrag. pauco
 puluere triafridi alperlam. vel opiatam in prædicta map.
 petentiæ curatione descriptam.

Emulsiones frequentes & ex leuibus frigidis paratæ di-
 citur humoribus acrimonijs potenter demulcent, vel affectum
 minus calidum lac amygdal. dulcium.

Syrupus de pomis cum syrupo cydonior. mixtus. ex co-
 chle. & helibendus.

Iulculum afflatum, & sæpe propinandum.

Aqua frigida, vel calida, aut pitana copiosè bibenda.

Oleum amygdal. dulcium humoris acrimoniâ retundit.

Foucaur regio stomachi cum spungia in aceto rosac.
 macerata.

y. Cerat. fantalini, & vnguenti rosac. ana ʒ. ʒ. malthices
 ʒ. ʒ. cortic. citri. & carnis cydonior. ana ʒ. ʒ. Cum succo
 semperui. & pauca rectibina, fiat emplastrum duri-
 quorum vniq. anterius, aliud posterius stomachi loci ap-
 plicetur.

Inungatur regio hepatis vnguentis refrigerantibus. Qui
 ab ea partes humores in stomachum confluere soliti sunt.
 Si vero malignæ cuiusdam qualitates suspicio fixæ, heracæ
 aliæque electi pharmaca erunt præcipienda, & regio ventri-
 culi ol. scorpion. Matthioli inungenda.

A quacunque vero causa oriatur singultus, sequentia vti-
 liter vsurpari poterunt.

Primò, humoris peccantis euacuatio per vomitum, si
 æger facili ferat, & reuerteratur vomito, si affectum immu-
 nationis autem proies auferat etiam fortioribus & sibi-
 tis, si necessitas exigit, & quemadmodum docet Plateus in sua
 praxi. Cuius rei exprimentum proponit in obseruationi-
 bus, his verbis. *Chirurgus æger saltu mex singultus capere,*
adde continuatis vobis dies, nollesque, vt nec avertire, nec
releuare, aut cibum capere pisset. Ad extremum hoc pallo
debilitatus, cum nihil inuisset, & iam in ægere esset, dedimus
eis non sine metu, ipse tamen summo però rogante, vomito-
rium satis validum chymificum, quod Medicus ad manum
habebat. Pnde immensam bilis argenteæ & nigre copiam,
eum cum aliquoties cessauitque singultus, ipseque sensim conu-
luit.

Si æget vomitum aduerfetur, per inferiora expurgan-
 dus est.

Preparandus hamor ante vacationem, aut ipsius itera-
 tionem, incidentibus, & adibgentibus. Pulita sequentia
 conueniunt.

Curabitur admodum dorso in regione ventriculi, vel
 etiam parti anteriori euident.

Ventriculo per salicam conditio, quo minus dilata-
 rius queat.

Extremotum ligaturæ.

Semen anili assumptum, quod peculiariter singultum ce-
 dare creditur.

Clysteres frequentes qui humores noxios à ventriculo
 reuellunt.

Animalia iuniora ventriculo admoda.

Acetum scilicet eius ex cochleari vsurpatum.

Sternutatio materiam in ventriculo tunc impactam
 excutit. Quemadmodum Chrysimas Medicus apud Plato-
 nem. Aristophanem singultientem qui spiritus colubiti-
 onis, & aqua frigida gargariata curari non potuerat, ste-
 nutamento exciuit.

Gal. 8. de comp. med. secundum loc. proponit medicamen-
 tum Asclepiadae. Cuius singula & emanat simplicia, idque
 probat, qualis omnes habeat facultates ad hanc intentionem
 idoneas; scilicet discutendi, & euacuandi materiam no-
 xiam per aluum & lotum roborandi ventriculum, & po-
 tentialio mitigandi acrimoniam humorum. Conpositio est
 talis, quæ recipi coth. vel illius loco galangæ croci, spica
 nardi, rosar. recent. malthices, ana ʒ. iij. alari aloes, ana ʒ. iij.
 opij ʒ. iij. cum succo lypylis fiant pastilli, de quibus datur ʒ. iij.
 singulo mane.

Ad huius inurationem breuius parari possunt pilule pro
 vna dosi, & aloes ʒ. iij. laudani opati ʒ. iij. vel ʒ. iij. Si animus fit
 magis purgare, addi possunt diagrydij. ʒ. iij. vel ʒ. iij.

Quam uulgines vires habeant in hoc affectu medicamen-
 ta & aloes parata, testatur De rebus his verbis. *Permissis cum*
singultu frangitur, anili alio per quinq. dies hiera per-
traglassi, & nigri humores euellunt singultus forme-
ceram.

Platerus in obseruationibus refert, puerum decem anno-
 rum per octiduum dies nocteque singultientem curasse a-
 qua nucum viridum, cum raphano prius in aceto macera-
 tarum, destillata, quam vomitionis excitatione gratia propi-
 nare solebat. Verum etiam minime vomierit, tamen flatum
 singultum desisse, & cum lub noctem denot. haustum bi-
 buisset, ab hoc symptomate penitus fuit liberatum.

Forettus narrat se hominem, graui singultu laborantem,
 curasse vnicò haustu decocti leuissimi anethi, carui. portu-
 lacæ, & papau albi in ceretia tenuiori.

Clandius valde commendat diaphanum cum philo-
 nio romano, vbi causa & symptoma valde vrgent.

Narcotica denique sola pertrahunt singultum, & alijs
 remedijs minime cedentem, facili compescunt, sensum
 partis obtundendo nimis exquisitum.

C A P V T VII.

De Nauſea & vomitu.

Nauſea & vomitus differunt tantum per magis & mi-
 nus, & utrique affectus est motus ventriculi, quo res
 in cauitate sua contentas & pellit, vel & pellere nititur. Est
 igitur nauſea inane vomendi desiderium cum anxietate, &
 tenuis ac pellitibus humoris per simplicem saluationem,
 excretionem. Eam & citare solet, quodvis ventriculo quanti-
 rate, vel qualitate moleſtum interuenit, tamen propter ven-
 triculi inobedientiam; aut officij eiusdem superioris ro-
 bor, vel materię crassitie, & visciditate excludi po-
 telt.

Vomitur verò qui Gracis *ἔμετις*, vel *ἰστέρα* nominatur,
 est motus ventriculi deprauatus, & concussus, quot vis
 ex pultis irritatæ, contractis hiberis partibus inferioribus, laxati-
 que supenoribus, materiam in capacitate contentam sibi mo-
 leſtam, & sensibilibet per superiora violento impetu rejicit.
 Docetur motus deprauatus, tum ratione obiecti moleſtan-
 tis, tum ratione motus ipsius, qui fit à fundo verus ori-
 cum, quasi per subuersionem, cum motus ventriculo natu-
 ralis, versus intellina & pylorum compulſus fiat.

Vomitus differentia à causis delinuntur, quæ vel inter-
 ne sunt, vel externe, idem vomitus primam diuiditur in
 naturalem, & artificialem. Naturalis rurſum, vel ex causa con-
 stitutionem morborum accide, vel in iplo morbo præſente
 vnde triplex exurgit alius differentia. vt alius sit periodi-
 cus, alius criticus, alius symptomaticus.

Pario.

Periodicus est qui extra morbosam constitutionem, & velut natura afflicta exerceat precationis gratia, & certis temporum spatii repetita, vnde apud Hippocratem legimus antiquos bis in mense, continuas aut interiectis diebus vomere solitos. Et nostris etiam temporibus multi repetuntur, qui per quadam intervallo, ali singulis mensibus, ali singulis per primas, ali singulis diebus humorum biliorum, & frequentius pituitosorum copiam, vomitu reiicere consequuntur, quibus evacuationibus tanquam prophylacticis a multi morbis praeveniuntur. Est hic vomitus vero symptoma non est, quia sine vilo morbo praesente exciatur, sed potius motus naturae nominandus.

Criticus vomitus non raro contingit in morbis, eoque materia morbifica (prius coctione preparata, a) salutariter euacuat, vel tota, vnde perfecta morbi solutio, vel maior parte, vnde magna illius immutatio succedit.

Symptomaticus vomitus fit a natura irritata & debilitata, sine aegri allocatione contingit, quia vel non satis copiose, aut confertim fit, vel continuo materiae morbificae afflusu fouetur & perleuat.

Alii vomitus differentiae perantur ab excretis. Quandoque enim materia quae excreatur albis est, alias excrementis. Albus materia est cibosa, aut chylosa, aut sanguis purus, vel permixtus. Excrementaria materia est pituita, bile, melancholia, serum, pus, sanguis, & similia.

Vomitus artificialis generali vocabulo a nobis appellatur, quicumque a causis externis inducitur.

Iste autem causae externae, quae vomitum excitare valent, sunt praecipue idem, vel causae compressio circa epigastrum, aut frigus, vel contagiosus, aut venenata, sicuti odor, excitatio, violentia, aut molestia, vel succussio, equi insulsa, nautatio in mari postissimum, si ante auro, aspectus vel imaginatio rei horridae, & exoleae, & similes causae externae, quae naturam irritando vel humores commouendo vomitum excitare solent. Ac praeter ceteris assumpta maxima vim habent ad vomitum excitandum, non solum medicamenta, emetica idem nominata, & venena toto genere nobis infesta; sed etiam alimenta, vel sua natura, vel alicui peculiariter enoia, vel est apud Hippocratem idem qui ab eis frugum vomitum vehementer excitatio interit. Idem coningit aulico Antonini Imperatoris ex calco puri magna copia comesto. Idem praestat alimentorum qualitas, pinguis, & oleosa, tum etiam ordo assumendi praeposterus, quando humilitas & relaxantia post atringentia sumuntur, denique alimenta, namque quantitate ingesta, quamvis euchaemia, & laudabilia, vomitum excitare possunt, ut crassa de dedit praecipue. Tunc enim in natura nimia mole grauat, multae pondus, cuius coctioni par esse non potest, excludere tentat, quam etiam exclusionem excitat mala qualitate, quae illis alimentis per corruptionem, ob praui coctionem, inducitur.

Causae internae sunt antecedentes vel coniunctae.

Antecedentes vel a corpore vniuerso, vel a peculiari aliqua parte in ventriculo confluunt. A toto corpore feruntur in plethora, cachexia, febribus, aliisque affectibus totum corpus occupantibus. A parte aliqua peculiari deriuntur, siue humores in ventriculo in hepatis inflammatione, siue, aut mensenteria obstruuntur, siue in mensenterio, aut hemorrhoidibus, catarrhola constitutione, & similibus. His addenda est praui potus colicoidis in conuulsione, quando scilicet non in duodenum intestinum, sed in ipsum ventriculum implantatur, vnde prociolici a praui nominantur, qui vomitu bilioso, propter praui hanc conformationem, frequenter diaecantur. Fit etiam vomitus interdum in peritritico intestino motu, quando obstruuntur intestina in colico, vel illico affectu humores liberant exitum non inuenientes, ad superiora propellunt. Lumbici etiam non raro in ventriculo ascendentes, ab intestinis cuiusque tumorem interiore vellicantes vomitum efficiunt. Ac denique ab intestinis disruptis in lene, mensenterio aliisque abdominis partibus, vomitum purulentum & saniolem excitare solent.

Causae vomitus coniunctae sunt eadem causae supra memoratae, quando ad ventriculum fluxerunt, quamdiu enim,

in alijs partibus continebantur, erant causae antecedentes. Postquam vero ad ventriculum transiunt sunt in eoque commorantur, causae coniunctae rationem obinent. Tales causae sunt praecipue humores variique, qui etiam nonnulli in ipso ventriculo generantur, pituita postissimum, cuius maximus praesentis non raro fit in ventriculo, per cruditates, & aepias, quando stomachus debilis alimenta probe non concoquit, eaque in pituitosum excrementum conuertit. Sic etiam in ventriculo interdum generatur bilis portacea ex corruptis alimentis, ut docet Galenus in 2. prognostic. & hoc luculenter apparet in paucis lactentibus, qui ex lactis corruptione in ventriculo, iaces portaceas, & eruginosas excrecere consueverunt.

Hec tamen bilis portacea, ex corruptis alimentis in ventriculo genita non est eiusdem naturae cum ea quae ex bile fluxa per aduersionem & torrefactionem generatur.

Signa vomitus diagnostica per se manifesta sunt. Causae vero prout variae sunt, fit etiam varijs signis innoteuit.

Primo igitur si ventriculi ipsius viuo vomitum contingat, eisdem partibus laborantibus signa apparet, ut cibi insulsi, diuina, grauitas, sentio, & inflatio in regione stomachi, tarda & difficilis concoctio, iustus acidus, & odorosi, & aliique signa debilitatem & intemperiem illius partem demonstrent. Sic etiam si ex morbo organico vel communi ventriculo inherente, ut tumore, vel viceri, vomitus oritur, cum morbo tum signa sepe produnt, si vero per lymphathum totius corporis, aut aliarum partium vomitus contingat, affectus totum corpus, vel aliquam partem obidentes apparent.

Totum corpus afficitur in febribus, cachexia, atrophia. Partes vero peculiares, a quibus frequentius humores ad ventriculum transmittuntur, sunt cerebrum, hepar, intestina, & venter.

Si e cerebro humores ad ventriculum confluunt, distillationis signa apparent, tum etiam vomitus erit purior, si a pituitosa causa, est magis molesta, quo tempore cibi assumitur.

Si ex hepate humor transmittitur, si plerumque biliosus esse conuenit, atque adeo bilis vomitu reijcitur, & vomitus ante cibum quidem eo assumpto mollior est, tum aliquis affectus, ut dolor, tumor, autque in hepate apparet.

Si ex intestinis materia ad ventriculum feratur, dolor colicus aut iliacus aderit, vel lumbicorum signa sepe ostentabunt.

Si denique per vteri lymphathum vomitus concitetur, conceptio aderit, vel mensium suppressio, vel alia ex vtero lymphomata prodibunt.

Quibulum etiam signis conijcere possumus, utrum humor in cauitate ventriculi conueniat, vel tunica ipsius haereat. Si enim in cauitate sit, leuissimo conatu reijcitur, & inell ventriculo tenso, & anxietas ab assumpto alimento, quae non cessat, donec humores vomitu creta sint, qui soli plerumque excreantur, alimentum vero retinetur, si vero humores tunicae adherent, ab ingesto cibo praecipue vomitus contingit, & aliusque sine humoribus reijciatur, cura vero cibum iuscula a modum molestat, & quod reijcitur crassum, & vitulidum est, magnoque conatu extunditur.

Causae externae ex agrorum relatu innotebant, ut si nimio cibo & potu lese ingurgitauerint, vel idem aliquem, grauem in illa regione acceptum, vel prauium aliquid edidit, tum aut venenatum iugulentur.

Innumerae denique vomitus signa proponuntur a Galieno 3. de cris. cap. vi. quia tumor colici capitis vertigo, tremor, brachia, tremor labij inferioris, oris, ventriculi, & alia, frequens & copiosa saluatio.

Prognosis huius affectus in hanc modum instituenda est.

Vomitus ex bile fluxa, & pituita mixtus, qui nec valde crassus est, nec admodum copiosus, & qui duos istos humores habet exquisitae permixtos, bonus. Talis enim vomitus in subtiliori qualitate, qualitate laudabilis est. Ex omnibus enim humoribus excrementis, pituita, & bilis sunt omnium subtilissima, si autem quantitate, & constantia mediocris, ac bene inuicem permixti per vomitum excreantur, omnes laudabilis vomitus conditiones obinebit.

Vomitus biliofus aut pituitofus die critico erumpentes, boni non solum enim vomitus permittit, et vti quoque humore boni sunt; led etiam qui sunt locum ex altero humore, si tales humor morbo acrim committatur, quo eger detinetur, Sic in biliofis febribus bilis critique erumpens aut pituita in pituitosis morbi fontem non effert, aut saltem maximam laetitudinem parit.

Longo autem profuso laboranti spontaneus vomitus superueniens morbum soluit. Aph. 15. *secl. 6.* fit enim reuulsio interitus morbo in contrariam partem. Et illa reuulsio ostendit non relictas vires resurgere. Vt enim Medicus coram quæ ad partem aliquam fluunt retractionem, mo' tora natura quam præparet. E. caput humens ad partem afflicta confluxus, et pulsus eum facit, dum illa pars refluat laboranti incipit.

Vomitus paucus, et bonofus in acuta febre analis: nihil enim eorum quæ decedunt sunt. E. *secl. 6.* lectum conueniunt quæ ita vacuantur omnia duorum alterum significat aut materia copiam quam natura tolerare nequeat, sed ex aliquo fupponatur effundit; vel natura imbecillitas quæ superfluum expellere frustra naturæ.

Vomitus variegatus ex multis humoribus constans, manifestant enim varios humores in corpore latitare, quæ eo magis negotium naturæ fecerit, ut quoque difficilius est pluribus iuuicis resistere. Si enim aduersus varia alimenta paginare naturam graue est: postea difficilius erit, et periculum plenum tutare varios humores prior naturæ modum erigentes conque, et edomare. Præcipue in morbis acutis in quibus breue est tempus pugnæ, quod debet esse longissimum, vt maior spes victoriæ ex parte naturæ haberi possit.

Vomitus porraceus, et ruginosus, liuidus, niger, aut foetidus, lethalis. Significat enim humidiorem vomitus bilem, porraceum, et ruginolum aut etiam in corpore redundare. At hæc omnes bilis species malignos morbos, atque lethales solent producere. His vero si factor adiunctus, fit insignem humorum corruptelam significat, cum qua natura diu consistere nequeat.

Vomitus syncerus, et impermixtus in acutis febribus, mali. Hipp. *propter* Humor enim syncerus non solum crudus est, sed etiam incotinus, quippe qui tam arduum coctionis, tum potentiam excidit, tum potestatem vocat humorum omnium mutationis expectem, vel omnem extremum ferendum, et crudum, quod suo loco datum non est. Cuius generatio vel partis aliquam vitio fit vel ferrore, ac incendio febri, exhausta aqua, et ferola parte. Ideoque in acuta febre magni situs incendium latere ostendit, plerumque a natura inuicibile.

Quod ad curationem spectat si vomitus ab aliarum partium affectu dependet, non alijs indiget remedijs, quam quæ modo a quo procedit, conueniunt.

Si vero fiat ab humoribus biliosis, pituitosis, aut melancholicis quantitate, aut qualitate sua ventericolum stimulantibus, humores illi vomitorijs medicamentis excludendi sunt.

Si vero crassi et glutinosi sint, acidendi, et abstergerendi, quæ admodum in curatione inappetentis dictum est.

Vomitus etiam in hoc casu plurimum conserui, qui promouendus est emetico mediocrum imbecillo, quale est oleum tepens, neque enim vehementi, quod a longinquis partibus trahat, vt quæ ex antimonio parantur. Sed illud tantum maxime conuenit, quod valida detergendi ac dissoluenti glusum illum humorem virtute præditum est, talis est, g. *Theophrasti*, seu vitriolum album præparatum paulo efficacius id præstat sal vitrioli ex vitriolo ad mentem rubedinem cucinato extractum.

Si vomitoria non ardeant, clysteribus frequentibus, et castorei blamus nati in peccatis detrahenda est, addito phlegmæ purgando alijs, et ventriculum roborat.

Sic in vomitu bilioso paulo sequentes præscribi poterit.

℞. Aloes opæ aqua rosæ lotæ Drachm. rubi. pulu. et aqua borac. irrorata Drachm. malichis, sanali rubi coralli præparati an. 3. Cum syrupo rosæ, solut fit malia pilular, cuius capiat 3. 6. vel 3. alternis diebus, donec sedatus sit vomitus. Vel

℞. Rubi pulu. 3. curc. myrrubal. extrin. 3. spodijs. 3. rala-

re cornu cerui. an. gr. vi. Fiat puluis, qui detur bis in *secl. 6.* mana, cum pauco iulio.

Vel fiat bolus ex hæræ picre, an. catholici 3. iij. cum 3. j. rab. paluereati.

In vomitu vehementissimo dentur laudani grana iij. cum cochiar. min. 3. 4. sed abstinere vomitus, et 5. poli. horas purgatio fiet per interiora. Satis magna ponitur purgantis quæ itas, quæ infirmitas laudano, quod ideo nilcudum est cum diagrydiatis, et coar. ynthuati. Si resistet medicamentum, clysteri acriori euocandum.

Poli sufficientem purgationem vomitus cohibendus erit partem roborantibus, vt syrupo cydon de granatis acidis, conuersa rosæ, vtcci, vel rad. lymph. 3. iij. muia valde, vel in lepo sequenti, si vehementissimus vomitus sit, valde biliosus, vt in cholera morbo.

℞. Succ. granat. acidor. 3. vi. succi menthæ depurati 3. j. aque oxalidis 3. 4. iij. cachari albi 3. 4. Fiat iulep, in cuius clarificatione leuiter bulliant in modum. *sanali*, extrin. rosæ, roborati. et *spodijs* ana 3. j. Capiat 3. iij. mane et sero.

℞. Terræ sigillatæ, boli armeni, coralli rubr. margar. præp. p. portulac. et acetos. an. 3. 4. rosæ coru. ceru. sol. menthæ siccor. ana 3. 4. rubr. rubi. P. 3. Fiat puluis aspergendus iuuicis, et ponticulis, aut sumendus ex cochleari, cum pauca aqua ferrata. Ex eo etiam poterat fieri melle cum saccharo aqua plantag. dissoluta, vel opiatæ cum syrupo cydon. addendo conseruiam rosæ, aut rad. lymphitis.

Malichis aliquot grana puriora, mane sumpta non parum valent ad vomitum compescendum.

Balsam. Peruuianij guttat. in osio iordibus cum saccharo in forma pulu. un. reddat idem efficacius præstat.

Laudatur etiam de octum tabernum aut lenium, abiectioni priori aqua addito pauco aceto. Succus cydon. crudus natus, uide vomitum sit. 6. 6. eius cochlear, vel 4. 6. bibi. beantur.

Camphora naribus frequenter admota, vel illata, atque etiam sumpta cum pauca aqua rosæ, et *catellu* pulu. damolchi, ad idem est efficax.

Spiritus vitrioli cum aqua plantag. vel communi mixtus, et ad moderatam aciditatem exhibitus, vomitum etiam potenter cohibet.

Si vero admodum pertinax fuerit vomitus, spiritus vitrioli quantitas augenda est, vt aqua valde acida reddatur. Cum vino generoso viriliter etiam mukeri potest. In spiritus vitrioli penuria, acetum fortissimum vsurpi potest, cuius cochlear vnum, vel alterum purum et impermutatum exhibendum est.

Salis abynthij scrup. j. cum succi limonis cochleari mixtus, remedium est præstantissimum, præsertim in vomitu, qui a febribus malignis solet contingere.

Si vomitus vires valde deiciat, detur laudano cum minna cydon. vel syrupo de rosæ siccis, et illico applicetur eucurbitula venterico, et cataplex hermentis pauli abstin. et cortic. arantior. iulacis cum succo menthæ.

Exterius vero regioni stomachi aduocentur foci, ex sponsa noua in aquam rosacæ, et acetum rosatum immersa, si que subingida. Vel dicta sponsa bulliat in aceto iord. et calide venterico applicetur. Vel composatur focius ex decodo rad. bilitoræ, fol. plantag. portul. menthæ, summatum rubi, et salcis. Deinde immingatur vnguento frequenti.

℞. Acacia. h. pocill. granor. sumach. et myrrill an. 3. j. malichis. et granor. kermes. an. 3. poli. mayrini 3. 4. ceræ q. l. Fiat vnguentum, vel sequens cataplasma admodum.

℞. Carnis cydonior. in aqua rosæ, et aceto decodatur. cydoniati fortiter contuli 3. iij. pulueris malichis, granor. kermes, myrrill et sem. plantag. an. 3. 4. Cum succo menthæ, vel cydonior. vel syrupo de aduicchio, fiat miltar cataplasmatas.

Vel cruita panis in aceto rosæ, macerata, et sequenti puluere consperfa.

℞. Rosæ rub. balsamior. sem. coriandri præp. ana Drach. 3. malichis. coralli rubri. sem. acetos. et *spodijs* ana Drach. 3. *sanali* extrin. 3. j. Misce. fiat puluis.

Vel emplastrum sequens applicabitur.

℞. Melle empl. de mastiche Voc. i. pul. myrrill. & rad. bifloræ, ana Drach. 3. cum oleo Jentiv. Fiat emplastrum scutiforme.

Si vomitus sit vehementissimus, & febrem symptomatice inducat, & corpus sit plethoricum; vtile est nonnullum sanguinem detrabere, ad præcautionem inflammationis, que in parvis internis ex concussione illa potest contingere. Id tamen caute agendum, & pauca manumetu deiectionis virium.

Præterea conveniunt cucurbitule dorso & vmbilico admoræ, frictions, & ligaturæ parium extremarum.

Fauces & collum obvolui possunt linteis oxycrato imbutis, ut humores repellantur. Manuum iniectione in aquam frigidam omnem vomitum compescit.

Ac tandem reliquis non contentis, ad narcotica veniendum erit, que omnes evacuationes citissime cohibent. In vomitu pituitoso (si vomitoria prædictis sedari nequeat) exhibenda sunt pilule dioscori, addito rhab. & agnisco, aut alia cathartica, cum opio.

Possed ad ventriculum roborem, & veniendum est, qualia in curatione inappetentia propolisa sanguibus addi possunt sequentia.

℞. Conferat rosar. & rad. physphytiana vnc. i. confectio, de hyacinth. Drach. i. pulvis electar. diambrae, & aromar. rosar. ana Drach. 3. trochisc. de spodio, terre sigillatæ, & granor. kermes. ana 3. cum syrupo cydonior. ha. optata.

Spiritus vitrioli cum aqua absinthii, vel succo menthe mixtus, vomitum potenter cohibet, & ventriculum roborat.

Vel aque imperialis cochli aut duo post vomitum exhibeantur magna fit ventriculi tranquillitas.

Exterius vero sequentia admoveantur.
℞. Absinthii, menthae, mellissæ, ana Maj. Coquantur in f. q. vini & aceti, ad tertiam partem consumptionem. Fiat posus pro stomacho.

Possed admoveatur emplastrum prædictum, vel cataplasma ex cydonijs, lubrificando puluerem nucis moschat. & caryophyll. loco myrrill. & plantag. Vel

℞. Absinthii, & menthae viridis, ana 3. i. crustæ panis assatæ, in aceto rosar. infusa 3. i. pulv. cydonior. vel cydoniat vnc. i. mastiche voc. 6. macis, & nucis moschat. ana Drach. 3. Omnia puluerunt fortissime cum oleo cydonior. & fiat emplastrum.

Vel hat cataplasma ex cydonijs in aceto fortissimo coctis & contritis, addendo parum lens. sinapi, & pulueris caryophyllorum.

Vel admoveatur crusta panis torrefacta, & in vino generoso cum succo menthe madacta, & pulu nucis moschat. caryophyll. thuris, mastiche, & granor. kermes. sinapica.

Villanovanus plurimum commendat fermentum aeris, quod aceto certum, & succo menthae maceratum applicatur ventriculo, & bis aut ter renouatur. Certissime enim sedat, post convenientes evacuationes, & resuersiones.

In diuturniori vomitu, ubi magna est ventriculi laxitas, ad valde astringentia veniendum erit, insequentem modum composita.

℞. Rad. bulioræ, tormentillæ, cort. malorum granator. balsam. & hypocist. ana Drach. 3. fol. menthae, & absinthii fer. cor. ana M. 3. granor. sumac. & myrrill. ana Drach. 3. roiar. rubr. P. cinnaam. caryophyll. & mastiche ana Drach. 3. gallar. viridum, & nucum cupressinæ Drach. 3. Fiat decoctus in aqua ferratæ, & vino rubro, in qua diluoli possunt grana aliquot moschi, quia odorata maxime faciunt ad vomitus compescendos. Cuius decocti capiat ager mané 3. j. & ex eodem foveatur regio ventriculi.

Possit forum admoveatur emplastrum, vel cataplasma aliquod ex supra propolitis.

CAPUT VIII.

De Vomitu sanguinis.

Sanguis est ventriculo per os exclusio, que vomitus sanguinis vulgo nominatur, hoc cum omnibus aliis hemorrhagiis commune habet, vt per anastomosis, tumorem, diaphragm, aut diapedesim sanguis & venis egrediantur; qui

quidem venarum affectus in hæmoptysis theoria pathologica expositi fuerunt.

Causa etiam sanguinis vomitum efficiens, cum hæmoptysis causis coincident.

Ac primum causa coniuncta istas sanguinis effusiones producat, est illas quantitates, vel qualitates excedens.

Sanguis quantitate peccans, venis namque, aut ostiis illarum aperire potest, sicque rixim aut anastomosis efficit, quod in plethoricis corporibus, & athletico habitu prædictis contingit.

Idem vero qualitate peccans, si nimis calidior, tenuior, que sit, per anastomosis effluere potest, quia calor ostiis dilatat, & tenuitas efficit, vt facilius effluere possit. Eandem qualitates diapedesim etiam perijunt, calor enim rarefacit tunicas vasorum, sequitur verò sanguis efficit, vt per poros eorum tunicarum facilius transire possit.

Sanguinis denique acrimonia, venarum tunicas erodit, & euiscerat, ac diapedesim producit.

Causæ antecedentes, eadem sunt, quas coniunctas appellamus, ideo tamen differentes, quando enim sanguis quantitate, vel qualitate peccans, venas immediate aperit causa coniuncta nominatur; Idem verò sanguis in venis contentus causæ antecedentes raubem habet.

Ad causas etiam antecedentes referuntur, partes manentes, quarum præcipue sunt, caput, hepatis, & venter.

Pierumque sicut sanguis a capite ad ventriculum per palatum, & oropharynx, sæpe etiam catarrhus febrius ex pituita acris & lala, genitus ventriculum erodit, & vasque, illius aperit.

Ad hepate, & liene, per venas que ad ventriculum struntur, & cum illis paribus communicant.

Ab utroque denique sanguis refluens in suppositione mensium ventriculi venas aperit, ita vt quedam mulieres perperie huerint, quæ purgationes menstruas per vomitum, sanguinis periodicum passæ fuerint.

Frequentius contingit sanguinis vomitus ab hepate, & liene, quam ab aliis partibus, ideo etiam, sæpius, quàm ab ipso hepate maiorem enim consensum habet lien cum ventriculo, quam hepatis. Patet siquidem ex anatomico maxime tantum venæ portæ, in lienem demitti, à qua venæ multæ ad ventriculum tenentur tum ad partem superiorem tum ad inferiorem, seu fundum ventriculi & quidem inferiores, ita vt interdum sitibus, & sanguine ditentur; mediis digiti crassitie æquæ, quod ex dissectione cadaverum innouat. Præterea vas breue patentissimum, vt extremum melancholicum in statu naturali continuo in ventriculi eructat; sic in præternaturali sanguinem magna copia in illius capacitatem effundere potest. Aduertendum autem hic est non solum per vomitum, led etiam per alium in hoc affectu sanguinem excludi, tum quia portio illius qui ad ventriculum confluit, ad inferiora detrahitur, tum etiam quia venæ mellarice aperiantur, & in intestina sanguinem profundunt; qui quidem sanguis in longo intestinorum tractu denigratur, & picis liquore infusa reuertit.

Causæ extrinsecæ sunt omnes, que vulnerare aut contondere possunt, tum etiam ætus vehementior ob ebullitionem que in sanguine commouetur, vnde naves ad 31. annorum sanguinis vomitus, aliisque hæmorrhagiæ specibus maxime sunt obnoxii, frigus etiam immodicus, contringendos, venarum rupcionem moliri potest, idipsum efficiunt motus intempetius, & labores, ac excitationes iniuste, & clamores, & vociferationes magnæ, que sanguinem in venis vehementer commouent.

Ac denique omnes causæ que hæmoptoen excitare possunt, proprio capite recensere. Sanguis enim in venis, & arteriis à quacunque causâ, siue interna, siue externa reboiueret commotus, ad eam partem facilius irruipit, quæ debilior, & illius receptioni magis disposita est, atque ita si ventriculus, aut venæ, quæ ad ipsum feruntur, eadem dispositionem habeant, vomitus sanguinis excitabitur, potius quàm alia quævis hæmorrhagiæ species.

Diagnosis huius affectus, in eo potissimum versatur, vt pars à qua sanguis profluit nobis innotescat.

Si ex ipso ventriculo sanguis effundatur, seu partis, & in ea doloris aut grauitatis scelus fieri continetur, illud demonstrabit.

flabit. Deinde minor est illius copia, grâtes enim sunt stomachi venæ, cum nausea sanguis effertur, ac in deglutendo mordacitas percipitur; tum sanguis aliquando cum cibo, aliis cum bile, vel pituita mixtus exiit.

Si a capite sanguis profuit, quædam circa fauces, & palatum titillatio percipitur; pars sanguinis aliquando per nates emungitur, mucro pernixta, capitis dolor, aut grauius præcæsit, quæ post talem hæmorrhagiam sedatur.

Ex liene & iecore sanguis copiosius effunditur, & plerumque tumor aut color in illa parte apparet. Ex liene crassus, globosus ac niger; ex iecore rubicundior, & quodammodo spumulosus. Præterea sanguis qui ab hepate fluit, magis per partem inferiorem elabitur, quam per vomitum, quia ab hepate per venas melaëraicas plerumque fluit ad intestina, & ab istis, (vt vomitum efficitur,) ascendere debet in ventriculum, si velò descendit in aluum, cum via sit procliuor. Contra qui a liene fluit, per vomitum potius quam per intestina purgatur; quia venæ a liene ad ventriculum sunt breuiores, & minus ample.

Si denique vomitus sanguinis fiat a suppressione mensium, apia suppresio ab ægrotantis relatu innotescet, & sanguinis excretio periodica erit, quæ augere conuulsuram, si nullus aliarum partium hæc fluxus conspiciatur.

Quod ad prognosim spectat, vomitus sanguinis a quacunque causa oriatur non est expers periculi, vel enim ex nimia sanguinis effusione morus substantiæ periculum imminet, vel si in ventriculo grumescat, contumpeatur, & patetæcat lipothymias, syncopen, & suffocationes parit.

Minus tamen periculosus est vomitus sanguinis ex suppressione mensium oriundus, quam si ex hepate vel liene procedat. prouocatis enim quomodocunque mensibus, curari solet, vt docet Hippocr. Aph. 34. sect. 5. his verbis: *Adhibere sanguinem emensum, mensibus erumpentibus solutus sit.* Ex his in sapè sola venarum inferiorum aperture mensura prouocantur, aut saltem paucis alijs remedijs melanaëgia adhibetur, & sic vomitus sanguinis abicitur.

Qui ex vomitu sanguinis in hydropem ascrem prolabuntur, ex eodem periculi. Testatur Dodonæus, se neminem a tali hydropse seruatum vidisse, & docet ex perientia ex quacunque sanguinis profusione hydropem excitatum, esse hereditarium, quia ex summa caloris natui dissipatione, exoritur, quæ irreparabilis est.

Ad huius affectus curationem opus est remedijs sanguinem a ventriculo reuellentibus, eiusdem intemperiem corrigendis, & aperturem venarum confirmandis ac glia anastibus. Quibus iungenda erunt, quæ partem primariè affectam respiciunt, a qua sanguis in ventriculo transmittitur, quibus præ varia eorum natura & affectu, prospiciendum erit.

Ac primum quia videtur ratio in hoc affectu maximum momentum habet: illius præcipua capita hic subiectenda sunt.

Alimenta igitur ordinaria debent esse astringentia, & emplaistica, tum etiam refrigerantia, ædè & porcelata talia: vt hordeacea, amygdalata, onisata, panatelle, gelatine, & in primis amyrum sine calce paratum, cum lacte coctum; quod ad hæmoptysim compescendam eximium est, his omnibus semper aliquid succi meli pumici, vel aceri rosæci addi poterit. His accedere poterit aqua indurata aceto intincta: mica panis aqua frigida macerata; infusa pullorum cum oxalide, portulaca, plantaginis, & granis vix immatura parata; pedes & inte flava veruicum, hædorum & vitulorum, ad portulacisim vigue decocta. In principio mensis sumatur aliquod astringens, vt malum cydonium, pomum, aut pyrum austerum sub cineribus coctum, muiæ cydoniorum, aut gelatina ex cæralis acidis, melpis, aut sorbis confecta.

Abstinere æget ab omnibus cibis acrioribus, salis, pipere, & frivolum etiam euchymis, quæ multum sanguinem generant, nisi aliquando vires collabi videantur, ad quarum refectionem illa aliquando, sed parca manu erunt exhibenda. Parcè admodum ægri nutriendi sunt, quo minus enim sanguinem generabitur, eo minor erit fluxus, & partes inanire sanguinem magis arctando, illius effluxum prohibebunt.

Potus erit per æquis, ex aqua ferrata cum pauco succo granato rum. Vinum interdiciendum est, nisi sit crassum &

austerum, quod nos tortium appellamus; & tunc etiam sebris carentia esse debet.

Act sit frigidiusculus, extra ventorum flatus, Solis & Lune radios. Somnus sit modicus, non durus. Quamvis enim in somno omnes fluxiones coherere dicantur; hæc tamen ex diuturniori caloris concentratione renouari potest. Alius sit temper libera, & omnia animi pathemata vitentur.

Dietæ in hunc modum instituta, & chirurgica, & phlebotomica remedia progrediendum est.

Ac primum venæ sectio statim celebranda est parva manu, & repetitis vicibus, vt maior fiat reuulsio. Idque ex basilica cubiti dextri, si a iecore; vel sinistri, si a liene malum exoriri videatur: vel ex vena malleoli, si ex mensium suppressione profluere.

Fiat frictions & ligaturæ partium extremarum. Clysteres detergentes inijciuntur.

Applicentur cucurbitule, nartibus, cruribus & lumbis, & hyphochondrijs, vt supra, retineantur.

Camphoræ scrupulus exhibebitur cum oxyacati, vel æq. plantag. 5. iij. Quod remedium Rondetius in consilio quodam, tanquam præstantissimum, commendat.

Oxyacati cyathus exhibebitur, si languis concretus suspicio fuerit: eo enim facile dissoluitur sanguis, & a ventriculo venis propellitur, eademque confringuntur.

Eodem oxyacato ventriculi regio foueatur subfrigidè.

Abstinere vomitu, vt vix constringatur, sequentia videntur.

Re. Album oui i. i. aque rosæ, & aceti, ana 3. i. Agitentur fortiter, deinde adde amyli 3. ii. Misce vtatur æget ex cochleari. Vel

Re. Corall. præpar. terræ sigillat. boli armenæ, lapidis hæmat. & trochisc. de carabe ana 3. i. aque plantag. & syrapi myrtinæ ana 3. iij. Misce, vtatur vt supra. Vel prædicto potuere vtatur cum iulepis. Vel

Re. Succ. plantag. 3. iij. Exhibeatur æstu frigidus, manè & sero. Testatur Galen. hoc succo nihil esse præstantius, ad quodlibet sanguinis profusum cohibendum.

Succus portulacæ, & polygoni cum saccharo sumptus ad idem est efficax.

Re. Aquæ plantag. & portulacæ ana 3. i. 4. syrapi myrtin 3. i. syrapi de papauere 3. ii. vel iij. fias prunellæ 3. i. Misce, fiat iulep. frequenter iterandum. Vel ex decocto prædictar. herbar. idem iulepis vtiliter componi poterit.

Re. Conferre rosæ antiquæ, & rad. i. mphyrtiana 3. i. cydoniati 3. i. sem. myrob. condit. n. i. trochisc. de carabe, & de terra leniana ana Drach. i. corall. præpar. & croci Martiani 3. i. Cum syrapi de ros. siccis fiat opiat. qua vtatur frequenter. Trochisci de carabe non solum astringunt, sed etiam sanguinem concretum dissoluant; ideo frequenter videntur.

Syrupus corallor. vtiliter etiam vsurpari poterit, sed multo vtilius eorum tinctura, cum succo limonum recenter parata.

Vbi magne impetu sanguis excreuit, nec prædictis remedijs illius vomitus sedatur, vt mortis periculum imminet, aut narcotica veniendum est, vel assumpta, vel per clysterem inuenta.

Exterius debet inungatur regio ventriculi ol. rosæ, & myrtino, lotis in aceto, & post methionem aspergatur pulvis coralli boli armenæ, terræ sigillatæ, vel inungatur vnguento sequenti.

Re. Succ. plantag. & centinod. ana 3. i. sem. aceti rosæ 3. i. olei emphac. 3. ii. Bulliant ad succor. consumptionem. Deinde adde sang. drac. malchices, cortic. granat. & myrtill. ana 3. i. j. caphoræ 3. i. cere rubre q. i. Fiat vnguentum.

Pro potu vtatur aqua ferrata, cum syrapi cydonior. & spir. vitr. iulcula etiam cum aqua ferrata decoquantur.

Fouentur hyphochondria & lumbi subfrigidè decocto plantag. & portulacæ, factio in oxyacato.

Manus demittantur in aquam frigidam: sic enim omnia vomitus sedatur.

Postea vnguentum refrigerans Galen. in aceto lotum distis partibus alinatur.

Celebrata sufficiuntur phlebotomia, ad causæ sobrietatem.

sem, & integram morbi solutionem, purgatio blanda & frequens instituerenda est, qua sanguis & biliosus humoribus hunc affectum producentibus repurgatur. Cuiusmodi purgationes a Medico prudenter celebrantur miranda prestant, ut nos experientia testatur. Debet autem fieri ex rhubarb. myrobalaris, tamarindis, & triphtha perlica; quæ medicamenta purgando altringunt, & humores nullo modo exagitant, ut inde non metuenda fit vomitus sanguinis concitatio. Illa autem exhiberi poterunt, vel in forma bolusum, cum syrupo myrtino, aut de rosâ fœlicis vel pocionis, cum decocto cichorii, acetosæ, portulacæ, & similibus.

Dum purgatio celebratur, quæ per tres aut quatuor dies potest continuari, parca purgantium sunt, vel peritinis horis exhiberi poterit opiatâ perdictâ, aut syrupus corall- aut aliud ex prædictis medicamentis alstringentibus & robora-

ntibus. Denique ad præcautionem rhab. pulu 3i. semel in septimana, per longum tempus exhiberi poterit; vel syrupus magistralis ad hæmorrhoides præcautionem descriptus. Tunc reliqua ferè remittit, quæ ad alius affectus curationem & præcautionem propolita sunt, in hoc etiam casu conuenire poterunt.

CAPUT IX.

De Cholera morbo.

Cholera morbus est violentissima humorum biliosorum acrimia, aut corruptorum, per vomitum, & alium excretio.

Cholera dicitur *ἡ χολή*, a bile flaua, ut docet Gal. ex sententia Gaudiorum medicorum 2. *meth. cap. 3.* cum ex bile flaua, & humore prauo hilem æmulante, supra & infra erumpente hoc malum oriat. Attamen Alexander Trallianus lib. 7. *cap. 14.* non vult hoc nomen ab humore bilioso esse deductum, quia non semper bilis exomittitur, sed etiam sæpe serosus, & pituitosus humor, sed potius *ἡ τὸν χολδαίνω*, id est ab intestinis, quæ ab antiquis *χολδαίνω* nominata sunt, quoniam ab intestinis, & inter æntes humores illi eruantur. Priorem etymologiam magis probanda est, quia non solum a Galeno sed etiam ab Hippocr. 7. *epid. textu 19.* Cello lib. 4. *cap. 11.* & Auerbach lib. 3. *acutus. cap. 19.* recipitur. Et quamvis biliosus humor non semper reiciatur, et tamen acer, mordax & corruptus, ad bilis naturam accedens.

Partem affectam alij tantum ventriculū, alij intestina, alij ventriculū, & intestina simul; verum Galeni sententiæ inherendum est, asserenti 3. *de sympt. causis cap. 3.* partem primariā affectam esse ventriculū, cuius lacusculæ expultrix vehementer irritatur, ut per utramque orificiū humorum noxium expellat; secundariū vero, gastricū, & intestina affici dubium non est.

Est igitur hic affectus symptomata facultatis expultricis læsæ, & vehementer irritatæ non potest autem dependere a retentrice debilitatæ, qui in ea humores paulatim affluunt, ut in heuenteria, & colicæ passione. Fateri tamen oportet, vehementiori fieri affectum, si retentrix debilis expultricis non resistat. Concurrit etiam ad hoc opus conuulsio læsæ, ob quam prauis humoribus in ventriculo generantur, & expultricem irritant, & hæc causæ tantum in antecedentis rationem habet. Hipp. 4. *de victus ratione in acuta textu 104.* duas proponit cholere species, viam humidam, alteram vero siccam. Humida est illa quæ hædus descripta est, quæve sola propolita debitione describitur, tanquam frequentior & magis vitata. Sicca vero longè infrequentior est, siquæ a spiritu flatuloso a ventriculo & intestinis exente, partem quæ per quas transit, mordicante. Generantur illi flatus, vel a ventriculo, vel ex igneo cibo corruptente, & in sudor conueniente; vel a cibis flatulosis & sudorosis, ut fuit cepæ, raphani & similia. Senectus aliam causam addit ab Hermeticoorum doctrina mutuatam, nempe humores laesos, & adulos circa hypochondria cumalatos, & aliter humores permutatos esse effluentes. Quanta enim (magis) spirituum copiam fides & spiritus salini cum spiritibus acris permixti suppedient, ex olei vitrioli, &

aquarum fortium cum sale tartari mixtione apparet. Tale ergo quidam etiam in corpore humano accidere & ex humoris salis atque aduli, cum alijs spiritibus commixtionem magis spirituosam copiam excitari posse incredibile non est.

Causa proxima huius affectus est humor biliosus, eructus, acidus, salis, vel putrescens in ventriculo, intestinis, hepate, liene, mesenterio, vel pancreate collectus, vel amentum praua substantia præditum, medicamentum venemens & deleterium, aut venenum allatum. Hipp. 7. *epid. text. 90.* causâ ferè omnes a quibus prauis illi humores generantur diligenter enumerat, his verbis. *Cholera, forisum & deorsum eruptiones, est summa esu carnis, potissimum fœcula crudiorum, est cibi inæstus, & ebrietas vini veteris, & dulcoris, ex granis pini, locustis, nucib. rancidis atque aliorum, & a portis, & ceparum, maxime a lactibus colli, brassicæ, & similibus crudioribus, a placenta etiam, & dulcoris, & mellis, fructibus boraginis, potissimum cucumers, & pepone. Funt autem magis effusa, quæ tunc facilius corrumpuntur, vel inæstus manent.*

Animaduersione dignum est, vnde tanta humorum copia deriuatur, quæ per vomitum, & in alium in cholera morbo reicitur. Vniū respondetur illos humores in mesenterio, & locis ei vicinis conari. Nonnunquam etiam est toto corpore confluere. Quod cum veritati consentaneum sit, dicere tamen possumus humores corruptos in ventriculo; aut partibus vicinis contentos, maligna qualitate alios quoque humores corrumpere, eoque a natura irritata ad ventriculū & intestina protrudi; quemadmodum venenata medicamenta, ut antimonium, colocythosis, elaterium, & similia a bonos humores corrumpendo, hypercatharism efficiunt.

Signa huius affectus diagnostica sunt, humoris biliosi, acidi, vel alius modis corrupti, per vomitum, & fecellum, frequens & copiosa excretio; ventriculi & intestinalium morius; nilatio & doloris sitis cum astu & anxietate; nauica v. hemes, quæ frigida nonnulli ledatur, sed calidæ statim reuertitur; pulsus non raro parvus, & inæqualis; interdum diaphoreticus, crurum & brachiorum conuulsio, lyncopæ, extremorum frigiditas, aliaque grauissima symptomata.

Causæ etiam hunc affectum producentes facili interuocari poterunt. Ac primum externe, ex ægrotum, & altitudinem telam innocentem. Si nimium æger alimenta in nimia copia, vel praua qualitate inuicta ingererit, venenum aliquod, aut vehemens medicamentum hauserit. Interne vero ex humorum quæ reuertuntur qualitate, eorumdem inus gestorum copia dignoscuntur. Præmarium esse addendum, & ventriculi vitio oriundum conijcimus, si reliquæ partes bene constitutæ sinuulquo affectu laborent. Præterea adest nauica perpetua, angustia, morius, & dolor ventriculi, materia reicitur viridis, & æruginea. Si verò in venis sit genita, febres ut plurimum maligna adest.

Prognosis huius affectus ita influenda est, ut nimium morbus dicatur acutissimus, subitam plenamque mortem inferre solitus. Si tamen assumptorum vitio oriatur, minus periculi est, quia ipse exclusus affectus plerumque soluitur.

Quæ grauiora sunt in cholera symptomata, ut lyncopæ, conuulsio, & extremorum frigiditas, eo breuiorem huiusmodi, & mortem propinquirem expectare oportet.

Hypocretes in causa cholera quidam criticas esse docuit, quæ hybris febribus adueniunt, & alio modo ex illius sententia solui non possunt, nisi ingenti bilis eruptione fuscum, & deorsum lacta; quæ tamen crises rarissime contingunt, & valde suspicte esse debent, ut potè bonæ crisis & salutatis conditiones non habentes.

Si vomitus mutatur & ledare incipiat, si faciei color cadaverosus & habitus. Hypocreticus in meliorem restituitur, saluti spes affulget.

In huius morbi curatione primum affectu incipiente, evacuatio aliquantulum permittenda est, dum prauis & corrupti humores exierint, & tum etiam interdum eorum exclusio molenda, vomitione concitata, haustu aquæ tepidæ, cum syrupo acetoso mixta, aut iulculo puli magna copia sumpto, & si non vomatur, & humorum acrimoniam saltem

eqq.

temperat. Vel dictorum humorum exclusio perficiatur phlegmâ exhibitum cum syrupo de abstinio in formam pilularum redactum; necnon clysteribus nonnullis detergendis ut prædictis.

Præterea clysteres pingues & lenientes identidem injiciendi: lacte, oil rosato, butyro infusuloto cum aqua rosata vel ex decocto pulli, carnis vitulina, vitellis ouorum quibus interdum, virgine affectu, narcotica permiscenda.

Clysteres etiam ex oxycrato plurimum conferuntur ex decocto lactuca, portulacæ, plantaginis addito aceto. (syrupo de nymphaea, & vitellis ouorum).

Interius etiam humorum acrimonia demulcenda; vt decocto portulacæ & plantaginis cum syrupo cydoniorum & de rosâ sicca, & sale prunelle. si ardor & sitis virgeat.

Ac denique vomitus cohibendus iis medicamentis tam internis, quam externis, quæ pro vomitu bilioso fuerint descripta.

Inter quæ narcotica principem locum obtinent, ac præcipue theriaca recens, quæ ad Drachm. exhibita vehementer illas euacuationes velut in momento cohibet. Idem præstat laudanum opiatum, ad gr. v. exhibitum.

Si magna sit virtus exolutio (vt lapsissime contingit) integra laudani dosis tuta non est; sed melius est gr. i. vel ij. tantum exhibere, & semel in die repetere, atque etiam bis, si res admodum virgeat. Si enim impetus humorum cohibetur, & naturæ dantur inducia, vt eos concoquere ac edomare valeat.

Cohibito vomitu, & alui fluxu remedia supra propostis, & viribus aliquantulum infusaribus cardiace remedia; ægri a periculo liberati videntur; quod non solum affantes, sed etiam medicos interdum saluti symptomata etiam post vnum aut alterum quietis & intermissionis diem, fortiora ac vehementiora reuertunt; & intermissio diem, fortiora ac vehementiora reuertunt; & intermissio diem, fortiora ac vehementiora reuertunt.

Si magna sit virtus exolutio (vt lapsissime contingit) integra laudani dosis tuta non est; sed melius est gr. i. vel ij. tantum exhibere, & semel in die repetere, atque etiam bis, si res admodum virgeat. Si enim impetus humorum cohibetur, & naturæ dantur inducia, vt eos concoquere ac edomare valeat.

Quia verò in hoc affectu vires ex maximis euacuationibus citissime concitantes earum satisfactionem diligenter incubendum est iis auxiliis, quæ in virium imbecillitatis curatione propostæ sunt.

C A P V T X.

De dolore ventriculi.

Dolor ventriculi est tristis eiusdem partis sensatio, a rebus mordentibus, aut distendentibus, sicq; continuitatem illius soluentibus excitatus.

In ventriculo autem tres partes plurimum inter se differantes consideranda sunt: orificium nempe illius superius, orificium inferius, pylorus nominatus, & reliquum illius corpus totam cauitatem constituens.

Orificium ventriculi superius exquisitissimo sensu donatum est: propter neruum insignem quem a sexta coniugatione natiuitur, & ideo dolores in eo sunt acutissimi, qui viscus nobilissimum, sibi que vacuum, cor nam rimum in consensum trahit; vnde cardiagus, & cardiogmus nominatur. Tantus enim est ille cordis cum orificio ventriculi superiori consensus, vt veteres illud orificium *cardiacum* nominauerint.

Si verò membræ ventriculi cauitatem constituentes, aut polynus dolore afficiantur, dolor ventriculi simpliciter nominatur; & interdum, colica ventriculi præcipue quando a flatibus excitatur.

Proxima huius doloris causa est solutio continui a rebus mordentibus, vel distendentibus excitata, illæ autem res mordentes, vel distendentes præcipue, & frequentiores sunt, humores, vel flatus. Quibus addi possunt lumbrici tunicas ventriculi vellicantes.

Humores acres, vel maligni, vt bilis poerracea, zingino-fa, vel atra, pituita falsa, corrupti ichores, pus ferendum, est disrupa hepatis aut thoracis vomica. in ventriculum effusum, & quicumque alij humores acrimonia prædicti, dolores in ventriculo excitare possunt.

Vapores etiam acres ex iisdem humoribus eleuati, hunc dolorem dolorem efficere consueverunt.

Flatus verò in cauitate ventriculi contenti, inflationem, & tensionem dolorificam efficiunt; sed multo magis intratunicas illius coerciti. Quia affligunt contumaciorem efficiunt: cum diffidunt inde eueriti valent.

Morbi etiam tum ipsius ventriculi tum partium vicinarum hunc dolorem parere consueverunt, vt intertemperies quolibet excedens, tum calida, tum frigida, & multo magis inflammatio; interdum verò cerebrum, aut alius tumor durus, grauem dolorem efficiens. Ac denique vulnera, & vicia eiusdem partis, vicinaria etiam partium tumorum, & inflationes ventriculum comprimens, dolorem ipsi inferre possunt.

Humores autem & flatus, ventriculi dolorem excitantes, vel in ipso ventriculo generantur, vel a toto corpore, aut quibuldam illius partibus in eum consurgunt. A toto corpore in febrilibus, vel dum corpus prauis humoribus refertum est. Ab alijs partibus vero sunt, præcipue ab hepate, liene, & cerebro; ab hepate bilis, a liene melancholica, vel atra bilis capite pituita falsa.

Ab alijs etiam causis extraneis ordinatis, & in frequentioribus talis dolor excitari potest, vt de lapidibus in ventriculo genitis narrat Schenkius lib. 3. *obs. 11. 12. 13.* Et de corio lardi sumo explicat refert Fabricius Hildanus *obs. 33. lib. 4.* cuius frustum deglutitum matrona quædam in ventriculo seruauerat per duos annos, continuè excruciatâ doloribus, idque tandem assumpto vomitorio medicamento, vomitu reiecit & liberata.

Causæ externe hunc afflictiū producentes sunt alimen-ti vel praua qualitate infecta, aut summa acrimonia prædicta, quæ per se talem dolorem inferre possunt, vel flatibus generandis idonea; vel nimia quantitate assumpta; & ita vt putrescant & acrimoniā inducant; vel calidiora plus iusto vt ex ijs copia bilis producantur. Sic etiam medicamenta fortiora, vel aciora, vel deleteria facultate prædicta, vel nimia quantitate assumpta, vel non satis correctâ, & venena exhibita hunc dolorem facili inferre possunt.

Signa diagnostica ad partem afflictiā & causam dirigenda sunt. Ac primum huius doloris orificium ventriculi superius affici ostendit, quando scilicet sub cartilagine xiphone percipitur. Sed multo certius hanc partem affici significat, & veram esse cardiagam, dolor acerbissimus ab exquisito partis sensu promanans, anxietates, & iactationes, vt æger in vno situ consistere non possit; quibus etiam sæpe accedunt lipothymia, & animi defectiones, propter cordis consensum, cuius summa est cum ventriculo sympathia, non solum propter viciniam, sed etiam propter magnam spirituum dissipationem, quæ per illos cruciatus contingit. Interdum etiam cerebrum trahitur in sympathiam, ob insignem neruum qui hinc paracule implantatur, & vapores acres, qui inde recta vi ad caput eleuantur, vnde cephalalgia, & hemetrasus, & aliquando vertigines, & epilepsia oriuntur.

In alijs verò ventriculi partibus dolores sunt quidem acerbis, sed tam grauius symptomata comitati non sunt, atque adeo dolores colicos imitantur, sicut tantum doloris differentes.

Causæ illos dolores efficientes proprijs etiam signis distinguuntur, quorum magis peripua ab excretis delinquantur. Si enim bilis vel pituita vel flatus, vel lumbrici per-

es, aut alium exornantur, facile est conijcere ab huiusmodi causis affectum dependere. At tamen etiam nulla, materiam morbosam excreto suam, signis peculiaribus bilis, aut pituitae, aut flatuum redantibus interuocere possunt; tum etiam signa lumborum interis latitantium ex proprio capite erunt delinenda. Quomodo etiam morbi peculiarietatem ventriculi ipsius, tum partium vicinarum hunc affectum producentes, ex propriis cuiusque signis innotescunt. Colligitur etiam diagnosi humorum, dolorem committentes, ex tempore mutationis, incrementi, aut cessationis doloris. Quibuldam enim ante cibum dolor exacerbat, & hoc bilis dominium significat, quae ieiunij tempore exagrat, et in ventriculo attrahitur, aut magis interdiu, & acrior euadit. Alijs iterum ab assumpto cibo dolor commouetur, quia humores crudi & mordaces, quia antea quiescentes, & ventriculi tunicis infixi, ab assumpto cibo commouentur, vel qui in fundo ventriculi haerebant, sursum attolluntur, & orificium ventriculi afficiunt. Alijs dum cibum concoquitur dolor exacerbat, quia vapores acres, & mordaces eleuantur ex materia morbosica, a calore aucto in ventriculo tempore concoctionis. Alijs quatuor aut quinque horis a palatu, quia ex concoctione deprauata cibi corrumpuntur, & corrupti ventriculum vellicant. Quibuldam denique post somnum dolor exacerbat, & ille fit a catarrho, fluente humore a cerebro per somnum, qui maiori copia cumulat, dolorem in vigilia producit. Sedatur vero interdiu dolor a cibo, quia ciborum benignitate humoris acrimonia demulcetur.

Quod ad prognosim spectat. Certum est cardiaciam reliquos ventriculi dolores esse ionge periculosiorem, propter equilibrium oris ventriculi leuiorem, & maximum illius cum partibus principibus consensum.

Maior vel minor cause morbosae praeiacta, & symptomatum vehementia maius vel minus periculum portendit. Febris continua, & acuta cum insigni ventriculi dolore, committit magnam minatur periculum, quod docuit Hippoc. *Aphor. lib. 1. sect. 5. In febribus circa ventriculi vehemens fluxus, car diognosis, malum.* Magnam enim ventriculi inflammationem vel humorum vitiosorum copiam in ventriculo contentam significat.

Ventriculi dolor a lumbicis, vel flatu oriundus, vtpote rimum minus periculosus est, quia causam morbi rebellem & parum minime affixam habet. Aliquando tamen ex lumbicis in ventriculo contentis, cumque mordentibus grauius symptomata oriuntur, ex quibus agri decerpere incipiunt. Sic etiam vbi incomperis flatus generans rebellis facta est, ac veluti habitualis, non caret periculo, quia in hydropem siccam degenerat ex Hippoc. *Aphor. lib. 1. sect. 4. In Cardialgia extenuorum frigiditas, mortem proximam praenuntiat.*

Curatio huius affectus pro causarum varietate maxime varianda est. Si enim ab alutrum partium affectibus oritur, aliorum affectuum therapia adhibenda est. Si vero in ipso ventriculo causa flabatur, dolor vel a flatu, vel ab humoribus acris, & biliosis, vel ab inflammatione, abicellu, aut vicere procedit.

Qui a flatu generatur, curandos est remedijs discutientibus, & euacuationibus flatulentiam illam materiam tum etiam proutiam, a qua flatus concitatur.

Ac primam iniiciendum est clyster emollientis & laxans, cui flatum succedat alter carminans, & discutiens, ex decocto fol. organae, calami menthi, pulegij, rutae, centaury, minoris fetuillae, nucis, dauci, cumini, & similibus. In quibus dissoluantur benedicta laxantia, ol. anethum, rutaceum, mel antholatum.

Si dolor perseveret, ex oleo rutae, aut nucum, & vini generosi, aut hippocratijs partibus aequilibus clyster eui componendus addendo aquae vitae 3.ij.

Vel pariet clyster ex vino albo, cum olei iuniperi, aut cymij, aut caryophylli, chymice extradi gunt, vin, qui misculatur, diluat libet.

Postea admodum focus sequens regionis stomachi.

* Rad. cyperis, galange, calami aromat. ana 3.4. fol. menthae, organae, pulegij, maioranae, hyssopi, saluae, ana M. 4. sem.

anisi, feniculi, carui, dauci & baccae lauri, ana 3. sem. flor. camomillae, melissae, anethi, & laendulae, ana P. 4. Contundantur, & incendantur, includanturque duobus sacculis, qui bulliant in vino generoso, deinde ex pressis, ventriculo, & toti ventri alternatim a demouantur.

At in materia minus frigida potest parari focus sequens, maxime laudatus a Forceto, vt qui reliquis remedijs non, conueniens, agrum a dolore citissime liberauerit.

* Rad. altheae 3. sem. rotulae, rubi, fol. cham. humilitatum abinthij, ana M. 4. Coquantur in aqua communi, & chamemad. 3. sem. in fine addendo vini Rhenensij opt. aquae rotulae, & acetum, ana parum. Fiat focus.

Poli tempore fiat illius ex ol. rutaceo, & anethino mixtis cum aqua vitae, quibus aliquid addatur oi saluae, aut caryophylli, chymice extradi.

Post inunctionem admodum emplastum de baccae lauri, vel eius loco cataplasma ex melle, & semine cumini.

Interim dum haec sunt, si nausea addit, excitabitur vomitus blandiori vomitorio; aut catharticum exhibebitur purum, cuiusmodi.

Purgato corpore exhibebit ol. amygdali amar. recentiter extracti, & cum vino albo mixtum: aut vinum Hipp. aqua claretta, vel aqua cinam.

Iulepus sequens ad dolorem sedandum, flatus discutientes, spiritum detergendum, & ventriculum roborandum, efficacissima est.

* Fol. abinthij vulg. centaury minor. & agrimon. ana M. 4. sem. Coquantur ad 3. v. in collat. dissolu. sacchari albi Vnc. Capiat mune per biduum.

Amarus Lusitanus valde commendat aquam de floribus chamomillae, tanquam praecipuum leniendum ventriculi, & intestinum doloribus, aurthum; cuius Vnc. 4. calide & hibeantur. Vel in aqua illius penuria, decoctum fol. chamem. vltarij poterit, maxime huiusmodi a Forceto: Qui se mercatorem quendam, ingenti stomachi dolore afflicto, cum insigni clamore, hoc solo decocto lenis exhibito curare refert. Quo epoto, emissis rubibus in sudorem solutus est, & incantamentis militis omnis dolor euasit, vt nullis alijs praefidijs opus fuerit. Ex hoc autem decocto, cum semine anethi parato, aut etiam a garico, vel radice alari; dissoluendo oxymel, & syrupum acetosum, aut rosatum solutium, parari potest vomitorium, ad initium morbi exhibendum, quod euacuando mitigare dolorem poterit.

Docet Galen, cucurbitulem ventriculo admotam illius dolores citissime resoluit inlar incantamenti. Hec tamen cautio adhibenda est, vt nihil aut parum humoris crudi in ventriculo lateat, alioqui dolorem intendit.

Vtiliter etiam admodum potest eidem parti panis recentis & siccus extrahi, per medium sectum, tum per se, tum pulperibus aromaticis conspersus.

Tandem dolore pertinaciter adherente, confugiendum est ad balneum ex decocto herbarum emollientium, & celsifacientium, quod tutissimum & efficacissimum est: flatus enim diffundendo, & per poros apertos resoluit, a dolore liberat. Quod citius efficitur, si in ipso balneo remedium aliquod discutiens aggro exhibebatur. Concurrent enim vtroque praefidio, tum interno, tum externo, opus rite peragitur.

Balneum esse debet valde calidum, vt facilius flatus discutiantur, & humores crassi colligantur.

Quod si propter dolorem vehementiam clysteres vel iniecti vel rectum nequeantur, in ipso balneo catharticum propinandum est, & in eo horam integram, aut dimidiam immorandum, donec vbi cathartica ventriculum & viscera attingat.

Aliquando autem, vbi ex doloris vehementia periculum imminet, ad narcotica est confugiendum. Quibus praudent exhibitis, admittimus non raro sublequitur effectus.

Nonnulli etiam cum purgantibus narcotica permiscunt, vt simul & dolor fedetur, & materia peccans educatur; quales est medicamentum Ebraei a Forceto laudatum, quod sic habet.

* Diaphen. 3.4. philonij Romani 3.ij. Cum aqua vel decocto chamomillae, fiat pocio.

Dolo-

Dolore prolixo subleto, in ijs qui ei sunt obnoxii, semel aut bis in mense purgatio iteretur, ut proxima statuum causa auferaturum ignem roborantia vias purpentur, qualia in iis concoctionibusque propolita sunt.

Qui vero a bile dolor excutitur, curandus est humoris peccantis evacuatione, vomitorio blando, aut cathartico medicamento; aut clysteribus frequentibus, emollientibus quidem non acerbis, aut calefacientibus.

Postmodum dempeccatur humorum acrimonia iolepis refrigerantibus & iuxta illantibus; emulsiōibus seminis, trigonorum, lactis recentis nucleo, oleo amygdalium recentivirellis ovorū & similibus.

Interim non omittantur epistæ, & aliæ roborantia, in superioribus curacionibus descripta.

Ac tandem necessitate vigente, ad narcotica coniungendum est.

Extrinfecus admoveant cataplasma ex mica panis in lacte decocta, additis virellis ovorū & croco.

Vel admoveatur panis recentior ab igne extractus, per medium sectus, & in aceto maderatus.

Vel foueatur eadem pars decoctio flos chamomillæ, violarū & nymphæ. Aut quod multo præstantius, demergatur æger in balneum aque tepidæ; id enim ad huius affectus curacionem præcipuum vim obinet.

Dolore sedato, si forte reuerti contingat, æger purgabitur bis in mense, & vicerum impetum calida congeritur victu refrigerante, & remedijs conuenientibus.

Qui vero dolor sit ab inflammatione, abscessu vel viceri, remedijs in sequenti curatiōne proponendis oppugnabitur.

C A P V T X I.

De inflammatione, abscessu & viceri ventriculi.

Licet in ventriculo, quemadmodum in omnibus alijs partibus omnia tumorum genera contingere possint, non hic tantum de inflammatione, seu phlegmone agemus, quæ frequentior est, cum reliqui tumores rarissime occurrant, & eadem methodo quæ reliquarum partium internarum tumores curantur valent.

Est igitur inflammatio ventriculi, tumor præter naturam a sanguine per venas quibus alitur a vena portæ ramis derivatus, tumore adfectu subitantiā cuius; membrana ciliosa.

Bile autem sanguis vel purus est ac lymphæ, & phlegmonem proprie dictam producit, vel cum bile putrida, aut melancholia permixtus, & phlegmonem erysipelatolam, oedematolam, aut ictericam efficit.

Causæ externæ plurimæ esse possunt; quæcunque videlicet sanguinem feruorem efficiunt, ut alimenta calidiora, & meri potio potio, vel cum ad illam partem promouere, possunt, ut contusio ventriculi, dum præteritum cibo target. Quibus addi possunt calidissima, & acerrima assumpcia, vel cantharides, sublimatum, & similia.

Signa huius affectus diagnostica sunt, ingens dolor, ardens & pungens, distendens & pulsans, & in dorsum vique potenter, tumor adfectu tactu conspicius imò & interdum visu. Scapulae dorsum trahuntur; respiratione difficilis, si cut & deglutitio, atque eructatio. Tactu nonnunquam aliquid eorum, si febris adfectu ardentissima fauissimis conuulsa symptomatis.

Si inflammatio est pura a solo sanguine oriunda, mitior aliquantulum est; si vero erysipelatolam, symptomata grauiora sunt, & spectantur febres lypyria adfectu in qua exteriora rigent, & interiora videntur, & sitis adfectu inextinguibilis, quæ etiam febres inflammationi intestinorum erysipelatolæ aduenire solet.

Huic ventriculi inflammationi plurimum affinis est inflammatio, quæ vel summam iecoris partem, quæ ventriculus obteggitur, vel incumbentem illi abdominis regionem occupat, quæ sola symptomatum vehementia & perniciæ distungitur, nempe ventriculo obfidentis inflammationi omnia seculum & periculossima præ se ferre consuevit.

Ex prædictis faciliè est prognosim elicere, & affectum valde periculosum quæsi, ut plurimum lethalem, nuntiare.

Periculosoior tamen est qui totum ventriculum ac superiorem eius partem occupat, vel qui ad erysipelatis naturam accedit.

Galenus in 3. perbreth. nauscam, & conturbationem ventris plurimam, & frequentem prauam esse docet, ostendit enim prauos humores ventriculi tunc perniciet adhaerere, & calque vellicare, & ad expulsionem irritare.

Si inflammatio non interimit, neque resolutione eurent, in abscessum degenerat, qui cognoscitur doloris & febbris remissione, tumore perseverante.

Rupto abscessu viciis relinquitur, quod puris excretionem, per vomitum & feculum recti innotescit.

At vetus viciis ventriculi non solum abscessu disrumpitur, sed etiam ab alijs causis producit, quæ hic etiam numerandæ sunt, ne quippiam in illius Theoria deficiat.

Causæ igitur viciis ventriculi sunt, vel internæ, vel externæ.

Internæ sunt humores acres in ventriculo geniti vel alimendi in eum transmissi, vel bilis illa, vel atravul pituita fallax.

Internæ causæ sunt medicamenta acris erodentia, aut venotica. Huc etiam referri possunt, vulnera ventriculi male curata, quæ in viciis degenerant, tum etiam ruptio alius viciis inferioris, quæ coalescere sufficienter non potuit, post vomitum sanguinem copiosum.

Cognoscitur viciis in ventriculo genitum præcipue ex pure quod vomitu aut fecula reijciunt. Cui signo præmissio alia addenda sunt. Primò enim percipitur in ventriculo dolor pungens cum ardore coniunctus, præcipue dum quæpiam excedente aliqua qualitate prædictum affluunt, acrescitur, salinum, vel acidum; aut intensè calidum, vel frigidum. A delit præterea deiectione appetitua, natus fortidus, febris lenta, & assidua.

Prognosis funesta vti plurimum instituenda est, nisi viciis sit periculis, & superficiem tantum occupet, ac febrem coniunctam non habet. Membrana enim ventriculi viciata, ut pote pars permixta difficillime coalescit; alimentum in ventriculo male afflicto non bene concoquitur, & ante obolotam conditionem reijciunt viciis lancinans. Præterea medicamenta partum præstant, quæ detergentia viciis curatiōne necessaria dolorosa & vitant, & exsiccantia vero, quæ alteram viciis curandiōnem indicationem implent, impediuntur continuo ab esculentis & potulentis, & chylola materia, aliisque humoribus, qui in ventriculo debili continuo refluunt.

Curatio prædictorum affectuum sigillatim instituenda est.

Ac primum inflammationis curatio inchoanda est a vena sectione pluries repetita in vtroque brachio, quantum vires terre possunt. Ac hec ob syncope, & extremorum refrigerationem, vires ab initio deiectione videantur; illa tamen virum infirmis est ab oppeffione, quæ vacuatiōnem postulat, atque ita vena sectione prohibere non debet.

Præterea apertio hamorrhoidum, si æger huic evacuationi assuetus sit, sanguinem a ventriculo valter reuelleret poterit. Quod etiam munus videri præstatum cucurbitulae scapulis, dorso, & naribus adnotat, tum siccat, tum humidat, iniectiones & ligaturæ partium extremarum, & calefactio carumdem partium, (quæ frigere plerumque solent) ad potius linteis calentibus, & inunctione olei iriti, nardini, aliorumque calidorum.

Purgantia in hoc affectu improbantur, quia humores conturbant & in partem affectam attrahunt.

Attamen Aiacuramidarum decoctum, aut cassia 3. cum aqua endive, vel sero lactis dilolutum commendat, singulis diebus vique ad septimum diem exhibitur. Quia molliendo, non trahendo expurgat, mitigat acrimoniam, & leuit dolore. Satis tamen est ab omni purgatione in principio abstinere. Septimo die apparentibus quibuscumque concoctionis & declinationis indicijs, potest etiam infusui purgatio ex rhab. 3. cum sanali rub. 3. in aqua borrag. infusa, addendo syrapi rotæ 3. vel ij. ut fortis parti herentes paulo valentius educantur.

Interini clysteres emollientes, refrigerantes, & lenientes singulis diebus sunt inijciendi, quorum formula talis esse poterit.

recenter extractæ ꝑ .i. olei rosac. & violac. ana ꝑ .j. sacchari
3. i. ꝑ .v. vitell. ouor. num. ij. Fiat clyster.

Alterantia verò & roborantia per os affumenda, eadem effic poterunt, quæ in curatione doloris ventriculi ab humore bilioso fuerunt propofita.

Peculiariter autem conferre possunt fyrupi de nymphæa & de succo portulacæ, potissimum in principio, quæ repellendis medicamenti vicem implere possunt.

Conferunt etiam non parum emulsiões iv. sem frig. mai. & sem papav. albi: dolorem enim leniunt, & calorem conterperant. Tum etiam iulepi sequentes.

¶. Aque rosar. j. ij. aque plantag. Vnc. ij. succi acetoſe, vel vini granat. Vnc. i. ſ. ſacchar. roſat. Vnc. i. Bulliant pa- rum & coletur. Capiat Vnc. ij. bis aut ter in die.

Si dolor vehementer urget, syrupus de papav. exhibi potest.

Pro potu utatur decocto hordei cum syrup. violac. & frigidum bibatur.

In progressu morbi, alia medicamenta praedictis erunt permiscenda, quae resolutionem adiuvant. In hunc finem saltem sequentes praescribi poterunt.

℞ Syrup nymphææ, de pomis, & de succo portulacæ, ana Vnc-ij. frupi de abinthio pontico Vnc-ß. aquar. lactucæ, acetosæ, & tuniculi, ana Vnc-ss. pulueri relectar. diamarg. frig. 3. i. Fiat rulep. pro iustofibus, bis in die sumendus.

His addere licet opiatas instaurantes, narcotica & similia. Quae omnia varianda erunt multis modis, pro Medici iudicio & prudentia.

Terebinthina cum aqua abfinthij lota, ſi bis, terve detur,
vel reſoluſit, vel maturat ventriculi apoſtoma.

Exterius vero fofus fequens in principio admouetur
ꝛ. Rad. acetof. Vnc. ij. fol. end-cachori & malua. ana M.
i. femis ladue & papau. albi ana 3. ij. fantali albi & rubri
ana 3. ſ. florum violar. & nymphaez ana P. i. Fiat decoctio,
addendo aceti roſaci parum, fouetur regio ventriculi te-
tide.

* Vel ex aquis stillatitjs end.lactac.& nymphæe,cum tan-
gi aceti,& pulv.trialentali, idem locus parari poterit.

Post fofus inungatur eadem pars oleo rofac. & violac. in-
uicem permixtis, vel vnguento fequenti.

℞. Ol. rofac. Vnc. i.ß ol. violac. acetj rofac. succi hieracij;
ana Vnc.ß. Brilliant ad fuccor. confumptionem, deinde ad-
de (antali rubri 3. i rolar. rubrar. 3.ß. spice & camphorę, ana
3.ß. cerez albe q. f. Fiat vnguentum.

Cataplasmata in principio non consentiunt, quia partem pondere suo gravant, & calorem retinendo inflammationem augent.

In declinatione si contingat, & tumor resolutione finaliter, quod maxime est exoptandum; fetus resoluens admodum poterit in hunc modum compositus.

Rad. iros Florum Vnc. a. fol. menthe, maiorana, pugil. & abfinthij pontici, ana M. i. feminis fenugreci & anifi, ana 3. i. granor. hermes 3. i. florum Echados, anthos, chamomilla, ana P. i. Fiat decoctio, addendo sub finem pa- rum vini albi qua foveatur regio ventriculi.

Poli forum inungatur eadem pars oleo abinthii, nucleis
mosch. nardio, & similibus, quibus addita cera, & pulv.
grecos Florent. aut cinam. potest condicnari unguentum.
Emplastrum verò, & cataplasma, quia pondere grauant
coram, hic non conueniunt.

⁹ Si verò tumor ad supurationem tendere videatur, fo-

neatur pars decoctio florum chamæm. & rofar. rubr. Postea cataplasma sequens admoveatur.

Rad.altheae Vnc.ii.fol.branch.vrfine.& rofar.ana M.
i. Coquantur optimè & contendantur ; deinde adde farinæ
hordelii.cum.lim.fennegræci.& pulv.chamem. ana Vnc.tera.
fanali albi & rubri.ana 3.ii.Cum oleo rofar.& chamem.
& nasca pinguedine gallinæ fiat cataplasma læpè renouan-
dum.

Rupto abscessu, vicus detergetur hydromelite in potu
exhibito. Cui addenda est interdum manna thuris, Galen.
praecepto. Vel aqua hordei cum saccharo rosaceo in prin-
cipio & confirmatione calidiori exhibenda.

Vltres confutatorum sunt abuntesque ac ab ea causa fructu
 alia sua in ventrem acerbis et erodentibus; velum
 vltum, canalicis, et tenuis rebus, genum fuerit, con
 affringens nuda, herbis refrigerantibus et modice
 affringens alterata, hordeta, amygdalata, cum faccha
 ro rosacea, lac recens multum cum facchato, et an
 tilla meliac tandem qua beatum tunc etiam aqua frigida
 potu ordinario, aut in qua boli armenae, vel terra figu
 rata frustula maduerint. Cui addi poterit vinum rubrum
 asulferum si perexigua caliditas in parte asperuerit.

Deinde apozema sequens in vřum reuocetur.

℞. Hord. integri ꝑ. i. fol. scabioſe, agrimon. pimpinell. & capill. ven. ana ꝑ. i. ſem. melon. Drach. ii. roſar. rubr. ſicc. ꝑ. i. Fiat decoctio ad ꝑ. i. In qua diſſolue ſyrup. de roſis ſiccis ꝑ. i. iii. Fiat ſpozema ꝑo. iv. doſibus frequenter iterandis.

Ad internatiam vlcera plurimam confert decoctum rad.chinæ, vbi febris abfuerit, per vnginti aut plures dies fumptum, leuiter iudores prouocando, fic enim vlcus paulatim exficcat. Si verò tabes, & corporis confumpcio timeatur, decoquatur prædicta radix in iulculo pulli gallinæ, vel columbini, cum herbis prædictis & hordeo mundato.

In disturniori vicere potus aquar. mineralium vitriolarum, ferratarum, aut aluminolarum, quales sunt nostre Meinenes, per mensem integrum sumptæ, non parum conferunt.

Toto morbi decursa; ad ventriculum ab illius re-
purgandum, conferunt leuiora cathartica; vt rhab. tamarindi.
myrobal. syr. rosac. & catholicum, semel in septimana
vsurpata.

Denique ad vlcis occlasionem sequentia vlturpari poterunt.

Re Boli armene, terra figillata, corall rubr. lapid. haer. in
aqua rotat. diligenter locor ana Drach. i. lang. dracon. gum-
mi arabici & tragacanth ana Drach. figill. papai. albi le-
uiter contusi & adh. hypocist. thuris & sarcocolla, ana 3 i.
facchari rotac. Vnc. i. Fiat puluis, cuius capiat Drach. i. cum
aqua plantag. aut confusa rotat. singulis diebus.

Vel ex eodem pulvere potest fieri opiata, cum conferas
syruphyti et rosar. syr. cydonior. aut myrrino exceptis.
Vt etiam possunt fieri trochisci ex eodem pulvere, cum
mucilage sem. piylli, aut tragacanthæ. Quibus omnibus
vicissim vti aeger poterit, ne eandem remedij tedio affici-
atur.

Exterius verò, ad viceris occlusionem, admoventi poterit regionis ventriculi focus ex decocto abinthii, rolar. malicor. gallar. balsamiflor. myrrillot. thuris. masticas ac similibus. Ac deinde pars eadem inungenda erit vnguento albugineo, vel emplastro albugineo eidem admoventi.

P R A X E O S M E D I C A E

LIBER DECIMVS.

DE AFFECTIBVS INTESTINORVM.

P R A E F A T I O.



Summa totius nutritionis perfectio in tribus his operationibus consistit: primis scilicet ingerere, augere, & coecere. Prima qua appetitum respicit, & secunda qua concoctionem ad ventriculum pertinet. Tertia vero respectu intestina, quorum exitum moderatur, & secundum naturam digerit pericula, maximam toti corpori commodum offere solet. Contra vero si deficiat, ut in varijs alius fluxibus contingit maxima inde incommoda, & gravissimi morbi emergunt. Peritres autem perfluum retentionis in intestinis doctores talia, quosdam & haemorrhoidales inferre solet. At densius patredans in intestinis generis, non solum alius fluxus praedictus, sed etiam lumbricos, generare solent. Vt haec omnia si gesserim exponatur, & numerus hic tractatus undecim comprehenditur capitulis. Quorum primum erit de dolore colico. Secundum de fluxu. Tertium de asphyxia alui. Quartum de Lentitia asphyxia colica. Quintum de diarrha. Sextum de dysenteria. Septimum de tenesmo. Octavum de fluxu hepatico. Nuncius de lumbricis. Decimum de fluxu haemorrhoidali. Proteriam de haemorrhoidum dolore.

C A P V T P R I M V M.

De dolore Colico.

Colicus dolor nomen desumit a parte affecta quae est colon intellum; quod longum & anfractuosum, est, & totius ferè corporis excrementis recipiendis destinatum, illa autem excrementa diutius retenta, dolores humilimos parere consueverunt.

Causae igitur colicis doloris sunt materię excrementitiae quatuor, quae solutionem continuam dixerunt, pungendo, aut erodendo efficere possunt, caecae sunt, sicut vel humores.

Fluxus ex erodentibus, aut frigida ventriculi, vel intestinorum intemperie geniti, si commodè non excludantur, propter induratas faeces, aut alias causas intestina obstruunt insignia copia in intestinis exsternibus, colo peritum cumulantur, de dolorem intellum effluunt.

Humores enim crassi, frigidi, & pilulosis tunicis intestinorum in partem, eiusmodi dolores efficere possunt tum mordendo, si acrimonia quadam aut fastidie praediti sunt tum reingertando partem, quae consequenter concoctas nem & diuisionem patitur, quemadmodum Galenus de fe ipso narrat, se dolorem colicorum acerbissimum pati se, pinguiam vitream adu frigida interiore, tum densa, quae fluxus emittendo, qui facile ex timore trafio, valento ac lento a calore debili glauatur.

Humores denique biliosi & acres tum etiam melancholici & acidi, pungendo ac vellicando intestina, humilimos dolores efficiunt. In huius autem casuum actione dubitatur licet, quomodo colicus ille dolorius exacerbationis & remissionis habeat, eadem materia in intestinis remanente, quae quando patens est, dissolutionem aut morum interire debet. Cui dubio respondemus materias illas & tetidum quietas permanere, & nullum tunc temporis aut exiguum dolorem efficere, interdum vero commoveri, & excitari per lomentationes varias, quae in humoribus contingunt, ut lolet fieri in epilepsia, hysterica affectibus, & febrium accessibus.

Aduertendum autem est diligenter, sicut illos aut humores non tantum in causate intestinorum residere, tunc

enim facile excludantur, ab euacuantibus, detergentibus, & carminantibus medicamentis: sed plerumque ipsis intestinorum tunicis infixos esse unde fit ut non tam facile inde auelli possint, morborumque longiorem ac contumaciorum efficiant, qui praedictis remedijs non ita facile oppugnari valeat. Sic humores crassi, pituitosi, aut melancholici, per venas intestinorum in eorum substantiam sensim ac paulatim confluunt, & non statim dolorem efficiunt, donec sufficienti copia cumulati naturam irritant ad expulsiorem, sicque commoti & exagitati dolorem inferunt vel sicut ex ea eleuantur, qui inter intestina tunicas conclusi, eas distendunt, ac duellunt; faciemque exitum non inuenientes dolorem inferunt diuturnum. Bilis etiam eodem modo per venas intestinorum, in eorum tunicas effusa, sique umbitudo, dolores acerrimos excitat, qui diuturni ac contumaces esse consueverunt, quia difficillimo negotio ab intestinorum substantia auelli potest.

Est alia colicæ biliosae species, quae in paralyfim degenerat, veteribus parum nota, quae fit ab humore bilioso, non in colon intellum, quemadmodum praedicta, sed in abdominis membranas repente effuso, qui eo transferatur a cylide fellea, vel mesenterio in crifi diuisionem febrium, aut a vehementi spasmu, aliaque causa & eterna quando propter obstructiones ad vias communes effundi non potest, sed motu praeposito ad praedictas abdominis membranas repente excutitur. Hinc dolor exoritur crudelissimus colicum mutatus, qui tamen neque clysteribus neque lomentis neque alijs remedijs cedat, sed ad plures mecos perleuat, unde corpus contabescit: sed ad plures mecos ex intermittendis typum praeterea molliat, interdumque & apius continuus, ac lentus, ac tandem doloribus remittentibus paralyfim succedit, huiusmodi illo per abdominis membranas in ipsius dorfi lesione repente. Illa autem paralyfis partes inferiores magis occupat: Crura vero & tibiae plerumque dolent, in paucis reliquuntur omnia, non bile scilicet ob leuitatem superiora petente, imo vero intestina in ipsius cerebrum intrant, & convulsionones epilepticas produunt, unde mors viximum lolet, laccedere.

Dantur & alij colicis doloris causae, sicut in his frequentissimum casum in intestinis geniti, de lumbrici glomati intestina obstruunt compressio, intestinorum a tumores vicinis partium vel angustia ab inflammatione, alijque turpibus intestinorum vel constrictio, constrictio a stultitia, constrictio a via est ad hanc quoniam interdu etiam in morbo quae colicis doloris, ut in comata ac maligna, & asphyxia praesentem efficit, sicut Platerus de quanta refectione in poliothymia in Italia exoritur multis Romanorum prouincia intestina. Quiaque quae corporis intestina obstruendo, vel dilata, morbo colicum dolorem efficere valent; ut calidi in intestinis geniti nuclei cerarum magna copia ingebit, calidus durus, & similia. Sic refert Platerus praefectum quandam colicis doloribus diu vexatum conuulsionibusque laborantem, post clysterum vsum caesi indurati magnam copiam per alium remisse, qui per longum tempus in intestinis haerant, propterea quod antequam agrotaret, eo se immoderat repleuerat.

Causae externae sunt aeris constitutio frigidiore alium compressio & costringens, ac indurans, vel calidior, a qua laes etiam induratur, & in enim a calore omnis humiditas exsurgit, vias ciborum, & potum hominibus temperamento minus conuenientium fructu crudorum, & si putorum, ciborum crassorum, & concocto difficilior, quies

nimia, & lœmnia immodicus; exercitia intempestiva, immoderata Venus, aliaque causæ externæ, quæ ventriculi contractionem inverteunt possunt.

Diagnosî huius affectus in genere satis facilis est. In primis enim dolor acerbissimus est, adco vt si leuior fuerit, verè colicus appellari non debeat, ex sententia Gal: *lib. 6. de diet. aff. 2. a.* Deinde dolor ille interdu vagus est, & modo in hæc, modo in illa parte grauiusve getitur, nunc hepatis, nunc lentis, nunc ventriculi, nunc renum regionem occupat, nunc supra, nunc infra umbilicum apparet; ac sæpiè in sinistro latere plus vrgeat, ex eo quod in ea parte sit quædam angustia, primum a Bujohno observata. Quando enim excrementa in superiori ac capacissima coli parte, in globos magnos, prout capacitatis illius ferebat, indurata, a statu versus illam partem inagna cum violentia pelluntur, fit vt non nisi magno cum dolore permeare possint, quo symptoma mate dolor colicus cum splenico, & nephritico sæpè confunditur; ab ijsque satis difficiili negotio reliquorum signorum comparatione distinguitur. Interdum verò dolor natus situs est, in vna parte stabilius, cerebro perior anti, aut palio infuso similis. Ductio in contentum ventriculo, vomitus sæpè excutitur, quo interdum pituitosa, interdum biliola, & portacea, & argenteola reijciuntur. Post cibum dolor interdum r. quia repletus ventriculus comprimitur intestina. Alius vlturum alitudo est, vt nihil per alium agrotantes, ne fiatam quidem emetere possint. Si verò aliquid excrementi, vel sponte vel arte, id maiori parte flatulentum est, ac bouino sicut ori simile, & quæ super natans, vt pote maiori parte pituitosum, quia pituita per alium excreta, aquæ & serolis excrementis dilargitur confluunt. Tanta autem interdum est supradicta alui atrox, vt leuante dolore, & medicamentis purgantibus exhibitis, etiam vehementiora, nihil operentur.

Signa casparum in hunc modum distinguenda sunt. Si dolor fiat a pituita, non adeo vehementer est, nisi flatuum habeat adhaerentem, qui ex ijs locis in quibus continetur nequeat erumpere; tunc enim grauiusq. dolores sunt; mor do in vna parte, ac si illa cerebro, vel infuso palo perfectorum modo in pluribus illi fluxus ille deaguetur. Agri a calidis iuuantur, a frigidis laeduntur. Præcedit victus ratio generandæ pituitæ idonea, vna crudior, & albidior interdum est, non tamen perpetuo, quod iuniores & inexpectos medicos fallere solet, interdum enim etiam in colica pituitosa ac flatulenta, vna flaua ac rubicunda apparere consuevit, propter vehementem dolorem, qui spiritus & humores in venis & arteriis contentos accendit & inflammat. Quod sapienter annotauit Auicenna. *lib. 13. lib. 3. tract. 3. cap. 11. Non oportet, inquit, ut dicatur aliquis, per id quod fuerit fit de ijs, & inflammascent, & rubendum aquæ, vt viximus, quod ex toto sit calida, illud namque est commune omnibus.*

Si a flatibus colicus dolor oritur, dolor tenuius adest, & quædam ventris inflatio: agri flatuum multitudinem, & ventris rugitur percipiunt; a flatuum excitatione maximè leuantur, victus ratio flatibus generandis idonea præcedit, vt aquæ frigida potio intempestiva, vius frequens leguminum, rapum, castanearum, oleorum, fructuum, & similibus. Et si flatus in cauitatibus intestinorum continetur, dolor vagus est, neque in vno loco consistit, & per intervalla remouetur. Si vero intra eorum tunicas coarceatur, dolor fixus est, quia flatus locum mutare non possunt; con tam is & pertinax, quia flatus exitum non inueniunt.

Si colicus dolor ab humore acri & biliolo oritur; ille acerbissimus est, vellicans, & pungitiusculus adest, sitis, & plerumque febris, vnaqueque lunc valde biliola. A calidis alimentis & medicamentis malum intenditur, frigidis vero leuatur. Materie biliolæ excretionem malum imminuit; & victus ratio bili generandæ idonea præcedit.

Dolores reliquorum partium in imo ventre contentarum a colico dolore proprijs signis facile distinguuntur, excepto dolore nephritico, cuius signa cum doloris colici signis tantum habent affinitatem, vt Medicos non raro etiam peritissimos, & in eorum distinctione errare contingat. Quod ipsi Galeno contingit, qui vt ipse fatetur, *de locis affectis cap. 5.* colico dolore verarum, le nephritico labore, & lapide alteri, præterquam impactio arbitrabatur, donec hu-

more per alium excreto, & isode sedato dolore, colicum esse animaduerit. Sequentes tamen signis hi duo affectus satis dilucide inuenient distingui possunt, si accurate examinentur.

Primo, dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad talem exporitur, secundum longitudinem veteris Colicis vero vagus est, & cinguli instar medium ventris affligit.

Secundo, a paulo colicus dolor augetur, ob compressionem intestini, quæ sit a ventriculo repleto; nephriticus vero nequaquam augetur, sed potius imminuitur, quia aliquid humoris alimentarij ad renes transiit, quod dolorem aliquantulum demaleat.

Tertio, in colico dolore vomitus est vehementior, & alius lætiôr; quia colon, intestinum fundo ventriculi adiacet, & intestina distenta, aut vehementer irritata sese confringunt, vt inimicum expellant. Vtrumque tamen, symptoma vtrique affectui commune est, vt eorum intensio, & tenuisio difficiili habeat diagnosim, quandoquidem dolor nephriticus intensior maiorem vomitum, & alui aditionem maiorem, efficere potest, quam dolor colicus remissionem.

Quarto in colico dolore, ab excretionibus per alium, & per vomitum maius leuamen emergit, quam in nephritico.

Quinto, in dolore nephritico, vna primum clara; & tenuis, & transcolata, postea aliquid subidit, & tandem areolæ, aut lapilli excreuantur. At in colicis vrinæ ab initio crassiores exstant.

Quo ad prognosin spectat, colicus dolor vlturimum, si leuior ac remissus sit, neque admodum diuturnus, neque consistens in vna parte, fed vagus, & labilis, per vices intermetat, & alium omnino non confringit; curabilis est, & periculo vacat. Si vero dolores sint acerbissimi, in vno loco firmiter fixi, nunquam intermetantur; nihil per alium excrementum, vrgeant vigilas, ac demum sequatur vomitus, singulus, delirium, refrigeratio extremitatum, & sudores frigidi, lethalis est effectus.

Colicus dolor contumax a materia acri, & biliola præsertim oriandus, in alios affectus colique grauiissimos læpè degenerat, arthritidem, epilepsiam, & frequentius paralyfim.

Colicus dolor epidemicus, contagiosus, & pestilens, lethalis vlturimum esse consuevit.

Curatio huius affectus pro varietate causarum varia insituenda est.

Ac primam flatulentia, & pituitosa eadem curatio adhibenda est; quæ incipit a clystere emolliente, qui postmodum succedat carminans & discutiens, (qualis in dolore ventriculi a simili causa descriptus est.) qui reiterandus est eadem die bis, ter, quater, donec dolor dispareat. Si tamen vno aut altero clystere alius non deponat, vt interdum contingit, acri suppositorio sollicitanda est. In vno autem prædictorum clystere vltur vltur adducit aquæ benedictæ. Vel colocyndidis 3*ss.* vel iij. in clystere emolliente & carminante decoquantur.

Si clysteres dolorem non soluant, in ijs pertinaciter insistentum non est, sed satius est leui aliquo medicamento vti. Obseruatum est, cum æger quidam triginta clysteres sine fructu accepisset; alium Medicum manu 3*ss.* cum oilam ydæ dale. Vncij in infuso gallinæ pingui exhibuit, & ægrum a dolore liberasse. In dolore tamen qui fit a pituita crassa, fortiori medicamenta exhibenda.

Postea vero fomenta inunctiones, balnea, emplastra, aliaque remedia conuenient, que in doloris ventriculi curatione supra propofita sunt. Quibus addentes sunt specifica nonnulla, huius affectui maxime proficua.

Intestina lapi vno albo abluantur, postea in furno excutiantur in vase terreo, donec in puluere reduci queant. Huius pulueris capiet æger Drachm. cum vino albo: subito dolorem fedat.

Aqua simplex bulliat, eique seruienti adde ol. commun. quartam partem, & grana aliquot piperti crassiusculæ triti; capiet æger cochlear. vel iij. calide; quantum ferre poterit. Sedatur dolor terre in momento.

Æ. oes opt. Drach. laudani opiat; gr. iv. diagridij gr. vi. Mille formetur pilule vi. deaurate, capiet æger hora comoda; dolorem post horam sedant, & postea humores

noxios euacuant. His etiam pilulis subtilius potest medicamentum ex diaphenico, & philonilo Romano, in colore ventriculi descriptum Hippoc. lib. de internis affectib. proponit purgationem ex pilulis & meconio.

Olei amygd. dulc. aur amara recentis Vnc. vi. exhibita dolorem demulcent, & materiam intestini adherentem, per inferiora deturbant.

Cum sequentibus etiam mixtum vitilifinum est.

3. Ol. amygd. dulc. vel aliterius in papaueribus, Vnc. jv. vini generosi Vnc. alcm. lytrupi de papau Vnc. i. Misce, fiat potio.

Cum manna etiam exhibitum e' cum amygd. dulcium in iusculo pingui, ut supra dictum est, dolorem lenit, & materiam precentem euacuat.

Semen amicos puluerat, cum vino exhibit, ad 3. i. virgente dolore cum subito siliit, & secunda exhibitione morbum plerumque auferit, admodum simul cataplasma ex terebinth. 3. sup. illopi exceptum, & sinapiatum pipenis, & sang. drach. subtilis pulverat, an. 3. i.

Galbanum Paracelsi humori discutiendo idoneum est, si totus venter eo illinatur. Illius descriptio a Cratone talis proponitur.

3. Gummi elemi, hederæ, galbani, ol. laurini, ana partes æquales. Diluuntur in arena per retortam; feruntur scotum, primum aqua; deinde ol. clarum; tertio ol. crassum instillemus, quo inspiramus utendum est.

3. Calami aromati, Vnc. i. galangæ 3. ij. fluxuædinis exterioris corticis arantior. Vnc. jv. cum, electis, sem. anisi & feniculi, ana Drach. ij. cumini Drach. vi. buccar. uniperi recent. Vnc. 3. baccar. lauri Drach. vi. Puluerentur subtilissimè, & inlindantur in vini maluat. opt. 3. vi. Stern. in infusione in loco calido per v. dies. Postea dissoluantur in balneo Marie. Dosis Vnc. præmissis euacuationibus.

Ventri admoventur vitæter gummi caragæ, & tacha-guacæ, & prius cucurbitula magna vmbilico affigatur.

Eiusdem emplastræ prædictæ ventri non admoventur, omittenda tamen non est cucurbitula vmbilico admoda, quæ ipso Galeno teste, dolorem a flatibus excitatum discutit instil in cantemeri.

Si affectus sit diuturnior, decoctio gusiaci per multos dies continuato scilicet curari poterit, purgando per interualla, & clysteres frequenter inpingendo. As si colicus dolor sit, a pituita vitæra, decoquat gualicum cum vino, quæmadmodum viropauit Amat. Lulir cum ipsi inaccessu, fuerit, 33. ENY. 1.

Sedato dolore apozema pituitam euacuans præscribendum est, quo reliquæ omnes educantur: vel eius loco decoctum galli veteris cum incidentibus attenuantibus, & catharticus compositum. Vel iulepus efficacissimus in colica ventriculi descriptus.

Colica biliosa curatur clysteribus emollientibus, & acrimoniæ humorum temperantibus.

Foueat venter decocto emolliente & anodyno, aut, quod melius erit, paretur semicupium ex eodem decocto.

Conuenit etiam cataplasma in humo ventri ex farina hordei, & sem. lini coctis in ol. chamæmel.

Tum etiam epithemâ refrigerans hepatis regioni admodum, in hunc modum compositum.

3. Succ. endiuæ, & cichorii, ana lb. 3. succi lactucæ, & pecti rosæ, ana Vnc. ij. Misce, fiat epi. hema.

Iulepi exhibentur ex aqua papau. rhead. lactucæ, endiuæ, acetosæ, cum lytrup. violac. de pomis, & de limonibus.

Si doloris atrocitas urgeat, ad narcotica confugiendum erit.

Mitigato aliquantulum dolore, expressio rhæi in aqua cichorii, cum lytrupo rosaceo exhibenda erit, & frequenter repetenda, donec tota humorum saburra euacuata fuerit.

Si purgatio ista benignior morbo eradicando non sufficiat, confugiendum est ad mercurium dulcem, qui aliquoties exhibitus cum purgantibus diagrydiar, curationem absoluit. Quibus illo speculum est diagrydiar, solus exhibetur mercurius dulcis, in pilulam efformatus, cum confusio rosarum; superhæta infusione lennæ, & rhæad. data manna, & lytrupo rosacea.

Potica vi. inter viurpantur aquæ acidulæ, & virolatæ,

Seniente dolore ad balneum, & laudanum confugiendum est, cui aliquando purgantia misceri poterunt, sed maiori dosi, quia eorum vi retunditur a laudano.

Galbanum Paracelsi, quamvis calidum ad humorem discutendum idoneum est, totus venter eo illinatur. Illius descriptio supra propoita est.

Phlebotomia in hac colicæ specie aliquando conuenit, cum metus est, ne caloris vehementia, sanguis incalcat, febrisque generetur. Si verò febres adierint, itatim celebranda est.

Virgente admodum siti, aqua frigida exhibenda est, docente Gal. lib. 13. meth. cap. 7. Eiusque vii testatur Amat. Lulir. se talem dolorem subitò, incantamenti instil, sustulisse. Eadem se vium scilicet tum sumpta, tum admoda, testatur Sepaluis duabus hyltorijs, lib. 7. animaduersionum prædictarum descriptus.

Ad colici doloris, qui in paralytism degenerat, curationem, alio varijs clysteribus soluta, primisque vijs cathartico spectis, deminuat æger in balneo tepidum, ex decocto emollientium paratum, bis, quater, quinque in die v. acrimonia humorum temperetur, ac pori membranarum aperiantur. Postea de cathartico acconimodato humor ille purgetur. Deinde repetatur balneum. Idque alteris diebus facendum, si vires ægri forte quant; donec et purgatis humoribus, & sedato dolore, æger in tuto sit.

Interim clysteres, continui, præstari, qui ex lacte parantur, ad dolorem demulcendum vitilifini sunt, quibus cassio, ol. violacæ, & liborum admisceri poterunt.

Venter ol. chamæmel anethini, amygd. dulc. lilior. cum butyro frequenter inungatur.

His feri lactis & acidiarum vlos tandem subiciatur.

Ac demulce, affectu vi longitudinæ abeunte, & quæ in melancholicæ hypochondriacæ curatione relata sunt, hæc aptari poterunt.

Neque omittenda est, ab ipso morbi initio, phlebotomia, & purgatio præmittenda, ac sæpe iteranda, si sanguis præua qualitate motus appareat, aut si dolor rheumatici particeps esse videatur.

Denique omnia remedia, quæ in colica biliosa propoita sunt, hæc etiam aptari poterunt. Quibus non conferentibus, nonnulli Medici confugunt ad potionem sequentem, quam licet fœdiorum, & delicatorum hominum ore indignam exhibent, & dolorem itatim mitigare affirmant.

3. Stercoris equini 3. i. Minutum diuidatur, & inlindatur in h. i. aquæ papau. rhead. in aqua spiritus vini gutta vii. vel x. dissoluitur fuerint. Colentur cum ex pressione leni, & diuidantur in tres doses satis amplas, unendæ horis exacerbationis doloris.

Si verò affectus in paralytism degeneret, lenienda est spina dorsii & partes paralyticæ, ballamo resolvente, & nervos roborante, modo febris aduerit. Si enim adsit, lana succida oleo, aut vnguento dirigente imbuta, partibus paralyticis alligatur, cauendo diligenter frigus, quo humor partibus impingitur, illiusque effectus impletur.

Galbanetini Paracelsi hic præcipue confert, si partibus prædictis, tum etiam vmbilico admoventur.

C A P V T I I

De Iacis affectib.

ILEUS seu Iliaca passio nomen accipit, ut nonnulli volunt, ab illo intestino, quod ut plurimum in hoc affectu laborat, quamvis alia tenuia intestina, imò & interdum crassæ eodem tentari valeant. Vel potius ab *ελεος*, quod circumuolui & circumcingi significat. Idèò Latini, voluulus seu conuoluulus nominatur, quod in eo intestina manifestè conuoluta, & motu præpostero ad superiora moueri videntur. *Χυλολις* etiam nominatur, quod intestina manum admoventi chorda quali tenæ, & veluti conuolutæ speciem representent. Barbari *mesenteria* vocant: quod miserabile sit malum, & ut plurimum lethale. atque adeo miseracione diuina opus habet.

Est autè iliacus affectus, motus intestinorum præposterus & inuersus, in quo alius omnino constituta est, & quæ pœ-

inf.

feriora deici debeant, ad ventriculum feruntur, ac per vomitum reijciuntur.

Notum est intestina motum habere naturalem, quo chylos & faeces ad inferiora sensim propelluntur, qui peristaltici nominantur. Hic motus fit per fibras orbiculares, & transversas intestina contrahentes, & comparatur motui limborum terrestrium, qui partes corporis succedisse movent. Invenitur autem motus ille aliquando a causis preternaturalibus; ut intestinorum fibrae, quae a superioribus versus inferiora contrahi debent, ad superiora contrahantur, & quaecumque in intestinis continentur, non versus album, sed versus ventriculum protrudantur: & tunc affectio iliaca generatur. Simile quidpiam in vomitu animadversimus; dum enim fibrae oesophagi a parte superiore versus ventriculum se contrahunt, de glugitio ciborum cum vero inuerso hoc agendi ordine a parte inferiore, versus superiora se contrahunt, vomitus excitatur. Fit autem motus iste peristalticus inuersus a facultate intestinorum expultrice vehementer irritata, quae quando materiam superfluum & excrementitiam per inferiora deturbare non potest, eas ad superiora violento motu propellit. Adeo autem violentus interdum est ille motus, ut non solum chylos, & flatuos & humores externatur, immo verò et quae per anum immutantur, ut clysteres, & suppositoria rapiantur, ac vomitu reijciantur. Sic refert Matthaeus de Gradi puellam quandam annos natam duodecim aëo laborantem, postquam per triiduum non solum faeces, sed etiam cum illis insectis vomitu reiecit, tandem suppositorium oblongum in anum immisit, post breue tempus vomitu excreuit. Cuius verò deinde suppositorium aliud filo ad coxam alligaretur, illud illarum disrupto filo, sursum ascendit ad ventriculum, idque agra cum parte filii appensi euomit. Erit cum terio suppositorium aliud quatuor filis fortibus alligetur, illud etiam paulo post, ruptis filis, per os cum parte florum, eiecitum fuit. Huius cum medicus iuberet, ut mater aliud suppositorium immitteret, tanta violentia sursum attractum ius, ut mater ne rursum reperiret, aliud extrahere coacta fuerit. Similes quaedam historiae apud autores reperiuntur, quibus breuitatis causa omittimus.

Illa autem facultas expultrix intestinorum irritatio a pluribus causis dependet, quarum praecipue & frequentiores ad obstruccionem referuntur. Quaecumque igitur intestina vehementer obstruere possint, ut nihil per inferiora descendere valeat, hunc affectum producere solent. Postquam enim, ut alias diu enia est, faeces & alia superfluitates per viam ordinariam excurrere sine fuso frustrantur, & excludendi necessitati satisfacere tentant, alia via aggreditur, & motu praeposito, ad superiora propellit, ut superfluitates illae per vomitum reijciantur.

Causae autem obstruentes sunt faeces induratae ac retentae; flatus crassi magna copia in intestinis collecti, & saepe vehementer diffidentes; inflammatio aliquae tumores magni, qui cauitatem internam intestini penitus occludunt; & intestini circumsolutio, ac complicatio; ut veluti nodus in ipso fiat: quae quidem complicatio, & contractio intestinorum in hernia saepe contingit, tum etiam in colico dolore, cui saepe succedit ileos, quae intestina flatibus distenta le conuolunt, ut interdum veluti nodum efficiunt.

Causae verò infrequenter intestinorum facultatem expultricem ita irritantes, ut motum suum inuertere cogantur, sunt exacerationes insignes aut humores acerrimi intestina vellantes. Quando enim faeces aut alii humores, ad inferiora delabentes partem viceratam attingunt, eam acriter vellant: ut ea irritata rem noxiam praeterfluere non patiantur, sed sursum impetu propellat, quem motum relictus intestina per sympathiam irritata sequuntur, donec materia noxia ad ventriculum feratur, qui motum eundem sequens, praedicto facultatis expultrix ministerio, foras per vomitum expellit.

Signa iliaci affectus alia communia sunt cum dolore colico, alia verò propria.

Communia sunt dolor in regione abdominis, inflatio, & diffusio ventris, alius attractio, alius salisidius, nauica, vomitus inquietudo, ipsiandi, & mingendi quaedam difficultas. Propria verò, & peculiaria passioni iliace sunt, dolor ac-

tissimus, & sensillimus, inflatio, & diffusio vehemens, tumor in hypogastrio eminens & durus, omnimodo alui supprelio, ut nihil per inferiora descendat. Progredeute malo vomitus accedit enormis, primum bilis, pituitae, & chylosae materiae, ac denique hircoris; vel potius materiae hircori similis, cibalis nempe corruptae ac fetidae, & rarsillae enim faeces reijciuntur; breui motus iussu laevis trigidus, copiosus, extremorum refrigeratio, cordis tremor, inquietudo, & animi deliquium.

Galenus comment. Aph. 30, sect. 7. asserit proprium & inseparabile huius affectus signum esse, nihil per inferiora descendere. Hippocr. tamen contrarium asserere videtur 3. Epid. sect. 2, textu 7 ubi illa mulieris voluissile quae apud Tifaniam habitabat, dicens. Desinere tunc, cras, perire. Cui difficultati respondendum est, desinere qualem emitti posse in principio morbo, sed faecibus contentis infra intestinum affectum, quae a natura vel arte excludi possunt per inferiora, antequam omnia intestina in consensum trahantur, & propriam naturalemque facultatem amittant. Postquam vero morbus confirmatus est, & motus omnium intestinorum peristalticus omnino inuersus, nihil amplius per inferiora emittitur.

Signa causarum in hunc modum se habent. Si ileos ab inflammatione fiat, (quod vltimum contingit,) morbus est acutissimus, qui velociter ad statum propter, febri adiecta est intentia, dolor vehementissimus, vomitus biliosus, & pituitosus citissime apparent; quos breui faciem resedit consequitur, & reliqua signa exitialia praepropia.

Si a faecibus induratis, alui contractio praecedit per plures dies perseverans, & in principio non est dolor, qui postea accedit morbus longius protrahitur, nec adeo est acutus, ut in inflammatione, nec dolor adeo vehemens, neque adeo intentia feberrima interdum nulla.

Si a flatibus vel pituita iliaci effectus generetur, ille dolor colico vel plurimum succedit, & praecedent signa huius doloris a pituita vel flatibus oriundis superiori capite praepropia.

Quod ad prognosin spectat, Ileos omnis periculosus est, sed vnus alio longe periculosior. Ille igitur est magis exitialis, cui vomitus superuenit primum quidem materiae biliosae, vel pituitosae, postmodum vero faeculentae; ex his nullum saluari alicui Gal. de loc. affect. cap. 2. Docet tamen, ex perentia nonnullis eadem, quando ex faciem retentione vel hernia intestinali affectus exoritur.

Quibus in stranguria ileos superuenit, intra septem dies moriuntur, nisi febre superueniente copiosius vna fluxerit. Hippocr. Aph. 4, sect. 6. Si stranguria fiat ab humoribus crassis & pituitosis, quae etiam magna copia in intestinis, & in venis redundent, superueniente febre possunt illi concoqui, liquari, & attenuari, ac per vias externas, unde solutio dei contingit. Licet Gal. in comment. huius Aphorismi se ignorare asserat, quae Hippocrates dixit in hoc Aphorismo, ea quae ratione & experientia confirmari non possit.

Si sympromata remittantur, & medicamentis, vel alimentis ore assumpta, per inferiora descendant, salus expectanda est.

Curatio huius affectus iuxta causam varietatem varianda est. Ac primum fit a feecibus induratis, vel a crassa & viciosa pituita obstruente intestinorum dependeat, emollientia, & relaxantia remedia interna, & externa erunt viis praepropia.

Primo igitur inuicantur clysteres, ex decocto altheae, maluae, violariae, chamomillae, & meliloti, cum sem. lini & fenugr. vel ex ol. communi solo ad ita. in quo butyri tertia pars dissolui poterat; vel ex decocto intestinorum & omentum veruocis, in quo dissoluitur baryrum, mel, & sal. gemmeum. Quibus decoctis, si status aduerum, ut puerumque solent, carminantia, & discutientia addere conuenit.

Has denum clysteribus emollientia aliquantisper materiae purgantia prius medocria, mox paulo vehementiora erunt adnascenda, ac tandem ad vehementissima transeundum erit.

Interim iomenta & linimenta emollientia toti veniri etiam admoenda, diuque continuanda. omentum castrati in aqua feruente calcietur, ventri applicandum, & quod vtilius multo, balnea emollientia adnascenda, quae erunt efficaciora, si ex oleo solo componantur.

Interius verò exhiberi poterit oleum amygd. dulc. vel solum, vel cum vino albo permixtum. Quibus, si dolor valde virgeat, syr. de papav. addi poterit, ut in colici doloris curatione dictum est.

Ac denique, si vehemens dolor & flatuum copia aduerit, reliqua remedia in colici doloris curatione propofita virgari poterunt. Non omiffis purgationibus, quæ opportune infultute mali causam euacuant.

Quæ fit ab inflammatione intestinorum, curanda esse venæ fectione frequenter repetita. si vires fuerint, tum in brachio, tum in pede cucurbitularum admotione inguinibus cum fectione. Clysteres etiam emollientes, & refrigerantes injiciendi erunt in hunc modum compositi.

℞. Rad. alth. Vnc. ij. fol. malu. violatæ. ana M. i. sem. cucurbit. Vnc. ss. sem. lini & psyllij. ana Draach. flor. nymphæ & rosar. ana ℥. i. dior. chamæm. P. i. Fiat decoctio in cuius it. i. dissolv. ol. rosar. Vnc. ij. cassiæ recent. extrah. Vnc. i. Fiat clyster. In progressu verò addendum erit ol. violac. & chamæmelinum.

Predicta emollientia in oxycrato decoqui debent.

Vel lac recent. multum cum pauco saccharo & albumine oui vel mucilag. seminis psyllij Vnc. i. ad dolorem leniendum injici poterit.

Vel parari potest clyster ex lacte amygdal. dulcium, aut cremore hordei, ex illius mundati decocto expresso, addendo butyri recentis & sacchari parum.

Ex oxycrato simplicij parari potest enema, & singulis diebus injici, quod ad inflammationem intestinorum cobibendam plurimum valet.

Inunctiones fiant ex oleo violato, amygd. dulc. & chamæmel. additis mucilag. sem. lini. ionogr. cydonior. xungij. gallinæ. anatis & butyri recentis.

Tum etiam fotus admoveantur ex decocto simplicium, pro enemate lapsa descriptorum.

Tum ex oxycrato simplicij fotus in principio parari poterunt. In progressu verò predicta simplicia in oxycrato decoquantur.

Necnon cataplasma, ex clementia eiusdem decocti, vel ex farina hordei, ionogr. lini cum butyro, xungij. oleis predictis compositum.

Ac denique balneum aque dulcis tepidum, huic etiam affectui erit convenientissimum, in quo emollientia & refrigerantia bulliant.

Post venæ fectionem exhibetur olei amygd. dulc. Vnc. ij. ad dolorem leniendum, & si dolor valde virgeat, ad narcotica veniendum erit.

Si vomitus non adit, promouendus est haustu aque tepide cum ol. violaceo, eo nemine purgantur superiora, & humores reuelluntur ad partem affectam defluentes. In toto morbi decursu propinandi sunt iulepi & emulsiones, in ventriculi inflammatione propofite.

Potus sit aqua hordei. Et in principio morbi, abstinere aget ab omni alimento per viginti quatuor horas, ut materia morbo portio ablumatur, postea iulculum pulli exhibetur. Summa enim cura tractandus est hic affectus, quia vltimum lethali est.

Præcipuum autem curationis negotium in abstinentia versatur; idque exemplo a vltimis intestinorum decoctis; qui enim ita vulnerati sunt, penè fame consiciuntur per 40 dies. Hoc igitur affectu laborantes per 4 aut 5 dies tria tantum cochlearia iulculi fumant singulis diebus, ut vomitus impediatur, qui morbum grauat auger. Adde quod alimentum exhibitum nullum solarium avertit agrotanti, non enim in nutritionem sed, sed plane corruptum, & chylus a ventriculo in intestina probans, cum excrementis retentis permiscetur, & vomitionem auget.

In potu paulo maior potest esse libertas, quia facili transit ad hepar, & illius materia morbo expugnanda idonea esse potest, si oxieratur ex hibetur valde temperatum, & in parua quantitate.

Denique a circumuolutione intestinorum quandoque, contingit iliacus affectus, quod rarissimum est; vel a flatibus productur intestina contorquentibus, vel ab hernia, quæ enterocoele nominatur.

Qui a flatibus exoritur, ipsi remedijs curatur, quæ ad

flatulentiam colicam præscripta sunt. Si verò omnisbus his remedijs satis diu viurpatis, alius non aperitur, sed omnia assumpta per vomitum excernantur, ut spes salutis in angusto posita sit; extremum remedium erit virgandum, quod proponit. Hipp. 3. de morbis, ut, scilicet, folijs fabris ana adaperetur; & eo flatu in ventrem immittatur. Postmodum clyster emolliens cum trochiscis albandal injiciatur, ut feces educantur. Valet hoc remedium, non solum ad ileum ex contorfione intestinorum; sed etiam ad tum qui fit ex obstruptione graui, & contumacia distanzendo enim intestina obstruptionem soluit. Amat. Lusit. curat. vlt. cent. 2. testatur se iliacum desperationem hoc remedio curasse; tum etiam Epiphanius Ferdinandus, in hisseria suis Medicis, lib. 74. refert, Neapoli filium Ioannis Altimari, Medici expertissimi, qui ex colica & ilia peribat, hoc eodem remedio ab ore laucibus fuisse reuocatur. Verum Aurelianus hoc remedijs genus improbat, ex eo quod ventus a folle immixtus frigidityte sua multum ledere potest. Atramem, hoc incommodum euitare facili est, si iuxta ignem folijs aere impleatur.

Aliud præterea remedium valde inusitatum à Paræo proponitur, quæ multos ab ileo desperatione imminente morte, liberatos esse refert, & hauius scilicet, argenti viui in aqua sola libris tribus. Pondere enim suo intestinum velut vincum expedit, & euoluit. præduraque & obstruens feces deorim devertat. Quod remedium ab alijs etiam, authoribus non paucis approbatur, qui & illud innoxie sumi posse testantur.

Verum tanta mercurij quantitas valde pertimescenda esse frigidityte sua calorem natium exiguat, & sanguinem in venis coagulat. In casu igitur desperato satius est minorem quantitatem exhibere. Quidam exhibent Vnc. ij. in ouo sorbilibi, & iterandum essent, si prima exhibitio non succedat. Vnius tamen vncie exhibitionem sufficere successum habuisse in obseruationibus nostris videre est.

Quando verò iliacus affectus procedit à prolapsu intestinorum in ferotum, tota cura eo dirigenda est, ut illa in suum locum reponantur. Quod fiet blanda & prudenti manu Chirurgi, locum affectum diu antea fouendo decocto emolliente, & oleis relaxantibus, clysteribus etiam emollientibus, carminantibusque frequenter iniectis; agrum ita collocando, ut caput sit valde deorsum, crura verò alata. Imo nonnulli, cum pedibus suspenderentur, citissime liberati sunt.

Si hernia sit cum inflammatione intestini, fotus ex aqua frigida curatur. Si flatus intestinum distendant, fotus ex ipiritu vini distillantur. Vtiusque curationis exempla vide in obseruationibus nostris.

C A P V T I I I

De affriccione alui.

PER affriccionem alui non intelligimus omnimodam, alui suppressionem, quia nihil per inferiora decurrit, qualis in ileo contingit. Sed tantum pigram, & tardam alui deiectionem, quæ feces, & cibi reliquæ raro nec pro alimentorum ratione excurrunt. In hac feces necessarii indurantur, quia diutius retentæ caloris ita continenter effricantur, ab illis; nonnulli tamen semper exigunt per venas mesaraicas, non modo ad tenuia, sed etiam ad crassa intestina propagatas. Est symptomata leuitas & expleticis immixtus vel retrorsus auditus. Causa tamen est multorum morborum; idcirco & creta & retenta in numero lex rerum non naturalium recentiorum, quæ debent naturæ legem non feruantes, infinitos morbos producere. Sicque alius alitudo vapores ad caput mittit, catarrhos alioque cerebri affectus producit, ventriculi coctionem aliarumque partium actiones perturbat.

Causæ huius symptomatis quamplurimæ sunt. Ac primum secum durities & scititas non solum est effectus affriccionis alui, ut supra dictum est, sed etiam causa efficiens, quia feces indurata difficiliter excurrunt, & facultatem expultricem non irritant. Duræ autem sunt, & sicciore, præcipue & frequentius, ab hepatis calore excedente, qui omnem humiditatem in intestinis contentam autem potenter attrahit, & feces sicciore relinquit. Cui rei etiam plurimum confert.

conferre potest mollescentior, perfrictum equitatio, ex cremoribus paucitas ex media proveniens; vel dum acrimonia non habent, quæ intestina velicare possit quod ex cibis frigidioribus contingit, & quando bilis liqua ad intestina non descendit, ut in scitro fieri videmus. Ac denique ex morbi intestinorum non patet, hanc alui contractio nem, efficere possunt, ut frigida, & sicca intemperies, tumores, obstructions, aut flupor, & paralysia aliquis non pauci.

Signa diagnostica ex causarum diagnosi dependunt, quæ ex propriis iombus haurienda. Calidæ enim hepatis intemperiei signa ex proprio capite delumenda sunt. Tumores etiam, alijsque intestinorum morbi propriam habent diagnosis. Ad denique causæ externæ, ut ciborum paucitas, vel frigiditas, equitatio, & similia ex egrocantis relatione innoscent.

Quod ad prognosim spectat, contractio alui magis vel minus periculosa est, pro maiori vel minori gravitate causarum. Si enim ab inflammatione, aut alio intestinorum tumore fiat, valde periculosa est. Ab alijs vero causis oriunda minus habet periculum. Continuas, & diuturnas plerumque esse solet, quando a facibus induratis producitur: inde enim facile colici dolores excitantur, quæ semel sedati, frequenter tamen recurrunt, cum propter novam lacum exsiccationem: tum quia licet purgantibus aliis sufficienter soluta videatur, & excrementa liquida permixta evacuata sint: non pauca tamen interdum excrementa solida, & dura in intestinis subsistunt, quæ novos dolores pariunt, & non nisi clysteribus quamplurimis, etiam post purgationem interdictis aucti possunt.

Curatio huius affectus a causarum suarum sublacione dependet, quæ ex proprijs capitis delumenda est. Cum tamen illa curatio, repleurum longa esse consuevit: præcipue quando a calida hepatis intemperie, aut sicca intestinorum dependet, & interim alui strictia grauiissima patitur incommodatæ illius correctionis eorum, inuocabendum est. Quod hæc in vniuersum remedia emollientibus, simulque alui excretionem promouentibus in lequente modo.

℞. Rad. arith. & litior an. Vnc. i. sol. malu. aith. mercurial. violar. brach. v. rinas. M. Item lini & lenigr. an. 3. f. sem. anisi 3. j. 6. prunor. dulc. par. 3. flor. chamæ. aeth. & mellor. an. 1. j. Coquantur ad 1/2. in colatura dissolue olei liliorum, & sem. lini an. Vnc. i. butyri recentis Vnc. j. 6. catholici duplici & diaphan. simplan. Drach. vi. Fiat clyster, mucie edes quoties opus fuerit.

Interdum verò loco huius clysteris vtatur sequenti.

℞. Decocti intestinorum verucis 3. j. butyri recentis Vnc. i. cassie recentet ex tracta, catholici optimi, vel diaphan. simplan. Vnc. 6. sacchari rubri Vnc. 4. Fiat clyster.

Parari etiam potest bis, aut ter in mensie clyster ex oleo communi solo ad 1/2.

Admittendum tamen est alijs remedijs alium molliere, quandoquidem frequenter clysmatum viâ naturæ seignior euadit, & tandem alui stricti nunquam alium depouere, nisi clysteribus irritata.

In hoc finem pruna dulcia, vel poma cocta cum saccharo, quandoquidem interdum erunt alimenda, vt docet Gal. 3. de a. m. facili. cap. 31. Alioqui si immediatè ante prandium alium inquit, nihil operantur. Vel iulculum pulli, aut commune in quo fort. borrag. betæ, & poma aliquot bulliant, vel ol. amygd. dulc. recentet extracti suæ igne coctæ. Cum syrupo capill. ven. pari quantitate, vel cocti. 1/2. rupt. lequantur.

℞. Mucilaginis sem. psylli, & cydoniorum cum aqua malus extract. 1/2. 6. sacchari albi 1/2. 4. Fiat syrups secundum artem.

Vt pruna melius operentur, vium lymphatum ante & post eorum assumptionem hauriendum est, ita tamen vt tota illius quantitas dimidium cyathum non excedat. Idem præstabit butyrum recens per horam ante prandium assumptionem, magnitudine nucis masculæ superbiendo vium lymphatum.

Semel in septimana vtatur aliquo ex sequentibus.

℞. Crais recentet. extract. 3. 4. cremor. tart. 3. 4. Cum saccharo fiat bolus.

℞. Manis granat. 3. 6. Caput manè cum iulculo. Vel

℞. Olei amygdal. dulc. & manis granat. ana 3. j. dissoluantur cum iulculo, & capiat manè duabus horis ante prandium.

℞. Pulpe facili 3. 4. pulpa tamarind. & manis granat. an. 3. 4. sol. lenis tenuiss. puluerat. 3. 6. cremor. tart. 3. 4. Cum syrupo rosato solutis fiat opus, capiat 3. 6. vel Vnc. 4.

Vel in decocto prunorum manis 2. 6. vel 3. 4. dissoluantur capiat hora vna ante prandium, quemadmodum prædicta omnia per horam ante prandium exhibenda sunt, sic enim melius operantur.

Pulsana ex cichor. agrimon. & acetola in aquam feruere incipientem coniecta est, per noctem inuisis, pro potu ordinario viuipata, vel sola, vel cum vino permixta, alium liberat feruat.

Iulculum frequens alium certissime laxat, eamque diebus continenter bibi laxationem reliquit.

℞. Fol. betæ & mercurialis, an. M. i. Coquantur in iulculo communi, quod capiat per horam ante prandium.

Vel parari potest conserua rosar. laxans, ex rufis palidis non explicatis, periculis vnguib. cum manna & saccharo ana partibus æqualibus, cuius dosis Vnc. 4.

Denique balneum, vel leuicupulum frequens ex decocto herbarum emollientium paratu mad partes omnes naturales humectandas, & alium emolliendum, erit vtilissimum.

C A P V T I V.

De lenteria, & colica passione.

Lenteria est species alui fluxus, in quo cibis non immutatus sed prout fuerat assumptus, per alium celeriter exemitur. In colica verò passiones alimenta cruda, & imperfectè cocta per alium reiciuntur. Vnde patet duos istos affectus differre inter se tantum, per magis & minus, vt lenteria ad actionem abolitam, colica passio ad immixtam referatur. Licet autem cibi vel omnino inconcocti, vel imperfectè cocti reiciantur, non ideo tamen ad conceptionem leiam hi affectus referantur: sed potius retentio: hem. Maie enim vel nullo modo concoquantur, quia citò deiciuntur, nec fatus diu in ventriculo retinentur, vt concoctionem lubre valeant. Hinc etiam colligitur in hoc affectu licet inter morbos intestinorum referatur ventriculorum valde affici, & plerumque magis quam intestina, vnde Gal. 6. de lenti affect. cap. 2. lenteriam, & colicam passionem tum ventriculi, cum intestinorum vitio fieri scribit.

Causæ lenterie, & colicæ affectionis plurimæ proponuntur ab auctoribus, quas omnes ad tria capita referre possumus, frigidam ventriculi, & intestinorum intemperiem, eandem partium irritationem, & tumorem, facilius retenticiæ debilitatem, & graui ac lethali morbo.

Frigida intemperies magnam crudorum, pituitosorum, ac glucinosorum humorum copiam generat, quæ ventriculi rugas obducit & oblini, vt alimenta in eo retineri nequeant. Vnde mirari licet Galenus 6. Aphorism. in veteres Græcos inuachi, qui hunc affectum lenteriam, & lenteriam intestinorum idcirco nominant, quod interna ventriculi superficies leuior reddita cibos non retineat, quandoquidem ventriculus non tam alperitæ tunicæ interioris, quam innata lege contrahendæ proprietate, cibos tandem contrahit, donec concocto peracta sit. Vt enim concedendum est præcipue retentionis, causam esse facultatem; sic etiam lateri oportet, facultatem illam intrinsecam indigere certo modo dispositis, sine quibus actionem exercere non poterat, quæ adeo cum tunica ventriculi interior alperita & rugosa lecta sit, vt alimenta in ventriculo commode reuincantur, licet est dubium quin illa alperitas tollatur, cum rugæ implentur humore pituitoso: retentio ventriculi læuatur, ita vt alimenta incocta præterlabantur. Simile quidpiam in vtero contingit, cuius tunica interior alpera, & rugosa lecta est, vt semen facilius retineat ad conceptionem, at si lenis & glucinosa humoribus obducatur, non retinet, & semen statim effluit, vnde sterilitas non paucis mulieribus inducitur.

Aduertendum tamen, si quis hanc nomenclaturam rigide examinare voluerit, ventriculi lenitatem potius quam lenteriam.

intestinelorum hoc symptoma effe notandum; neque tamen omnes illius species comprehendere, sed illam tantum quæ ab humore pituitoso producitur, quæ cum omnium frequentissima sit, reliquarum denominatio ab ea sumi potest.

Irregularis ventriculi, & inferiorum ab acris humoribus fit, qui vellicando partes illas ad excretionem prae-
turban excitantque admodum in vesica contingit, quae ab
vinæ acrimonia vellicata frequenter multum laborat,
unde stranguria exoritur. Gal. 6. observat, dicit ab illis humoribus
acris fieri in ventriculo ulceram diffinitionem, eo
modo quo asphix in ore pectorum fieri consuevit.

Sonima facitibus reterentibus inbecillitas in grauius & lethalioribus morbis saepe lenteriam efficit; vt videre est frequentius in d; lenteriaque natura succumbente, & lenteriam degenerat, ventriculo in confensum intestinum grauer ante morum pertracto; cuiusque facultatibus omnino deoritur. Sic etiam in febribus malignis, alia illius lenteriae passim est coniuncta; in qua iulcula itarum fere ac assumpta sunt, per alium incocta reijciuntur. Idem potest contingere a rebus venenatis aut noxiolissima qualitate praeditis assumptis.

Et si alia causa a praedictis diuersa quae peculiariter colligantur passionem ethere consequuntur, nempe obstructions venarum melaenarum quae trahunt impedunt chylolae materiam ad hepaticum necesse est illam per alium reijci. Verum vt hae affectio fiat oportet omnes venas melaenatas aut maiorem illarum partem obtuli; quemadmodum contingit in pueris itrodisagnotum incientium glandulis innumeras repletum inuenitur. a quibus venae melaenatae praeceduntur et hic continuo alius fluxu chylolo & epiloco laborant; multum comedunt & in dies emaciuntur; donec in marasmum incidunt.

lactis & Cellis multique eorum sequaces aliam etiam
lintericem causam prop. munitur per leuem & demem
catricem interitibus ex magna d'interia relictam; ob quam
venarum oculis obstruuntur alimenti distributio impeditur,
& ita fit linteria. Quae tamen causa non videtur
recipienda quandoquid oportet vitare interitula iuile vicerata,
& in us pojmodum genant catricem omnes propemo-
dem venas melaricas oculisclique quod rationi nitid modo
videtur contentaneum: siquidem impossibile est vitare
interitula vicerata: quia homo intereat.

Signa horum lymphosarcomatum graviora ex antedictis patent. Si enim alimenta cruda, & imbecuta celeriter, & frequenter per inferiora descendunt, enteritiam significant. Si vero aliquantulum immutata, & nonnulla chyli (speciem adepta) affluent, celaciam affectionem offendunt.

Signa vero caularum inde colliguntur: si enteritis aut celiacis, pusio fiat a frigida inemperie, & pituitosis humoresbus, tunc acidi apparent: pituitosa excrementa per alium deiectionum, sitis, & doloris carentia; & si a capris siliat pituita, quod infrequenter contingit, deiectiones sunt spumose, maior est fluxus post somnum, & aliæ causæ caput alterantes, aliæque catarrhi signa apparent.

Si vero ab irritatione proueniat, mordicatio interdum in
ventreulo lentitur, color in hypochondrijs percipitur, litis
interdum vget, & deiectiones acres, ac bilioſæ apparent.

Quod ad prognosim attinet, enteritis, & colicis passio
diu perseverans periculosa est, quia toti corpori nutrimentum
lubripit, unde atrophia, vel hydrops consequitur. Et si
gravisimos acutissimolque morbos conlequatur, lethalis
vel plurimum esse conficitur.

Cura: si laus affectus pro varietate causarum illum, productum varianda est. Ac primum qui ab humore putuloso producit, is remedijs curari poterit, quae pro inappetentia frigida causa oriunda fuerunt propofitaci- genda ea quae maiori attingendi vi praedita sunt, et ventris fluxum possint compellere.

Incipiendum itaque erit a purgatione humoris peccantis medicamentis compositis ex aloe, rhab. & myrobalanis.

Clyctes hic parum conueniunt, cum ventriculus præcipue labore; nisi immoderata deiectione a cedere, ut in alijs alij fluxibus eos requirat. Tumque altitantes & roborantes esse debent, iuxta formulas, quæ in sequentibus curationibus proponuntur.

Post sufficientem purgationem roborandus venterculus opiatis, pulueribus, lotibus, emplastris, aliisque remedijs di-
 & loco propofitis in quibus, vt dictum est, astringentia
 non erunt omittenda, vt malleus, cortex citri, sem. cori-
 andri, dillioris, torum entilis, corallia &c.

Ac præter illa remedia conuenient opiatæ sequens ab Amato Lusitano maxime commendanda, quæ fenem quedam histericum, post multa alia remedia frustra usurpata, liberatum esse testatur.

¶ Conseruaz rolanquaz ꝑ. vj. theridē opt. ꝑ. vj. minz cydonor. quantum latis. fiat opiata, de qua capiat ꝑ. β. manē, nili superbibendo.

Quia fit humore bilioso cutanda erit ijs remedijs, quae ad vomitum biliosum fuerunt propofita: tum etiam ijs, quae in diarrhoea biliofa curatione defcibentur.

Quae e reutricis facultatis imbecillitate oritur, in gravi & lethali, aut faltem valde periculoso morbo, curanda est, primum fomentis ventriculi regioni admotis, in hunc modum compositis.

Rad. bitture, tormentillæ, & corticis citri succi, an. Vñdij foliæ menthe plantag. & abimbij pontici, an. M. linacis monachii caryophylli & ciuriani, an. 5. melleo rubra. P. iij. Concoquantur, & incidantur, ut artis est. Ique impleantur duo facculi interperforati, necentur in x. ius paribus aque ferratæ, & vini cocti alteriusque, vel in vino folio. i. magnæ lebris non aduocetur, & applicentur regioni ventriculi calidè vutrum.

Pollica adinqueatur vnguentum, vel emplastrum aliquod
ex his, quæ pro vomitu bilioso propofita funt.

Totus venter etiam oleis, vel linimentis astringentibus
innungatur.

Clytters iniciantur ex iaculo communi, in quo rosa rubra bullierint, dissoluendo saccharum & vitellos ouorum etiam interdum confectionem de hyacintho, si ager sit valde debilis.

Ac venique per os, roborantia, & astringentia, in curatione vomitus propolisa exhiberi poterunt, etiam ea quae pro alui fluxu proponuntur.

In celiaca passione alimenta cruda & imperfecte concocta per alium resurgunt. Differt tantum a tremetia secundum magis & minus, iisdemque remedia profligantur.

Si vero dominio chylois fit et deiectiones non a vitiis ventriculi sed ab obstructione venarum melancolicarum dependent, hoc afficitur, quod satis frequens est, et ianicibus praecipue laetariis. Ideoque remediis obstructions aperientibus cutandis est, et hepatis roborantibus; quia illius imbecillitas saepe coniungitur, non autem alitringentibus; nihil aliud luxur species libebatur. Horum materia in hepatis alitrum curantibus locis desinitur.

C A P V T V.

De Diarrhoea.

Diatheza est illa species alui fluxus, qua humores excrementitii sine sanguine aut alimento, & sine exulceratione intesticorum excernuntur.

Hiæc conditionibus diarrhœ propriè dicta ab aliis aliis fluxibus speciebz distinguntur, quia in hæmorrhœa, & colicâ passivâ alimentum incoquitur, aut feni confectum excipit in dysenteria & teneismo, sanguis cum humoribus excrementis permiscetur, quemadmodum in fluxu hepatico, & hæmorrhoidali sanguinolento excretio reperitur.

Plurima sunt illius differentie, quæ ut dilucidè exponantur, tria capita referendæ sunt, quorum primum respicit materiam quæ exornatur: secundum continet locum à quo: & la materia profuit: tertium verò modum & causam effluens: quæ alius fluxum producit.

Ratione materiae quae excernitur, alii fluxus diuiditur in bilium, pituitosum, melancholicum, & scrofum.

Ratione loci a quo humores profluunt; vel alui fluxus
provenit a toto corpore, vel ab aliqua parte peculiari, puta
cerebro, ventriculo, intestinis, hepate, chene, mesenterio, ut
ro, aliisque partibus.

Tertio ratione modi, & causæ efficientis, alia diarrhoea
est

est critica, alia symptomatica; alia a causa interna vt intemperie, vel prava alia partium internarum diarrheis; vel externa, vt medicamento, aut veneno assumpto.

Iste autem diarrhoeis simplices vltimum non reputantur, sed in vno eodemque alui fluxu saepe complacantur. Sic alui fluxus biliosus alii ab hepate, vel toto corpore; pituitosus a cerebro; ventriculosus, melancholicus a liene, ferrosus a toto corpore.

Complicantur etiam vt plurimum iste diarrhoeis ex varia humorum miscellanea, vt non raro bilis, & pituita, & ferrosus humor, eodem alui fluxu excrentur.

Eit & alia diarrhoeis species a praedictis diarrheis, quae *rotatoria*, seu colliquisia nominatur, orta ex colligatione subitantis corporis, & humorum ab intente calida partium solidarum intemperie, qualis contingit periculum in vicerum inflammationibus, febre ardente intensiori, hectica, & pestilentiis quibus materia pinguis, quasi adipis, vel oleo perfusa, per alium deicitur.

Denique ad alui fluxus species refertur fluxus, stercorofusus, quo magna copia stercoris liquidi frequenter eicitur, qui ex cibi excrementis in ventriculo corruptis, aut magna excrementorum copia in intestinis cumalata, exoritur.

Diagnosin in genere manifesta est, quando scilicet per alium deicitur excrementa liquidiora, & frequentiora, quam instituto naturae conueniat.

Signa etiam differentiarum quae peruntur a materia, conspicua sunt; cum sensibus puscat vtrius excrementa biliosa, pituitosa, melancholica vel ferrosa deiciantur.

Partes vero mandantes difficultatem habent diagnosim, tamen ita distinguende sunt.

Si a toto corpore humores profusantur, adeit, vel praecedit febris continua, vel alius alius totius corporis affectus, vt cachexia, leucoplegmatia, vel inglorium ciborum, & potuum copia praecedat, & nullus partus peculiaris affectus insinuetur.

Si autem critica sit illa diarrhoea, fit cum bonis agri rebus, ac facili tolerantia, & inde morbo soluto; aut maxima alius immunitio consequatur.

Contingit etiam interdum critica diarrhoea sine vilo morbo in corporibus nonnullis prauos humores cumulare solitis, quae cum robore insigni praedita sint, prauos illos humores dum copia luxuriant, & naturam grauius, per interualla deponunt; vt docuit Galen. *7. meth. cap. 1. de quo etiam alui fluxus Celsus mentionem facit lib. 4. cap. 19. his verbis: vno die fluere alium, & alio pro valetudine est; atque etiam pluribus si febris absit, intra septimum diem conualescit, purgatur enim corpus, & quod tunc in laetum erat, totius est effunditur.*

Inter criticos etiam referri debet alui fluxus ferrosus qui sine vilo morbo praecedente contingit hominibus, quibus serum in venis plurimum redundat, idque potissimum, tempore autumnali, cum videlicet frigus autumnus nocturnum, vel matutinum, apertos ab aestate praegressa cutis & partium externarum meatus offendens, ac propterea sefe altius in corpus insinans ferrosos humores in venis contentos exprimit ad superiora, quod deinde natura a nimia illorum copia grauius, per venas neclariac ad intestina protrudit, quousque lapidinis aciditas eos per vires exernit, vnde contingit multos in principio autumnus, & primis illis frigidibus, magnam vtriusque copiam per aliquot dies profundere.

Si vero diarrhoea symptomatica sit magnum facit laborem agrotanti, vires plurimum deicit, & morbus cui superuenit, iugiter, vel saepe in eodem statu persequatur.

Iste autem fluxus symptomaticus in febribus ardentibus & malignis saepe fit colliquisia, & inde dignoscitur, quod excrementa oleo aut pinguedine perfusa, appareant; tunc corpus confestim emaciatur, & absumitur, ac ferre in marasmodum perducitur.

Si a cerebro diarrhoea oritur, deiectiones sunt spumosa, vt docuit Hippoc. *aph. 30. sect. 7.* Quod tamen non est perpetuum; quandoquidem pituita posita a cerebro deiectione citra statum perniciem, quae vnicuique spumosa causaturum etiam humoribus genitum aut contentum in

ventriculo & intestinis, possunt permisceri statim, vnde excrementa erunt spumosa, licet non a capite profusant. Ideo huic signo alia adiungenda sunt, nempe si cerebrum aliquo affectu manifeste laboret, vt catarrho, surditate, & lethargo, apoplexia, aut insignis saltem capitis grauitas, aut dolor, aut somnolentia appareat, & noctu magis alui fluxus quam alio tempore fatigat.

Si a ventriculi vicio procedat, alui fluxus signa aduertant quae vitiantur ventriculi coctionem demonstrare solent; verbi gratia, si alimenta corruptantur, recipiant quae acrem & nidorolam qualitatem, ex qua deinde irritata, facilius expultrix, cogatur ac per alium expellere, tumque frigida calidae ventriculi intemperie aduertant. Sic etiam si cruda, & pituitosa deiciantur, & tarda, ac immutata fuerit alimentorum coactio; & a frigida intemperie intestini ventriculi coctionem arguimus, ac denique vitium in ventriculo residere cognoscimus, si eger antea prauis edulis sefe impieuit quae facile in ventriculo corrupti poterunt.

Ab intestinis procedit alui fluxus, praecipue cum illa lumbicus referta sunt; & tunc signa lumbicorum apparebunt, proprio capite delinenda.

Si ab hepate procedat alui fluxus, deiectiones erunt biliosae, quia bilis in hepate generatur, & signa calidae intemperie, in illa mutationis obiecta, aut alterius cuiusdam hepatis affectus apparebunt.

Si a liene diarrhoea procedat, deiectiones maiori parte nigrae, aut ad nigrum vergentes erunt, vt sinistro hypochondrio tensio, grauitas, aut dolor, & alia lienis laborantis signa conspiciuntur.

Si a mesenterio procedat, tensio vel dolor in illa parte, apparebit. Vtriusque humores in mesenterio collecti; ab hepate vel liene perueniunt.

Si ab vtero procedat alui fluxus, suppressio mensium, vel symptomatica affectu vteri aduertant, quae magis seure follet, & praesent alui fluxus ingraueat, quo tempore mentium sterere consequantur.

Prognosin diarrhoeis in hunc modum insinuanda est.

Alui fluxus, qui cum facili tolerantia continetur, & ex quo eger leuamen aliquod percipiat, bonus. Contra vero, qui laboriosus est ac deiecit; & malus. Ille enim criticus, conuersus est, hic vero symptomaticus.

Alui excrementa liquida quae in progressu morbi sensim, crassescunt, bona. Virtutem enim bene operantem significat, quae prauos humores concoquit, cum concoctio fiat incallando.

Fluida alui excrementa cum dolore & laboriosa, ac frequentia deiectione, mala. Significat enim maximam humorum acrimoniam, quae intestina vehementer vellicat, stimulat, pungit & erodit.

Liquida deiectio quae non sentientibus effertur, valde mala. Aut enim errorem mentis & delirium significat; aut caloris naturae exolutionem, quam sensus abolitio consequuta est.

Liquida deiectio quae cum morbo acuto incipit, & cum eodem persequatur, mala. Significat enim magnam materiae morbificae copiam, vel malignam qualitatem, quae naturam cogit ad praecocam istam diarrhoeam.

Leucoplegmatiam denotat sorti diarrhoea superueniens, malum solum Hippoc. *aph. 29. sect. 7.* Materia enim in toto corpore retinens eius euacuatio fit. Id autem limitatione indicet. Verus si quidem est Aphorismus, si talis alui fluxus in morbi principio, & adhuc constantibus viribus accidat; alioquin non morbum, sed egerum de medio tollit.

Mulieri vtero generis si alius multum fluat, periculum est ne abortiat. Hippoc. *aph. 34. sect. 5.* Alimenta enim fetus nutritioni necessaria per alium maiori parte excrentur, & vires deiciuntur, per vim vincula vteri continuo humorum ad illas partes affluunt, lauantur; tunc locus ac vterus retro excrementorum continenter deiectionum vapores insinuat.

Alui deiectiones vitellinae, virides, argillinae, & iudae, nigrae, variegatae, aut valde foetide, mala. Haec deiectiones male sunt propter cae rationes, quas de finali comitu capite proprio retulimus.

Quod ad curationem spectat, cum diarrhoea symptomatica periculum sonatur ex prauis corruptisq; humoribus biliosis.

liosis pituitosis, melancholicis, aut serofis, & præcipuè biliosis, acrimonia sua facultatem intestinorum expultricem, irritantibus, illius curatio ab humoris peccantis euacuatione aufpicanda est quod fieri medicamento quod purgando alstringatne humoribus commotis alui fluxus nimium irascitur, quod in similem modum concinnari potest.

℞. Rhab. elect. ʒ. i. myrob. bal. citrin. ʒ. ʒ. lantal. citrin. ʒ. ʒ. Infundantur in aqua plantag. In expressione dissolue rhab. puluerat. ʒ. ʒ. lyropi colac. Vnc. ʒ. Fiat potio. Potest addi catholcum, vel aliud medicamentum purgans, pro conditione humoris expurgandi.

Vomitus etiam interdum conuenire poterit, quia reuelit & euacuat materiam morbosam.

Si sanguis redundans indicia fuerit, & robur virium, phlebotomia iniuncto celebranda est. At si febris aduersus, sanguis detrahendus est, etiam nulla plethora appareat.

Ante & post purgationem, clysteres detergentes inieciendi sunt, quorum delcriptio talis esse poterit.

℞. Horp. integri ʒ. ʒ. i. futura sacri & rosar. ribar. ana Pul. sequit. rale & papuli integr. ana. ʒ. ʒ. Coquantur ad ʒ. ʒ. in colatura dissolue sacchari ana ʒ. ʒ. vitellos quorundam. ʒ. ʒ. Fiat clyster.

Corporis sufficienter euacuato, tum medicamentis purgantibus, tum ipso alui fluxu, alstringentia & roborantia viurganda erunt, ut per os assumenda, tum per clysterem iniicienda, tum ventri ad mouenda, quorum formulae a curatione dysenteriae erunt repiciendæ.

Præterea vero sequentia vitales viurgari poterunt.

℞. Aceti chalybeati patrem vnamque chalybeate partes duas, sol. & frustum myri. cydonior. melpilior. lorborum. Ana. ʒ. ʒ. nucum cupressi par. ʒ. Coquantur ad medias, Colatura souseatur totus venter, tepide frequenter.

℞. Ol. maliches. cydonior. & myrtin. ana. Vnc. ʒ. ʒ. lang. drac. thuris & gummi tragacanth. ana. ʒ. ʒ. cere quantum locus fiat. Ynguentum, vtilitendum post coctum. Vel

℞. Mice panis assate, & in aceto chalybeato infulse & cænis cydonior. ab cineribus coctorum, vel cydoniat. ana. ʒ. ʒ. thuris maliches. lang. drac. ana. Drach. ʒ. Cum lyropo de abstinis cydoniorum. Fiat cataplasma.

℞. Maliches ʒ. ʒ. Bulliant in ʒ. ʒ. aqua fontis pro potu ordinario. Prælat aqua ferrata, quia alium tribat, sed in affectu calido non valet; in cuius curatione conueniet vt tintura rosarum, vel conserua rosarum, cum aqua fontis permixta cum aqua extinctionis auri, cum lyropo cydoniorum agitata.

Amatus Lusitanus refert quendam curatum diarrhoea biliosa largo frigide potu in quiete. Nos vero eundem virò sâguine, diarrhoea biliosa astate media laboranti cum siti intensa, præscriptum salem prunelle in potu ordinatio, tum etiam iuleps, cum aqua iulepsæ & portulacæ, ær indie fumendis, & intra vincturi quatuor horas curatus est.

Si humor læcis valde acer & adultus, parcius & mitioribus medicamentis purgandus est æger, alioque affectus ingratificat, sed refrigerantibus & humectantibus temperandus est, tum etiam laxum parca manu detractio.

In eodem casu plurimum conuenit melleum tepidum, cuius exemplum habetur in obseruationibus nostris.

Folia plantaginis in sulculis decocta, ad hunc affectum, vtilissima sunt.

Ne vero diarrhoea in dysenteriam transeat, ad demulendum humoris acrimoniæ, clysteres ex lacte chalybeato viurgandi sunt: tum etiam emulsiones ex seminibus frigidis, & sem. papai ana.

Ad eandem diarrhoeam biliosam syrupus sequens erit conuenientissimus.

℞. Succo cydonior. Vnc. v. succi endiuie & acetose ana Vnc. ʒ. ʒ. Item, acetotæ, & plantag. ana ʒ. ʒ. corall. rubr. ʒ. ʒ. aquæ plantag. ʒ. ʒ. Coquantur ad medietatem consumptionem. Colentur & forster exprimentur. Adde sacchari patrem colaturæ quantitatem, & fiat tyropus, de quo caput ʒ. ʒ. manet & sero.

In omni autem diarrhoea, præmissis vniuersalibus, bolus frequens viurgari poterit.

℞. Coniectæ rosar. antitric. ʒ. ʒ. cydonior. condit. ʒ. ʒ. i. pulperis tormentillæ ʒ. ʒ. i. boli armati ʒ. ʒ. cum saccharo. Fiat

bolus frequenter iterandus. Vel si affectus sit diuturnior, & iilem aut similibus maiori quantitate præscriptus, opiatæ concinnati poterit, ad plures doses fumenda.

Vel ad potius alstringendū vtatur eger puluere sequenti.

℞. Saug. drac. thuris. malich. mumie. terre sigill. lapidis hennati. trochile. de carabæe. ʒ. ʒ. boli arm. veri Drach. ʒ. ʒ. Fiat puluis, de quo caput ʒ. ʒ. cum potio idoneo.

Rhab. bis infusus, & postea aqua rosar. iutuum bis aut ter, & exsiccatum vtile.

Tabellæ triantallæ quadriplicato rheo. bis in die exhibitæ, pondere ʒ. ʒ. alui fluxus materiam auferunt, & viscera corroborant.

Conyaz folia super prunas iniecta, vt fumus in cathedra perforata recipiat, specifica vi alui fluxus medentur. Tum si eadem herba cum aceto trita, regioni stomachi admoventur.

Sutius etiam taphi barbari in cathedra perforata receptus, insignis est efficacia, cuius exemplum habetur in obseruationibus nostris.

Syrupus corallorum ad idem est efficax, & multo magis illius tintura, vel magisterium.

Conserua cynorrhodi per se ad diarrhoeam biliosam vtilissima est, ut etiam si opiatæ alstringentibus permisceatur.

Vt verò ex fluxu frequentiori, & acris periculum est ne vires deficiant, laudanum opiatum cum maliche, & terra sigillata vtiliter exhibetur.

In continuata alui fluxu, clyster ex infuso & theriaca recenti vtilis.

Pulsæ de bdelio bis aut ter in septimana, vel alternis diebus viurgandæ ad durandos, & contumaces alui fluxus sistendos vtilissimæ sunt.

Ad idem valer melpiliorum vius frequens, vt le experientia comprobare testatur Forelius ob. 1. lib. 22. his verbis. *Qui diuturno alui fluxu laborabat, & omni suam substantiam frustra in Medecorum opem consumpsit, sensibili causa, ut ab his male liberari possit, ad me accessit. Cui consilium dedi, ut melpia etiam immatura cepit duceret. Quibus coniectionibus perfusum paucis diebus cessauit. Et cum eandem causam merca, et Zelanda, ad Ioannem Spurnheim quendam Medicum, Louanensem celebrarem profecta, ut ab eo curaretur. Qui cum multis mensibus laboraret perisus, & eandem etiam dysenteriam, neque ab illis Medici curari posset, tandem melpia coniectione ex consilio Medici consilio, sanataem consequuta est, & Medico rectius aures, pro sola melpiliorum prescriptione numerant, quibus solis in præfatum sanitatem fuerat restituta. Hæc Forelius.*

Verum aduertendum est, vt ante melpiliorum vsum corpus ab excrementis, & omni cacochymia liberum præstetur. In diarrhoea inueterata sequentia vtilissima sunt.

℞. Ralebores ʒ. ʒ. i. coniectionis alkerm. ʒ. ʒ. sacchari in aqua ros. dissoluti Vnc. ʒ. ʒ. Fiat tabellæ.

℞. Crocis maritis reuerberat. g. vi. bezard. mincr. ʒ. ʒ. conseruæ ros. ʒ. ʒ. spirit. vit. gut. vi. Mûce, fiat bolus qui datur bis in die, jõe a passu.

℞. Succi perlicæ maculata, & semperui mai. ana. ʒ. ʒ. i. bulliant ad tertie partis consumptio, & dentur mane. Certo curam quilibet fuit, cum quantumvis inueteratum.

Mercurius diaphoreticus per aliquot dies ad gr. xii. exhibitus, omnes corporis in puritate aulere, quæ contumaces interdum alui fluxus parere consueverunt.

Decoctum granorum iuniperi in vino paratum, per triduum exhibitum multum conseruit. Tum puluis cicadurum eum vino albo exhibitur ad Drach. ʒ. ʒ. Hæc duo conferunt, materia alui fluxum committendum deriuando ad vniæ vias. Paratur autem decoctum iuniperi in sequenti modo.

℞. Granor. iuniperi Ma. vini rubri ʒ. ʒ. i. bulliant ad duarum tertiarum consumptionem: colaturam capiat mane triduum.

Pocus a quatuor sulphurearum, totum corpus expurgando, & ventericulum roborando, inueteratam diarrhoeam curat. Cuius rei exemplum habetur in obseruationibus nostris.

Si diarrhoea fiat catarrhus cerebri propiciendum est, vt per partem mandatis, is remediis, quæ in catarrhi curatione propolita sunt. Si verò pendat ab hepatis, aut lienis obstru-

atione, vel imbecillitate; illis affectibus mederi oportebit, prout in peculiaribus eorum curationibus docetur. tumque adstringentium medicamentorum vius nullus, aut parcellissimus esse debet. Plures in cura hamorrhoidum, dicit sanguinem calentem miscitum mirabiliter alium fluentem cohibere.

CAPUT VI.

De Dyſenteria.

Dysenteria est frequens, & cruenta alui defectio cum ventris dolore, ac torminibus ab intestinorum excitatione dependens.

Dysenteria nomen apud veteres plerumque sumitur communiter pro omni cruenta alui defectione: fixate tamen & proprie eam tantum alui fluxus languidus, imbecillitatem significat, quae ab vlcere intestinorum exoritur.

Gal. 3. de symptomat. caus. l. 4. cap. 4. quatuor cruentae defectionis species proponit, quibus & etiam dyſenteriae nomen communiter usurpatur.

Prima est, quando propter aliquam partem praecisam corporis, aut interitum aliquam excitationem, aut sanguinis evacuationem per alias partes, patitur nares, vel utrumque supprellantur sanguinis copia luxurians, per venas melaenicas ad intestina detrahitur, & per alium evacuat.

Secunda dyſenteria est, quando propter recedens imbecillitatem sanguis aquosus, & lotus cumum similis excretur, quod in fluxu hepatico contingit de quo infra tractabimus.

Tertia dyſenteria est, quando sanguis melancholicus & splendens excretur, quia propter nimiam moram in hepate, aut hunc vitione conceptus, & cum humore melancholico permixtus splendor vitionis significat, qui quandoque in sanguis qui ex refrigeratione nigrescit splendorem non habet, utrum vero cum quem prius habebat amittit.

Quarta dyſenteria est, ubi verebimus quosdam interualles acri cum humoribus, & excrementis sanguinem resistunt, cui interdum puris aliquid admixtum est, quod cum dolore, & torminibus, quibus intestinorum visus arguitur. Hae sunt proprie dicta dyſenteria, de qua tantum hic agimus.

Causae internae dyſenteriam efficientes sunt, humores acres & emulsi, aut bilis flava, porracea, argumola, & atrata, etiam pituita falsa ab incerto calore genita, vel per putredinem in ventre salteminem adepta, & ad intestina delata ubi propter lentorem diutius haerens assidue detegendo, tandem exulcerat.

Hae dubium non sive proponitur, ab autoribus, quomodo bilis flava interdum breui temporis spatio dyſenteriam facit, cum tamen non raro bilis porracea, & argumola simpliciter faciat diarrhoeam ad longum tempus perdurantem, quae tamen nunquam in dyſenteriam degenerat; cum bilis porracea & argumola ex fluxu generetur vlcere autulione, & prout maiorem habeat acrimoniam.

Respondet Mercatus, cum humorum acrimoniam requirit lentorem, & visciditatem, cuius ratione diutius morantur in intestinis, eaque magis corrodant. Et ita si flava bilis lentorem habeat dyſenteriam efficit, contra vero si porracea & argumola fluidior sit, & numerum in intestinis moram faciat, simplicem producat diarrhoeam.

Sennertus hanc resolutionem probabile esse dicit, eam tamen omnino dubium non solvere, insinuat, quod saepe alui fluxus denuit, in quibus visciditas & lentor cum acrimonia repetitur, & tamen dyſenteria non excitatur. Contra vero visciditas & lentor saepe non adest in biliosis humoribus dyſenteriam excitantibus, ideo censet humores qui dyſenteriam pariunt, peculiarem & occultam quandam qualitatem habere, quae peculiariter intestinis insensibilis sunt, eaque exulcerant sicut lepus marinus pulmonem, & cantharides vesicula exulcerant, non autem alias partes. Illam vero qualitatem malignam & intestinis vlcipulum insensibilem probat eo quod dyſenteria plerumque contagiosa est, ut in miasmata ex defectionibus dyſenteriarum exhalant, sola intestina afficiant, in iis qui contagium recipiunt,

non autem alias partes. Idem contingit in aliis morbis epidemias & contagiosas, in quibus venenum grassatur parti cuiusdam peculiari, autem. Sic dantur pleuritides, peripneumonies, & anginae pectorales. Sic venenum canis rabidi soli cerebro insensibile est. Id aperius in medicamentis purgantibus videre est, quae peculiariter vim obtinent, humores in corpore commouendi, & ad intestina propellendi, cum enim illa non solum omni sumpta, sed etiam vmbilico adnotato vapore spiorum naribus attracto, alium moueri, & purgare soleant, verissime est illa per poros cutis, & valiorum extremitates in venas & arterias penetrant, agitationem quandam & fermentationem in humoribus excitare, quia vitiosi humores a bonis separantur, & ille deinceps naturam stimulantem ad intestina propellunt, vi medicamenti ad ea loca expulsiorem dirigunt. Pari etiam ratione, sed modo diuerso, ludorifera ad cutem, & diuretica ad vesicam insita vi humores propellant, & quibus licet colligere contagium dyſentericum quocunque modo, & loco intra corpus admittit fermentationem quandam in humoribus excitare, & sibi similem dispositionem imprimere, quae in intestinis insensibilis ad ea cursum humorum promouet, eaque labefacta atque exulcerata, illa demum tali dispositione infecta humores & alimenta insensibiliter vade vera & proprie dicta dyſenteria emergit.

Quaeritur etiam apud auctores, quidnam sit illud mucosum, & album, quod magna copia pierumque in dyſenteria, excretur, cum sanguinis, alique humoris permixtum. Quidam putant esse pinguedinem intestinorum abrasam; alii mucum quo intestina obducuntur, ad faciliorem transitum excrementorum, aut piumtam a cerebro, alique partibus delinquentibus, pus ex visceribus manant. Nos vero ita opinamur hanc mucosam substantiam nihil aliud esse, quam intestinorum excrementum praeternaturale. Intestina siquidem labefacta, & a sacrali constitutione deiecta, propria alimentum non conuertere nequeunt in suam substantiam: sed illud imperite ali nutriendo in mucosam illam substantiam commutant, quae cum nutritioni illarum partium inepta sit, expellitur foras, & pars demum nutritionis indigna nouam attrahit alimentum, quod denovo cum per septe transmutatur non possit ob vitium partis, in substantiam illam heterogeneam, & mucosam conuertitur, cuius magnus est proventus, quoniam pars ad sui nutritionem continuo languinem attrahit a venis, qui in mucosam substantiam conuertitur, atque adeo pars suo genio fraudata nouam intem attrahit languinem ad sui nutritionem, quae perpetuo intendit, qui cum propter depravatam hominam in praedictam substantiam commutatur, magnus fit mucosi illius excrementi proventus. Idem in quamplurimas a suis partibus contingit, & praeterea in iis quae magna prolunda vlcera patiuntur. Pars siquidem vicerata cum ob prauam diathesim probe nutririque nequeat, sanguinem continuo attrahit a venis, qui in purulentam substantiam commutatur, unde totum corpus insensibiliter exhauritur, & tandem contabescit. Neque solum partibus viceratis hoc vitium contingit, sed etiam aliis nullo vlcere aut abicellu affectis, ita ut licet excrementum praedictum puris naturam amittatur, non sit tamen verum pus, quod non nisi ex vlcere vel abicella procedit. Id praecipue apparet in ophthalmia, in qua oculi simplici inflammatione affectus, copiosum excrementum puri similis continuo emittit, quod ex sola parte intemperie & deprauata hominis procedit, idem contingit saepe althmaticis & aliis qui pulmonum afflicti, laborantibus cum pulmonis male affectu, propterea alimentum male concoquunt, & in excrementum purulentum atque interdum puri simile conuertunt, quod per anacanthum expellitur, in tamen nullum vlcus est in pulmone, quod multi Medici etiam petiti illam pronuntiant, concepta illa materia ipsius speciem referent.

Causae externae dyſenteriae sunt quaecunque humores acres & viscosos generare possunt, vel iam genitis prauam illam dispositionem dyſenteriae excutere idoneam inducere. Inter illas primis tenent cibi acres, & vel putredine valde obnoxii, ut fructus hotarici, & alii omnes qui non satis maturi deoraturadem praestant, quae valde crude, aut minerali aliquo infectae in potu ordinario usurpatae, cum citra medi-

medicamenta assumpta deleteria qualitate prædita.

Præta etiam æra dispositio ad dyfenteriam efficiendam maxime efficax est. Sic apud Hipp. *Aph. 11. fecit. 3. si hyems plus iusto frigidiore & ficiore & inter, ver autem pluviosius & aultrium, ætate futuras esse dyfenterias.* Est *Aph. 12. eiusdem sectionis.* si hyems admodum aultrina fuerit, & pluviosior autem sicum & æquiorum dyfenterie producende tempestates illas esse maxime idoneas.

Peculiare etiam aeris vitium dyfenteria generande idoneum reperitur in epidemica dyfenteria, quæ aliquando pestilens, et ac valde perniciofa, aliquando vero minus inerti periculum, & ex ea ut plurimum grotescas eadunt. Ad hanc etiam classem reuocandum est contagium, quod ab ægrotantium excrementis exhalat & sua spè labem afflantibus communicat. Imo verò si talia excrementa in latrinis effundantur, multos eisdem famulas in ficere solent.

Signa dyfenterie diagnostica ex diffinitione ab initio propoliata facili eliciuntur. Adest enim frequens & cruenta excretio, cum dolore & torminibus ventri. His accedunt plerumque febres, vigilie, sitis, lassitudo cibi, & alia quæ cum multis morbis communia sunt.

Quantum verò intestina, tenuia nimirum an crassa vicerantur dignoscere difficultus est. Vulgo dicitur quod si dolor sit supra umbilicum, tenuia intestina afficiuntur, si verò infra, crassa maxime laborant, quod tamen rationi manifestè repugnat, cum & tenuia & crassa intestina ad partem superiorem & inferiorem circumguntur. Melius igitur elicietur ista diagnosi ex qualitate doloris & his quæ excrementis. Si enim tenuia intestina affecta sunt dolor est acutissimus, ut agni aculeis compungi videantur, quia tenuia intestina magis membræ anota sunt, & sensu & exquisiti prædita. Deinde alius itam post tormina & dolores non deponit ac denique sanguis cum stercoreis omnibus permixtus est. Cum enim via à superioriorem intestinis ad anum longior sit, sanguis, & purulenta materia antequam per alium excrementum longiore itinere magis cum stercore permixta. Si verò intestina crassa afficiantur, dolor est minus vehemens & diuturnus; à torminibus & cruentis ventris itam fit excretio, cuius & purulenta materia excrementis supermatat, aut parum permixta apparet. In maiori exulceratione veluti caruncula excreuntur.

Signa causarum ab excrementorum colore præsentunt, defumutur, quatenus illi citrina, flava, viridia, albicantia, vel atra conspiciuntur. Quibus adiungenda sunt signa abundantium in corpore humorum, quæ ab ætate, temperamento, anni tempore, & vitæ genere defumutur.

Prognosis huius affectus in hunc modum instituenda est.

Si tenuia intestina exulcerentur, maius est periculum, substantia enim pollent magis nervosa, & hepatici viciniore bile syncroviorem recipiunt.

Dyfenteria ab atra bile proveniens lethali est. Hipp. *Aph. 24. fecit. 4.* quia tale viciu, quia propter lentorem diutius in externis corporis partibus raro curationem admittit. Si tamen per crum excreta atra bilis dyfenteriam moueat, adeo periculosa non est. Cauendum tamen hic est ne sanguis concretus, aut diutius retentus pro atra bile accipiat.

Dyfenteria à flava bile aut cibus acris proveniens facili curabilis est.

A pituita falsa dyfenteria veniens, crudelior & contumacia est, quæ quæ à flava bile, quia propter lentorem diutius intestinis hærens, grauius affligit, & magis exulcerat.

In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium malum, & cum febre penus Hipp. *Aph. 3. fecit. 6.*

Si dyfenteria decto veluti caruncula deiciantur, mortiferum. Hipp. *Aph. 26. fecit. 4.* profundum enim viciu, significat, quod intestini particulari abradit.

Vigilie immodice, deiectiones syncræ, nigra, foetida, sanguinis excretio copiosa, superueniens intestina, sanguinis vomitus biliofus, litoreis & præcordiorum dolor sitis intensior, lethalem ut plurimum dyfenteriam pronuntiant.

Podagricis, & leniosis superueniens dyfenteria, bonum. Hipp. *2. præg. 2. Aph. 46. fecit. 2.* hæc tamen dyfenteria talis reuera non est, sed potius ad simplicem diarrheam referenda

quæ materiam morbificam, illos morbos producentem, euectat.

Senes & pueri ex hoc morbo sepius pereunt, quæ in media ætate constituti Hipp. præg. pueri quidem, quia cito dissoluantur ob molliem, tum quia præceptis nimis obtemperantes, verò quia viribus sunt exhaustis, quæ magna itatus naturalis exortio significat. Talia si quidem excrementa dyfenterie producende idonea, non facili egiunt.

Curatio huius affectus perficitur medicamentis humoris acres lenientibus, abstergentibus, euacuantibus: viciis consolidantibus, fluxumque costringentibus.

Humoris peccantis euacuatio itam ab initio morienda est, ut cito educatur, antequam grauius ledaui. Imo verò rependa, donec magna ex parte subleuius sit.

Et si tum non videatur singulis, vel alternis diebus purgare, fieri potest tertio, vel quarto quoque die. Huic viciu, cæteri prælat medicamenta iubarbarum, vel substantia cum iulculo viurpatum, vel in potionem formam redactum, ut in diarrhoea curatione, vel in sequentem modum.

1. Fol. plantag. M. ss. liquor tal. & pulv. integr. an. Drach. iij. rotar. rub. p. j. tamard. Drach. vj. corticis myrob. atrin. ol. amygd. dulc. conficit. Drach. ij. Coquantur ad Voc. iij. In colatura dissolue rhyo in aqua plantag. cum spica infusa Drach. i. tyru. cydonior. & fiat potio. Vel

2. Tamarindor. Vnc. iem. myrob. atrin. Drach. ij. Coque in aqua hordei & plantag. In colatura infunde rhyo. Drach. iem. fantal. cortic. 3. Co. anure Vnc. iij. adde tyru. rotar. solut. Vnc. i. fiat potio.

Comendatur à nunnulis decoctum myrob. in plures doses exhibendum, hoc modo præparatum.

3. Corticum myrob. cepulor. Drach. x. cinin. 3. v. pulv. l. minor. Vnc. i. Coque omnia in que Voc. xxvj. ad consumptionem tertæ partis. Pulvis colatur. Adde colaturæ sacchari Drach. x. Clarificetur, aromatizetur cinam. Voc. sem.

Penoris sequentem potionem laudat, tanquam singulare remedium ad dyfenteriam, & diarrheam desperatam.

4. Corticis guaiaci contri. Voc. ij. Bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad medius cum impone rotar. rub. balsam. sem. plantag. an. Drach. ij. Bulliant per horas. Deinde colaturæ adde rhyo. puluerat. Drach. j. cathol. Drach. iij. Fiat potio.

Quamplurimi prædici rhyo torrefactum exhibent, ut via purgans ex parte auertatur. Sed Amatus Lusitanus secundum rhabarbati infusionem viurpat, dicitque primæ infusionis ouiem cum acrimonia aultri, & cepulæ esse hoc modo viurpatum, quod torrefactum la emat torrefactio: ne empyreuma acquirere non pauci existimant. Præparatio autem talis est.

5. Rhab. elect. Drach. i. sem. Infundantur in aque plantag. vi. per aliquot horas. Colentur & leuiter exprimantur, iterumque imbandantur in vna aqua plantag. Voc. iij. In expressione diluolue calide recenter extractæ Vnc. iem. Fiat potio.

Si propter humorum crudorum copiam magis purgare est animus, tyru. rotacens catholice, alioque maiora ad miscenda sunt, abstinendo à vehementioribus.

Vomitus aliquando conuenire potest, si æger sit nateledias, & humores in ventriculo relligant videantur: fit enim reuulsio à parte affecta. Quod differt innoti Amatus Lusitanus *carat. 34. cent. 1. in febribus* has verbis: Si ad intestina corruptionem biliofam, & acrem humor dyfenteria egiuntur. Adde per superiorem retrahere possit, & cū per vomitum auerant, dicit præc. incipit effere. Cetera Galeni præcepta libro artis Medicinali, & methodi sua curantur, per intestina, videri possit, si materiam ducere. At cum hoc, Medicus non sit diffusi possit, si materiam per vomitum ducatur, consequens medicamentum purgat ergo id efficit, præteritum rhyo ar. illud ipsam docerat Hipp. *Aph. 15. fecit. 6.* A longo alio pressu habito spontaneus vomitus, superueniens morbi, soluit Gal. verò in commentis *Aph. 11. c. inquit, exemplum ex eorū quæ recte sunt à natura, quæ Medici inuenerit oportet.* Idem confirmat Mercatus his verbis: *Alio humores transire, sanguine missi, si opus fuerit, ut caput, quibus phlegma excluditur, vel vomitus, necesse est.*

in *in fella punita, nam hoc via diuturna dyfenteria curari conſuevit.* Angelus Sala in dyfenteria lequens preſcribit vomitorium.

ꝯ. Sal. vitriol. 3. fl. vel Drach. i. ſymp. cydon. & aq. beton. an. 2. i. aq. cin. Drach. x. Miſce & propina.

De phlebotomia in hoc affeetu magna eſt diſſenſio inter authores. At peritorum ſententia eſt, preſente febre, & inteſtinorum inflammatione, (que non raro vici copulata eſt) debere celebrari in principio morbi, antequam vires ad alui profluuium diuturniori fuerint attrite: ſic enim fit remiſſio ſanguinis & humorum acriorum ad inteſtina, profluuium. Imò vero Valeſius de Taranta, & Amatus Luſitanus in antiqua dyfenteria ſanguinem detrachunt. *P. aldi ſenex*, inquit Valeſius *dyfenteria à tribus ſan menſibus miſeri torquebatur. Vocatus in conſilium, reſpondit omnibus alijs Mediciſ, iuſſi venam aperire. Alux conuulſit. Amatus verò ſi habet. Ad venam illam, qui dyfenteriam diuturnam, & fortè triginta dierum, ingens cum febre patiebatur, & poſt multà ac varia adhibita remedia, imbecillis & & gracilis eſſe ſolus, perſeuerante etiam fluxu ventris multo cum ſanguine; Medici cordatus ingreſſus eſt, qui ſanguinem, ex baſtica dextri brachij extra. Sed quanto iunioris, auctore, ſilicet, miram dicta, ſanguis cohibitus fuit, perſeuerante adhuc fluxu ventris. Caeterum ſaccharo ad aliquot dies, & nonnullis ingreſſibus clyſteribus, ac topici aſtringentibus remedia applicata, alius in totum reſtrictus eſt.*

Interim varij iniiciantur clyſteres primam lenientes, & detergentes, poſtea vero glutinantes, & aſtringentes. Non raro autem in vno eodemque clyſtere omnes prædictæ indicationes permixcentur, aut earum plures.

Clyſteres lenientes & anodyni parantur ex lacte, vel ſolo, vel cum vitellis ouor. n. i. aut iii. vel mucilag. ſem. pſyllij, & cydon. Vnc. iv. vel ad ſumal aſtringendum, cum ſaccharo, aut mellis roſacei Vnc. i. vel ad glutinandum cum, ſeu hircini recentis Vnc. i. ferro, auro, vel ſilicibus ignitis in late extrinſis, vt ſeroſa illius portio abſumatur, ſicque glutinoſum magis euadat.

In lactis verò defectu, lac amygd. dul. vel cremor. hord. ſeu oryza, quem oryzogalon vocant, ſola vel iunctim, mixta, tum etiam iulculum veruſſis, puli caponis, vel capris & inteſtinorum veruſſia viſpari poterunt, niſque reliqua permixcere. Vulgare autem eſt roſas, & caudam equinam cum capite veruſſis decoquere. Vel decoctum ſequens erit preſcribendum.

ꝯ. Rad. alth. Vnc. i. hord. mundat. vel oryza P. i. ſem. lini & cydonior. an. 3. i. ſem. pſyllij Drach. ſem. ſſor. chamæm. P. i. Fiat decoctio in lacte, vel iulculo, addendo ſeuum; vitellos, & alia præſcripita.

Vt fieri poteſt ex lacte ſolo, cum rad. alth. decocto, in principio ad tergendum, & dolorem demulcendum.

Dolore admodum vigente, narcotica interdum dictis clyſteribus admixcenda ſunt; vt philonij Perſici Drach. i. vel ii. pilul. pe. cynogloſſo 3. i. vel ii. ſymp. de pupa. Vnc. i. ſem. laudani opiat. gr. v. vel vi.

Si inflammatio inteſtina obſidere videatur, quod ex dolore ventris continuo, & conſtante ſele exalperante, tum etiam febre, ac lingue ſiccitate dignoſci poterit; iteretur phlebotomia: clyſteres iniiciantur ex aqua roſar. in qua ſal Saturni diſſolutum fuerit, & venæ oxycrato ſocentur. Idem ſal Saturni per os exhiberi poterit ad gr. x. cum conſerua roſarum.

Clyſtes detergentes ſunt: ex decocto hordei, ſuſiar. maſtri, & roſar. rubr. cum ſaccharo, aut melle roſac.

Ad maiorem vero detractionem, & viciorum glutinatione addi poterit terebinthine Drach. i. cum vitello oui diſſoluta. In forſi dioribus viceribus, ad fortiora interdum detergentia erit conſugiendum, vt betam, & parietariam, in prædicto decocto viſparandam. Fortiſſima vero ſunt centaurium, abſinthium, gentiana: mucia, ex Gal. 12. *meth. cap. 1.* & ſimilia; quorum vius hoc tempore rariffimus eſt, propter dolores, qui grauioribus multo ſolent euadere.

Zacutus Luſitanus autem eſt vti arſenico, cum ſolici tamen ſuccoſo; vt videtur eſt *ſeſſer. 18. lib. 2. Praxis Medice admodum.*

Chymici nonnulli oleum cere in clyſteribus diſ-

ſoluant ad Drachi. eoque ventrem inungunt.

Ad vicus glutinandum, clyſteres primo leuiter ſiccantes & parum aſtringentes conueniunt, ad eos poſtmodum deſcendendo, qui maiori ſiccitate aſtringendique vi præditi ſunt, Atque iſta ſient primam ex lacte chalybeato, in quo roſa decocta ſint, vel ex decocto hordei, aut oryza torrefacta, & roſar. rubr. P. i. addendo vtrique clyſmati interdum vitellos ouor. alios n. ii. aliquando & mel roſac. & cum magis operari ſit, ſucci plantag. Vnc. i.

Ad magis aſtringendum & glutinandum, in hanc modum parabitur.

ꝯ. Radic. conſolid. maj. & rapſi barbari, ana Vnc. ſ. fol. plantag. & conſolid. ana M. i. roſar. rubr. hord. torrefacta ana P. i. myrrulor. Drach. ii. Fiat decoctio in aqua cifterna. In colatura m. i. diſſolue mellis roſac. 3. i. album. oui num. i. vel mucilag. gummi tragacanth. Vnc. i. ſeu hircini Vnc. i. ſiacci milleſij vel polygoni Vnc. i. Fiat clyſter. Vel

ꝯ. Rad. biſſort. vel tormentil. Vnc. i. ſem. rad. conſol. mai. Vnc. i. fol. buri. paſtor. polyg. equiſet. & pilolei. an. M. i. baſil. calycum glandium oucum cupreſſi. an. Drach. ii. oriz. toſſe P. i. fiat decoctio in aqua ſabori. In colat. m. i. diſſolue ſucci plant. Vnc. ii. vitellos ouor alios n. ii. Fiat clyſter.

Angelus Sala mirum in modum commendat clyſt. ſeq. Caput veruſſis per medium ſectum decoquatur, donec caro ab offibus ſeparetur. Luri colata addit ſummit. hyperici Mai. vel iii. rad. torment. craſſo modo contale Vnc. ii. Infunde per 3. vel 4. horas ſupra cineret calidos. Colatura bis, terve in clyſtera formam iniiciatur.

Succus plantag. ſolus, vel lacte, & decocto hordei con-

temperatus vtiliter iniicitur.

Gummi tragacanth. Drach. i. vel illarum infuſio in aqua peculi roſar. & plant. clyſteribus vtiliter permixtur, vel cum ſucco plantag. permixta, addito ſeuo hircino, efficaciſſimum enema componet. Loco tragacanth. aut etiam cum illa, vtiliter viſpari poterunt gummi arabicum, thus, maſtiche, ſarcocolla. Que omnia in prædictis liquoribus ſoluta, glutinandum operantur, nec vt valde aſtringentia vi-

cus exasperant. Amatus Luſitanus valde probat clyſteres ex Emplaſticis prædictis paratos, quia internam inteſtinorum ſuperficiem, contra huentis materie morium, cruſte inſtar obducunt, eoſque iſta componit.

ꝯ. Aq. hord. Vnc. x. album. oui optimè concuſſum n. i. gummi arabicus, adipis caprim. ana Vnc. ſem. ol. roſac. Vnc. i. ſol. arm. & gum. tragacanth. ana Drach. i. Miſce fiat clyſt.

At ne clyſteres iſti emplaſtici ſuo lentore acres materias tanquam carcere retentis, inteſtina affigant, ad clyſteres detergentes deueniendum eſt, qui non diu ſunt retinendi; tum etiam, clyſteribus aſtringentibus detergentes ſimili-

dem interſcindi ſunt. In clyſteribus aſtringentibus vtiliter admixceri poterunt acacia, hypocitiſ, ſanguis draconis, lapidis hematitis ſucus rubeus, arnitioe cum aqua roſar. vel plantag. cicutina, bolarmen, terra ſigill. trochichi. de luccino, alb. Rhafis ad Drach. i. vel ii. Alii vero pulueres qui a nonnullis præſcribuntur, nonij potius ſunt, cum in liquore ſubſideant, partemque vellicando irritant.

Imò vero ſarſus eſt etiam prædictos pulueres in liquore, vel decocto infundere, & ſacta colatura inuicere.

Dum clyſteres iniiciuntur, medicamenta iſdem viribus prædita per os exhibenda ſunt; idque multo frequentius, quando ſuperiora inteſtina vicerata ſunt, ad que clyſterum materia peruenire nequit.

Lac caprinum, vbi magis deterget; vaccinum, vbi magis glutinare eſt animus, cum ſaccharo roſac. vtiliter exhibetur. modo febris abſit. At chalybeant efficacius conglutinat; illius Vnc. ii. cum ſucci plant. & ſacch. roſac. ana Vnc. i. præſtans efficitur medicamentum. Vel ſymph. maioris radic. in lacte chalybeato vtiliter decoquunt, & exhibetur.

Vel fiat panis ex ſubſiſſima, & puriſſima hordei farina cum vitellis ouor. Coquantur in furno poſt extractionem. panis. Micas ſas lacti ſaccharato immiſce ad pulſicem conſiſtentiam, de qua æger capiat cochlear v. vel vi. bis, aut ter in die.

Iulculum carnis vitulinæ, optimè, & diu cocta, viciorum dolores lenit.

Cremon oritur munda bene coctæ, viscera consolidat.
 Revertit lenius in sua historia, multos dyentericos in
 loquax nauigatione lane, prope modum menceos oryza
 in lacte decocta, ad dictis virellis oryza & succo hederæ res-
 restis, fuisse restitutos.

In lacte etiam amygdalino oryza poterit decoqui, &
 vtrumque lac prius auro vitulino.

Hordii vero cremon cum saccharo paratus detergit, &
 refrigerat.

Iusculi ex decocto pimpinellæ cum butyro paratum, &
 per triduum exhibitum, mane & sero, dyenterie duratio-
 nem mirabiliter promouit, idque magis, si eiusdem deco-
 ctum eodem tempore pro potu ordinario exhibeatur.

Cortex duorum aut trium subaridum in m. viii.
 aque decocti pro potu ordinario, curacionem accelerant.
 Rofura crassi humani Drach. i. bis aut ter exhibita eundem
 iusculo, aut acrio liquore idoneo, dyenterie curacionem,
 citissime absoluit.

Mucilago gummitragacanthæ extractæ cum aqua
 rosar. coctilear ii. vel cum arabic. Drach. sem. in singulis
 impulsibus & panatellis vultus dissolvitur, tunc etiam gutta-
 ne cornu cerui coctilear.

Tandem decocti astringentia ad integram sanationem
 corpore bene euacuata, exhiberi poterunt. Quæ hinc ex
 rad. aurtora, tomentillæ, hyssopifoli, boli plantag. melle fel-
 bule pulvis, pulvis, pulvis, pulvis, pulvis, pulvis, pulvis, pulvis,
 sumach, vinorum rosar. rubris, &c. in aqua cisternæ dis-
 solvuntur cydonia tyrt. aut de ros. sicc. tum etiam inter-
 dum acanum, hypocist. bolum armenum, aut spodium.

Succus cydoniorum coctus si e ad additione ad consilientia
 in iusculis robet & ad coctilear. i. vel ii. frequenter exhi-
 bi, valde prodest. Similes succi ex pyris, cornis, aliisque
 fructibus austera parari possunt.

Intestina veruere pingua decoquantur in olla, donec
 iusculum redcat ad mediâ vtelam; huic addit. dulcis
 parem quantitatem, capiat æger per os. Dyenteriam non
 valde constantem vna vel altera exhibitio sufficit. Idem
 præstat oleum & aqua rosarum pari quantitate exhibita.

Vitelli duo uorum mduant, & in aqua rosarum dis-
 soluti instillat panatellæ, condiantur saccharo, & pauca nuce
 moschata, & bis aut ter exhibeantur.

Succus plantag. crudus ad Vnc. iij. vel iv. exhibitis folis,
 vel cum plus permixtus præstantissimus citis & si inflama-
 tio adfuerit, eam compescit.

Tritatur Hollerius hederæ terrestres succum propina-
 tum plurimos a morte liberasse.

Iusculi ex aqua, vel decoctis, & syrupis astringentibus
 frequenter etiam exhibendi.

Syrupus corallorum, tinctura, magisterium huic affec-
 tum valde idonea, quibus vtatur æger ex coctilear
 frequenter, vel syrupus sequentiibus.

Y. Syrupi de agrest. n. yrtini, de succo plantag. cydon.
 de ros. sicc. & de succo portulacæ, ana j. i. Misce ad vsum
 dicendum.

In fine dyenterie valde confert succus abinthii & men-
 the bene depuratus, cum saccharo in syrupum redactus
 habet enim munda cum abinthio mixta miram vim cor-
 roborandam vultu plantam.

Imò verò, si dyenteria a multo fructuum viti contige-
 rit, in ipso principio valde conducit syrupus de abinthio
 cum aqua cisternæ, vel theriacali & ventriculo interim ad-
 mouendo fauente & emplastra corroborantia.

Malum cydonium excauatum, cæta alba derafa imple-
 tum & sub cineribus coctum, ac pollicæ exhibitum per al-
 quot dies specissimum citi dyenterie remedium.

Querectanus idem remedi parat ex pomo curtispenda-
 lo & canato, & gummi arabicæ raturæ ceræ albæ, ana
 Drach. i. repleto, & ad ignem cocto. Pomo deuorata sit-
 tum exhibet haustum decocti astringentis.

Alia viurpant pulum columbum cera infectum, &
 assum, ac in priando exhibitur.

Meipoliorum vilius dyenteriam inueteratam curat, vt re-
 latat Forestus hitorius duabus lib. 2. 2. 6. 1. propositis, qui
 locus supra citatus est in diarrhoeæ curatione,

Brutrinus verò lib. 8. de v. tibia cap. 32. cecit scilicet seipsum
 delperat dyenteria laborantem, de anus cualiam consi-
 lio foris cruda largissimè deuorasse indeque sanitati resti-
 tutum fuisse.

Nec omittenda est illa vna quercina, à Martino Rulan-
 do descripta, quam dicit esse concretum quiddam in
 forma vuz, ad radices quercum huius terra, tempore verni
 pullulans, saporis stypticæ, colore foris purpureo, intus
 candido, & quasi lactifero, qui in ætate precat, & quasi
 liat lignæ: ideoque tempore verni debeat excidari in vmbra,
 & deinde puluerificari hocque puluere inhi præstantius
 esse ait in dyenteria, omnique sanguinis profusio. Illius
 etiam vuz mentionem faciunt Sincelus, Bauchianus, &
 Sklenkion.

In omni fluxu à putridis humoribus roborentur intesti-
 na pane bifecito, qui in aceto fuerit decoctus, & postea
 efficitur. Bis teru reperta cæ preparatione, ille pulue-
 rificetur, & iusculis induatur ad mediocrem crassitiem.

Potius ad eundem affectum vari etiam parantur in
 sequentem modum.

Y. Rad. bistortæ tormentillanæ Drach. i. sem acetosæ
 plantag. an. Drach. i. corall. rubr. & margarit. preparat. an.
 Drach. sem. fiat pulvis tenuissimus, de quo capiat Drach.
 i. cum iusculo, vel huiusmodi. Postea addit huic pul-
 ueri ad maiorem astringentem, rosæ rubræ, myrtilli, balas-
 tici, cornu cerui vtilis, vel spodium, aut trochisci de spo-
 diis vel ad maiorem aduac astringentem, sanguis draconis,
 acacia, galle, bolus armenia, terra sigillata, lapis hemat-
 ites. Si in uulgi mare deliquiescat adde sem. pylii, amylium
 gum. tragacantham.

Bolus armenia orientalis ad j. i. cum iusculo, stimulat
 dyenteriam, si purgatio fulticibus præcesserit. Vel

Y. Pulueris tragacanthæ Drach. i. nuce moschate, co-
 ralli preparati an. Drach. sem. Mince capiat in duas vel tres
 doses cum oio foribus, aut cum iusculo. Vel

Y. Gummi arab. Drach. i. corall. rubr. preparati, boli armen-
 iæ Drach. sem. Mince vtatur loco prædicti. Vel

Y. Cornu cerui vtilis, boli armenia, corall. vtriusque, fanta-
 storum omnium, malliches, an. Drach. i. sem. churis tragacanthæ
 sem. Mince fiat puluis de quo capiat Drach. i. frequenter.

Forestus valde commendat puluerem sequentem, ali-
 quantes viurpant.

Y. Myrobolan. citrin. & rhaz. parum torrefacti, an. j. i.
 Fiat puluis pro vna dosi.

Hercules Saxonia quæsi puluere dicit omnes dyenteria
 rescentes inhi fluxu admodum vigacillatim & certo sanari.

Y. Ollis læpis viti Drach. i. spongie picæ vntuæ, & in
 ollula vitæ & cort. ouum mduatur. ablata pellicula interio-
 ri an. Drach. i. Fiat pulvis i. dosi Drach. i. in liquore idoneo.

Non minoris efficacæ, imò frequenter experientia con-
 firmatus est pulvis gran. acies à Querectano descriptus in
 Pharmacopeco ætali quædam modis ibidem videre possit.

Y. Opus & etiam in sequentem modum præscribi possunt.

Y. Conseruæ rosar. antiquæ & cydoniatissimæ Vnc. i. co-
 feruæ rad. hyssopifoli, i. sem. corall. preparati 3. i. g. croci
 mirti, boli armenia, terra sigillata plantanæ j. i. (pode).
 3. i. Cum syrupo de ros. sicc. vel myrtino, fiat opus de
 quâ capiat magnitudinem castaneæ, bis aut ter in die. Vel
 cum saccharo rosar. ad pondus omnium poterit fieri con-
 ditum ad vsum frequenter.

Mydrea Nicolai ad dyenteriam, & reliquos alui fluxus
 vtiliter viurpant.

Sapienter monet Crato, ante septimum diem, priusquâ
 viscera intestinorum probe abiterantur, astringentia per os
 non conuenire, nec foris etiam applicanda esse. Verum post
 septimum a leuionibus incipiendum. Montanus vero astring-
 entia peritus adhibere de cæteris, in iusculis, & in
 crassatibus contentus. Verum materia morbifica probe
 euacuata, astringentia facilius imbecillitas, quæ fluxus ab-
 iouet, astringentibus remediis oportune tollitur.

Vnde ergo fuerit post purgationem iustitientem bolum
 armeniam, terram lemniam, puluerem granorum acies, aut
 alia astringentia, & efficacius per plures dies cū saccharo
 exhibere, & vsque ad integram sanationem. Quod si affe-
 dia

nulla cum vixere hymenæum excreuit, & alio die illuc effusus, indeque sanus exiit.

Hic pro coronide addatur, quod in curatione diarrhææ ex Placero in cura fluxus hæmorrhoidum relictum est; sanguinem (gravidum iniectionem mirabiliter alium illicet, cohibere, vel humanum, vel alius animalis.

C A P V T VII.

De Teneismo.

Teneismus est assidua defendendi cupiditas, quæ nihil præter mucosum quoddam, & subserenum, aut purulentum excrevit.

Causa proxima huius affectus est viciis recti intestini, à quo ianus quidam aut materia purulenta continuo emanat, & aculeatam expultricem irritat: unde assidua defendendi cupiditas emergit. Præterea mucosum quidam cum sanguine aut pape permixtum excrevit ex depravata, hominibus partes viceratæ, quæ proprium alimentum probe non concoquit, & sibi assimilatur; sed in substantiam illam, hæterogeneam & mucosam conuertit; ut de alijs viciis intestinorum in dysenteria fusius exposuimus. Cui verò in dysenteria theoria dictum sit à nobis, omnia intestina, in eo affectu posse viciari tentari, hinc sequi videtur etiam recti intestini viciari ad dysenteriam esse referendum. Vnus tamen inuoluit, ut quando solum intestinum rectum afficitur peculiari teneismo nomine donetur; cum tamen alijs intestinis affectus, si rectum etiam afficiatur, licet dysenteria nomen obtineat, frequens illa defendendi cupiditas, repetitur & ita teneismus & dysenteria sunt eiusdem naturæ, & eandem habent generationis causas, ut tota eorum affectionum differentia in loci affectu diversitate consistat. Arque ita, omnes dysenteria causæ superiori capite propositæ teneismum etiam producere valent, ut eas repetere non opus sit.

Ad diagnosis huius affectus nihil aliud requiritur quam cum a dysenteria distinguatur, quod facile obtinetur, per ea quæ in definitione propostæ sunt. In teneismo enim assidua est defendendi cupiditas, in dysenteria verò interpollata, & dilucida habens interualla; præterea in teneismo post magnum defendendi conatum exiguus mucus, si quæ violentus aut putulentus excreuitur in dysenteria verò tum excrementa aut humores singulis deiectionibus excremitur.

Signa causarum eadem sunt, quæ in dysenteria causis dignoscendis sunt propostæ.

Quod ad prognosin attinet: Celsus lib. 4. cap. 19. teneismum facile tolli assertit, & nunquam per se hominem iugulare Gal. comment. 3. de usu partium cap. 4. inter morbos qui ventriculi accidenti grauiosimos enumerat, & ceterè ratione molestiæ & durationis, grauis morbus dicit meretur; periculosus tamen non est nisi ab atra bile excitetur; tunc enim ad cuncti viciatæ naturam accedit. Præterea grauius incommoda afferre potest, ut abortum mulieribus. Sic apud Hipp. Aph. 27. sect. 7. Mulieris vero gerenti, si teneismus superuenierit, abortum facit. Assiduum enim defendendi conatus recti intestini vicium maxime fatigat; deinde musculi totum exclusioni destinati, ad fetum etiam exclusionem inferunt; ideo quando illi assidue ventrem inferiorem compungunt, abortum faciunt. Denique viciata recti intestini aua vicina, si diutius durent, in fistulam irreducibilem degenerant.

Teneismi curatio est dysenteria curatione parum abest. Atque ita, primum humores acres & erodentes, ab hepate aliisque partibus profluentes, expurgandi sunt medicamentis atringendis ut prædictis, quales est i. primis rhubar. quod eo vique iterandum est, donec exhausta, & inhibita luxu videatur.

Si addit inflammatio, (sive febre potissimum dignoscitur, aut multitudine sanguinis, phlebotomia vtienda est. Imò vero si in inflammatio post vena sectionem perseveret, ut etiam sit irregularis effectus, (quod non raro solet contingere.) venat ut hæmorrhoidatum apertio per hirudines erit utilissima.

Tum clysteres, nunc lenientes, cum dolor vixit plurimum: cum, abierges, glutinantes, aut altringentes pro-

variis viciis curatione iniiciendi sunt, quorum formulæ ex dysenteria curatione deducenda sunt.

In clysterum autem vii obseruandum est primo, ut sepe & in parua quantitate, scilicet ad ℥ss. imiciantur, quia difficile ob conatum assiduum retinentur: deinde ut calidus in podicem blandissime inferatur, ne locum irriter, dolorumque augeat.

Tum pars affecta sedulo tractanda est fortibus, inefficibus, suffragiis, suppositoriis, & manitionibus.

Fotus in hunc modum concinnari poterit.

℥ss. tapfi barbati, & albinthij, ana M. vi. decoquantur in lacte recenti, & includantur doctus facellis, qui alternatim ano & toti ventri calide applicentur. Vel

℥ss. Flor. chamæmel. & rosæ ana M. i. vini rubr. ℥ss. ii. Infundantur per duas horas supra cineres calidos. Foveatur anus calide quantum ferre potest, cum linteis quadruplicatis. Postea super spongiam in eodem huiusmodi liquore expressam sedeat æger ipsamque sedendo comprimat.

Vel impleantur duo sacculi fursure tritici, & in aceto bulliant. Sedeat æger, modò super vnum, modò super alterum calidum, quantum ferre potest.

Si multum languinis excremantur, locus in hunc modum componi poterit.

℥ss. Fol. verbasci cum radic. M. i. rosar. rubr. P. i. cortic. granat. & gallar. ana V. i. iij. Conquantur in duabus partibus aquæ iuratae, & vna vini rubri pro loco: quem efficaciorum effectus, si alumnus Vinclem. addideris.

In leuius ad dolorem leniendi sunt ex emollientibus, in aqua vel iure extremitatum veruicis decoctis: quibus, si ardor meretur, addi poterunt violæ, solanum cucurbitæ & melonis ramentata. Ad viciis vero sanationem: ex altringentibus pro situ supra descriptis erunt componendi.

Suffusus viciis exsiccatum idonei sunt, ex thure in ignem coactis. Vel ex decocto sabine lacto in oxyrato, aliisque in curatione dysenteria propostis: quorum sumum excipiat æger in cathedra perlorata. Sequens autem maxime laudatur à Foresto.

℥ss. Malichæ 3. Læthuris 3. i. myrrillor. 3. i. g. rosar. rubr. 3. i. Fiat puluis pro suffragio.

Suppositoria in hoc affectu multum possunt, quæ blandæ acienia esse debent, ne partem admodum sensibilem, exasperent. Fiant autem commode ex leuio hirci, vel capre, in formam suppositorij lecto, & induro, dolorem enim ledat, & viciis consolida. Sed ad dolorem sedandum erunt præstantiora, si semen papaueris, vel hyoscyami subtilissime tussim permixcas: & in nodulum chartaceum suppositorij forma effundas. Longe magis, si horum loco oleum dictis seminis expressorij guttas tres cuiuslibet suppositorio addideris, vel opij gr. i. in ol. amygd. dul. 3. dissoluatur.

Ad viciis sanandum efficacius fiet si leuio, ut dictum soluto, vel lymplici, vel narcoticis additis, amylium & gummi tragacanthæ citrem. vel insulum prius in aqua plantaginis micas. Vel in lequentem modum componi poterit.

℥ss. Gum. tragacanth. quantum satis. Assunde tantulum aquæ plantag. ut memetcat tantum, neque nimium liqueat: adde mucilag. item pssylli aut cydon. tantundem, & vitellum ouali alium. Mice, inque parum calentibus adde ceræ albæ liquatæ q. d. ad suppositorij consistentiam. Huic etiam narcotica addi possunt. Tum etiam quemadmodum in prædictis ad maiorem erosionem curandum, pulueres, crulæ, tuthiæ, bolus, balsamulora, aliorumque circa acrimoniam siccantium, qui tamen subtilissime leuigari debent, ne partis sensum exasperent.

Olea & vnguenta admodum poterint, tum ventris quæ in dysenteria curatione propostæ sunt: tum ano, ut vnguentum rosar. popul. vel ex mucilagibus, vitellis ouor, oleo rosar. & c. paratum, ad inflammationem, & dolorem demulcendum, & aliisque in hæmorrhoidum dolore proponenda: vel ad viciis sanationem vnguentum album Rhasis pompholygosum hyetomidei liquatum, & alia innumera.

Denique in grauioribus affectibus ad narcotica confugiendum est, non solum amocia, sed etiam assumpsa. Cæteris autem prælar laudandum opiatum ad gr. iij. vel iij. cum matricæ & terra sigillata exhibitum, vel in clystere permixtum ex decocto flor. chamæmel. parato.

Fluxus hepaticus est ille, in quo serosi & sanguinei humores loturæ carniū similes excrementur.

Productur hic affectus ab hepatis imbecillitate, & atonia, propter quam bonum & laudabilem sanguinem producere non potest; sed chylofam materiam in sanguinem temem, & ierosam conuertit, qui cum alendis partibus idoneus non sit, à natura expellitur ad intestina, unde fluxus iste hepaticus contingit.

Illa autem imbecillitas & atonia à qualibet intemperie, produci potest. A quocumque enim primarum qualitarum excessu robur hepatis natium, & vis illius sanguifica deicitur. Quod tamen dubitationem habet ab experientia delumptum, quandoquidem videmus sæpe graues hepatis intemperies, & indignes primarum qualitarum excessus, alios morbos producere; illum verò ab illis minime induci. Contra vero fluxum hunc hepaticum se pè apparere sine insigni primarum qualitarum excessu. Vt igitur affectus illius natura integrè libiatur, dicendum est cum sapientissimo Varandæo præceptore meo, præter vulgarem intemperiem aliquid superius, & maius reperiri quod illum affectum producere valeat. Et illud dicit esse occultiorē quamquam intemperiem, quæ exolutionem siue cōsumptionē humidi primigenij, siue radicalis in hepate inducit, ad quā sequitur calor innoti ipsius maxima exolutio.

Hanc prauam diathesim & occultam intemperiem producere possunt febres ardentes, & syntectice; intemperies vicerum calidior oleosam substantiam colloquans; occulta putredo; humorum corruptela, refrigeratio summa à pituita vel melaencholia copia in corpore præter naturam, cumulatā, & calorem natium opprimente, ac cursum-pente. Id ipsum præstare possunt causæ externæ, vt larga frigida potio, niuis aut glaciæ haussus, oleum frigidorum ac crudorum visus immodicus, venena asumpta, & medicamenta cathartica vehementia. Si enim vinum mera, cum copiose haussit, ascria, & piperata aliisque insigni qualitate prædita, iecoris substantiā exhaustiuit; & extorret; his addere hec omnes alias causas que impèdēt refrigeratōe vel calefactōe, hepatis robur ac tonum dissoluere possunt.

Verus igitur ac legitimus fluxus hepaticus huiusmodi ex-pollitus est, qui hunc peculiariter habet characterem, vt in eo deiectiones liquide ac serosæ, & loturæ carniū similes appareant, & his ab hepatis imbecillitate procedat, ob quā sanguificatio non rectè perficitur, seu ab intemperie maligniori calidum & humidum natium parvis vitante.

Datur verò præterea fluxus hepaticus spurus, qui à simplici intemperie, sine vilo humidi primigenij vitio procedit, à qua quidem intemperie, ipsa facultas non læditur, sed tantum illius opus corrumpitur: ita vt loco puri sanguinis impurus & corruptus proueniat, vel bonus sanguis in prauum degeneret, cum in legitimo fluxu hepatico nunquam bonus & laudabilis sanguis in hepate generetur.

Corrumpitur autem, vel impurus redditur sanguis fluxum illum spurum cōmittens, vel ex permixtione bilis fluxus, aut atræ, ateriusque cuiusdam materie impure; vel ex diuturniori in hepate locique vicinis mora, ob quam, crassior redditur, aut adurit, aut etiam interdum putrescit, vel propter vitium lienis læsculentum sanguinis portionem non trahens. Et in hoc spurio fluxu huius interdum crassus, interdum niger, interdum varis coloribus diuersis colorata infectis permixtus excrementur.

Signa huius affectus ex his que dixi sunt facile elici possunt.

In fluxu enim hepatico legitimo deiectiones liquide, & loturæ carniū similes apparent, quod in alijs fluxibus sanguineis non contingit, aliter vt omnibus deiectionibus tales materie appareant, in dysenteria enim si aliquando salis excretio sit, id raro contingit, & consequenter bilis, pituita & feces varii coloris excrementur. Adde quod in dysenteria adiunt dolores & tormina ventris; in fluxu verò hepatico nullus est dolor.

Caularum vero signa proprijs characteribus distinguen-

da sunt. Si enim à calida intemperie hepatis imbecillitas, & atonia inducta sit, febres ardentes aut colliquantur præcesserunt, vel vomitus æruginosi aut deiectiones, sitis, & febres adeo corporis qualior, & inappetentia, & deiectiones valde foetida apparent. Si vero à frigida intemperie, ortam duxerit deiectiones manus frigidæ, nec sitis, nec colliquantur adeo; totum corpus frigius efficitur, & luido colore persuitur.

Interdum tamen ex humorum præterdine febres exoritur, quæ dicta symptomena aliquantulum immutat, sed causæ prægressæ examinandæ sunt, quæ vtquamque intemperie facile manifestare possunt. In hac etiā frigida intemperie ægri maximo vini generosi ac meracioris desiderio tenentur.

Humidior verò ac ficior intemperies ex contrarijs effectibus deprehenduntur. Humidior enim plurimam ac erobram deiectionem facit; & valde tenuem, contra ficiore paucam, & crassiorē reddit, quam tamen ingens potus cupiditas comitatur.

Causæ denique externæ ex relatu ægotantium adliantiam facile innotescunt.

Spurius verò fluxus hepaticus omnia ierè signa habet communia cum dysenteria, nisi quod in eo nullus adeit ventris dolor neque tormina molestant, neque vlla ramenta aut caruncula in deiectionibus conspiciuntur.

Prognosis huius affectus non nisi mala & vtriusque, funesta insitui potest. Cum enim pars princeps grauisimè labore, & haussu scilicet & consumptione humidi primigenij cuius reparatio vix sperabilis, est nonnisi certum exitum vt plurimum & expectandum esse, præcipue quando à calida intemperie affectus ducit originem.

Quando enim in febribus hac affectus contingit, colligationes corporis, & putredines ingentes breui succedunt, quæ citò ægotantes de medio tollunt. In febribus verò malignis, & pestilentialibus propter causæ cacoethiam periculum augetur. Quando verò hic affectus à frigida intemperie ducit originem: diuturnior esse solet, & in hydrope immedicabilem plerumque degenerat.

Denique fluxus hepaticus spurus licet admodum periculofus sit, minus tamen habet periculum legitimo, quia à simplici & vulgari intemperie, & praua humorum diathesi tantū exoritur, tono & robore hepatis integro remanente, & subactis causis sanguine vitantibus cunctis pè restit.

Curatio huius affectus perficitur remedijs hepæ roborantibus, eius intemperiem corrigentibus, fluxumque cohibentibus. Et quia longè frequentius atque vt plurimum à calida intemperie ducit originem, ideo huic in primis intemperie curationem apertissimam, cum ille qui à frigida intemperie produciur rursus contingat, & eandem, cum hydrope curationem desideret.

Primo igitur quamuis nullus vacuationibus locus esse videatur, cum fluxus immodicus sui tantum cohibitionem indicet; thab. tamen vel solum, vel cum myrobalanis exhibitis, iuxta formulas in dysenteria curatione propositas, interdum prodesse poterit quæ hepæ roborat; idque impensis, si quædam impuritates deiectionibus permixtæ videantur, immo vero nonnulli ægotantes rhab. Scrupul. cum confusa rosar. in multis das exhibito liberati sunt. Clysteres hic parum prosunt, cum hepæ affectum sit. Attamen ex lacte chalybeato, vel decocto lenicæ astringente interdum iniici poterant, ne intestina nimia relaxentur.

At iulepi hepæ roborantes, cuiusque intemperiem corrigentes, in hoc modum componi poterunt.

℞. Sacch. cichor. gram. acetos. ana Vnc. i. fol. endiu. agrim. cichor. plantag. culcitræ, ana M. i. abinthij pontici M. f. lantali rub. ʒ. i. sem. rufot. eboris & spodi, ana scrup. ii. coriand. præp. ʒ. i. ros. rubr. P. i. Coquantur ad m. f. l. In colatura dissolue syrup. cydoniorum, & acetos. simpl. ana Vnc. ii. Fiat iulep. pro i. d. bibulis, sero & manè sumendis. Vel.

℞. Aquæ plantag. Voc. ii. syrup. de ros. siccis Voc. i. l. p. ritis vitrioli q. l. ad moderatam aciditatem. Fiat iulep. frequenter iterandus.

Potent etiam æger vti frequenter ex cochleari syrupij sequentibus.

℞. Syrupi myrtinis cydonior. & de ros. siccis ana Vnc. i. Q. 9. syrup.

¹rup. de cichot. simpl. aut compol. cum rhco. Vnc. i. fem. M. l. e.

Fiat. yrup. prasantiffimus. ex tinctura ros. facta in aqua rosar. & cum saccharo rosæ. redacta in syrupum.

Pulsus etiam sequens ad 3. fem. vel 3. i. semel aut bis in die, in ovo sorbilo, iulculo, aut alio liquore idoneo viurari poterit.

3. Sem. Plantag. & acetosæ. ana 3. i. fem. endiu. portul. cul. cur. coriand. præp. ana 3. scrup. rosar. rubr. trochisc. de spodio. gum. tragacanth. torrefacta. ana 3. fem. pullicul. interiorum ventriculor. gallinæ. exsiccatior. Scrup. sem. Fiat pulvis tenuissimus.

Vel tab. trisantalini duplicato rheo ad 3. ii. pro dosi exhibitæ ad hepatorum etiam utilisissima, tum, etiam opata sequens.

3. Confer. rad. cichorij. 3. i. confer. rosar. veter. 3. ii. pulv. psalliar. corinth. 3. vi. croci Martis 3. i. coralli præpar. caluræ eboris, & cornu cerui. ana 3. i. Cum syrupo de ros. siccis, fiat opata, addendo spirit. vitriol. 3. ss. De qua capiat magnitudinem calidæ. tribus horis ante prandium, postest etiam addi hepatis præparatum, quod ab authoribus commendatur tanquam specificum.

Pulsus maiores vel corinthiæ, quia hepatis amica, in hoc effectu commendatur, ideo magna copia cum leuibus sunt comedende. Quod vi commodius fiat, prius mortario crunt contundenæ.

Vel rob. psalliarum fieri potest, coquendo eas in vino rubro, vel alio generoso, si calor non obstitit, & postea suc cum ex his exprimendo, cuiusque in formam rob. de coquendo. Quod simplex viurari poterit, vel cum sequentibus componi in formam opate.

3. Pulsu. coranthiæ. ff. ss. Coquatur ad pulvis consistentiam in vino veteri. Transfunditur fetaco, & colatur admixte corticis condit. pulvis Vnc. sem. pulu. electar. iris. fantal. & dianarg. frig. ana 3. i. coralli præp. & rosar. rubr. ana 3. scrup. iv. accoris lupi præp. 3. iii. fiat opata.

Syrupus coralli ad hepatorum etiam, & fluxum cohibendum prasantiffimus est. At longè prasantior alius tinctura. Cui etiam subditi poterit extradum vel magisterium, in aqua plantag. exhibitum.

Succus ex succulis tenuioribus vitæ præ se ad 3. ii. vel cum aqua & aceto exhibitus manet per triduum, thuxum, siliu, & sanguinem corruptum purificat.

Quia verò in hoc affectu corporis valde absumitur, delapsatum resaurans fluxum etiam cohibendo idoneum, vel per se frequenter exhibendum, vel omnibus cibariis permiscendum est.

3. Caponem pinguem & perdicem, usque deplumatis & exenteratis replentur ventres locichorij, agrimon. & carnis telluridum. ana M. l. confer. ros. ff. u. sem. plantag. præp. præp. ana 3. ii. myrobalan. citrin. 3. i. fol. sanguinarie M. l. trochiscor. de carabæ, & de spodio, ana 3. iv. pulu. elect. de geminis, trisantalini, & dianarg. frig. ana 3. i. seroentur omnia visio styptico, & simul in ventres acium immixta coquantur in aqua ff. v. ad medietate partis consumptionem vase clauso. Postea reponantur omnia in alembico vitro cum xiii. optimi Vucal. Dissiluentur in balneo Mariæ ad visum dictum.

Pro potu vitatur æger tinctura rosar. vel decocto cichor. & graminis cum syrupo cydonior. addendo ali quoc guttulas spiritus vitriol.

In cibis hordeata & amygdalata, æ præcipue orizata conveniunt.

Exterius verò applicentur ventri eadem remedia, quæ in dysenteria curatione præcon præstant, addendo hepatica pomelia, vt abluuntur rosas. faucula omnia, i. p. chidul. &c. Quæ inter quosque ventris ad hepatis visque regionem debent pertinere.

Hepati vero sequens episthema admodum poterit:
3. Fol. endiu & cichorij. ana M. l. culicæ, & abluuntur vitruque. ana M. l. rosar. rubr. Pasantali rub. 3. i. fem. spodio. Scrup. Coquantur ad tr. i. sem. In colatura dissolue, aceri rosar. 3. ii. iterum bulliant leniter, & colentur. Fiat episthema.

Eodem pat. sequenti viuento diluatur,

3. Cerati fantalini 3. ii. olei cydonior. & abluuntur. ana 3. ii. M. l. e. fiat linimentum.

Denique vigilie plurimum agrotantum insistent, vt non raro solet contingere, quia hic finis nocte solet ingrauescere ad narcotica erit deueniendum, qualia in superioribus ad alios fuerunt propolia.

C A P V T IX.

De Lumbriis.

Quamvis lumbrii in variis corporis partibus generentur quia tamq. ad rarissime contingit, & frequentissime in intestinis magnus fit eorum prouentus, ideo nos tantum de his in hoc loco agere instituimus.

A nonnullis ambigitur, ad quod genus affectum præter naturam lumbrii referendi sint: omnem tamen dubitationem auim facili auferre possumus, dicentes, si subuerso respectu ad omnia genera referri posse. Provt enim intestina vellicant & pungunt, vel obstruunt aliisque morbos producant, cause morbosæ dici possunt. Provt verò sunt substantia superaddita in quibus naturaliter in intestinis contineri debent, inter morbos in numero. Aucto tota genere præter naturam a Galeno recentur, quemadmodum & calculus: ac denique provt excrementa per aluum præternaturaliter, aut etiam per os, ad vitium excrementum sunt referendi.

Tris lumbicorum genera proponuntur a Galen. comment. alph. 26. ff. 3. teretes seu rotundi, qui in tenuibus intestinis frequentius generantur, unde sæpe in ventriculorum ascendunt, ascitæ, seu tenues lumbrii filiorum pariculas referentes, qui in parte inferiori crassiorum intestinorum, & iuxta sphincterem musculum residere solent: & lati lumbrii, fasciæ etiam nominati, quia lati, & longi sunt illar. fasciarum quibus infantes obvoluuntur ista species rarior multo est cæteris, & medico proximæ excenti vixit aut quater in vita valde conuenit. Magnæ tamen de eo apud auctores habentur controversiæ, aliis scilicet afferentibus, hæc verumem vnguentum valis verò ex plurimis vermiculis simul unitis compositam, quos vermiculos cucurbitinos appellat, & lati lumbrii particulas esse aliter, alii verò quantum lumbicorum speciem faciunt, cucurbitinos contententes, quorum rationes, & experientia sigillatim recensere, & totas ab aliis decantata repere institui posstratio non patitur: sed ea curiosus lector apud Rondelietum. Platerum, Sennertum, aliisque innumeros.

De causa etiam lumbicorum efficiente admodum conueniunt: ut, aliis calorem putredinis, aliis natium aculeantibus, aliis vtrunque vicissim concurrere afferentibus. Primi omnia ista ex putredine secundum Aristotelem exoriri contendunt. Secundi aduenit calorem putredinis esse intentum, ignem, & destructum, quare adeo corporis viuens generationi non esse idoneum. Tertij vt pugnantibus hæc intentis conciliant, dicunt a calore putredinis materiam disponi ad generationem vermium, eoque ita præparatam a calore natum per viam concoctionis in lumbicos conuerti. Quæ tamen conclusio subiliter non potest. Siquidem ex axiomate physico, eund. in est materiam disponere, & formam inducere, atque ita præparato materiam & inductione formæ, ex eodem agere proficisci debet. Deinde in cadaueribus generatur vermes in quibus nullus est calor natius. Dicendum est calorem, qui putredinis est respectu materię putrescentis, fieri natium respectu lumbrii, quia calor naturalis & putredinis differunt tantum gradibus, sed ad diuersorum animalium generationem diuersi caloris gradus requiruntur, quare calor qui putredinis est respectu nostri potest esse naturalis respectu alterius animalis, si calor quicunq. naturalis est, nobis est febrilis: & per consequens putrefaciens. Multi coniungunt ad calorem Solis, qui est causa vniuersalis omnium generationum. Sed agnoscenda est perpetua causa peculiaris, à qua immediatè productur effectus, concurrente & cooperante causa vniuersali. At Iogegrauior hæc etiam occurrit difficultas, ex eo quod vulgatiſſimo

visimo theorematē sanctum est nihil posse seipso nobilius generare: atque ita calorem non esse principium agens in generatione lumbricorum, qui ad substantiā categoriam referendi funticulari verō esse accendens; & quidquid de sole, dicatur, perpetuo forma lumbrici, & virtute forma vivens, nobilior est forma solis, quae tantum est forma mixti. Haec dubitatio in grauem illam atque prolixam de generatione aequoquā disputationem non conijcit: in cuius ambagibus praestantissimi quidam philosophi integris voluminibus se fecerunt, ut quos lectorem remittimus, & in primis Forcunianum Licetum lib. de *generatione viventium* etc. Sufficit hoc loco dicere, multorum opinionem eo deduci, ut credant multipliciter rerum feminā in variis substantiis latitare, quae iuxta varias illarum permutationes, in lucem emittunt, prout videlicet marcia per putredinem, aut aliam, quamvis alterationem, ad hanc velillam formam recipiendam, magis disponitur; & semen illi dispositioni magis analogum seiscitur in actum, formamque sibi propriam in materiam introducit. Haec sententia non valde recedit a veteris philosophia, quae docet formam educi & potentia materiae Sed si quis dicit velillam, luminis rerum in materia reconditae, & vere sine efficientia, quoniam solam materiam potentiam agnoscere, quae nullam habet efficiendi vim, cum illa eius materiae potentia inqueat, cum est aliquid efficiens, quod formas illa educat, aut potius in eam introducat.

Causa materialis lumbricorum vulgarissima est pituita dulcis, putredinem concipiens, cuius putredinis ope eam acquirit dispositionem, ut in lumbricos transmutetur, verum nullo modo necessarium putatū, ut alimenta vermibus generandis, docuit in pituita prius conuertitur. Ex ista enim immediate, dum putrescit, vermes generantur, quemadmodum videmus in carne, calce, calcantibus pomis, putrescentibus, aliisque innumeris fructibus vermes per putredinem produci. Ita fit in corpore nostro, quicquid perit edinem conficitur in ventriculo, & coactum ad intestina denaturatur, quod si carnem admixtam habeat, quae tam cito coacta non potuit, illa cum lacte simul in intestina demutatur, quibus putrescit, & in lumbricos conuertitur.

Hoc verō tyrones aduertant, quod in praxi quotidie observatur, pueros lactentes, quibus carnes exhibentur, a lumbricis maxime infestari propterea quod tenelli eorum stomachi solidum illud alimentum concoquere non possunt; ideo corrumpitur, & in lumbricos scissit. Adde quod lactescentia conficitur in ventriculo, & coactum ad intestina denaturatur, quod si carnem admixtam habeat, quae tam cito coacta non potuit, illa cum lacte simul in intestina demutatur, quibus putrescit, & in lumbricos conuertitur.

Obseruent etiam iuniores, ex lacte solo nunquam lumbricos generari, ut, quoties de morbo infans aliquis ambigatur, virum scilicet ex lumbricis labores, quos mulierculae perpetuo acculant, omnesque morbos infantiles, ac pueriles ad lumbricos referunt; quemadmodum omnes mulierem affectus vtero adhibentur. Medicus certō pronuntiare possit, quando illud illud lacte solo velatur, neque carnem aut iusculum ex ea gustauerit, lumbricis non laborare. Hoc docuit differre Galen. *comm. aph. 26, sect. 3*, dicens in pueris lac lugentibus vermes non generari. Cuius rei ratio perspicua non est. Mali dicunt in pueris lactentibus calorem non esse satis fortem ad lumbricorum generationem. Est fulcrum responso auctoritate Galeni dicens *loco citato*, ad generationem lumbricorum requiri calorem fortem; unde sic dicit, ut lumbrici magis generentur in pueris adultioribus quam in infantibus, quod docet Hipp. *Aph. praedicta*. Cui tamen doctissime ille Hippocrates refragari videtur *de morbis*, dicens in pueris dum vtero clausi sunt, generari vermes, at illi non habent intensiorem calorem, pueris lac lugentibus. Est idem Hippoc. aliam reddit rationem cur pueri in vtero clausi vermes generentur, quia, inquit, *aut in ipso vtero, aut postquam vero in lucem exierint non generantur, quia in his amplius fides non retinetur*. Quod tamen satis facere non videtur, siquidem in pueris extra vterum lac esse saepe remanet, & lumbrici tamen in ipsis non proueniunt, quando si solo lacte videntur. Cum igitur praedicte rationes solida ingenua non explicant; no-

uas hac in re sapientium cogitationes expectamus, & interim quid nobis videatur, paucis aperimus, id doctorum criterio libenter subiicient. Dicimus igitur lac putrescere, aciditatem contrahere, quae inepta sit lumbricorum generationi, immo vero illi fortiter obstat: acida enim omnia vermes enecare notissimum est. Hinc succus limonum ad hanc rem vtilissimus, & vtriusque est. Est in potu ordinario aqua spiritui vitrioli acidula reddita, in hoc affectu mita bilis est.

Inter causas materiales lumbricorum dulcis primum locum obtineat vulgo existimatur. Quod tamen dubitatio, non caret, cum vulgari axioma sanctum sit, dulcia facile bilefcere, & bilem amaritudinem lumbricis enecare, cui tamen dubitationi facile est respondere, in corporibus biliosis, & caloris acrimonio praesitis dulcia facile bilefcere, quae victori coctioe amaritudinem contrahant, ut in coctione artificialis quotidie experitur. Verum in alijs temperamentis minus calidis dulcia non bilefcunt, sed potius in pituitam conuertuntur, dum a ventriculo citius, quam par sit, attrahuntur ad intestina, & ita cruda, ac semicotta putrescunt, ac lumbricis generandis materiam idoneam praebent.

Sed manet adhuc difficultas de saccharo, & melle, quae cum substantiam habeant putredini maxime obnoxia, immo vtro cetera omnia, quantumvis putredini obnoxia, ab ea praeseruent, non possunt ex ipsis lumbrici generari. Quae ratio cum omnino conuincatur, dicimus ex saccharo & melle lumbricos non generari, cum habeant substantiam incorruptibilem, sed iam genitos excitant, ac commouent, quia lumbrici dulcia maxime appetentes, ad nullo & sacchari occursum facile exagitant, & versus ventriculum feruntur, nec non citissimum incrementum capunt; vnde symptomata emergunt lumbricorum confectaria.

Signa lumbricorum praesentium, & in intestinis latitantium varia sefe offerre solent, non omnia quidem in omnibus, sed plura in pluribus. Frequentiora tamen & magis ordinata sunt, oris fœtor peculiaris ad aciditatem vergens, ideo mulierculae nostrae acidum anhelum vocant, & deiectiones stercorei bubulo similes, ac griseo colore infectas, ita ut argillam dissolutam repraesentent. Alia signa infrequentiora sunt febres continuæ, quae pluries in die et acerbantur, ex motu vermium, cum anxietate, sudore frigido interdum, & animi dejectione, vomitu, & ita inextinguibili. Pulsus est inaequalis, quae alternatim rubens, aut luescens, oculi splendentes, narum pruritus adiectionum litior, & interdum tremor. Tussis adeo fœca, & exigua, talis praeter litum ex ore effluit. Interdum etiam, capitis grauitas & sopor, interdum deliria, interdum conuulsiones epilepticae. Dolor in ventre plerumque attingit, morum & erulsionem repraesentans: interdum etiam venter soluitur, ac distenditur, instar hydropicorum, interdum, hœc illa, est in somno exasperata, nonnulli in somno tremant, ac surgunt, atque iterum possunt; interdum totum corpus praeter naturam decreuit, & nonnunquam ager saepe canina laborat, atque insatiabilis: quod in lato lumbrico magis contingit, quae omnia alimenta assumpta deuorat, & absumit. Praeterea vermes eucurbitant, si excretaur hœmum, sunt indicia Alcarides v. r. ex pruritu ani molle cognoscantur, & leues non raro ipsi conserpse apparent.

Pro coronide, inter signa lumbricorum in corpore latentium censeri debet gingiuum, & vel putredo, quod frequenter obseruatur confirmatur. Puer quidam erofione gingiuum a longo tempore grauissime vexabatur, multa, variaeque remedia tam interna, quam topica ipsi praescripta, & adhibita fuerunt, frustra tamen omnia. Tandem viam, cum uorte conuulsam. Aperto corpore tanta mueta est abundantia vermium, ut aliquibus in locis intestina erofcent, multisque in vacuo ventris reperi fuerint.

Quod ad prognosim spectat, lumbrici plures paucioresque sunt, de quibus a iunioribus minoribus. Non raro periculosi sunt, & graues morbos accerunt, ut febrem intestinalem, & inordinatissimum, aphorismum, delirium, epilepsiam, colicam, vel caninam appetentiam.

In morborum principio vermes prodire, malem, tam

ymos,

vius, quam mortuus, potissimum si soli, & sine stercore exeat; viui enim summum crudelitatem, salutem pieturam significant, mortui vero magnam putredinem, & quæ euectur.

Lumbri in declinatione morbi, & iam coitione apparent, cum excrementis exeant, salutem portendunt; ostenditur enim tum naturam excrementis dominari.

Curatio lumbicorum ad eorum expulsiōem dirigenda est, cum sint toto genere præter naturam. Illa autem expulsiō commodè perficitur cathartics medicamentis; quæ vermes euectant, & expellant, tum etiam putredinis materiam, ex qua generantur, euacuant.

At vetò inter purgantia præstantissimum est rhab. quod etiam præsentia alui fluxui & febrì conuenit. Illius tamen, exhibitionem præcedere debent lumbicos euectantia, aut saltem quæ ipsos ad inferiora intestina detrahant, per os assumptum quæ eisdem deorsum euocant, per clysterem inieciā. Quorum formulæ vulgò in hunc modum se habent,

℞. Aquar. graminis & portulacæ vnc. j. sem. syrup. de limon. Vnc. j. confect. de hyacinth. Drach. j. pulueris contra vermes 3 j. Fiat potio, quæ detur statim, & paulo post clyster sequens inieciendus est.

℞. Hordei integ. furfuris macris & rosar. rubr. an. P. j. liquirit. ras. & passul. mundat. ana Vnc. j. coquantur ad 1/2 sem. vel quartaria tria pro puero. In colatura dissolue sacchari rubri Vnc. j. vitellum oui n. j. Fiat clyster. Potest addi cassia, vel catholicon, si magis laxare est animus.

Quibus remedijs semel aut bis vsurpatis, potio sequens propinanda est.

℞. Rhab. closti Drach. j. fantali citrini scrup. sem. Infundantur in aquæ graminis, aut portulacæ Vnc. j. vel iij. In expressione dissolue rhab. puluerat. & puhi contra vermes, an. scrup. j. syrup. rosar. Vnc. j. Misce, fiat potio. Vel

℞. Rhab. puluerat. & corallinæ an. Drach. sem. plus, minus pro ætate, aquæ graminis vnc. j. syrup. violac. vnc. j. Fiat potio.

Si febris magna non adest, hietæ picæ Drach. j. plus, minus, potioni admiscenda sunt, illa enim propter amaritudinem lumbicos potenter euectat & expellit.

Si vero prædictis remedijs non cesserit affectus, ad sequentia transieundum est.

℞. Rad. graminis & acetosæ an. Vnc. j. sol. endiuie, cicchorij, acetosæ, & portulacæ an. M. j. lummitarum hypericis cordij, & centaui minor. an. P. j. corallin. Drach. iij. Coquantur ad 1/2. In colatura dissolue syrup. de limonib. vocat. Fiat iulep. pro iij. aut iij. dosibus, bis in die sumendis.

℞. Vnguenti de archanita Vnc. iij. mercurij crudi 3 j. Misce, mungatur rotas venter.

Deinde purgatio repetenda est, imò frequenter iteranda donec impuritati corporis sit satisfactum.

Imò vetò prædicto decocto senna, agaric. rhab. &c. addi poterunt, & runc semel tantum in die erit exhibendum.

Rondelatus valde probat electar. diapicrat. tanquam remedium potentissimum ad vermes deiciendos, & putitum expurgandam, ætiam chylum corruptum, ex quibus generantur & nutriuntur vermes; tum etiam infusioem agarici in oxymelle. Quæ remedia præcipue conueniunt, si febris non aduerit.

Quia vero sæpe non nisi magno labore, & longo tempore verminosi affectus in nonnullis pueris expugnari possunt, quinque plurima remedia, æque præstantissima, ab autoribus inuenta & vsurpata sunt, tum interna, tum externa.

Inter interna primum recensere debent pulueres varij, quorum formulas apud autores præbent videre est.

Ad præcipuos vero sequentes referendi sunt, quorum, desisset a scrup. ad Drach. pro ætate puerorum, cum liquoie idoneo.

℞. Sem. fantonici quod contra vermes vulgò vocant, vnc. sem. corallinæ Drach. iij. naturæ cornu cerui Drach. j. Fiat puluis.

℞. Sem. contra corallinæ, & corn. cerui, ad summam albedinem vti, ana partes æquales. Vel

℞. Pulv. hietæ 3 j. p. 3 j. idem contra cordij, centaui minor. corallinæ an. Drach. j. Fiat puluis.

℞. Rhab. & agarici an. 3. ietrochile, athandal. scrup. i. diargryd scrup. j. corallinæ, cornu cerui vti, an. 3. j. smyrthæ cedoar flor. tanacet. an. scrup. j. lalis abobthi & tartarianæ, Drach. j. Fiat puluis tenuissimus.

In hisce autem pulueribus aduertendum est, vt ex calidioribus medicamentis compositi, in calidis naturæ & febricitantibus, araro & in minori dosi vsurpentur.

Mulierculæ vulgò pueris à lumbicis male habentibus exhibere solent sem. contrā saccharo incrustatum vel nudum sem. cum melle permixtum. Quod remedium præstantissimum est, siquidem lumbici dulcium rerum audiū mel deuorant & cum melle semen quo interficiuntur.

Qua vero semina alia valde calidum est, temperari potest si in aceto infundantur per duas horas; postea verò cum melle eodem melleatur ad totam opiat, quam Amatus Lusitanus prædicat, tanquam primum aduersus lumbicos remedium.

Cornu cerui vti & Foresto maxime laudant, cum passulis, aut alio quouis modo exhibitum, vt nonnulli hoc solo remedio curati finitis præcipue conueniunt, qui lumbicis cum alui fluxu laborant. In qua affectum complicationem commendat etiam succum plantaginis, & decoctum centinodie in potu exhibitum. Quibus addi possunt topica venter admoda, partim astringentia, partim lumbicos euectantia virtute prædita.

Vulgo etiam vsurpatur à mulieribus oleum commune, cum vino exhibitum. Illud autem lentore suo, animalium eorum, quæ sola transpiratione viuunt, spiracula occludens, ipsa suffocat & interimit. Vinum etiam a crimonia sua, eadem intericit. Ad præsentē febre, melius est oleum cum seccho limonum, vel granatorum admiscere; vel quod multo præstantius est, oleum amygdal. amar. cum prædictis succis vel aqua florum arantiorum.

Stocheus in Empirica sua, oleum è ligno exsiccatō corryli, seu ouellæ per descensum paratum laudat, si vna, vel duæ guttæ puero exhibeantur, grandioribus vero, tres, vel quatuor cum melle panis immediat, inquit, interfecti, & educti per fecum, iuniora verò lumbicis, & pediculis extra corpore seu contrahi euect. Volunt autem authores peritissimè hoc oleum è ligno corryli extractum esse, oleum illud heraclinum, quod Martinus Rulandus pueros à lumbicis ferè in momento liberabat, habere & vmbilicum eodem illinendos; vt passim in illius centurijs videre est.

Nos autem experti sumus, oleum iuniperum ad guttam vnā exhibitum cum iulepo, puerulis hisce à lumbicis laborantibus multum opulari, in odore febris absit.

At reliquis omnibus remedijs forte prælati mercatius crudus, cum per eos exhibere audeamus, quod tamen magnorum virorum suffragia fieri posse testantur. Quorum vni nullam in medium proferam; vt qui hoc remedijs genus tentare voluerint, ad nimis sine auctore scisse existimetur.

Matthiolus epist. 4. ad Stephanum Laureum, Medicum Celsareum. Cum inquit, argenti vniū nulla alia leuiter a facultate (vt Dioscorides inquit) interima; quā quod sua ingens pondere interfocare lacertis; nihil fieri verendum videtur minus, quantū ut id posse moliri, inquam; præsertim cum sua granitate & sphaerica forma, facile è corpore per os inferri laetatur. Idcirco mirari non debemus, si Brasimolus, tam clarus atque nostra Medicus, ad necandos interuentum vermes, ad pueris argentum vniū nulla incommodo scriptum reliquit; & etiam salicet res eas sit alter quā clarissimis Medicis Patens, quāquam parando, tandem rationem minime inquam docere voluit. Atqui ego, si hoc medicamentum nunquam sum vsurpandi tamen darsi sept illud scrupulis, vel si quadrata pondere à Gortensius obstricere, ex præstantibus mulieribus, nullo profero incommodo, sed salicet, semper euenit. Hæc Matthiolus.

Fallopianus tract. de morbo gallico cap. 76. Si bibulus inquit, argenti vniū illud non facit, quod vniū. Vidi mulierem quæ libris eius bibulus ut abortum faceret, & sine noxa. Ego exhibui in vermibus puerorum, & nullam parit symptomata, solum necante vermes.

Piatrus in curatione lumbicorum, Argenti vniū inquit, quatuor vniū vel alteram vel 3 j. aliqui diligenter dam prope-

nant

nant quod vermes, quibus maxime aduersum acie fugas, potest. que emoxit vt alibi etiam dictum fuit.

Apud Fabricium Hildanum observ. 71. cent. 2. in qua de apud historiam curiandam mulieris lumbicis laborantis. d. Gilberto Saraceno ad dictum Fabricium missa, sequentia habentur. poli quorundam remedium enumerationem. Hic ad dictum est ex hydragry prostantissimum remedium illud enim ad sequestrationem porum, & per certum tractum haurientes ab eo infestare cessant cum dura hac animula.

Ioannes Baptista Zappata lib. de secretis mirabilibus, c. 5. iniquos proponit historiam lumbicis laborantium mercori viua facit curam quibus infinito alia remedia. tum aloë & abstinum frustra viuprata fuerant. Illius autem exhibendi nodus duplex ab eo proponitur. Primus talis est.

¶ Arg. viui 3. pro puerulo vero 3. vel ij benioini 3. fl. aq. vitæ rectificatæ guttas iv. vel v. Mucetur simul in mortario vitro cum pulitio vitro. Postea adde confectæ rosar. aut violar. q. ad incorporandum fiat bolus, quem capiat arg. man. per se, vel in pane hostiario. Secundus modus talis est.

¶ Sacchari valde rub. parum, aqua commun. guttas iij. vel iv. Mucetur in mortario vitro ad consistientiam mellis. Deinde adde arg. viui quantitatē dictam. Incorporetur simul addendo olei amygd. dulc. guttas vi. aut vii. quæ impediunt ne mercurius visificari possit. Mucetur omnia. Tandem cum pauca confectæ rosar. fiat bolus.

Barcellus in hortulo genali hæc habet. Hydragryum, quod a multis venenum existimatur siccissimum succu contra vermes ætæ betur. aut aqua certitudinis illud in Hispania reputatur mulieris tenellis putris; quæ illius veneni laborant ad quantitatē granorum in. in propria substantia propinare audent. Hæc autem via mortui cessare videtur frequentius experientis. Ego quidem videram mulierem curam, quæ nomen dierum spatio, venenissimum caninus ex vermibus laborabat, & fere videri non comederat, nec cibum retinere valuerat. Hæc cum hydragry 3. parum tantum cydonia mortificati propinare, absque ulla molestia per aliquem centum & plures dies sic vermes, & eadem de libertate est, & solita exercitio omni & foris nequaquam profecto parentum admirationem, cum gravis debilis & emaciata esset. Alius etiam exhibuit, & bene semper euenit; domique continuo aquam habuit, in qua hydragryum infusum retineo, illamque pueruli pro vermibus libentissime concedo: nec adhuc quempiam ex illo noxam accepisse experies. Vt ut hoc remedio ad vermes necandos Maribus, lus. Hora ius Anguina, & plerique alii celebres vires, qui omnes huius oculis maxime excellunt beneficia. Datur pueris in substantia 3. i. grandioribus 3. ii. vel 3. iii. Corrigitur illud & mortificatur in mortario vitro cum saccharo rubro, idque tantum conseruetur in porce immixtibile dissoluitur. Ne autem in pristinum formam iterum redeat, olei amygdal. dulc. guttas duas addere oportet; cum saccharo rosæ osolato, vel cydonia iuncoformacho languentibus propinatur. Hæc Barcellus.

Sanctorius in meth. vii. ant. error. lib. 5. c. 11. Nisi, inquit, in lumbicis necandos ad valida presidia conueniamus, vt ad aloem non iam, vel ad mercuri 3. cum aloë & terebinthina panis, ad pilula peraxique formam recipi, nihil sit.

Qui mercurii crudi vium reformidant, eodem præparato vt possunt, nempe mercurio dulci, non solum ter, (vt vulgo sic) sed etiam licet fabulato; vltiori enim præparatione malignitas illius magis retunditur; admixtis aliquot granis diagrydii, vt citius & corpore eliminetur, simulque lumbicis, eorumque materiam expellat.

Quantitas autem illius augenda, vel minuenda est pro ratione ætatis. Exempli gratia pueris octo, aut decem annos natis ita præscribi poterit.

¶ Mercurii dulcis gr. xii diagryd. gr. vi. fiat puluis, qui datur cum pomio cocto saccharo consperso vel panetella saccharata.

Pro potu ordinario aqua supra laudata erit vtilissima ex hydragry miluione parata, vel in qua hydragryum per horam integram in ampulla vitrea semiplena agitatum, fuerit.

Vtilis etiam est aqua in qua stannum fulum sæpe extin-

ctum fuerit. Si verò hydragry vt lubet, satius est aquam cum eo parum bullire, enim efficacior redditur.

Non minoris forte est efficacia aqua fontis, cum spiritus vitrioli aut sulphuris guttis aliquot acidula reddita: sunt enim acetositates illæ specifica materia qua moriuntur vermes. Aqua vero, pro vt puer est grandior, magis vel minus acida est efficienda.

Vulgo autem viupatur pro potu ordinario, decoctum graminis, aut coriandi præpar cum syrupolimonum, aut granatorum mixtum. Vel decoctio graminis iaccharum cum acem tantillo admisceri poterit.

Dum prædicta remedia viupantur, clysteres toto morbi decursu frequenter inieciendi sunt; primum attrahentes lumbicis, ex dulcibus compositi, vt ab initio dictum est. Qui non solum ex decocto liquiritiæ, pasiluræ, & ficuum parati possunt; etiam ex iussulo puli admixto saccharo & melle rosaceo, vel ex lacte si febris absuerit, aliqui facile contempnunt.

At si lumbicis in crassam intestini esse coniiciamus, quia tunc vix amplius intenua possunt ascendere, medicamenta illos emaciant per clysterem infundere possumus in huius composita.

¶ Rad. gram. vnc. i. sol. betæ, mali mercurial. & portul. ana M. ss. corallina 3. i. coriandi præpar. & sem. conor. ana Drach. ij. In aqua que fiet decocto in colatura 3. ii. dissolue olei rosar. vnc. i. cassiæ decocto extractæ 3. vi. distillatæ 3. ii. mellis violaci 3. i. Fiat clyster.

Si fortiores desideres.

¶ Rad. gentian. vnc. i. abstin. vulgaris, & abrotoni ana. M. cent. min. M. sem. lupinor. vnc. ss. sem. contra Drach. ii. Fiat decoctio. In colatura q. dissolue olei abstin. vnc. i. sem. salis Drach. iij. Fiat clyster, qui iterandus est, & in posteriori vt vermes necati educantur, dissolue benedictæ laxatiue & huius picæ ana. Drach. i. vel vnc. iij.

Si præfens sit alui fluxus, clyster sequens inieciendus est.

¶ Rad. tormentillæ & artillo rotund. ana 3. i. cortic. granar. & myrobabali ana 3. i. Jentum p. i. bacca rumi myrta 3. i. rolar. rubr. p. i. Fiat decoctio. In colatura dissolue olei menthæ, vel abstin. 3. i. Fiat clyster.

Externus vero ventri admoventi solent topica varia, non solum antea propolacæ sed etiam sequentia.

¶ Rad. gentian 3. i. rad. artillo 3. vi. cortic. arantioe. 3. i. colocythid. 3. i. cornu cerui vlti 3. ii. croci 3. ss. Fiat puluis, qui lubigatur cum oleo de abstinio, vel amygd. amar. & addita cera fiat vnguentum.

Item oleum simplex cum pulpa colocynthid. decoctum, efficacissimum est.

Item oleum de abstinio & hyperico, toti ventri manè & sero admoendum.

¶ Ol. abstin. menthæ, & amygd. amar. ana 3. ss. succi abstin. rutæ ana 3. ii. tormentillæ, dictamni albi zedoar. ana 3. ss. fellis bubuli 3. i. oil. 3. i. Pulueriscentur, & cum modica cera fiat vnguentum vel.

¶ Colocythid. Drach. vi. Terantur, & cum felle bouis & vino imponentur vmbilico. Quo remedio & vermes interficuntur, & venter soluitur.

Myrrha 3. vii. mastich. 3. viii. aloes hepat. 3. x. viii. al. com. th. i. Consta omnia desiliuntur per rectorem lenem igne, & magna diligentia: exibat primò aqua deinde oleum igne. Quo si illinarur infantium vmbilicos, omnino purcedem corrigi, qui in eorum melencerie rellagnat.

Cataplasma etiam in hunc modum concinnari poterit. ¶ Farinæ lupinor. 3. ii. myrrhæ aloes ana 3. i. fellis bouis quantum satis, olei de abstinio 3. ii. Fiat cataplasma ventri admoendum.

Si alui fluxus diutius perdurauerit, cataplasma sequens admoventi poterit.

¶ Olei ydonior. & abstin. ana 3. i. succi portulacæ cum aceto & extracti vnc. i. sem. farinæ lentum. vnc. i. farinæ lupinor. vnc. i. sem. coralli rubr. cornu cerui vlti ana 3. i. Incorporantur simul, & cum pauca terebinthina fiant ad iocendam cataplasma atis.

Ex folia hiera picra cataplasma confectum efficacissimum est.

Fotus etiam iuxta lūm adhuc possunt, quando magna yen.

ventris inflatio & tensio apparet, in hunc modum compo-
fiti.

℞ Fol. abinthij. abrotoni. tanacetij. cordij. malus & vio-
larie. ana M. j. lupinor contulor. Vnc. sem. centaur. P. j. Co-
quantur in aqua & aceto. Foveatur totus venter calide fre-
quentur.

Denique ad latos lumbros & alcarides, clyster ex ama-
ris composuit erit vtilissimus. Cui addi debet purgantia
toties repetita, donec corporis impuritas, ex qua illi gene-
rantur extirpata fuerit.

CAPVT X.

De hæmorrhoidum fluxu immodico.

Licet moderatus hæmorrhoidum fluxus salutis sit, &
a multis morbis, isque gr. auissimis hominem præfer-
uat, ac liberare solet, quemadmodum docuit Hipp. in
Epidem. & Aphorism. nempe pleuritide, peripneumonia,
nephritide, mania, melancholia, aliisque innumeris. Im-
moderatus tamen periculosissimus est, alioque morbos
periculosos inducit, nempe totius corporis imbecillitatem
omnium viscerum refrigerationem, & præsertim hepatis,
atrophiam, cachexiam, & hydropem propter caloris natu-
ri deperditionem, effluo vitæ thesauro, & totius corporis
fomento.

Ille autem fluxus immodicus easdem habet causas, quæ
alia sanguinis profusio excitare solet; & sanguinem num-
rum quantitate, vel qualitate peccantem. Dum quantitate
peccat, & magna copia ad venas hæmorrhoidales defertur,
eas impensè dilatat, & oscula illarum aperit, quod quidem
fit tunc temporis robore facultatis expultricis: sed nimia
interdum copia sanguis ad eas venas propulsus, retentior
oppriuit, unde fit, ut illa in officio suo deficiente, fluxus
fiat immodicus, qui artis ministerio cohibendus est.
Dum verò sanguis qualitate peccat, acrimonia, vel tenuitate
nimia facultatem irritat expultricem, quæ non solum in-
iungit, sed etiam vitium sanguinem per illas venas ex-
ternit. Sanguis autem huiusmodi fluxum immodicum efflu-
ens acrior redditur ex permixtione bilis, aut feri acrotes.

Cognoscitur immodicus hæmorrhoidum fluxus ex viri-
bus proflatis, & imbecillitate, quam æger percipit, & ex
disturnitate fluxus, ac copia sanguinis excreti; tum etiam
sædo totius corporis colore ad cinerum vergente, ut æger
iætero laborare videatur.

Si a sanguinis quantitate prodeat affectus; præceter
causæ sanguinem multiplicantes, & patientes in principio
leuiter fuerint, alacriorque sunt; postmodum verò perpe-
tante fluxu, debilitantur, ac vires eorum maxime de-
ficiunt.

Si verò à sanguinis acrimonia, vel tenuitate nimia fluxus
immodicus oriatur, causæ bilēm generantes aut ferum acre
multiplicantes præceterunt; temperamentum corporis
adest biliosum, & exsultum; sanguis magno impetu effundit-
ur, & effusus admodum rubicundus, rutilus, ac veluti flam-
meus apparet; cum aliisq. folia quantitate peccet, subniget
& melancholicus effluere solet.

Prognosis ex prædictis sufficienter colligitur, cum gra-
ues affectus, quos fluxus hæmorrhoidum immodicus efflu-
sequuntur, enumerauimus.

Ad curationem, sanguis immodicè fluens cohibendus,
aut saltem moderandus est; quod fiet reuellentibus deri-
uantibus, incassantibus, & astringentibus remedijs.

Ac primum phlebotomia in omni sanguinis profusione re-
uulsorium est remedium. Ideo in profusio hæmorrhoi-
dum sanguis ex vena brachij erit detrahendus; maiori qui-
dem copia, si plenitudinis quedam signa appareant, &
nonnihil maxima sanguinis quantitas per hæmorrhoidas
effluxerit. Alioquin in exigua quantitate, & partitis vicibus
tantum erit detrahendus.

Sanguinem etiam per dictas venas effluentem reuellunt
irritationes, & ligaturæ partium superiorum, tum cucurbitu-
lar, scapulis, mannis, & hypocondrijs adnotæ, quæ ad ma-
iorem reuulsionem in capulis (sanctuari) poterunt; in om-

nibus autem locis prædictis plures, & frequenter erunt ad-
mouendæ.

Purgatio etiam blanda humores biliosos sanguini im-
petum concilians ad intestina deriuat; eaque fieri debet ex-
purgantibus astringendi vi præditis, ut rhubarbaro, myro-
balanis, & tamarindis, qualis ad vomitum sanguinis fuit pro-
posita. Docetque Mercurialis tamarindos, præcipue, ad
compellendum huiusmodi sanguinem fluentem, miramur,
quandam potestatem habere, tam decoctis, quàm in sub-
stantia viurpatis. Imò pruna hollratia acidula, quæ aliquo
tamarindos emulantur, frequenter citata ante alios cibos,
huic rei etiam conducere. Illorem præterea vñs erit con-
uenientissimus, ut alius laxa feruetur, ac si non sufficeret,
alia etiam addenda erunt, quæ ad alui astringentem fuerint
proposita; quandoquidem vii medicamentorum astringen-
tium alius confutatur, & in conatu, qui ad facies du-
ros expellendus necessarius est, hæmorrhoides magis
aperiuntur, ac copiosum sanguinem effundunt.

Postmodum ad ea remedia veniendum est, quæ sangui-
nem incrassant, & venas laxiores costringunt; qualia sunt
ea, quæ ad sanguinis vomitum, & sanguinis (putum, in for-
mam silepi, pulueri, opiatæ, aliorumque (super) proposita,
sunt. Deueniendum etiam ad narcotica, ut ibidem dictum
est, si maxima necessitas postulauerit.

Ac præter illa remedia, valde laudantur ab auctoribus
pilaule de bellio, quæ tamen reijcit Rondelietus; propte-
rea quod verò de bellio Pharmacopoei careant, & illius loco
myrrham vsurpent, quæ sanguinis fluxum promouet.
Verum huic obijcit Solenander, aliisque experientie
peritiam opponit, assensens ei in vi hærum pilularum, ut sunt
præscriptæ, atque cum vñato bellio compositæ, effectum
quem promittunt, tam euidentem comprehendisse, vt de
compositione dubitare vix queat. Nisi quis putet ab adie-
ctis siccatibus & astringentibus, hoc qualescunque quod
recipiunt myrrham, obtulum (super)arumque esse. His addere
possumus, Baideronium in Pharmacopoeia, alioq. recentior-
um assensens, verum hodie bellium, Dioscoridis descrip-
tioni consensens, ex India nobis afferri, & a myrrha non di-
ficile distingui. Illarum autem pilularum vii talis esse po-
terit.

℞ Pilular. de bellio 3. j. trochisc. de carabe, & de terra si-
gillata, ana 3. j. Cum macil. sem. ydoneor. extracta. cum
aqua rosaceâ fiat massa pilularum, de qua capiet 3. j. bis in
die, ante prandium & cenam.

Topica remedia eodem tempore vsurpanda sunt, in va-
riis formulis redacta.

Fokus ex verbasci, seu taphi barbari decocto in aqua fer-
rata, vel vino atringente parato conuenientissimus est; hæc
siquidem planta hæmorrhoidum fluori, & dolori appro-
priata est, in vii verò fomenti diligenter obseruandum, vt
frigide vel saltem temperate admoceatur.

Magis composita decocto in hunc modum præscribi
potest.

℞ Radicis bistortæ th. g. folior. plantaginis, verbasci, sum-
miratum rubi, & quercus, ana M. j. si granorum sumachi,
balaustior. galliar. viridum, & malcori ana M. j. myrrhellor. 5.
sem. rosar. rubrar. P. j. aluminis 3. j. Coquantur in tribus par-
tibus aque feratæ; & vii rubi adhiberi pro foru.

Marinus & Iulianus fomentum laudat ex duobus faccul-
lis, alternatim calide admotis: ex rubro panno confectis, &
glândibus contusis, ac quereus folijs repletis, & in forti ace-
to malum decoctis, quibus oculus fluxus consistit.

Ex decocto superioribus, adacti dosi simplicium, potest
fieri incillus, quo vitatur æger subrigide, vt de fomento di-
ctum est.

Vnguentum compositæ ad fluxum cohibendum vñssim-
um est; eoque magis debet dori, & hæmorrhoides, vel in
rem præsentem tale componi poterit.

℞ Ol. rosar. omphacis, & myrrhellor. ana 3. j. succi plan-
taginis & taphi barbari ana 3. j. sem. acet. vini rubi vnc. j. Bulliant
ad succorum consumptionem, deinde adde boli ar-
menæ, sanguinis draconis, thuris, & scoræ ferri subtilissimæ
puluerat ana 3. j. ceræ 4. j. Fiat vnguentum.

Rondelietus magis probat vnguenta quæ sine oleis pa-
rantur, quia magis astringunt, eaq. in hunc modum paratæ.

℞ Sicc.

In Succo plantag. bullæ pafforis. & tapfi barbati. an. vnc. ii. Syrup. acetosi (simplicis vnc. ii.) Coquantur simul leuiter. Pollea misce sanguinis draconis vnc. i. boli armenæ, terzæ sigillatæ, & radices bi fortis subtilissime puluerant an. 3. Jem. ceruillæ lotæ 1. ij. Misceantur ad formam linctus.

Si hamorrhoides sint exulceratæ, sequens parati poterit.
y. Olei rofacei. Vnc. ij. thuris & aloes, an. 3. j. iacoccoli, sanguinis draconis, boli armenæ, an. 3. semipodii, carabes an. 3. i. amyli 3. iij. succi plantag. Voc. 3. Fiat vnguentum.

Pinguis anguillæ, quæ dum torretur exsudat, vnguentis addita, per opietate quadam agens alia efficaciora reddit.

Cataplasma etiam dictis partibus valitè admouetur, in hunc modum compositum.

y. Boli armenæ, aloes, maffiches, thuris, sanguinis draconis, jdem. oil. myrbolan. indorum, & gallarum, ana 5. j. Subjacetur cum albumine oui & succo plantag. fiat cataplasma.

Vel pilli leporis combusti, & tela aranearum minutissime micantur cum albumine oui, & fiat cataplasma, quod ipsi venæ aperitæ apparetur, vitulæ admouetur, aut in podicem utandè inferetur.

Suppositoria huic vici sunt valde idonea, quia penitus in partem deiciuntur. Hæc autem forma talis est.

8c. Colophoniz, thuris, ana 3. ij. boli armenæ vnc. fem. ceruillæ, plumbi vitiani 3. j. acaciæ 3. fem. Subtilissime trita, expiantur leuo hircino pro formandis suppositoriis.

Iniectiones per syringam in anum sunt, ex succo plantaginis, alijsque supradictis ad totam propolis. Sanguis cuius animalis recenter extractus, & adhuc feruidus iniectionis tribuitur linguem, ex aluo produlcentem cohibet.

Pulvis arictis adhuc calens & cretæ, podici subiectus, magis in infundendo sanguine habet efficaciam.

Si Sudoris etiam in eundem finem vitulæ viamp: hntur, ex decocto lotum prædictorum parati. Quibus etiam admi. puluic, qui in dyfenteria curatione fuerunt propoliti. Iam eam sequens.

te. Iuris, aloes, maffiches, rosæ, rubr. myrtulor. & abfin. thuris 3. iij. sem. trochilæ de carabæ 3. ij. fiat pulvis crassior, car. bonibus impandus. Cuius recipiendus est in cathetura perforata per infundibulum ampullam, cuius angulo orificio aperitur tubulus ex ligno, vel arg. intus an. demill. s.

Suffragina ex decocto tapfi barbati omnium scilicet vituliculis est.

Si venæ ipsi fluenti remedia applicari possint, reliquis præferenda sunt. Ideoque vt illa apparet possint, æger supra mentem collocatus podicem exprime debet, quasi deinceps velatidone conspiciat si adhuc in inferiorem opus fuerit institutio ad eum non nisi inuertendum. Tuncque reuæ cataplasmata prædictum, ex telis aranearum & pilis leporinis, vel alia remedia validissime fuscianta adhibenda sunt, vel bolus armenæ, alumen aut vitriolum vitium. Olio etiã vitriuli venam tangere efficacè est remedium, vel in extremo periculo aqua forti appellata.

Quibusdam conferentibus Hipp. lib. de viis. ratione in actus, lib. de hamorrhoidibus, de ligatione, sectione, & vitiocon hamorrhoidum proponit, vicia seruata, quæ tamen operationes tanquam laboriosissima & valde periculosa oltis temporibus oboliunt. Quamquam Massaria hanc semel operationem se vidisse refert, cum historiam proponere erit vtilissimum: siquidem ex ea operandi modus, cuiusque euentus aperte docetur. Ea autem talis est. Fædericus Cæsius, sanguinis laborantibus primam dolorem, deinde immo deinde fluxione hamorrhoidum. Et cum ille multa præstidia expertus fuisset frustra, tandem Patavium se contulit, ubi Ab. Alcius communis confesio statuerunt sanguinem esse cohibendum. Sed cum ille varia præstidia, tum interna, tum externa ab ipso præposita frustra expertus fuisset; non verbo, cum in omni malis remediis non inueniret, statuit hanc manu operationem expertus. Cum autem apud nos nullus esset chirurgus idoneus, aduocato chirurgo Neapolitano, qui hanc rem præstidit, & ab ipso hamorrhoides incisæ, ligatæ, & combussæ fuerunt. Summa autem huius administrationis est hæcmodi. Hæmorrhoidem primum accommodatè vincunt, ut nullo modo possit dimoueri. Deinde extrema capita hamorrhoidum, quæ quos alia fuerint, ab intestino extraxerunt leuiter, & separant

tum propria quadam aqua forti adducta filo ferri ad extremum tota perforant, & strillæ diuincunt, consuntque. Hoc præstidit, deinde ferre ampulæ a venarum pertinencia, quæ ex supra super est, ignite ferre eam comburant. Opus autem est dolerificum, & suffragina ad ligaturæ sectionem, & vitiocon Fæderico ferri, atque insignis dolor superuenire. Sed membra sua præstidia adhibente chirurgo, non pauci diebus, & a febre, & a dolori, & sanguinis fluxione, non sine molierum admixta vena, liberantur, integram suam sanantem viam esse recuperare. Verum tamen non est præstidendum, cum ille sibi nimium sciret, neque solum præstidisset sectionem venæ, & purgationem, ut necesse fuerat, sed & nullam vnam videri rationem præstidisset, proximo anno febre pestilenti correptus esset. Vnde obseruandum vult diligenter Hippocrati præceptum Aph. 12. scilicet, sextæ, ut vna hamorrhoidis aperta feruere. Nisi, ut docet videri, maluerit æger, quæ a suppressione immenit pericula, viciis frigali, exercitio, vena, sectione, & purgatione cohibere.

In ordinaria autem curatione, quæ per medicamenta fit, hepatis & limis ratio habenda est, cum venæ inflaræ viciis huius inflaræ inferantur, præsertim si hæc calidiora sint, aut debiliora. Ideoque non inutiliter episthemata, atque vnguentâ refrigerantia & roborantia applicantur; qualia in fluxu hepatico iucuntur propoliti, & iulius in earum partium calida interemptio, & inflammatione descendit. Aliquando etiam obstruuntur vicerum, & venarum melastrorum huic malo dant originem. Quæ omnino soluendæ sunt, vt æger ab hoc afflicto liberetur. Et nos aliquando fluxum hunc episthemacem, pilulis ex chalybe, in hepatis oblatione decipit purgationis fultissimus.

Toto autem curationis tempore vitur æger pro potu ordinario aqua ferrata, vel decocto millefolij.

Eodem tempore, præ ceteris omnibus, summa cura sanguinis vitium emendandum est, quod primaria huius fluxus causa esse videtur. Ideo si acer & biliosus fuerit, misio rhei & tam aridiorum sæpe repetito corrigendus est. Si calidus & tenuis, in crassioribus & refrigerandus. Si quælibet, delicatioribus. Si multus, victu tenui. Nam frustum de lappido huore consilium licet capere, nisi mali frugis prius tollatur. Quod abunde obliuiscunt Solenander, cens. 22. scilicet 4. sequenti historia. Mæmici (inquit) me Annam, ex Deculo, Cluentium per natam, grauiorem hamorrhoidum, dactylis, quæ fluxu carantem, magna diligentia, immoque nixu, quæ viderem vitibus labefactis, spiritibusque dissolutis, immum descremen inuenire, profusum obfirmasse. Verum cum illa videri primo de recreata sequentibus misio grauior, & circa præcordia tumere atque inflari inciperet, respectu sexto decalogi, viciis reclusis, profusum rursus moui. Neque potui, ægeri & suo stringere primum, quoniam corporis, sembris vacuatis, hepaticque necessario aliis alterantibus atque roborantibus proficissem.

Curato tandem hamorrhoidum fluxu, de præcautione cogitandum est ne iterum redeat. Quod fiet victus ratione conuenienti, phlebotomia bis aut ter in anno viturpata, purgatione vituli ex syrupo magistrali, aut alia medicamentis, cum caustico tubæ admodum, aliisque huiusmodi, quæ varianda sunt, iuxta varias corporum dispositiones. Præterea atque mineralia vitriolacæ, aluminosæ, & lerratæ erunt conuenientissima. Fontica conueniunt ad præcautionem huius affectus de coctum lentici, vel eiusdem infusionem in vino, paratam hoc modo.

y. Raturæ lentici 3. ij. Infundantur in libris xii. vini per 24. horas in loco tepido. Deinde colentur, & de hoc vino bibi pro potu ordinario per meum integrum. Habet enim vires sistendi hamorrhoides, cum etiam ventriculum roborandi.

GAPVT XI.

De dolere hamorrhoidum.

VENE hamorrhoidales in recti intestini extermitate, & anum decedentes sæpe tumore afficiuntur, ex quo grauius dolor non raro excitari solet.

Fir autem ille tumor ex eadem causa, quæ fluxum hamorrhoidum excitare potest; sanguine videlicet quantitate.

te, vel qualitate peccante; qui si viam non inueniat, & venarum illarum extremitates aperire nequeat, in iisdem congeritur, & calque rependo tumorem efficit cum inflammatione; & dolore, qui acerbitate sua omnes intensiores curatibus ad se trahit. Causa autem præcipua, cur sanguis ex illis venis effluere nequeat, est eiusdem crassities, quippe qui melancholicus est: dicuntur enim vulgò hemorrhoidales venæ præcipue, humorem melancholicum a liene excipere, & interdum expurgare.

Multe proponuntur ab authoribus hæmorrhoidum differentias magnitudinis, numero, figura, & loco desumptæ: unde alie magnæ, alie parvæ; alie plures, alie pauciores; alie visus, moris, verrucosæ, aut velicæ similes, unde viales, morales, verrucosæ, aut velicæ nomenantur: alie denique iustæ, vel externæ dici consueverunt.

Ex his diagnosis facili elicitur. Si quidem ex tumore in ani extremitatibus apparente, eiusdemque magnitudine, colore & consistencia, variz illius differentie cognoscuntur. Præterea tamen ab alijs affectibus distinguende sunt, qui non accidere consueverunt, quales sunt, rhagades, condylomata, thymi, ficulæ, &c.

Rhagades sunt vlcera quædam in fissuras diducta, quæ in se ferè similes sunt, quæ in manibus, labijs, & vehementi frigore excitantur. Nullam habent cum hæmorrhoidibus similitudinem, sed eas cum tuberculis paucis & æquidistantibus, ut omnes affectus anum obidentes cum hæmorrhoidibus innotescant, locis illi ad morbos externos propriè referendi sunt.

Condylomata sunt tumores quidam pelliculæ ani, quæ quum natura sua rugosa sibi, ad eam confluentibus humoribus, ruga aliqua intumescat, affectio illa dicitur condyloma. Distinguitur ab hæmorrhoidibus, quoniam hæc maior est, nigra, & rotunda, venam aliquam occupans, cum illa sit oblonga, concolor, & venas non attingens.

Thymi sunt tubercula carnosæ, quæ non modo in ano, sed etiam in pudendo viriliæ muliebri solent exoriri, verrucæ consimilia, & sicciorum thymi formam referentia, vnde, nomen sortita sunt. Parui sunt humiliorum tumores, colore candido, vel lubrubro, & dolores & pertusæ cum hæmorrhoidibus sunt maiores, nigriores, & vplurimum doloris.

Fici sunt etiam tubercula carnosæ: sed magnitudine thymos operantur, cum etiam humidæ, & doloris adeo hæmorrhoidibus similia sunt, sed ab his distincti, quod carnosæ omnino sunt, hæmorrhoides verò vni extrema dilatata, & sanguine turgida representant. Adde quod fici plerumque vicerantur, & malignitatem quandam præ se ferunt, quæ tanta interdum est, ut ad canceri naturam accedat.

Huiusmodi fici finitime sunt caruncule illæ, quæ ano subpretere solent, crullorum nomine donatæ, in Italia familiariores, apud nos verò infrequentes: quandoquidem ex impuro, & præputio concubitu solent exoriri; pullorum Gallinaceorum cristas referunt, vnde nomen sortiumur, tum nullam cum hæmorrhoidibus habeant similitudinem, distinctione non indigent. Hoc saltem pro coronide dicendum, prædictos omnes affectus non innatentes sola chirurgia sanari, verò peculiaris eorum Therapia proponenda non fit.

Quod ad prognosim tumantium hæmorrhoidum (peccat illæ vplurimum periculosæ non sunt, quando tamen adeo grauem inflammationem concipiunt, ut gangræne periculum imminet, aut saltem præ doloris acerbitate, & frigoris vehementer excruciant.

Hæmorrhoides si suppurentur, aut excolescentur, fistulam sepe in ano relinquunt, eamque vplurimum incurabilem, propter partem molliem, & famam humiditatem, quæ vlcis exsiccationem difficilem patitur.

Ad huius curationem primò sanguis detrahendus est, ex venis brachij, ut fiat resussio à parte altiori. Quia sufficienter celebrata, deriuatio gratia vena malloxi etiam, aperienda est.

Cucurbitulæ etiam idem beneficium consequuntur, ad motus hypochondrij ad retellendam, coxus verò ad deriuandum.

Purgantia potest iora in hoc affectu non conueniunt, quia humorem ad partem attrahunt, & tumorem irritant.

Attamen alius continuò emollienda est, quia dura excrementa & cum aliquo conatu enisla, dolorem exasperant. Ad alij autem lenitionem insulam cassie, manè & serò exhibitum, manè conuenit, in hunc modum paratum.

℞. Folior. lactuæ, buglosæ, & summitat. maluæ, an. M. ss. liquoritizæ rai & passul. mundatæ. an. ʒ. ss. Folior. buglosæ, botraginæ, & violarum. an. P. Coquantur ad ʒ. viij. In colatura infunde cassie recentis extracta ʒ. ss. Colentur & clarificantur addendo postmodum syrup. viol. ʒ. ss. Capiat bis in die, ut dictum est.

Interdum etiam ad humoris acrimoniam demulcendam emulsiones quarum ferum frigidorum, cum prædicto decocto extracti, exhiberi poterunt.

Interim topica varia parti adinueniuntur sunt ad dolorem leniendum, inflammationem auferendam, & tumorem discutendum. Oleum amygdalarum dulcium recenter extractum, parti dolenti admotum, dolorem demulcet. Idque multò efficacius prestant olea ex nucleis malorum perficorum, vel ex feminibus cucurbitæ, papaueris, & hyoscyami.

Pæcetera autem efficacissimum est oleum buxi, est enim narcoticum. Et sicuti dentium dolores quous ad miraculum sedat, ita & reliquos dolores, ac præsertim hunc hæmorrhoidalem mitigat, si illius gutta vna supra hæmorrhoides apponatur cum stylo gossipio inuolutæ, aut si cum oleo seminis lini misceatur, ea proportione, ut prædicti olei ʒ. ss. olei buxi ʒ. precipiet.

Quercetanus valde commendat oleum nucum expressum, in quo millepedes, seu alicelli bullient. In oleo communi eoque dulci, possunt etiam alicelli decoqui, & dolorem mirabiliter sedant.

Oleum quorum simplex, vel in mortario plumbeo agitatum, ad idem est efficax.

Linimenta & vnguenta ad eundem usum varia præscripta possunt. Quorum alia dolorem tantum leniunt, alia tumorem etiam discutunt, & exsiccant, alia vlcis hæmorrhoidibus moderant. Eaque cum linicis lana, aut gossipio parti admotæ sunt.

℞. Vitellum oui num. ʒ. olei rosæ, vel violæ. q. s. Fiat linimentum. Cui si vnguentum, populeum addatur, efficacius erit ad dolorem sedandum; tum etiam in dolore acerbiori opi grana aliquot admisceri poterunt. Vel

℞. A. ung. ʒ. alinæ Vnc. sem. pulp. prmi cocti, bul. cineribus ʒ. ʒ. croci rotati ʒ. ss. sem. vnguent. popul. vnc. sem. vitellum oui n. Fiat linimentum vel

℞. Olei violæ. vnc. ʒ. vnguenti populei vnc. ss. Cum ovo integro fiat vnguentum. Vel album oui, cum lacte muliebri agitatum, admoqueatur cum pannis leneis hoc liquore imbutis. Vel

℞. Mucilag. sem. psyllij Vnc. ʒ. olei violæ. vnc. iii. Fiat linimentum: vel

℞. Mucilag. femin. psyllij & smugæ. extract. cum vino, an. ʒ. ii. butyr. recentis vnc. ʒ. i. seu hœdini. vnc. i. Agitentur simul in mortario plumbeo. Fiat linimentum.

Vel butyrum solum in mortario plumbeo ductum ad solem donec nigrescat, est egregium remedium.

Pomata etiam recens parti admotæ, est valde anodyna. Vel

℞. Sacci portulacæ & mellis, an. vnc. ʒ. i. Misceantur in mortario plumbeo ad formam linimenti. vel

℞. Vnguenti rosæ. vnc. ʒ. i. mercurij crudi ʒ. ii. Misce, fiat linimentum. Vel

℞. Diachyli albi cum oleo chamemel. mollificati vnc. ʒ. cro. ʒ. ʒ. opij gr. ʒ. ii. Fiant vnguentum.

Horibus plurimum commendat linimentum ex linazie herba cum floribus, cocta cum adipe porcino. Cui expresso, & parumper refrigerato vitellum oui permiscet, idque cum lana vel gossipio dolenti parti applicat. Dicitque hoc linimentum eiusmodi dolores ad miraculum vique colescentem sistere, sequilud accepisse à Ioanne Vvolgio, celeberrimo in Hæstia Medico, qui Principi Ioh. Hæstia Landgrauio, tanquam secretum, eximium reculare noluit, donec ipsi annuatim bouem laginatum promitteret.

Ad tumorem discutendum simul & dolorem leniendū sequentia linimenta vtiliter viurpari poterunt.

Potiorum radices sub prenis cum stylo madefactis de-

coctæ.

et oleo, & cum butyro pillatæ dolorem, & tumorem auferunt. Idem præstat et rubrum cum pulpa lili decoctum, & cum oleo myrrino pillatum & lubecum. Vel

¶. Olei nucis-perficis, & olei amygdali-amararum ana Vnc. ij. sty-racis liquidæ, & bdellii, an. 3. ij. Omnia dissoluta in oleo incorporentur in mortario fist. linimentum.

¶ Balsamum sulphureus ex floribus sulphuris, & spiritu terebinthinæ paratum, præstantissimum est ad dolorem sedandum, & tumorem discutendum: tum etiam viscera earum purum mundificat, & detergit. Idipoteuitus si loco spiritus terebinthinæ, oleum hyperici & ouorum substituantur. Tum etiam in tumentibus & valde inflammatis hæmorrhoidibus loco prædicti spiritus oleum rosaceum, aut violaceum subrogari poterit.

Cataplasma etiam ad eisdem vsus commodè vsurpatur, ex quibus vulgarissimum est, ad omnes dolores ex inflammatione demulcens, cataplasma de mica panis, compositum ex medulla panis albi in lacte decocti, addendo oleum rosaceum, & vitellos ouorum.

Aqua pendens commendat cataplasma ex plantagine, patricaria, & malua in aqua coctis: & cum oleo rosaceo decoctis & subactis interdum, cum magis & ficcare est animus, farinam hordei & milii admisceat. Si vero dolor virgat, lac ouine adijcet. Idem etiam laudat cataplasma ex radicibus porrorum in oleo communi, aut myrrino coctis, tum etiam ex serofularia in aqua decocti.

Folia sambuci vitidis coquantur ad putrilaginem in aqua communi. Postea extendantur super pannum magnitudine volæ manus applicentur calide, agro prono exsistente: prius tamen parte affecta oleo communi ulla. Renouetur sæpe applicatio, & continuetur per multas horas. Ante applicationem foueat pars decocto eorundem foliorum.

Eadem lola sambuci consula, & frigide admoda, tertia applicatae dolorem sedant.

Portulaca etiam consula, & admoda, dolorem sedat, tumorem immittit, viscera consolidat, & excrecentias carneas absumit.

Ci pa alba sub cineribus cocta, & cum butyro recenti rubacta instillat cataplasmatibus dolorem sedat, & tumorem discutit.

Fotus admoventur eidem parti, ad dolorem sedandum, ex decocto taphi barbari, malua, bismalua, patricaria, semina lini fenugreci, althææ, flor Chamæm & anethi, in lacte parato. Vel lactis defecati, idem decoctum parari potest in hydreizo, vel iussulo intestinum veruens.

Infectus ex eodem decocto, aucta quantitate simplicium, parari potest.

Aqua frigida sola pro fotu vtilissima. Infectus in eadem præstans, hyeme sit tepida.

Fotus etiam vtilissimus fit ex aqua rosarum, in qua sal fatum diluorum fuerit, præsertim si pars admodum inflammata fuerit.

Ad tumorem discutendum conuenit fotus ex alumine, in vino rubro decocto.

Polypodium quercinum, & hypericum coquantur in aquis partibus aquæ, & vini, & prono corpore decocto infusetur in hæmorrhoidibus guttatim ex spongia expressa. Hæmorrhoides sensibilibus detumescent.

Ad idem conferunt aque thermales, pro fotu cum spongia admotæ, vel infectus in ipsam calidissimæ.

Aqua pendens admovent spongiam, ex aqua calcis expressam, & supra partem alligat.

Suffus ex decocto supra dicto dum feruet, exceptus, vel ex paucioribus, aut solo tapho barbaro in lacte cocto cum, etrico fecalino, dolorem quoque compedit. Vel

¶. Sempervivum mai. M. ij. Decoquantur in vino albo, & su-

mm excipiat æger in sella perforata.

Ad hæmorrhoides abluendas & exsiccandas conueniunt suffumigium ex palueribus solistaphi barbari, serofulariæ, super pronas coniectis. At efficacius fiet suffumigium, si sulphure simul utatur. Imò verò ex sulphure solo suffumigium paratur, & per tubulum exceptum hæmorrhoides cæcæ, & latentes potenter exsiccat. Suffus ex lapide priuæ in aceto extendo optimus ad hæmorrhoides abluendas.

Ad easdem hæmorrhoides cæcæ & latentes, mutum in modum conserit insecto loquens, frequenter vsurpata.

¶. Succo & plantaginis & olei violæ, an. 3. ij. balsami naturalis vnc. sem. Milce, fiat mectioe in anum.

Amatus Lusitanus curatiue q. centur. 2. suppositorium sequens hinc verbus prædicat. Romana que ad pontem sancti Angeli habitatum cum vteri prædictam patieris, de dolore hæmorrhoidum quæretur, At cum illa multas, & sceleris medicamenta admoda essent, quibus non inuenerat, ad balneum ex seu hircino cum aqua consuetam confregistis, quo dolor euasit, nec posset credi. At postea calidus roborantibus, secum, prout post admoda suppositoria fieri solet, fronsus.

Idem Amatus curatiue 6. centur. 3. sequens topicum commendat, his verbis. Reuerendissimus ille, qui ab hæmorrhoidum dolore grauiter cruciabatur, post varia & multa à medicis tentata præstidit, hoc remedium à nobis præsentare vsus fuit: Et breuè alio infestissime dolore liber euasit. Habet autem remedium sic.

¶. Arantium pomum, & ad cultro excutæ, in quo oleum rosaceum, & pædonar dissoluta, & dilata semina infundat, ad cineres calidos admovent, & calidam applicat, & sæpi innotat, est enim mirum.

In communi vsu est pulmo heediis, ex animali adhuc calens parti appositus: vel illius lamina inter duas patinas calefacta, cum tanillo aque etiam admoventur. Sic enim dolor admodum demulcitur.

Ad hæmorrhoides viceratas conueniunt tum balsamum sulphuris prædictus, tum vnguenta frequentia.

¶. Olei ouor. recentis vnc. 3. Agitentur in mortario plumbeo, & applicentur.

¶. Ol. rosar. vnc. iv. occusse vnc. j. lythargyri vnc. sem. cere nouæ 5. vj. opij 3. iv. Fiat vnguentum vel.

¶. Thuris, myrrhæ, croci, ana 3. j. opij, gr. ij. vitellum oui n. j. ol. rosar. & mucilag. semini pilythani. q. s. Fiat vnguentum.

Si non facile resoluti possint, post conuenientes resoluones aperientes sunt, conficando panno asperiori madefacto in succo ceparum, in quo dissoluta fuerit aloës 3. 3. Est secretum Hartmanni. Promptius tamen & cum minore dolore, calpepso, aut hirudinibus admotis aperiantur.

Per os etiam assumentur specifica nonnulla ad dolorem sedandum, & hæmorrhoides abluendas idonea: quorum præcipua hæc sunt.

Decoctum millefolij, in potu ordinario per triduum exhibicum, hæmorrhoidum dolem sollicitare solet discutere.

Semen trifolij hæmorrhoidalis ad 6. j. cum vitello oui per plures dies exhibitum ad idem est efficax.

¶. Taphi barbari puluis exhibitus cum lacte, vel alio modo, valde probatur ad hæmorrhoides tumentes abluendas. Puluis millefolij, & tormentillæ idem præstare valent.

Succus taphi barbari per se, vel cum saccharo rosaceo, aut penidato mixtus; vel cum saccharo in syrupum redactus, ad idem vtilis est.

Denique pillule de bdello frequenter vsurpate, tumentes hæmorrhoides absumunt, earumque causam insensibiliter detrahunt.

In ijs qui huic affectui valde obnoxij sunt, causticum tibiale vtilissime admoventur.

P R A X E O S M E D I C A E

LIBER VNDECIMVS.

DE AFFECTIBVS HEPATIS.

P R A E F A T I O.



Hepes, quæ admodum alia partes, omnibus morborum generibus communis est. Quatenus enim ex partibus suis aliis componitur, variis patitur interperies: quatenus vero est pars organica, tumoribus & obstructionsibus afficitur: ac denique solutæ contumax, vulneribus, & ulceribus tentari solet. Et quamvis hydrops totum abdomen occupet, in ascite, & tympanite; vel etiam totum corpus, ut in anasarca; præsertim illius radix, ut plurimum à vasa hepatis dependet. Nos hic affectus præcipuos, & qui frequentius in Praxi Medicæ occurrunt, exponere aggredimur, eo quæ lex capitula comprehendimus: quorum primum est de calida hepatis inflammatione, obstrictio, & vilitate. Tertium de obstrictione. Quartum de illero. Quintum de scirrho, Sextum de hydropse.

C A P V T P R I M V M.

De calida hepatis interperie.

Calida hepatis interperies in quam plurimum hominibus accutur, etque sæpe congenita, & à primis generationis principis oriunda. Quæ cum in latitudine latitatis posita sit, ea hic non agnus, sed tantum de præternaturali, & morbofa, quæ hepatis actiones manifestè lædit.

Illa autem interperies vel simplex, vel composita esse potest, vel sine materia, vel cum materia coniuncta. Vt plurimum tamen coniunctam habet materiam, quandoque cum calida hepatis interperie calidos ac biliosos humores producere consuevit.

Causæ huius interperies sunt, calidior aer, exercitationes immodicæ, vigilis immoderata, ita frequens, & alia animi pathenata grauiora, & præsertim alimenta, vel medicamentis calidiora frequenter assumpta, vel aromatis condita, & vinum metacum ac potens largius potum. His accedat partium vicinatum caliditas, ut in febribus vehementioribus a calore cordis & ipsius hepatis calefit.

Signa diagnostica calidioris hepatis interperies sunt cibi fastidium, & præcipue carnis, sitis, alius astricta, calor vehemens in toto corpore, præcipue in vasis abdominalis, pedumque totius corporis, & præcipue à calidis laetantur, auuantur à frigidis: & si præterea calidiores humores exasperent, bilis per vomitum, aut feculum inædum exornatur, & amaror adfuit, & plerumque febris.

Quod ad prognosin attinet. Calida hepatis interperies non valde periculosa est, cum hepatis constitutioni non ita aduersetur, sed multorum morborum, non solum hepatis verò, etiam aliarum partium causa esse solet. Difficile est curatio, si præsertim si venterculus frigidus sit, ut plerumque contingit. Illa enim quæ ad hepatis refrigerandum exhibentur, venterculo nocent, & aliis interperiem intendunt.

Curaus omnino consistit in correctione illius interperies, per refrigerantia remedia: & biliosi humores, qui ab ea produciuntur, inque viscibus sunt, aliorumque morborum causa exillit, euacuatione.

Ac primum vena læta hepatis maxime refrigerat, biliosi sanguinis portum educit, & obstructions a bile soluit. Mittend. igitur sanguis est à basilica dextra, quantitate plenitudinis ac virtutis robore respondente, vel vna vice, vel per interualla, pro illius magnitudine, & duratione; idque

premissis elytre, vel medicamentis primas vias expurgatæ. Deinde bilis, quæ in hoc interperamento continuo luxuriat, educenda est chologago medicamento benigniori, per interualla tepetito, aut apozemate in plures doses exhibitæ, aut syrupo mag. itrali, aut etiam syrupo de chorio, composito quadruplicato rheo, qui conuenientissimus est. Si quidem innotuit biliosos humores expurgat, iecur refrigerat, & corroborat, cuique obstructions aperit.

Dictorum remedium formulæ tales esse poterunt.
℞. Scing. miltid. & tamarindor. an. ʒ. i. sem. anisi Drach. ii. cichori. & acetos. ana. M. iij. liquirit. raf. Drach. iij. flor. iij. cordal. an. P. iij. Coquantur ad vnc. iij. In colatura dissolue rhæb. in aqua cichori cum spica insusi Drach. i. sem. Cathol. dapl. Drach. iij. syr. ros. Vnc. i. Fiat potio, & detur manè cum regimine.

Pro delictioribus sunt potiones clarificatæ à recentioribus inuentæ, quæ iulpi formam referunt, ac gustui plurimum ingrati. In istis duplici purgantium quantitas præfribitur, eo quod de eorum vi clarificatione plurimum amittitur; ita ut robustiora corpora nonquam sufficienter euacuent, in hac potissimum regione, quæ propter interperiem siccam, humores minus fluidos, & minusque purgantibus oblequentes efficit. Ac verò Lutetia, in aliisque regionibus multo humidioribus, huiusmodi medicamenta testicis operantur. Hæc igitur potio cum clarificatum sequens cito exemplum.

℞. Senn. mundat. vnc. i. sem. anisi ʒ. i. sol. cichori. & capill. ven. ana. M. iij. liquirit. raf. vnc. ʒ. Coquantur ad ʒ. x. In colat. infunde rhæb. elect. Drach. ii. easil. recent. extr. & cathol. dupliana Vnc. i. tamarindorum consor. vnc. i. sem. coriandi Drach. iij. syr. ros. fac. Vnc. i. Colaturæ & clarificetur ut artis est, & fiat potio.

Apozema bilem epacurata componi poterit.
℞. Rad. acetos. gran. cichori. & oxylapth. ana. ʒ. i. fol. endiu. cichori. deinde leon. & capill. ven. ana. M. i. sem. 4. itup. mai. ana. Drach. ii. liquirit. raf. vnc. i. sol. cichori. buglossi & violæ. ana. P. i. sem. mund. ʒ. i. tamarind. vnc. i. macis & caryophyll. ana. Drach. i. Coquantur ad quartam v. In colat. dissolue expressiorem voc. sem. rhæb. in prædicto cum cinamomo insusi, syr. de chorio compositi, & rosati solutus, ana. Vnc. i. Fiat apozema clarificatum & arom. Drach. ii. sensu citum, pro i. dosibus matutinis.

Syrupus magistralis compositus potest ex materia prædicta apozematizari, applicari, & purgantem, & addita facchari quantitate decoqui, & quali.

Vt autem iussus apud nos est, i. syr. p. succis, summo effectui, ac chronicos omnes morbos, qui à calida hepatis interperie, & bilis fluxu, aut ex illa proveniunt, & in eis intersequentem modum præparatur.

℞. Succor. recent. ex prædictis, & per residuum depuratum, ex foliis endiu. cichori. acetos. fumarie, borrag. & buglossi lb. iij. succi portor. endiu. & recent. extr. & opur. ʒ. i. polypod. querc. recent. ʒ. i. sem. mundat. vnc. iij. capill. ven. an. ʒ. i. x. recent. trochiscat. vnc. ʒ. macis & caryophyll. ana. ʒ. i. Infundantur, & decoquantur vt artis est, donec colaturæ ita superperit. In qua dissolue rhæb. elect. in prædictis succis cum spica insusi & extr. vnc. i. sacchari albi ʒ. i. ʒ. i. Fiat syr. perfectæ coloris, clarificatus & arom. ʒ. ii. pulv. electari trisialant. qui seruetur in vase vitreo. Dosis vnc. i. vel iij. aut ter in mensē cum iulculo pulli, solis endiu. cichori. & acetos. alteraro, vel cum ferro lactis.

Ad hepatis refrigerium sequentia vtilissima sunt. Ac primū pro

pro potu ordinario vsurpatur, vel psilane vulgaris ex hordio, & liquoris confecta, vel addita graminis, aut acetosae radice. Vel huiusmodi decocta permiscuntur cum syrupo de limonibus, aut capilli veni. Vel is qui palato sunt delicatiori, simplicem aqua fontana, cum praedictis syrupo permixta exhibetur. Quod si potentius refrigerandum sit, addi possunt spiritus sulphuris, aut vitrioli q. l. ad gratam aciditatem. Et si vehementius, addi additur etiam salis prunellae Drach. j. Fir. eum ad suum potus gustui gratissimus ex confusa rolar. cum aqua fontis permixta & colata. Cui adduntur spiritus sulphuris, aut vitrioli gutta aliquot: sique gratam aciditatem, & colorem rubellum, vino persillem, acquirat. Huic subtiliter poterit tintura rolarum, in hunc modum compoſita.

℞. Rolar. rubrar. ficcar. vnc. j. aque tepidae lb. iij. spiritus sulphuris, aut vitrioli Drach. j. Infundantur per vj. aut iv. horas. Colaturae addi sacchari albi quartaria iij. Seruetur ad vsum.

Ad eodem vsus refertur iuleps Alexandrinus, qui vltro sic parari solet.

℞. Aque fontis lb. j. aque rolar. succi limonium, & sacchari albi ana vnc. iv. Coquantur lento igne dum decuplaue- rint.

Posteriora duo remedia duobus modis solent vsurpari, vel pro potu ordinario, vel in forma iulepi: bis aut res in die sumendi.

Varietatem iulepi hepar refrigerantes praescribi solent, quorum sequentes formulae exempli loco esse poterunt.

℞. Radices acetosae, cichorii, gram. & lapathi acuti, ana j. j. fol. endiviae, cichorii, acetosae, capilli, vena ana M. j. fol. cichorii, buglossi & borrag. ana P. j. Coquantur ad lb. j. In coctura dissolue syrupo de limonibus vnc. iij. Fiat iuleps clarus pro iisdem bis in die sumendus. Si magis refrigerare studeas, adde singula dosib. spiritus sulph. aut vitrioli q. l. ad gratam aciditatem. Potest etiam mulceri salis prunellae Drach. ad maius refrigerium.

In herbatum pessima componentur iulepi, ex aquis sil- latibus V. g.

℞. Aquarum endiviae, acetosae & cichorii ana. Vnc. iij. sy- rop. de limon. & granatorum ana Vnc. j. sem. Fiat iuleps pro iisdem bis.

Possunt etiam parari iulepi ex succis efficacissimis, & gu- stui gratissimis, quorum hoc, omnium loco esse exemplum.

℞. Succus pomor. redolent. recent. extracti, & per resi- dum depurati vnc. iv. succi limon. vnc. vj. aque rosaceae vnc. ij. succi malor. granat. vnc. j. sacchari albi lb. sem. Fiat iuleps pro iisdem bis.

Iuleporum loco iucula medicata delicatioribus exhi- bentur, ex herbis praedictis cum pullo gallinaceo parata. Quibus ad maius refrigerium salis prunellae 3j. addi potest vel iucula redduntur guttis aliquot spiritus vitrioli.

Sanguis cichorii, & chamaedryos ad sanguinem depu- randum, obstructions referandas, & hepar refrigerandum vtilissimus est, in syrupo rosaceus in hunc modum.

℞. Aque cichorii in B. M. paratae q. v. folior. cichorii par- tes duas, chamaedr. partem vnam, Maceretur simul, & di- gerantur per triduum in B. M. postea exprimentur: liquori adde noua (olia cichorii) & chamaedryos i. digerantur ite- rum per triduum, deinde exprimentur, & infusiones illae coctae, vel decies repetantur. Liquor euadet rubeus milar sanguinis, cui addi sacchari partem liquori quantitate, & fiat syrupo.

Vertere opiate, & tabellae hepar refrigerantes, & robo- rantes ita componi poterunt.

℞. Confusae flor. cichorii iucularum, nymphae & buglos- sian. vnc. j. pulu. elect. triasent. Drach. sem. Cum syrupo de limon fiat opuscula vltat frequenter.

℞. Tabellatum triasentali duplicato theo vnc. iv. capiat tabellam vnam pond. Drach. ij. singulis diebus mane & dua- bus horis ante passum.

Confusae ex fructu cynorhodi, seu rose caninae optime mendoae, & coctae cum saccharo ad formam cydoiatai, hepar potentissime refrigerat: si ea vltat ager loco opiate praedictae.

In iucura cozarillorum cum succo limonium parata hepar

refrigerat, & corroborat, si eius cochlearia duo singulis diebus exhibeantur, aut saltem bis in hebdomada.

Bulneum aqua tepide frequenter vsurpatum, totum cor- pus refrigerat & humectat multo potentius, & vltius quo- uis alio remedio, in emaciatis praescriptum corporibus.

Serum lactis ad idem est efficax, si ad 5 dies, aut plures vsurpetur. Elucitur autem commodè per lactis ebullitionem, affundendo parum aceti, vel succi limonium, & pos- tea colando. Amatus Lusitanus ipsum preparat in hunc modum.

℞. Seri lactis lb. j. syrupo acetosi valde acidi vnc. iij. Misce, & facta vna ebullitione capiat more aquae mineralium, si licet per duas aut tres vices, postea deambulando. Antiqui eo crebantur ad hepatis, hoc est lb. v. Quercetanus vero in hunc modum preparat.

℞. Seri lactis lb. j. succi limon. 3j. succi pomor. redolent. recent. extracti vnc. ij. Omnia simul cum albumine oui prius agitata ad ignem clarificetur, addendo parum sac- chari De colatura cape, vnc. vi. vel vii. continuando per 15. aut 20 dies.

At si emaciatus & consumptum fuerit corpus, lac in- tegrum & praeteritum asinum, in plures dies exhiberi po- terit.

Decoctum chinae cum succo limonium paratum, huic etiam vlti confert, praeteritum si obstructions aduerint. Cuius compoſitio talis esse poterit.

℞. Rad. chinae tenuiter incise vnc. i. aque fontis lb. vi. si- cilia ana vnc. ij. Macerentur per 2. horas, deinde coquan- tur ad 3. partem consumptionem: postea colentur per mani- cum Hippocratis Caput Vnc. vj. mane & vespere, vinum; eo diluatur.

Denique aquae minerales vitriolatae, vt pote apriendi & refrigerandi vi praeditae, quales sunt nostrae Meyenicae sunt vtilissimae.

Perseuerante affectu, haemorrhoides per hirudines ape- riantur semel aut bis in mense.

Ac tandem exteriori regioni hepatis epithemata & vn- guenta refrigerantia admoventur. Epithemata sunt ex aquis acetosae, cichorii, rufar. plantag. acet. & capthor. quib. ad robur partis additur pulvis triasentali. Vnguenta vey- ro sunt rolaceum, refrigerans Galeni, & ceratum santali- num.

CAPVT II.

De hepat. inflammatione, abscesse, & vlcere.

Hepatis inflammatio est tumor calidus, ex sanguine extrusato, & in illius substantiam effuso, oriturque.

Propterea autem sanguis vel purus est, ac syncerus, vel aliis humoribus permixtus; sic varias tumoris differentias pro- ducit. Si enim a sanguine puro phlegmonem exquiramus parit: Si vero ab eodem cum bile, pituita, aut melancholia permixto, generetur, phlegmonem cryspellatolam, eodem- marolam, aut scurholam generat. Et vix veris, si praedicti humores sanguinis predominantur: erysypelas phlegmo- nosum, edema, aut scurhum pariter phlegmonolum efficit.

Est & alia differentia ratione loci, quod hic inflammatio pro vltilla vel partem gibbam hepatis occupat, vel causam Quod tamen ita accipiendum est, docente Galeno 5. de loc. aff. 4. p. 7. vt in neutra hepatis parte exsistat diffinita, inflammatio possit consistere, altera integra, & omnis mali immunis constituitur, quia viscera caro continua est in omnibus suis partibus, & ideo vna patiente, altera etiam quodammodo afficitur.

Praeterea animaduersione dignum est, quod docuit Gal. 13. meth. c. 14. Causa hepatis parte laborante, inflammatio- nem necessario vltus melenteris communicat, quae ex vena porta oriuntur. Ex docet experientia in iis qui ex tali in- flammatione perierunt, abscellum non solum in hepate, sed etiam in melenterio reperitum esse.

Notandum etiam est ex Hipp. Aph. 41. scil. 7. inflamma- tionem aliquando solum membranarum hepar vltentem occupare: i. quando vero ipsam hepatis substantiam, & proprium parenchyma. Quorum, inquit, hepar suppuratum aderit, si purus fluxerit, & alius aduocet, in unica omni

hæpatis continetur, si vero qualis amara fuerit, percutit, Galenus in commentis sic loquitur. Quibus in tunica est præputium patitur, subsistunt hæpatis, saluberrime tunc; quibus vero usque ad carnem hepatis, corruptio pergitur, non absque ratione minus periculosa.

Causæ hæius affectus immediatæ sunt sanguinis quantitas nimia, vel eadem effectus, tenuitas & acrimonia, vel commotio, & exagitatio in venis: à quibus propter dictas causas facili extrahatur, & in partes magis dispositas effunditur. Hæpar autem magis dispositum redditur ad sanguinem inlucem recipiendum, si calidus sit, vel dolore aliquo tenetur, calor enim & dolor attrahunt: vel denique si nimia quadam, aut aliterna imbecillitate laboret; quia omnes partes humore aliquo grauatae ad debiliores se se exonerant. Ad harum etiam causarum numerum referri debet hæpatis obstructio, quæ facit, ut humores crassiores inlucem putrescant, & à calore præternaturali inflammentur.

Causæ verò externæ plurimæ esse possunt, ut nimia corporis caliditas, ex immodico motu, vel igne acquilata, si calefacientes acres, vel aromatici conditi, vini generosi potus in medicis, ætate venæ, ex ascensione, percussio calus circa hæpatis regionem. Idem præstant medicamenta calefacientia in regionis hepatis præpositæ admotæ, quæ tenet Fabricius Hildanus eundem impetum ingredi ventriculi laborantis, empiaphora, & vnguenta calida ex pipere, cardamomo, oleo garyophyllorum, & similibus admotæ fuisse, quæ inde inflammationem hepatis excitatam. Hæpar enim ventriculo congerit, ut medicamenta ventriculo admotæ ipsum modum turbant.

Idem præstare possunt cucurbitula regionis hepatis admotæ. Cuius etiam rei exemplum affert idem Fabricius Hildanus de quodam hemorrhagico narium laboratore, cui cum magna cucurbitula ad hæpatis regionem admotæ fuissent, sanguis quidem subsistit, sed hæpatis inflammatio sequuta est.

Signa diagnostica hæius affectus plerumque proponuntur à Galeno, alijsque authoribus, quæ hic sigillatim exponenda sunt: à quandoquidem sæpe in recta illius diagnosi errare contingit.

Primum signum est, Grauitas in dextro hypochondrio, quæ à repletione & distensione hepatis contingit, quandoquidem viscus suapte natura amplum, & valde compactum, si humore multo repletur, summam grauitatem nanciscitur, quæ ab ægrotante præcipue percipitur, dum seise ab vno latere in aliud conuertit.

Secundum signum est dolor, qui aliis in vno, aliis in duobus, & tribus locis percipitur. In ipsa hæpatis regione dolor percipitur grauius. Aliquando etiam in northis costis, quæ tenuius, quando inflammatio ligamenti hepatis suspensorii communicat, quæ costis noctis conuertuntur. Aliquando etiam dolor communicatur iugulo per continuationem membranarum, quæ communicationem habent cum membrana hepatis ventris.

Tertium signum est febris, quæ nocti repletissimum exacerbatur, & magis, vel minus acuta est, pro ratione humoris peccantis, si bilis enim inflammatio, acutissima est, si pituitosa, mitis, & in sanguine, medio modo habet.

Quartum signum est difficultas spirandi, propterea quod hæpar diaphragmati contiguum esse, quicquid aligatur, atque ad eo grauitate illud deorsum attrahit, tum magnitudine, & intumescencia illius etiam comprimit; ita ut vtroque modo liberum eius motum impedit.

Prædicta signa vniuoca sunt, & pathognomonica. Multa verò alia dantur æquiuoca, & ad certam diagnosis inlibabiles non parum conferunt, qualia sunt tussis sicca, & molesta; pulsus durus, inæqualis, & quodammodo ferratilis color lingue primum ruber, deinde niger: cibi fastidium vehemens, sius implexibus vomitus biliosus, interdum pituitosus color totius corporis pallidus ad ictericum vergens vna rubra, flammæ, & acris decubitus lupinus facili dissoluitur sicca latera, quæ in dextro decubitu hepatis premittitur ventriculo, in sinistro tenditur & suspensum: alius affectus, à calore omnem humiditatem chylosæ matris absorbere, interdum tamen liquida est, si nimium inflam-

mationi summa hepatis inbecillitas coniungatur; tunc enim liquida excrementa deiciuntur, & locustæ carniuum interdum similia.

Signa differentiarum ita insinuanda sunt, si gibba, vel conuexa hepatis pars efficitur, tumor adest in dextro hypochondrio tactu conspicuus, & figuram hepatis inflexilem referens, dolor inter respirationem maior, & visus ad dextram iuguli partem protensus, vel dextrali videatur; tussis & respiratio erubescit, & grauitas maior.

Si verò causa hepatis pars laboret, tumor ad tadium non est ita conspicuus, tamen quævis antea diximus, vna pars hepatis inflammari non potest, quin alia etiam aliquid patitur, dolor aliquis in viscere tangendo, & comprimens percipitur, deinde quia hæc pars ventriculo incubat, maior adest cibi fastidium, maior vomitus, & ventris laxitas, & corruptis alimentis inter in ventriculo, propter viciniam grauius affecto.

Signa casuum in hunc modum se habent. Si inflammatio à puro sanguine oritur, rubora adest faciei interdum purus, interdum verò subfuscus, pulsus magnus, mollis, & vnicolor, vna rubra, & crassa; corporis habitus carnosus, & dulcedo quadam in orietatis iuuenilis; vitius præcedens plenus & liberalis.

Si vero bilis prædominetur, color est citrinus in facie; pulsus velox, durus, & inæqualis: vna tenuis, & intensa citrina, & interdum flammæ habitus maculosus, & extenuatus oculi conuulsio, amaror, vomitus biliosus, præcedens causa bilem multiplicans.

Quia verò inflammatio musculorum abdominis cum hepatis inflammatione magnam habet similitudinem, ideo hæc ab illa proprijs signis distinguenda est.

In musculorum abdominis inflammatione, cutis circumtensa est, ut si quis digitis apprehensam attrahere velit, ex minimis sequatur. Rediorum musculorum tumores oblongi, & per totum ventrem extendi, vmbilicum comprehendunt. Sic etiam aliorum musculorum inflammatio, eorum figuram quodammodo repetunt. Contra verò hepatis inflammatio partis laborantis figuram, & circumscriptiorem tectum, si musculi manibus tractentur, tactu cedere videntur, & tumor profundior apparet. Præterea totius corporis color est magni momenti ad hoc affectus distinguendos: siquidem in musculorum inflammatione viscidus permanens, & solum naturalis itatu constitutus: ac in hepatis inflammatione, pellidus, & citrinus apparet, ad ictericum vergens. Huius rei inque exemplum habetur apud Gal. 4. de loc. aff. c. 7. de quodam Stefano, qui cum ab alijs medicis indicatus fuisset abscissum habere in hepate; Galenus vocatus, ex sola faciei inspectione itatu pronuntiatur, non esse abscissum in hepate, & ventre postmodum explorato, cum in musculis abdominis latere conseruit: hoc autem ita iudicauit, quod a ger non haberet faciem ita immutata, ut in hepatis inflammatione vel abscissum esse debuisset simile exemplum habetur apud Valeriolam, lib. 4. obseruationem capis de quadam muliere, quæ ab alio medico iudicata fuerat habere tumorem phlegmonosum in hepate. At ille, quædam vniuersa, & præ me ad certam adhibens non pati illam secundum hepatis phlegmonosum tumorem indicauit, sed in musculis supra pectus paulo post. Primum ad hanc viciatæ decem & octo, immo in hypochondrio dextro tumorem phlegmonosum, quæ se ab vmbilico usque per pectus pectus porro se max. talis efferebat: color in facie rubicundus, vmbilicus presens, & ruber, & alio mixtus, per eorum morbi decursum in eodem statu permanens, vna ipso ac confestim coloris, atque contentorum apparuit. Ex quibus omnibus deprehendit non solum in huiusmodi musculis abdominis supra pectus morbo teneri. Vt namque hepatis afficitur, videretur in facie colorem apparere inessarium, & ex colore namque plurimos secum dum hepatis laborantes deprehendisse Galenum ipsemet testis est lib. 5. de loc. aff. c. 7. hepaticorum enim color ad citrinum, & ad bilium, cum bilico quodam virore plerumque inclinat.

Præterea pleuritidem ad hepatis inflammationem distinguere satis operolum est, quæ in eodem modo apud Gal. de loc. aff. c. 7. videre est in historia Siculi Medici, qui in seipso deceptus est, de pleuritide laborare arbitratus: ex eo quod

illi adesse febris, respiratio parua & frequens, tussis exigua, & dolor inferiores colias attingens. Galenus tamen cum hepatide tentari cognovit ex aliis deiectionibus, quae locurae caruioni erant conformes, tales enim deiectiones fluxum hepaticum constituunt, & hepar maxime laborare ostendunt. Verum illud signum facere perpetuo non potest ad distinguenda quae plenitudo ab hepati inflammatione & squidem, docente Galeno, *huc est* deiectiones huiusmodi liquidae, & cruentae accidunt tantum in hepati inflammatione, quando cum ea summa debilitas coniuncta est, alioqui vnum ex signis hepati inflammationis ab eodem Galeno propositum est aliis allicita. Ideo deficiente illa hepatis imbecillitate, quaerenda sunt alia signa, quibus pleuritidem ab hepati inflammatione distinguere possumus. Si itaque inflammatio plerumque versus dextrum hypochondrium occupet, dolor erit vehementior, & punctior; difficultas spirandi maior; nulla erit coloris faciei mutatio, tussis vehementior ac molestior est, & non plane sicca; sed plerumque, saltem procedente malo, cruentio (puto, aut aliquantulum saltem colorato, coniuncta: ac denique pulsus durus est, ac ferrinus. In hepati autem inflammatione, dolor minor est, eum grauius sensu coniunctus; color corporis ad flauum accedit, tussis adesse arida, dilucida habens intervalia: pulsus minus durus, tumor denique aliquis in dextro hypochondrio apparet.

Denique inflammatio fit in melenferio, tumor, infra regionem hepatis apparebit: coloris mutatio in facie nulla erit, aliis deiectiones erunt liquidae, in quibus primo tenuis & cru da deinde sanies conspicietur, postea materia quaedam concocta puris speciem referens, praefertim ubi sanationis spes est.

Prognosis huius affectus ita instituitur. Est. Omnis hepati inflammatio periculossima est, ac pietumque lethalis, & si non cito regulatur in hydropem, aut atrophiam terminatur. Vnica autem salutis spes in virum robore consistit. Gal. *in meth.* 5.

Inflammatio glibam hepatis partem occupans periculosior est ea quae causam obidet, propter maiorem viciniam cordis, septi transuersi, & vane causae.

A liuio succo inflammatio in proterenti periculosior est ea quae a puro sanguine fit, quia febris intensior, & reliqua symptomata grauiora.

In hepati inflammatione singultus, malum ex Hipp. *Aph.* 17. *sect.* 7. Indicat enim augumentum inflammationis, eiusque malignitatem, quae ventriculum per consensum vehementer afficiat.

Alii fluxus hepati inflammationi coniunctus lethalis est, nisi materia quae eicitur, concocta appareat, & fluxus ille citissime cesset.

Si inflammatio hepati per resolutionem discutiri non valeat, quod rarissime contingit, in abscessum degenerat, si facultas valida sit, aliqui in grangrenam & sphacelum cōuertitur. Et si suppuratio vt plurimum intra viginti dies contingit. Et ille abscessus tamen periculossimus est, ab eoque pauci euadunt. Si tamen exiguus fit, particulam tantum hepati exiguum occupans, & pus alium, ac aequale per alium, vel vrinam effluat, liberatur. Sic etiam tumor extrinsecus & conuexum hepati superficiem occupante, ita vt in fumina cute eminentiam faciat cum quodam fluctuationis sensu, caetero actuali aperiri potest, & si pus album & purum effluerit, euadunt: in tuncia enim pus continetur: sin qualis amittat, intereunt.

Rupto abscessu, si aeger superfluis fuerit, vlcus remanet, quod etiam medico curanti magnum facit negotium; ac nisi septicarium sit, in hydropem, aut mar alium agrotantem perducit.

Potest etiam vlcus in hepate fieri ab humoribus acerbis, & erodentibus, praefertim biliosis, per hepati labrantiam diffusum, qui sensum putrescentes, malignam & vitulentam qualitatem acquirunt.

Huius vlcis gens praecedente inflammatione ex humorum acrimonia geniti, diagnosis difficilissima est. Quibusdam tamen signis internolei poterit. Ac primum dolor quidam vlcerosus in hypochondrio dextro percipitur, aeger sensum contabescit: & si vlcus fit in cauo hepati, deiectiones albae

purulenta apparent: Interdum & quippiam cruentum exernitur, cum dolore intersternorum ob materiae acrimoniam vt dysenteriam emulatur, quae ab hoc affectu distinguitur ex eo quod sensus grauior & punctior circa hepar haebeat. Interdum vero icteris portuiculus per alium excreta iussu ab auctoribus est obseruatum. Si vero in parte gibba vlcus lateat, vrina purulenta apparet, absque vilo affectu renum, aut vesicae indicio. Febris in progressu morbi, lenta oritur, typum non feruens, quae tandem in hecticam degenerat. Color faciei citrinus apparet, & nonnumquam, puulne paruescet humorum adunione, in ea efflorescunt. Cibi omniū praecipue carnis, magnam est salisidum faetor anhelitus adest; ac tandem frequens animi deliquium accedit.

De prognosi simul dictum est, quod hae affectio febrem lentam & hecticam accersit.

Praeterea nisi vlcus exiguum sit & superficiale, & inter initia curetur, exitale est.

Periculosiores sunt hepati exulcerationes, quae inflammationes & abscessus sequuntur, quoniam quae sine ipsis incipiunt.

Curatio inflammationis hepati eadem fere instituenda est, quae in ventriculi inflammatione fuit proposita; & in primis quod ad phlebotomiam attinet, purgationem, & alterantia remedia iio principio morbi exhibenda.

Clysteres etiam frequenter miciendi, quales in ventriculi inflammatione descripti sunt.

At in progressu vlcis refrigerantes, detergentes, & aperientes erit propinandi, quales superiori capite fuerunt descripti. Cauendo tamen ne admodum dulces sint: nam quicquid hepatis inflammatum in maiorem molem attolitur, vt docet Traillanus *lib.* 4. c. 10.

Pro potu utatur aeger decoctio hordei & graminis, cum tantillo liquiritiae, vel syrupo violaceo, aut capill. ven.

In declinatione adduntur praedictis vlcis radices apii & petrolei, sol. agrimonij, capill. ven. &c.

Ac tandem terebinthina cum aqua agrimonij vel petrolei, bis aut ter exhibita morbis reliquis alberget.

Si vero morbus fit contumaciior, & vlcus protrahi videatur, apozema ex aperientibus & laxantibus erit prescribendum in sequentem modum.

℞. Rad. apij, petrolei, an. vncij. polypodij querc. recent. vnc. iij. solior. agrimonij, pimpinell. ecerach. capill. vener. ana. M. sem. asof. incensib. & petrolei an. Drach. j. florum. chamem. violar. an. P. j. lenne mundat. vnc. j. Coquatur ad quartaria v. i. o. colat. dissolue rhabarb. & cinna. Drach. ij. Coquantur ad th. i. sem. In colat. dissolue aq. rosar. th. i. acet. rosar. vnc. i. sol. drach. j. syrupo acetosi simpl. vnc. vi. Fiat apozema pro iij. dosib. alternis diebus sumendum.

Externis vero varia conueniunt topica, in toto morbi decursu admodumenda. Ac primum ab initio morbi conueniunt epithemata, linimenta & cataplasmata refrigerantia, & fluxionem inhibentia, quorum copositio talis esse poterit.

℞. Aquat. endiuiz. cichorij, acetoliz. plantag. & rosar. an. vnc. iij. acet. rosae j. pulueris electuarii traiaant. 3. j. camphorae 3. j. Fiat epithema, admodumendū regioni hepatis tepide frequenter. Vel

℞. Fol. endiuiz. cichorij, scariolae, plantag. bug. offi. borrag. & flor. nymphae. an. M. j. abstinhi roman. M. sem. fol. rubrar. P. i. ianiali rubri, & citrini an. Drach. ij. Coquantur ad th. i. sem. In colat. dissolue aq. rosar. th. i. acet. rosar. vnc. i. camphorae 3. j. Fiat epithema.

Si magis refrigerare est animus, praedictarum herbarum succi alterutri epithemati addi possunt.

℞. Olei rosae 3. j. olei de abstinthio 3. sem. Misce, abluant oxyurato, & inungatur eadem regio post vsum epithematis. Vel

℞. Olei rosae & myrtini, an. j. i. succi endiuiz. & cichorij, an. j. i. acet. 3. sem. Bulliant ad incertum consumptionem; deinde adde pul. ianiali rubri & rosar. tub. an. drach. j. cere albae q. f. Fiat vnguentum.

Vel vnguentum rosae, solum, aut refrigerans Galeni oxyrato locum potest admodum.

In progressu morbi, in tuncia te febre ac dolore, resoluenda cum refrigerantibus permiscenda sunt aequali, vel inaequali dosi, prout morbus ad statum, aut declinationem, magis

¶ el mīns accedere videtur, quā d Medico prudenti temperari debet. Vt tamen eorum materia innotescat, nonnulla exempla annotabimus.

℞: Olei rosae. Vnc. i. ol. de absinth. vnc. i. ol. chamem. vnc. fem. pulu. r. uni. lantal. 3. ꝑ. picæ nardi 3. fem. cera q. l. Fiat linimentum.

4. Daetyl-mundat. n. x puffular. integr. vnc. ij. Coquantur in oxyaceto, poltea contundantur, addendo flor. chamomili-incisiot. rofar. rubr. an. p. j. spicē nardi, k. chonanthis an. 3. j. fem. ap. peiroiet an. 3 fem. eudae, portulac. ana 3. j. lem olei de abfinth & rofar. an. vnc. j. farinē hordci vnc. j. Fiat cataplasma.

Vel minus calidum sic parabitur.

Vnc.ij. olei rosar.
Vnc.ij. Melle cum decocto endiuiz & cichori, fiat cata-
rictima.

In declinatione, febre profligata, resolventia erunt admo-
uenda, additis emollientibus, ne qua duresces superfit; & non-
nullis adringentibus, ad robur partis conferuandum.

γ. Rad. altheae 3-ij rad. cyperi & culami aromat. an. vnc. fem fol. malvæ, violar. agrimon. an. M. j. abanthi vtraque an M. fol. malvæ, cougou. anisi & feniculi. an. Vnc. fem. flor. chamæz. mellior. anethi. an. P. spicæ nardi, ichemanthi, mafficks. an. j. sem. Fiat omnium d. coctio, qua louseatur pars affecta caligula.

℞. Ol. chamemel. lilior. & amygd. dulc. an. vnc. i. ol. de ab-
sinthio. & nardini. an. vnc. fem. pulu. f. chomanthi. rofate. no-
uella. & abfinthii. ana 3-j. qtz. q. f. Fiat linimentum, in decli-
natione vsurpandum.

Si durities partis persistat, gummi ammoniacum in aceto dissolutum prædicto limimento addere conveniet, vel etiam sequens emplastrum erit admoendum.

γ. Empl. de mellefeto, & diachylonis ireari. an. ʒ. j. Mellef. extendatur super alutam. Fiat emplastrum ad formam seminis, ad inuendū partē affectā. Vel

7. Gummi ammoniaci in aceto remolliti vnc. j. ladan. & mastiches, ana ʒ ij. olei abfinthii & ceræ, ana q. f. Fiat emplastrum.

Si inflammatio ad purpurationem vergat, quod cognoscitur ex f. b. & doloris intensioe, iuxta Aph. 47. lib. 2. maximum est periculum, & pauci evadunt. Atque purpuratione adjuvanda est emplastris praedictis, quae materiam resoluibilem resolvunt, & suppurabilem suppurant, tum etiam admotis cataplasmatibus mollientibus, ut verò exhibendum iuxta pulli alteraturum malum, & cancris, penis. Rupto abscessu, si pus album effluat per anum, aut urinas, abstergendum est aqua hordivei, sero lactis, cum melle rosaceo, si remediis, quae ad viceris ventriculi curationem proposita sunt. Si verò purpuratione vergat in partem, caternam, cultello ignito aperienda est, secundum Hippocratem. Et si pus citius albu, & coctum, ipse est sanationis. Si verò rubrum, & viscidum, & foetidum, tendit ad gangraenam, & interitum.

CAPVT ML

De Obstructione hepatis.

Hepatis obstruſio eſt anguſtia, & occluſio præternaturalis propaginum venæ portæ, & cauæ, quandoq; etiam ipſius parenchymatis, tranſitum humorum naturalium, alieneſque diſtributionem impediens, à materia ſpurſa cauſata, aut emulſione producta.

Hinc patet obstructionem esse morbum organicum, nempe in viâ & materia obstrictâ, qui sanguinis distributionem impedit ad membra nutrienda. Vis autem illa, & materia non solum venâ sunt per tractum hepatis parvis lymphâ differat; sed etiam poris & intus in folliculis quibus loca hepatis; sicut & reliquorum partium lubrificantia relictâ, effi; quibus ad humores præternaturâ oculis, nec calor hepatis infusus ventilantur, nec halitus sua tenuia excrementa cuncti possunt.

Materna oblationem efficiens, ut plurimum, est humor crassus, viscidus & igneus, qui liberè praeterfluere non valet.

in meatibus illis subfistit, & d calore partis magis ac magis
 incraffaturata ut obstructions, quò diuturniores sunt, eo
 contumaciores evadant.

Insuper etiam humorum quantitas & copia obstru-
ptionem efficere solet, ut docuit Gal. 10. meth. c. 2. his ver-
bis. *Item vero obstruptionum causarum alia est quae ex abundan-
tia, alia quae ex qualitate succum felicius quae aut lentis, aut
crassis, aut acidis. Praefertur autem inter remedia in ea quam
copiosa, sanguinis missio in ea quae ex humoris qualitate
existit obstruentionum visus.*

Illa autem obstructio à copia humorum oriunda, præcipue in valis & causticibus contingit, quando illa nimis repleta ira distenduntur, vt non possint se contrahere ad excretionem in materiam contentam: quemadmodum si pe obstruamus vesicam à nimia vrinæ copia, ex diuturniori illius retentione distendant, se contrahere non possint, vnde vrine funoreffluat, aut difficilis illius exclusio succedit.

Non folium autem humores, fed etiam interdum flatus craffi & copiofi, qui non facile difcuti poffunt, (quod itis non pteat aditus, vt in colico dolore contingit) obftruftionis caufa eife poffunt, docente Gal. 3. de leccis aff. Quae tamen caufa: rariffima efi: & nonnullis absolute negatur.

Humor crassius obstruens est in primis pituita, quæ facile crassescit, et viscidius atque contrahit. Hanc sequitur melancholica, quæ frigidiore, crassius, facilius obstruere potest. Sanguis vero ratione quantitas, et crassitudo idem pati solet. A ceteris quoque bilis in hepate durities hærens, crassitudo, et perniciosa obstruções parit. Causæ antecedentes et posterioræ sunt, quæcumque humores crassos, et viscidos producere valent: ut aer crassus et nebulosus, et crassius fucus viscidus, ac otitilicis conditionis et distributionis, et crassius frigidi, ad eum parum apti, et pituita, corymbosa, morbi, molliora, iurgicalia, et gemina, coctio bona, et porcinæ pilosius viscosi, et immo indurati, panis non probe coctus, et aquæ, calidæ, et vinum crassum, et rubrum, et stypticum, et cretæ, et crassa.

Mala autem hepatitis dispositio, frigida præfæctum inter-
peries, etiam ex laudabili cibo obstructiōnis gignere po-
test; si nempe oblatum chylum non bene concoquat, sed
eum in materiam tartaream, & mucilaginosam convertat.
Venitruuli etiam interperies causa obstructiōnis esse
potest; dum chylum cruentorem generat, qui ab hepate
pollu- odum recte suffragi non valet. siquidem vitium prin-
cipitacionis non contrahit a secunda

Signa huius affectus diagnostica in varias particulas dividenda sunt, ut alia morbi speciem, alia partem affectam, alia causam eum producentem significant.

Signa morbi (speciem) indicantia omnibus partibus naturalibus obstructionibus obnoxia communia sunt; indicant enim solum ubi frustilles in imo ventre latitantes; & ita hæc diagnosi obstructionibus lenis, & effluentiæ præsertim cognoscendis, è futuræ.

Obstructiones igitur in dictis partibus latitantes offendunt, alii excrementa à naturali statu recedentia, præteritum liquidiora humida, frigida, chylosa, & interdum languidiora, vasa alba, tenuia, aëriosa, & velut transcolata: quia partes crassiores periculis obstructionis transire non possunt, sed ipsa aëriosa tenuior impetum suum præterlabitur: potius tamen esse citius, si caliditas adeo indicia respiratoria, præcipue si æger concitatoris gressu ambulet, vel montem, vel kalas ascendat, quia partes obstructæ diaphragma deorsum trahunt, cuiusque liberum motum impediunt: faciei color pallidus: maciæ & febricitans totius corporis: pulsus inæqualis: ac deinceps gratuita sensus in hypochondriis sui perfunctus, quoniam percipit iquei felle cibus plurimam impleverunt. Ideo Hippocrati de vitiis & causis morborum gravitatem illam vocat fatietatem hypochondriorum, affectionem hypochondriis tribuens, quæ proprie ventriculo debetur. Quotiescunque enim hepatis lien pravis humoribus repletus & intumescit: ab assumpto cibo etiam læssimo, & in pauca quantitate ingesto comprimuntur, & grauatatem interunt, similem grauitati eorum, quæ immodecibus cibis & potibus esse impleverunt. Hoc signum hypochondriorum obstructionis ita citro indicat, licet nullus dolor, nec tumor in illis

par-

partibus appareat: vt Propter Martianus comment. in lib. II. ppter. gradum, aliter hoc loco signo, viscerum obstructions; ante hypochondriam contractionem, affirmare non dubitatis.

Partem afficiam indicant, cum signis predictis, tensio, & retentio in dextro hypochondrio, & aliquando dolor in eadem parte, illic grauius & obtusus, cui a sumpto cibo ingrauescit, praeterum si ab huius in gestione vehementer exercitatio subest: rursus interdum fissa respira- tio difficilis, propter maiorem cum diaphragmate vici- nam, & grauius visceris pondus, quam relinquarum partiu.

Signa casularum sunt. Si fiat ab humoribus, dolor magis grauius, tensius & fixus: si a flatibus, acutior & vagus. Si a trigidis humoribus, maior grauitas sensus in dextro hypochondrio, color faciei albidior, ocella febris, neque- flos; victus ratio frigida, crassio & ocella praecellit. Si a calidis humoribus, grauitas minor adell, maior sitis, facies citrina à bile, rubra à sanguine, febris, & dolor interdum pungitius, & victus calidus praecellit.

Prognosis huius affectus in hunc modum infirmitas est. Obstructio recens, facile tollitur, inueterata difficulte. Obstructio hepatis, nisi cito, penitusque tollatur, inhi- ta mala inter se conuenit: nempe humorum putredines, febres, inflammationes, alui fluxus varius, diuturnus, ac vehemens, quia alimenta ad partes nutriendas penetrare nequeunt, colicam, aeternum, cachexiam, hydropem, scirr- hum, alioque infirmos morbos, vt Aesculapius obstructio- nem, aggritudine maris vocauerit.

Obstructio quae fit ab humoribus deterior est, quam quae à flatu generatur.

Quae à crudis & pituitosis humoribus, vel à flatu pro- ducitur, febre superueniente interdum dissoluitur; siquidem calor febrilis flatum discutit, pituitam attenuat, & liquorem reddit, ac resoluat.

Curatio obstructionis aulpicanda est ab vniuersali totius corporis euacuatione, quae fit primum per: one purgante agnoscant naturae appropriata: mox si quaedam plethorae indicia appareant, immo vero, nisi corpus sit valde emacia- tum, detrahendus erit sanguis ex basilica dextra.

Potius vero sequens apozema erit praeficiendum.

Rad. apii, petroselinici in vino albo per noctem infusur. an. Vnc. i. rad. chelidon. mai. Vnc. ii. rad. silicis emul- camp. cortic. rad. capp. mediani fraxini, & tamarisci an. Vnc. i. sem. abstinthi, agrimoniae, capill. ven. chamedr. sum- mitatum hyperici, & centaurei min. an. M. sem. apii, petro- sel. anisi & feniculi, an. Vnc. i. sem. feniculi, munda- que, & medullae sem. carthami, an. Vnc. ii. cypthy mi cre- tici Vnc. i. zinzib. & caryophylli, an. Drach. i. flor. tamar- isci calandulae & cicurum rubror. an. P. i. Fiat decoctio ad quartaria 5. In colat. dissolue (symp. de 5. radicib. & rosar. solut. an. Vnc. ii. Fiat apozema clarificatum, & arom. Drach. ii. cinam. elect. pro iv. dosibus matutinis; addendo vnicuique dosi crystalli tartari Drach. i. salis abstinthi & tamarisci, an. scrup. sem.

In vltima dosi dissolue, (si priores sufficientes non pur- gauerint,) elector. de citro solut. & diacarth. an. Dr. 3. sem. In praedicto decocto interdum additur vinum album, interdum aceti parum, pro varia aegri natura.

Si aeger fuerit delicatus, & apozematis vium ferre ne- queat, in eius locum sequentia iuscula erunt vsuanda. Rad. apii, petroselinici & alparagi, an. Vnc. i. sem. fol. agrim. hyssopi, capill. ven. an. M. crysall. tartari Drach. i. Bulliant cum pullo gallinaceo, vel cum frustulo colli veruici. Fiat iusculum quod capiat mane per iedies.

Melius est crystallum tartari in iusculo iam confecto, & colato dissolue, quia indecoctione refrigerata concre- scit iterum maiori parte, & ab ea separatur. Immo vero dum exhibetur cum iusculo, mox debet diligeret cochleari argenteo immediate prorsum assumatur, alioqui bona illius pars in fundo scutellae relinquetur.

In alterius iusculis infunde, & leuiter decoque fenne munda- que Vnc. 3. sem. anisi Drach. i.

Quamdiu vitur aegri cemedis predictis; vel etiam, post eorum vium, quos opus videbitur, foveatur regio hepatis, mane hora vna ante haustum apozematis, & vel-

peri hora vna ante comam, fota sequenti.

Rad. althaeae & bryoniae, an. Vnc. i. sem. rad. ebuli cypri- cryngii cortic. rad. capparis, & mediani tamarisci, an. Vnc. i. Fol. maluae, althaeae, violariae, agrimoniae, chamedr. menthae, & abstinthi, ana M. sem. lini, sem. greci, & bac- car. iuniperi, an. Vnc. i. sem. coriandri, & fantal. citrio, ana Drach. ii. flor. genifitae, sambuci, chamam. & melior. an. P. i. Fiat omnium decoctio in duab. partibus aquae chal. beatae, & vna vini albi sub finem addiri. Adde colaturae aceti 3. 5. Foveatur pars, vt dictum est.

Poli socum inungatur eadem regio vnguento sequenti. O. liliaceae de cappatib. an. Vnc. i. succi rad. bryoniae, & apii, an. Vnc. iii. Bulliant ad succorum consumptionem, ad- dendo vnguenti de althaea, & gummi ammoniaci in aceto sol. & traieci, an. 3. sem. dauci, & spice nardi, an. 5. i. sem. cetae flauae q. fiat vnguentum, quo vtrius vt dictum est, ad den- do aceti rosacei parum vinctiois tempore.

Poli horum remediis vnum, ad obstructionum reli- quas conterendas, & partis robur inflaurandum conue- niens opiat sequens.

3c. Conferat fol. abstinthi, capill. ven. & flor. tamarisci ana Vnc. i. conicru. rad. enulae camp. & cortic. citri conditi an. 3. 5. myrobalan. condit. nu. i. nucis moschat. condit. 3. i. confect. alket. m. Drach. ii. puluer. elect. diarrh. abstinthi 3. i. salis abstinthi & tamarisci, an. 3. i. croci 3. i. ambr. griseae 3. i. Cum syrupo conditur citri, hae opiat, de qua capiat magnica. altance singulis diebus mane, & duabus horis ante passum, superbibendo vini Hippurum.

Plurimum etiam conferat balnea tepida, in quibus emollientia & aperientia bulliant.

Si obstructions contumaces sunt, pilulae sequentes in vium veniant.

3c. Aloes opt. succo abstinthi diligenter nurrie Vnc. i. sem. gummi ammoniaci aceto soluti, & traieci 3. ii. myrrhae electae in vino calente solutae, & traieci Drach. ii. puluer. elector. m. alant. & cryll. tart. ana 3. i. agarici recenter trochi- ch. & rhubarb. elect. an. Drach. ii. salis abstinthi & tamarisci ana Drach. sem. croci scrup. sem. Cum syrupo rosar. solut. fiat massa pilular. de qua capiat Drach. sem. duabus horis ante prandium, bis in septimana.

Loco apozematis predicti, decoctum galli veteris vili- ter, subtiliter poterit, in diuturnis & contumacibus obstru- ctionibus.

Poly pod. quere. & sem. carthami, an. Vnc. i. (serp. squemithymi & epyth. mi, an. P. i. sem. anisi, feniculi, carui, ana Drach. ii. fenic. munda- que, Vnc. ii. crysall. tart. Vnc. i. sem. Con- tundantur omnia, & maseantur, iisque impleatur veter galli veteris cuiscerati. Conquirat in tribus aequi par- tibus, & vna vini albi donec galli caro ab ossibus separatur. Fiat iusculum, quod capiat eger in quatuor doses matutinas.

Vel quod melius erit, & quatuor predictorum simplici- eum parte, fiat decoctio pro vna dosi, in singulis dies vsuanda.

Huc etiam iusculo addi possunt herbae, & radice aper- ientes in parua quantitate.

Ad obstructions inueteratas, maxime commendat Querquetanus in Pharmacopea puluer. rad. arois composi- tum, cuius Drach. ii. cum liquore idoneo ad aliquot dies exhiberi possunt.

Sed praeter ceteris omnibus medicamentis, ad delendas obstructions inueteratas, maxime conferunt remedia ex tartaro, vitriolo, & chalybe confecta.

Ex tartaro sunt crystalli, sal & spiritus, & cum variis medicamentorum formis exhibentur.

Crysall. tartari vius supra propositus est in apozemate & iusculis medicatis, tum ex pullo gallinaceo, tum ex gal- lo veteri confatis. Circa hoc medicamentum iuniores me- dici monendi sunt, illi maiores esse efficaciam, quam vulgo creditur quod quidem illam in vius praestico raro animad- uertimus, propter incuiam Pharmacopoeorum, & fraudi pseudochymicorum, seu plebeiorum illorum destitutorum qui chymica medicamenta Pharmacopoeis vendunt, quoru nullum ferè lyncerus est, sed omnia adulterata. Incuria Phatmacopoeorum maiori parte talis est vt crystallum tar- tari à destitutoribus illis emere malint, quam propria manu

manu conficere (quamvis nulla medicamentorum præparatio in tota arte facilius reperitur) quia vilissimum pretio illis venditur, & non nisi maiori sumptu possint præparare; possent libra liquidum illius, septuaginta vel octo alibus tantum ab illis impioribus venditur. Et hoc solo, Pharmacopos fraudem arguere debent, damnus potius inde emergere videntes, quam lucrum aliquod, si fideliter præparatur. Fraus vero in eo versatur, quod impositiores alii parum tartari, & multum aluminis decoctis suis admiscunt, non quod tartarus carius vendatur, sed quod exiguum crystallorum cinapium præbeat; alumen vero totum in crystallis abeat. Hinc medici suo fine fraudantur, cum alumen astrigendi prædium sit, aperienti facultati, quæ ab ipso desideratur, contra. Aliud præterea damnus huius medicamentum infertur, quod nimirum crystalli humiliorum eliciuntur per decoctiones factas in cacabis aneis, à quibus maligna æris qualitas medicamentum imprimatur. Notissimum enim, vulgatissimum est Pharmacæ præceptum, ne acida in vasis aneis decoquantur, quia facile penetrant, & quandoque æris tincturam, maxime noxiam attrahunt. Ad crystalli tartari acidissimi sunt, & à nonnullis aciculis tartari nominatur. Qui tamen error vitæ plurimum ab ipsis Pharmacopos committitur, & omnes res eorum, qui has crystalli propria manu præparant, vasis aneis vituntur, ut viderim interdum apud quosdam Pharmacopos, crystalli tartari colore caruleo infectos à viridis æris ex vase cupreo atrado. Plurimum ergo medicis, & conscientia, & exultationi suæ, & agrotum saluti consulunt, si Pharmacopos cogant crystallum tartari propria manu, & in vasis vitreis, ferre & aut terris vitreis, conficere.

Sal tartari maxime habet deobstruendi vim, & apozematis, opariis, pulvis aperientibus vtiliter admisceri potest. Sed præcipuus illius usus est in præstana laxante, quæ fit ex fenice Drach. ii. in aqua frigida Vnc. viii. infusus cum tempore lvi Drach. semel tartari, à quo fenice tinctura, potenter extrahitur; ut præstana hæc multo potentius purget, quam præstana vulgaris, & à multis dies continuatur, omnes obstructions solvat, & effectus non raro quartanas contumaces huius præstana viis per xv. dies continuatur radicitus curatæ vidimus. Si sal tartari metatur acrimonia, corrigi potest spiritus sulphuris, aut vitrioli, ut pro Drach. semel, sint guttæ x. spiritus.

Spiritus tartari vius ex hydropsi curationibus in obstructionibus nostris descriptis elici potest, sub nomine spiritus diurectici.

Ex vitriolo verò oleum tantum spiritus viis puratur in apozematis syrupis, aliisque remediis in formis. Exemplum esse poterit sequens syrupus in omnibus icteris, mententerij, & venarum obstructionibus perutilis; quo plurimum per diuturnas febres in cachexias, & hædroses deo-luti, præstana sanatatem rursus adepti sunt.

y. Rad. apij. enula, camp. asporagi, eryngij ana Vnc. i. fol. agrum. ceterach. capill. ven. culcutæ, cædri bened. ana. M. j. lumen. abfinthij pontic. & centaury. min. ana M. sem. granorum alkicengi Vnc. i. aquæ fontis lb. vi. Coquantur, donec colaturæ lb. ii. supersint. In quibus dissolue succorum cichorii, & pimpinellæ depuratorum ana lb. ii. fumariz. & lupul. aut Vnc. vi. feniculi, & petroselinæ Vnc. iii. aceti icellizii lb. i. ff. sacchari albi lb. iv. Fiat syrupus, cui adde olei vitrioli q. s. ad gratam aciditatem, de quo capiat æger cochlearia iii. ante iactaculum, & eodem ante prædium & cenam.

Vitrioli autem equarum offendunt aquæ naturales acide & vitriolatæ, quarum vius frequentissimus, & valissimus est, in omnibus morbis ab obstructionibus oriundis.

At spiritus vit noli cum sale, aut spiritus tartari permixtus, valde commendatur à Spagyricis, ex quibus conficiunt tartarum vitriolatum, & mixturam spiritalem ex spiritus vitrioli tartari, & theriacali consistant, quæ cum aliis multis periculis admisceri possunt.

Denique ex chalybe varia præparantur medicamenta, tum à Dogmaticis, tum à Spagyricis, quæ eundem effectum obstructionibus breui resoluunt, omnes coequent ad vium cœteri frequentem etiam illos, qui omnia remedia ex metallis præstanaquam naturæ nostræ minime analoga, at-

que adeo infecta, respuunt, & abominantur. Illa etiam medicamenta ex chalybe parata componuntur in formam vini, syrupi, opiati, pulularum & tabellarum.

Vinum chalybeum hoc modo confici potest.
y. Limaturæ chalybis Vnc. iv. rad. eryngij, enul. camp. ana Vnc. 4. s. (sanal) cri. Vnc. coralli rubr. lab. eboris, ana Drach. vi. caryoph. nuc. mulchat. cinam. ana Drach. ii. flor. genifz, anthos, & ephymii, ana P. i. vini albi generosi lb. vi. Maceretur per octiduum in B. M. vel retro fustum. Deinde trancoleatur per manicam Hipp. ut vinum optime clarificetur, de quo capiat æger 3. i. vel iii. modis duabus horis ante pradium, per xv. dies, aut plures si opus fuerit. Vel in hunc modum fieri potest.

y. Chalyb. prep. cum sulphure 5. j. rad. enul. camp. & cort. med. tamaricis ana Vnc. ff. sem. Vnc. ii. ephymii Vnc. 4. tuculæ bromiz & cinam. ana Drach. i. pulu. triantal. Dr. i. ff. aquæ agrum & vini albi, ana, lb. i. Infundantur per triiduum in B. M. Colaturæ capiat Vnc. iii. vel iv. tribus horis ante pradium.

Vulgo autem viis puratur in infuso limaturæ chalybis, facta in vino albo claretto, pro potu ordinario, cum multa aqua permixta, per duos vel tres menses continuanda.

Syrupus ex chalybe ita præparatur.

y. Limaturæ chalybis in aceto maceratæ Vnc. ii. cortic. med. tamaricis Vnc. i. sem. cel. chalyb. M. sem. cinam. Drach. iii. aquat. abfinth. & agrum ana lb. sem. vini albi lb. i. Infundatur per dies sex in loco tepido. Colaturæ adde sacchari lb. i. ff. Fiat syrupus capiat æger 3. i. vel ii. mane singulis diebus. In prædicta præparatione chalybis, maceratur in aceto ad solem, donec acetum exciderit; idque tertio reperitur pollea leuigatur in marmore.

Huiusmodi syrupus purgans & efficator eas debet, si cum saccharo dissoluatur, aquæ cisternæ lb. i. in aqua fenicis 3. i. rhab. Vnc. 6. per noctem maduerint.

Pulvis ex chalybe talis erit ex Quercetani Pharmacopoea depromptus.

y. Limaturæ chalybis communiter, vel cum sulphure præparatæ Vnc. i. tuculæ rad. aronis 3. i. ff. ambræ griseæ 5. ff. pro pauperibus species cordiales loco ambræ sufficienti corall. & margaritana 5. i. luccini prep. & cinam. ana 3. i. ff. sacchari q. s. ut fiat pulvis gustui gratissimus, cuius capiat cochlear semel 3. i. cum vino per xv. dies.

Ex eodem pulvere, cum saccharo in aqua naphæ dissoluto, confectione alkermes, possunt fieri tabellæ gustatissime, eodem modo sumende. Vel.

y. Confusæ fior. tamaricis & capill. ven. ana Vnc. i. sem. conseruæ rad. enulae c. inij Drach. vi. chalybis prep. cum sulphure vel aceto Drach. i. salis tamaric. Drach. i. spiritus vitrioli 3. sem. Cum syrupo conditura cist. ff. opiatæ, de qua capiat Dr. i. aut ii. singulis diebus mane. Vel.

y. Limaturæ chalybis lb. sem. vini albi lb. i. sem. Misce in vale vitreo. Vas igitur apponito, mollissime feruere finito, semper agitando sursum, & deorsum vsq; ad xv. el. ebullitiones, quousque spumam sursum feratur. Tunc spumam & pinguem chalybis partem, quæ seruo separatur, simul cum vino in aliud vas transpone. Atque id quater facies prædicto modo, infundendo novum vinum, seruescendo & separando. Deinde separatum vinum ex 4. ebullitionibus igitur appone lento, donec leuiter feruens, mellis crassitudinem acquirat, & leuiter in visum, qui talis est.

y. Chalybis prædicto modo præparati Drach. vi. sem. petroselin. dauci, ipocier. diacurcum, & diarrhod. abbas, ana Drach. i. cinam. Drach. i. sem. Cum melle deipsumato fiat opiatæ, de qua capiat Drach. iii. vel Vnc. sem. singulis diebus mane. Vel.

y. Chalyb. præparatæ cum sulphure Vnc. i. fenicis mundat. rhab. elict. & agarij reconner trochiscat. an. Dr. ii. diarrhod. abbas.

abbat Drachi. croci 3 i. Cu m syrupo rosato solut. fiat opiat. de qua capiat Drachm. manē tribus horis ante pastum. continuando per xv. dies.

Pulvis ex chalybe reliquis remediis non cedunt, & in modum lequentem concinnari possunt.

℞. Chalybis preparat. cum sulphure Vnc. sem. aloes optim. senna mundat. agaric. recent. trochiscat. & rhab. elect. ana Drach. i. pulvis. electur. distillat. abbat. Dr. sem. croci 3. sem. Cum syrupo rosato solut. fiat massa. De qua Drach. i. formetur pulvis vel deasarit, quas capiat mane singulis diebus. tribus horis ante pastum. continuando per xv. dies.

Hicse pilulis addi possunt, pro specie morbi, & egroti opportunitate, gummi ammoniacum, lagapum opoponax, mirba, gentiana, aristolochia, maluco, nux moschata, aliaque.

In omnibus medicamentis chalybeatis hoc perpetuo obcurandum, ut post eorum assumptionem deambulatione corpus exerceatur, ut huius beneficio medicamenti vires in adum melius reddantur, ac in partes obstruatas transmittantur. Eaque deambulatione communda est per duas horas. Quibus transactis capiat ager iuleulum in quo herbae & radices appetentes nonnullae decoctae fuerint.

Præter omnia prædicta remedia, Chymici commendat purgationes mercuriales, ex mercurio dulci, præsertim cum pilulis ordinariis, vel per extracta paratis, quia mercurius valde penetrat, & obstruções aperit.

Bezoardicum minerale plurimum etiam commendatur, & cum mercurio dulci exhibitur miranda præstat. In hunc autem modum præscribi poterit.

℞. Bezoard. min. gr. xii. mercurij dulcis gran. vi. confer. ur. for. Drach. i. vel Drach. ii. Fiat bolus, qui detur per plures dies.

Si obstruções hepatis reperitur in corpore bilioso, cum calida & sicca pars interperis: tunc temporis aperientia frigida, aut temperata erunt usurpanda. Quas proponuntur ut curatione affectionis hypochondriacæ, sicut affectus lenis à nobis explicandæ.

Pro potu ordinario vitæ ager aqua ex infusione chalybis parata cu vino tenui. Vel vitæ leni decocto tamarisci, ager. ceterach. capiv. ven pimperinell. nique simul mixta. aut ferocim usurpatis, etiam cum vino.

Quidam laudant infusionem ligni, nephriticæ pro potu ordinario, alij decoctum rad. cynosabat, quod potenter aperit, & roboret eoque solo multos à gravibus affectibus liberatos esse contendunt.

Potentius autem operatur infusio limaturæ chalybis facta in vino albo, vel robro tenui, cum aqua prædictis, aut etiam cum aqua simplicis permixta. Hoc cum solo remedio quamplurimum virgines à chlorosi liberantur. Et adhuc potentius operatur vinum illud chalybeatum, si præter potum ordinarium meracum manē sumatur ad 3. an.

CAPVT IV.

De Ictero.

Icterus est dolor flauus totius corporis à bilis in cutem. vniuersalē effusione proveniens.

Est igitur symptoma qualitatis mutare, verum statim scie offere dubitatis illa vulgarissima ab omnibus propemodum Pathologicis exagitata, quod ille color flauus in cornua visionem immediate lædit, efficiens nempe ut omnia obiecta appareant flaua. Quæ ut vno verbo expediamus, (misis aliorum ambigib.) dicendum est esse morbum in numero aucto; cum enim cornes debeat esse omnis coloris expert. ut species obiectorum puras, & immutatas transmutare possit; si colore aliquo extraneo præternaturaliter afficiatur, laborat morbo in numero aucto eorum que necessaria sunt ad naturalem illius constitutionem.

Auctores duplicem icteri speciem luctant, flauum scilicet & nigrum. Icterus niger à liepe dependet, & rarissimus est. Ideo hic affectus hepatis exponentes, de flauo tantum agimus.

Effusio bilis in cutem à causis producitur; quæ quidem ad tria capita reduci possunt, prauam scilicet hepaticam, scilicet, vesicæ fellæ obstruccionem, & biliosi humoris prauitatem.

Praua hepaticæ diathesis varia esse potest; ut intemperies inflammatio, obstruções, scirrhus, & quæcumque partem ita debilitare possint, ut bilis excrementaria à sanguine separari valeat, sed cum eo ad totum corpus distribuantur.

Obstruções cystidis fellæ bilis conmeatum impedit ad intestina, vnde illa in hepate reſidat, & inde cum sanguine corpus vniuersum peruat. Hæc autem obstruções fit, vel à pigra crassa, interdum à bile crassa & copiosa, interdum à calculis, qui sepe in cystide fellæ generantur. Potest denique fieri venæ celiacæ, aut illius meatuum angustia, à compressionē partium vicinarum inflammatione vel scirrhus laborantium.

Prauitas humoris biliosi consistit, vel in quantitate nimia, quæ non potest regi à natura, neque à massa sanguinis fecerit; aut etiam quia ita repletur vesica fellæ, ut non possit sese contrahere ad illius expulsiōem. Vel in praua qualitate, quæ humores corumpendo debitat eorum lectionem impedit, vel etiam interdum ad naturam subiectum illius propulsiōem irritat. ut ictero critico & symptomatico contingit. Corruptio contingit in febribus putridis biliosis: tum etiam ex veneno assumpto, aut morbo quorundam animalium venenatorum, quo totus sanguis in bilioso naturam commutatur.

Signa icteri flauo per se manifestata sunt, color scilicet flauus in toto corpore, maxime in albis oculorum conspicuus quem sequitur corporis prurititas, & leuities, lingua amaror, vomitus biliosus interdum & singulus.

Signa causam ex propriis fontibus delatantia sunt. Si enim calida hepatis intemperies, inflammatio, obstruções, aut scirrhus huic malo originem dederint, eorum affectuum diagnosi ex propriis capitibus desumenda est.

Obstruções cystidis fellæ peculiariter indicant, faeces albae, & albus alitricus, ex bilis defectu; quæ faeces colore flauo, vel rufo tingere consuevit, & facultatem expulsiōem in intestinum excitare, ut licet habeat milar clysteris naturalis. Viripe sunt colore flauo intense saturato, ad rubrum vergente, iniectione; quæ intemum in eis immeritum colore flauo imbuunt.

Si à prauitate humoris biliosi fiat, faeces alui tunc valde coloratæ, tum etiam vrine; præsertim si febrilis putriditas succedat, quando icterus est symptomaticus; tumque febribus post icteri aduentum perferat; si vero criticus sit, febris cessat, tum alui excrementa, & vrine, bene colorata apparent. Cause externe, ut venenum assumptum, & morbus animalium venenatorum, ab ægro, & alijs quibus referende sunt.

Prognosis icteris variis instituenda est, pro varietate causarum. Curatio facilior est, qui ab obstruções vesiculæ fellæ producitur, quia illius motus intestinis propioribus huius & materis illis adherentes, ad ea facile decurritur, modo obstruções non sit à calculo, qui cum dissolui non possit, morbum facit incurabilem.

Icterus ab inflammatione, aut scirrhus hepatis proveniens periculossissimus est; illi enim plerumque in abscessum hic in hydropem degenerat.

Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum accedit, malum Hipp. Aph. 6. sect. 4. cui Aphorismo opponitur alia eiusdem Hippocratis sententia, quæ habetur 4. de vitiis rat. an acutis, his verbis: In febre biliosa morbus regius ante septimum diem nasci, cum rigore morbum soluit, sine rigore perissem. Hæc etiam sententia ratio ad tripulatur. Cum enim die tertia, quarta, & quinta, contingat crises salutaris per sudores, vrinas, & alui fluxum, quidni etiam icterus criticus isdem diebus poterit cōtingere? Et testatur experientia, à multis probatis authoribus proposita, sepe icterum ante septimum diem salutariter contingere. Illi autem auctores prædictum Aphorismum ita interpretantur, quod nempe Hippocrates per diem septimum intelligat quemvis diem criticum; septimum enim enunciat, tanquam nobiliorum criticum, ut pro alijs omnibus intelligi.

intelligatur. Verè autem criticus ille audiendus est quem legitur a concocto materiæ febrem elicentis præcelsi.

Curatio igitur ad causarum sublationem dirigenda est. Si enim a calida hepatis intemperie, aut aliquo eiusdem visceris tumore oritur; illicum affectum curationes ex superioribus capitulis deprendende sunt. Qui verò in febris puris contingit, si criticus sit, nulla curatione indiget. Si verò symptomatice sit, curatio illius dependet à curatione morbi à quo exoritur.

Qui verò à cylindris siccæ obstructione dependet, illius ablatione curandus est: quæ convenienter perficitur remedijs superiore curatione propofitis. Quibus suppositis, nonnulla etiam huius affectui magis propria, & specifica, subnectenda sunt.

Primo igitur humoris peccantis portio educetur bolo sequenti.

℞. Elect. de succo ros. & diaphan. solut. ana Drach. iii. rhab. pulv. Drach. i. croci 3. sem. Cam. saccharo fiat bolus qui semel atque iterum exhiberi poterit, si cacochymia vergeat. Vel apozema aptius & purgans erit exhibendum.

Quod ad phlebotomiam spectat, hæc ac improbetur à Gal. quævis modum ratione ipsius affectus non prodest: tamen si multitudine sanguinis in venis contineri videatur, illius immunitio utilis est.

Post viuales evacuationes sequens insulum, per sex, vel septem dies usurpatum, iterum affectum plurimæque radicitus evellit, si recens adhuc ac minime inveteratus sit.

℞. Rad. rub. tinctorum 3. 6. fol. chelidon. mai. M. i. hum. mat. abstin. huius portici, centaur. min. ana P. a. cinam 3. 6. croci 3. 6. Infundatur per noctem cum 3. viii. vini albi. Colatur adde sacchari albi 3. sem. Capiat manè tribus horis ante primum.

Vel potest fieri sequens decoctum.

℞. Chelidon. cum toto M. i. fol. & flor. hyperici, ana M. 3. raiuræ eboris, pulv. stercoris anseris ana 3. iii. croci 3. 6. Pulvis stercoris anseris, & crocus ponantur in nodulo, & omnia coquantur in aquis partibus vini albi, & aque abstin. ad lb. j. In colat. dissolve sacchari Vnc. i. Detur in tres doses matutinis, quæ postmodum iterari poterunt.

Ad hunc usum valde commendat Quercetanus stercus anserini verno tempore herbarum palcentis i. tum etiam, stercus albam gallinæ exsiccatam, & ad 3. lb. vel 3. lb. exhibitur per aliquot dies; dicitque horum æthereum animalium stercora esse nitro sulphurea, & miram habere incidenti attenuandi, ac dissolvendi facultatem.

Commendat Diolecoris suorum marrubij ad morbi regij curationem, & postea recentiores (ac præsertim, Forestius qui nonnullis refert vin. syriaci ex sacco marrubij fuisse persanatos, cum multa alia remedia frustra usurpata fuissent.

Generius laudat radicem viticæ, in hunc modum præparatam.

℞. Rad. viticæ lb. i. croci 3. lb. Contundantur diligenter & cum vino albo succus extrahatur? de quo capiat æger 3. iv. per 4 aut 5. dies matut. postea regere ut videtur.

Dum interna remedia exhibentur, illius et regio hepatis sequenti linimento.

℞. Succor. aply. petrosel. & eichorij, ana 3. j. aceti albi Vnc. sem. olei tamaricij Vnc. ii. Bulliant ad consumptionem succorum & aceti. Mox adde salsati citrini, & fruct. nardi ana Drach. j. cere q. l. Fiat linimentum.

Substis obstructionibus fluxus ille color brevis evanesce diffusus humore cuti imbibito, per solum natu caloris minuitur. Vi tamen promptius evanescat, parari potest balneum aquæ tepidæ, corpus in eo consistendo laculo laurini, hordii, & labatum recepto.

C A P I T U L U M

De Scirrò hepatis.

Scirrhus hepatis, est tumor durus, resistens, & in do-

Duplex autem est scirrhus, esquisitus, & non esquisitus. Esquisitus tantum propofita definitione comprehenditur, qui indolens est, & lenis omnino exers.

Non esquisitus verò quendam habet doloris sensum, & fit à materia minus indurata; vno verbo est scirrhus incipiens, & nondum confirmatus; esquisitus est confirmatus, ita vt differant tantum per magis & minus.

Duos modis in hepate scirrhus generari solet, per fluxionem scilicet, aut congelationem humoris crassi, & glutinosi in partibus substantiæ: vel ab inflammatione, aliique tumorebus induratis per resolutionem partium tenuiorum humoris illos committentes, relictæ ac superflue parte crassiori.

Materia prioris est humor pituitosus, aut melancholicus, vel ab alijs partibus transmissus, vel in ipsa visceris substantia ex prævia hominis genitura, & coaceruatus. Huic humoris producendo non parum facit vitius ratio prævia, ex crassis, frigidis, ac viscosis alimentis consilans: pituitosum aut melancholicum temperamentum, & natia hepatis angustia. Vnde Galen. 13. meth. scirrhum in hepate fieri, & renibus facile generari docet. In hepate quidem, quod viz trietur sit, & sanguine crasso nutrantur. In liene verò, quod sanguinem crassum recipiat. In renibus denique, quod sanguine crasso nutrantur.

Potiores scirrhus seu alij tumores succedentes causæ sunt, immo dicitur discutiendum medicamentorum visus, vel etiam repellentium, quæ refrigerant, & costringendo materiam incrassant, cuiusque resolutionem impediunt. Huiusmodi materię morbosæ frigiditas propria, & crassities, quæ resolutioni non cedat, vel partis imbecillitas, quæ diaphoresin saltem sentiri præponere non potest. Ac denique vitius ratio refrigerans, & ipsa crassitas.

Signa scirrhi in hepate geniti sunt: durities & resistentia in dextro hypochondrio hepatis circumscriptioem referens, & multo maior, quam in obstructione grauitas in eadem parte, & pondus sensus, præcipue quando magna fixatio præstat: lebris cruentis, & doloris, quibus distinguatur ab inflammatione, aut saltem dolor est longus in scirrho non esquisito: debiliior decubitus in tægis sinistris, quoniam hepar durum & graue ventericolum comprimit, &que dolorem infert: color faciei pallidus, & quali virens: quia sanguis lapidatus in hepate scirrhoso non generatur. Corporis quævis enervatur, quia necque humoris neque anadolis huiusmodi pericitur.

Prognosis huiusmodi à Gal. proponitur 2. ad Glauco. cap. 4. his verbis: Scirrhus infensibilis curari non recipit, qui vero diffusus sentit non incurabilis quidem est, non tamen facile curari potest admittit. Idem Gal. cap. 5. infensibilis Scirrhus, inquit, incurabilis ab initio sanantibus sequi vbi vitæ ad plures dies sitis extensus, neque esse potest sanare neque alium videri quæ possit.

Scirrhus incurabilis, & incurabilis in hydrope infensibilem degenerat, & potest quidem nonnulli tempore longo, alij vero breviori, quibus scilicet alij fluxus superuenit, & diutius pericurret. Scirrhus igitur succedens, aut illum generans, periculosus, vide Hippocr. Aph. 42. scilicet morbo regio laborantibus, si fiat hepar durum, malum.

Scirrhi curatio hic primum causæ antecedentes ablatione, per apozema in obstructione hepatis descriptum. Cui etiam alia remedia obstructionibus referenda idonea subijci vtiliter poterunt.

Potmodum verò materia indurata emollientibus, & aperientibus discutienda est. In hunc finem maxime commendat pulvis ex chalybe supra descriptus: præcipue si in addidit oleum, ammoniacum & lagipenum.

Si vero durities consummata fuerit, sequentes pilule ad multos dies erunt usurpandæ.

℞. Gummi ammoniacum in aceto soluti & traieci, atque iterum inspersi 3. lb. bellid. styriaci, ana 3. lb. Millecapit. 3. lb. ternis debet.

Intermedis vero diebus vitetur opia, vel tabellis roborantibus & aperientibus, in obstructionis curatione descriptis.

Sequens vero pilula ad scirrhum emolliendum, ac dissolvendum mirabilis sunt efficacie.

7. Aloca

¶ Aloes optima, & gustomi ammoniaci aceto soluti, & tractati per setaceum, atque iterum inspissati ana Vac. sem. mercurij dulcis Drach. ii. diagrydij 3. i. Cum oxymel. scilicet fiat massa pilular. de qua capit Drach. sem. quatuor horis ante prandium, singulis diebus per 20. aut 30. dies.

Zacutus Lusitanus lib. 4. l. 1. Præcis admir. refert scitrum contumacem conseruat murrubij 40. diebus vius pata curatum fuisse.

Quidam Præctici commendant vium terebinthinæ in hunc modum præparatæ.

¶ Terebinthinæ lotæ cum vino albo 3. l. i. facchari pulverati Vnc. sem. Capit Drach. i. singulis vel alternis diebus: est enim remedium appetitus, vrimam mouens, & alium emolliens.

Toto curationis decursu vitatur æger pro potu ordinario vino albo, aut clareto tenui, ex infusione chalybis parato.

Tum etiam alia chalybis præparationes supra descriptæ hic etiam maxime conuenire poterunt.

Externis vero adhaerere debent fomenta, vnguenta, & emplastra, in sequentem modum composita.

¶ Rad. althææ, beronæ & lioræ ana Vnc. i. sol. maluæ, violat. parietariæ, absinth. agrimoni. ana M. l. sem. lili. fenugr. anethij ana Drach. fem. flor. chamæm. meliloti, rosar. ana P. i. Coquantur in tribus partibus aquæ, & vna vini albi, sub finem additis: vel in aqua & aceto. Colatura foveatur regio hepatis mane, & vtro.

Si scitrus hic consumatur, addantur decocto rad. ieros. nostrat. cucumer. agrest. & ebull. Et parietur decoctio in aqua decoctionis interlinorum veruicæ & vino albo.

¶ Oli. lior. chamæm. meliloti & amygdal. dulc. ana Vnc. i. sol. rosat. & absinthij; ana Vnc. sem. gummi ammoniaci in aceto soluti 3. l. ceræ 3. l. fiat linimentum, quo iungatur dicta pars post forum.

Si lortus inuenientur desideres.

¶ Succor. bityon. & cucumeris agrest. ana Vnc. ii. ol. de capparis & tamarindis ana Vnc. i. vini albi 3. l. Bulliant ad succor. & vini consumpt. deinde addi absinthij puluerat. Drach. i. gummi ammoniaci in aceto soluti Vnc. sem. ceræ parum; fiat linimentum.

¶ Mailæ empl. de mucilag. Vnc. i. empl. de meliloto vnc. sem. gummi ammoniaci liquati in succo absinthij Drach. i. Mixtentur cum oleo absinthij & liurum. Fiat emplastrum, admodumque polit inunctionem.

Vulget etiam parti admoventur folia hyoscyami in aceto decoctis, addito oleo amygdal. amarar. & in formam cataplasmati redactas.

His etiam addere licet fenicupia, ex emollientibus, digerentibus, & roborantibus parata, qualia pro potu descripta sunt; usque alternatim æger vti poterit.

Ac denique causticum tibiæ dextræ inuendum, vt mæteris peccantis portio per id loci deriuetur.

CAPVT VI.

De Hydropē.

DVæ hydropis differentie reperiuntur apud Hippoc. vniuersalis scilicet, & particularis. Vniuersalis dicitur ille qui totum corpus, vel abdomen vniuersum occupat. Particularis vero, qui tantum tantum corporis partem, vnde hydrops capitis, pectoris, & vteri, de quo hic non agimus, sed tantum de vniuersali.

Huius autem hydropis vniuersalis tres proponuntur (species a Galeno, ascites, tympanites, & anasarca, seu leucophlegmata).

Ascites est tumor abdominis ab humore seroso in illius capacitatem collecto oriundus.

Neque solum abdomen vniuersum intumescit, sed etiam pedes, tibiæ, femora, & scrotum eodem tumore, plerumque alliciuntur. Quinimo ascites non raro à pedum tumore incipit, qui postmodum tibias: deinde cruras: ac tandem abdomen ipsum inuadit.

Huiusmodi aquæ ille serosus, seu aquosus, quatenus aqua

naturam retinet, frigidus quidem est: sed quatenus etiam faldedus est particeps, calorem in se habet, qui tum è viscerum vicinia augetur; tum etiam, & multo infensus, ex putredine, quam diuturna mora contrahit; unde febris erigitur, & sitis à vaporibus salis ac putridi os ventriculi inficientibus, excitatur.

Contingit autem interdum, vt humor ille aquosus, non in cauitate abdominis, sed in vesiculis quibusdam paribus ventris inferioris adnatis, contineatur. Cuius rei histologie proponuntur à Sckenckio lib. 3. obfer. & Mauroasco Cordæa comm. 3. & 5. in Hippocr. l. 1. de morbis mulierum. Censuit Galenus (cumque sequatur est tota fere Medicorum, tum antiquorum, tum ætioriorum cohort.) omnem hydropem fieri ab hepate frigidiore, & hæmatosum non exacto perficiente, ita vt pro laudabili sanguine, multum aqua putatam aut flatum generet. Quæ sententia, vt de anasarca verissima est, & omnium consensu receptissima; sic de ascite, & tympanite à recentioribus non pauci controuertuntur; propterea quod in multorum hydropicorum dissectionibus hepar incolume illatum inuentum fit; vt ex plurimis histologis collat ab authoribus propolitis. Præterea Hipp. 2. Præterit. differt æstet hydropem fieri vel ab hepate, vel à parte iano. Per partem vero ianem intelligit totum illud spatium, quod à colitis ad ilia extenditur, & partes in eo contentas. Idem Hippocrit. 4. de morb. & 1. de morbis mulierum hydropem ex iunc. descript. Quibus authoritatibus vulgo respondere solet, hepar perpetuo affici primario, vel secundario; ita vt nunquam hydrops contingat, quin hæmatosis vitetur, & loco laudabilis sanguinis, aquosus generetur. Vtrum hæc rationes hanc doctrinam acriter vrgent: prima desumpta est ab experientia supra propolita, quod mirum si uerissimum esset hepar perpetuo affici. in dissectione cadauerum nunquam uisum reperiuntur. Secunda, quod si hepar sanguinem aquosum generaret, ille in totum corpus distribueretur, quemadmodum in anasarca sanguis pituitosus in omnes partes transfertur. Neque sufficiens ratio reddi possit, cur terrosus humor in hepate generitus in solum abdomen, non in alias partes deferatur.

Quod ad frigidam epatis intemperiem (pectat, illa etiam, impugnatur Tralliani, Auicennæ, & aliorum authoribus, qui statuunt, etiam à calida intemperie hydropem excitari, & non nisi refrigerantibus remedijs curari. Quod etiam Hipp. auctoritate falsum potest. 2. Præterit. murrata. Hydrops, inquit, morbo acuto superueniens, malus, febrem enim non relinquit. Si igitur hydrops superuenit, periclitante febre, manifestum est calidam intemperiem permanere. Neque mihi vniquam placere potuit, quod vulgo dicitur à Galeni mancipis: à calida intemperie calorem natium dissolui, ac plurimum immixui, & calorem alium immixtum frigiditatis nomine donari. Sic enim in febre hectica & febris alia diuturnis, in quibus calor natius plurimum immixtum, frigida intemperies est perpetuo accusanda, & symptomatica, quæ illas sequuntur, huc intemperiei essent adscribenda, non autem caliditatem. Vnde magnam confusionem, in symptomatum causis inquirendis, excitari quis non videt?

Inter recentiores Carolus Pilo, quem sequutus est Sennerius, in vna hydropis alitis causas alius penetratur; statuitque hanc generari ex materia serosa in potu, & cibis humidioribus contenta, quæ ab aliqua causa præternaturali in venis portis, & caue diutius retenta, & in totum corpus non distributa (vt in statu naturali fieri conueit) in abdominis capacitatem effundantur. Retineatur autem humor ille serosus in venis, & ad totum corpus non distribuitur, ex lesa, vel impedita facultate attrahente partium, ad quas deleri solet: vel ob errorem excrementum.

Partes autem præcipue, quæ primum serosam materiam attrahere solent, sunt hepar & lien. Illa enim viscera chylosam materiam ad se trahunt: in qua substantia humida & aquosa ciborum & potuum continetur. Tum etiam lien, potentiam materiam ad se trahit puram & permixtam, vt docuit Hipp. & tellatur experientia eos qui potu maxime indulgent, alius portionem effluui dignam emittere per vrinam statim à paltu, quod fieri dicunt autores peritis;

Am, si liene aquosam illam materiam attrahente, antequam calorem concoctio in ventriculo peracta sit.

Læditur autem hepar, & lienis attractio à variis causis præcipue ex defectu, seu imbecillitate caloris nativi: debilitatur autem calor nativus à frigida vel calida intemperie, & à suffocatione.

Frigida intemperies à nimio alimentorum refrigeratione visu, larga sanguinis evacuatione spiritus confecti, imbecillitate, vel quavis alia causa excitata, cum per se calori adversa sit, etiam nativum hepar, & lienis calorem obducit, cuiusque actiones lædit.

Calida vero intemperies nativum calorem dissipat, unde ille debilior factus à duobus hepatibus & lienis minus caliditate exercet. Iudicatur autem calida illa intemperies à febribus ardentibus, vini meracioris largo potu ciborum, & medicamentorum calidiorum visu nimio.

Denique debilitatur calor nativus per suffocationem, quando sanguis nimis copia redundat in venis, præcipue impurus, qualis emulsiore hepatis & lienis minus caliditate (suppressione: per illas liquorem evacuationes corporis impuritates expurgari folent, que vident suppressionis potestate totam sanguinis massam inhiere.

Læditur etiam, vel impeditur prædictorum viscerum attractio ab obstructionsibus, quæ liberum materię serosę transitum interceptant. Sic securum hepatis & lienis hydrops consequitur, non tantum quod illas partes debilitate sanguinem laudabilem generare nequeant, sed præcipue, quod totam illam materiam, que potu assumitur, attrahere non valeant, & ad alias partes transmittant.

Hic obicit potest, in hydropem totum corpus nutrire à sanguine in hepate genito ex chylosa materia, quam ad necessitatem attrahit. Cum autem chyli portio ex qua sanguis generatur, effluat sit serosa materia, nihil impedit quo minus serosa illa materia etiam attrahatur. Respondemus primum hepar melius attrahere, quod sibi familiarius est, & idoneum, ut in sanguinem convertatur; illud autem attrahit nimio copia quam pars fit, propter attracticis imbecillitatem, unde totus corporis macies exurgit, & cum ex chyli portione sibi magis analoga, portio nem etiam serosę substantię pro vehiculo relinquit, reliquam vero in venis metastatica, & epileptici relinquit, que ibi mortem faciens in abdominis capacitate sensum effluoritur.

Non negamus tamen in hydropem sanguificationem ledi, præsentem enim frigidiorem, aut calidioris intemperie, aut graui obstructione, vel scirrhus, non potest esse sanguifica- tio integra. Sed negamus illam esse proximam, & immediatam hydropis causam: imò potius consecutivam quid & interdum hydropis effectum, cum scilicet aqua in abdomine cõcreta corrumpitur, in ea innata viscera corrumpit.

Possit hepar & lienem, serosam materiam ad venam eadem translatam attrahere renescere, & totum corpus à supersua illius copia liberant, ita ut si functione eorum cessarent maxima feri copia in venis retineatur; quæ in abdomen effusa hydrem operam alacrem brevi producit. Cessare autem potest rerum attractio à multis causis, frigidiori intemperie, tumore, vitæribus, & obstructione, quæ functionem eorum imminuere, abolere vel interceptare valent.

Denique ob errorem externum feri distributio impeditur, quando magna copia aquæ frigide hauritur, cum non possit regia natura, & in venas sufficiens distribui. Sic refert Carolus Piso quendam adolescentem tertiana laborantem cum in paroxysmo quatuor intemperantibus bibisset in alitem incidisse, à quo tamen vinitu tabellæ diacarthami visu liberatus est, aqua in abdomine retinente constrictum rediit. Si tamen diutius continuatus fuerit minus ille aquæ potus, hydropem inducit non ita facile curabilem, propterea quod graues inde sunt obstructions & frigida inducit viscerum intemperies, calore utitur à modum labefactum; unde hydrops curatu difficilis emergit.

Per quas autem vias serosa illa materia à venis in capacitate abdominis transieratur, à nonnullis dubitatum est. Quibus tamen simpliciter satisfacere possit, dicendo ex doctrina Hippocratis in corpore viuentis omnia esse transluabilia, & permeabilia; ita ut vtgentes necesse sit non solum humores tenues ac serosi, sed etiam crassiores per meatus

insensibiles partium transmittatur. Sic in pleuritide sanguis, & pus densam pleuræ & membranam pulmonem ventisientis subtilitatem penetrat, ac per anacartham expellitur. Sic in cibus ac cutis fractura, que illis nescitis, & cute contingit, sanies ex ossis fractura manans, prædictarum partium subtilitatem penetrat, & inficit limes fasciarum. Sic in hydropem ipso, sapie ingens aquæ quantitas vna die per alium eximitur, exhibitio hydrogrog potentiori, quod fieri non potest, nisi aqua in abdome contenta tunica intestinorum perdat.

Neque obstat, quod à Felicis obicitur, frustra conditas fore à natura tot patentes vias, si per cæcos meatus humores transferri possent.

Respondemus in notu humorum ordinario & naturalitotus corporis nutritioni delinatio, necessarios esse ductus per quos illi continuò facili, & altitum fluere possit: Sed in casu extraordinario, vt gente, prouidam naturam vias extraordinarias inuenire, per quas materias noxias exterius, aut saltem in locum minus incommodum deponat.

Obicit iterum Felicis, in his, quæ ex vna per 30 dies suppressa extincti sunt, aquæ nihil deprehensum esse per cæcos illos ductus in abdominis deluxisse.

Respondemus, naturam non semper eodem modo operari circa causas præternaturales, neque humores noxios ad eadem loca deponere: sed ad eas partes præsertim que magis dispolite sunt eorum receptioni, vt potest imbecilliores. Sic in vrine suppressione serosus humor per venas & arterias patenter decurrit, easque implet, & si quidam par debilior repetitur, in eam impetu ruit: unde fit, vt quidam comatosi, alii oethopicoi, alii ex alterius partibus insignis latione moriantur. Sic etiam impedit, quoniam patens abdominis, ad quas venarum & arteriarum extremitates defluunt, debiliores reperiuntur, humor serosus in illius capacitate transferri valet.

Neque verum est, quod Felicis adstruere velle videtur, nunquam hydropem ex vrine suppressione exoriri. Immo multoties ab hac causa producti ratio & experientia docet, quemadmodum nos supra ostendimus ex ista remum attractione, ab aliquo insigni illius vizio, hydropem contingere.

Ho, tamen aduertendum est, vrine suppressionem feri redundantiam efflicere in venæ causæ magis, quam in portæ ramis, per quos in primis humorem à quosum in abdominis capacitate fluere sequens apparet.

Possit igitur satisfieri quæstioni propolita, simpliciter dicendo, per cæcos & insensibiles partium ductus serosos humores transmissi in abdominis capacitate facile tamē illi ductus conspicuos, & patentes iudicare, per quos libere est humoris serosi à venis in capacitate illam comestus.

Horum autem doctum notitiam nobis indicauit Hippocratis Aph. 55, c. 7. Quibus, inquit, secus aquæ repletum in omentum eripit, his inter aqua crepitat, & moriantur. Cuius Aphorismi sententia talis est (Galenus latine perfectus) aquam ab hepate in ramis venæ portæ per omentum (patios) influere, & cum illi repleti fuerint, vel buncis coru rarefactis per diapedesim, aut oculus patetis per anastomosis in cautatem abdominis deferri. Idem liene potest contingere, & forte frequentius, cum liene aquam magna copia è ventriculo trahit, vt ex multis Hippocratis innotescit. Et è liene in omentum trahit conatus eiusdem Hippocratis sententia à d. meritis propolita, his verbis: In ventriculo autem etiam potius feruit, quæ expletur feruit, ac è liene recipit, & ad venas omenti transmittitur. Ex prædictis videre est, per omentum venas præcipue, quæ Epiploicæ Galeniploicæ nominantur, aquam in abdomen effluere; quæ per alias etiam venas extralleare possit.

Præter causas hydropis prædictas, quæ frequentiores sunt, & magis ordinatæ, alie dantur minus frequentes, & ab authoribus relatæ, & quibusdam obseruationibus confirmatæ, quæ scilicet ex peculiarium quorundam partium vizio contingunt, non solum hepar, & lienem, sed etiam mefenterium, pancreas, ventriculus, intestinum tenue, vesicula, & vteri lesa, narium illarum hominū, à graui quodam affectu, vt proprium alimentum curruant, & in serolum humoris colliquatione quadam conuertant. Sic apud Gal. com. Aph. 55, c. 7. videntur hydatides in hepatis superficie inter-

dum excitantur, quæ disrumpit ferofum humorem profundum in capacitatem abdominis, ex cuius collectione hydrope emergit. Sic Fernelius exilimatur hepar valde exsiccatum, huiusmodi rimas quibuldam defluere inlitar terre ficcas, ac per illas rimas serum continuè effluens abdominis capacitatem replere. Alii verò dicunt ex intestinis hydroperum fieri posse illa perforantur, & homo statim non moriatur sed humor aquofus in abdominis capacitatem ex us fuiliet. Tum etiam ex renibus illi valde vicerentur, & per ea vicia kerosus humor erumpat. Sic refert Platerus in quodam hydrope utrumque reum multis vicibus perforatum fuille, vnde sanies & serum in abdominis cauitatem effluxerat. Hydrope denique ex vteri vitio prognati habetur historia apud Sennertum ex Ioanne Heinio de ancilla quadam hydrope, cuius viscera omnia falua inuenta sunt, exceptis icribus, qui tumidi sunt reperi ad magnitudinem capitis in lantis recens natiuum etiam laudihugofu, & plurimus viceribus confectus quibus ferola materia hydroperi committens exulcerat.

Hydrops tympanites a tympano nomen habet siquidem abdomen intus tympani tenore elicit si manu percutatur sonum confimilem eam tenso autem illa est a flatibus in abdominis capacitatem conclusis. Aliquando tamen contingit, ut tympanitis efficiens, non in capacitatem abdominis, sed in cauitatibus intestinorum contineri quod obferuat Symptus, dicens in quibuldam, qui tympaniti putabantur post mortem dissecti, nihilum flatum e vterius cauo erupisse, nec ventrem subleuatum fuille, præsertim tenuiora, flatibus adeo dilata, & conuoluta profuiffe, vt in ventrem denno reponi nequeat.

Quoties autem elicit rarò flatum tympanicè efficitur, solum in abdomine contractis, sed puerumque aquæ peritum, quem admodum etiam in alcite non aqua sola, sed flatus etiam in abdomine continetur, & vtique a prædicto nomen mutatur. Si nimirum maior flatuum, & minor aque copia collecta fit dicitur tympanitis: fit verò aqua flatibus præualens, alcite uocantur, illi denique æqualis vniufque portio cumuletur, ambigit inter vtutemque vt dubitare liceat, vtrum alcite, vel tympanitis talis hydrops dici debeat.

Flatuum causa materialis est humor crudus & crassus, siue pituitosus ille fit, siue melancholicus, qui a calore exagritus, & attenuatus vapores crassos emittit, qui diffusi sunt diffiuntur, & illi vapores flatus nominantur.

Humor autem ille crudus & crassus in ventriculo & intestinis aliqua ex parte refidet, sed malò magis intra diaphragmatis & intestinorum membranas conuenitur, vnde difficilior quam a cauitatibus partium prædictarum, auelli potest. Huius rei fortiori coniecturam facit Aphorismus Hipp. 1. 1. 1. 6. *Quibus tormina, & circa umbilicum labores, & lumborum dolor, qui neque medicamentis, neque aliter soluantur, in hydroperum sicum firmantur.* Cum enim meienterium parte anteriore intestinis alligetur, posteriore verò lumbis; faciliè videre est, dolores ad vmbilicum & lumbos spectantes, ex meienterio prodire. Adde quod dolorum contumacia causam denotat in profundo corporis, & partium substantia concludam, quæ nullo modo deturbari valeat. Si enim in ventriculo & intestinorum cauitatibus continetur, facilius excludi potest.

De causa verò efficiente differebat inter se autores, aliis frigidam intemperiem aculaniibus, alius verò calidam. Qui frigidam intemperiem acculant, se latorem habere putant Galenum, dicentem flatum generari a calore debili. Quibus respondendum est, calorem posse dici debilem respectu materie, quæ eo non potest diffusi ac resolu. Sed hoc potius adhibendum est illi ipsius materie defectui, non caloris, qui sæpe intensior efficit præternaturalis. Et certè agnoscendum est cum doctissimis authoribus, materiam tympani generandæ magis idoneam esse humorum melancholicum adultum, & arbutarium, qui a calore vicerum torrefacti generantur. Qui quidem calor eandem materiam exagrat, & ex ea flatus crassos, ac diffiçile resoluibiles educit.

Hydrops anasarca fit ab humore pituitoso in totum corporis habitum effuso, qui ideo tumidus & albus apparet, vt

de leucophlegmatia nominatur. Generatur autè humor ille pituitosus ab hepate frigido, quod pro laudabili sanguine crudus & pituitosus producit, qui cum substantia partium in hominibus sufficiens agglutinari nequeat; potius illius crudior, & nutritioni inepta refertur in partibus calidissimis reddit, hinc anasarca, seu leucophlegmatia exurgit.

Affectus incipiens dicitur cachexia, quæ ab eadem causa procedit, & eadem habet generationis principia vt faciliè cachexia in leucophlegmatiam degeneret, cum differat tantum secundum magis, & minus.

Cause antecedentes sunt, quarumque hepar impensè refrigerare valent, illiusque vim concoctricem plurimum intrinsece vt alimenta frigida & humida largis effusum, suppresiones meulium & hæmorrhoidum, obstructions & tumores frigidi, quales sunt scierhorum etiam hæmorrhagie copiosæ, aliorumque humorum magnæ ac duræ evacuationes, a quibus calor naturalis plurimum immittitur.

Signa hydropis, & cuiusque illius speciei, ex prædictis factis manifesta sunt. In alcite enim a quofus humor in abdomine cõtenus indicatur ex abdominis mole grandiori, tumore molliore, ac latiore, qui per latera cõpessus fluctuationes leuissimè manifestum repræsentat, & æger ipse dum se in alterutrum latus conuertitur, murmur velut fluctuans is aquæ percipit, tum visceris moles in basiu illud prouoluit. Hinc pedes & scrotum intumescunt, superiores verò partes graciliores euadunt, ac contabescunt, vrina sunt parce, & crassa, & interdum rubra, quia exigua feri quantitas ad renes, & vesicam trãsit, in illaque diu moratur, & in illa mora crassescit ac coloratur. In progressu morbi difficultas respirandi adell, ob aquæ copiam diaphragmati incumbenti, præcipit dum æger decumbit, vt ea de causa erectus manere ac ledere cogatur. Siti etiã adell molesta est humoris falsedine, cui venenosis innat. Ac denique febri continua, & leuiter excitatur ex eiusdem aque putredine, quæ viscera omnia in ea immatata tandem labefacta & corrupta.

In tympanite verò venter percussus inlitar tympani sonum edicans, alioquin minus grauis illi quàm in alcite, tormina præcesserunt circa vmbilicum, & lumborum dolor, ægro supino iacente venter diffensus ac durus manet, neque dum se conuertit æger, ac a latera deuiat.

In anasarca denique non solum venter, crura & tibiae, sed etiam manus, brachia, pectus, facies, & totum corpus intumescit, & vbiuque digito prematur, velligium relinquit. Color cutis pallidus, ac caduerosus, carnes molles, & laxæ, vrina tenuis, & alba, respiratio difficilis, febris lenta non rarò consequntur.

Quod ad prognosticon attinet, omnis hydrope periculosus est, & cutat difficilis eoque diffiçilior, quo magis inueteratus. Sed inter species anasarca minus habet periculum; alcite verò & tympanites inter se ambiunt, vt nunc hic, nunc ille periculo fit, fit pro maiori vel minori grauitate causarum, a quibus dependet. Sic alcite a scierho hepatis otundus, aut viceris alciuis partis internæ, periculosior est tympanitis, verò a nimio aque potu, aut obstructionibus ito adeo inueteratis, minus infert periculum.

Hydrops facilius curatur in ferus, quàm liberis, in rusticis quàm in nobilibus, quia cum desideret famem, sitim, & multa alia regulæ longamque patientiam, promptius succurritur huiusmodi faciliè conguat, quàm quibus noxia libertas est.

Hydrops a diturie lienis minus periculosus est, quàm a diturie hepatis, quia lien nimis princeps membrum est, quàm hepar.

Hydrops morbo acuto superueniens, minusneque enim sed a febrem, sed dolore admodum infert, ac mortem. Hipp. 2. Prægn. 11.

Quibus hepar aqua plenum erumpit in omentum, si venter aqua implentur, & oruntur. Hipp. Aph. 55. 1. 7.

Ab aqua intercutem habito, si aqua quæ in venter est, in ventrem confluxerit, morbi fit solutio. Hipp. Aph. 14. 1. 2. Hic Aphorismus priori contrarius videtur. Sed contrarius soluitur dicendo Hippocrit in priori per ventrem intelligere calliditatem abdominis, in hoc verò alius. Si nimirum

Michael Paschalius; quod in pilulas efformabat propter amaritudinem.

Chymici extractum hellebori nigri,aquilam coelestem,
& mercurium vitæ commendant,eaque cum alijs medica-
mentis vulgaribus permittunt, vnde copiose lequitur fe-
rosi humoris euacuatio. Sed viribus admodum robusti-
opus est, ad horum medicamentorum vehementiam tole-
randam.

• **Mixtus operatur mercurius dulcis & mercurius diaphoreticus.** At fine manifesta euacuatione, antimonium diaphoreticum cum fale petre ad albedinem calcinatum; ac multo efficacius diaphoreticum ex buryto antimonio puratum omnes hydropis species curat.

Verum in omni purgantium administratione obferuandum est, purgantia laetem validiore non esse frequenter viurpanda, vt docet Galen. p. *xi rrrv*, quia corpus debilitant, vt pollea maior aquarum proventus exoritur. Ideo roborantia & aperientia frequentius quam purgantia erunt praefcribenda. Et experientia nos docet, euacuacionem in hoc morbo quae fit per viinas anelius succedere caeteris, fit per alium.

Purgationem vice clysteris injici possunt, quibus statim disculantur, aquæ educantur & venter immuniatur, in hunc modum compositi.

q Fol. maluae, nuc. tural. bractee rubrae, an. M. i. foldanel-
le M. f. i. sem. anisigaru & anethi, ana g. u. flor. chamæ meli-
th. it. thachod. & genitil. an. P. j. Coquantur ad b. in 1 colar.
dissolve catholici; 5. u. hiet. p. cre. 5. i. olei anethaliliorum, &
mellis comm. ana 3. i. Fiat clyster, bis in hebdomada. inu-
cendis. Vel.

4. Turmenti acrioris ꝑ. 3. falis comm. ꝑ. i. Coquantur in aqua q. i. in colat. dissolue urinae pueri impubis ꝑ. i. v. olei rutacei ꝑ. iii. mellis deipurnati ꝑ. i. Fiat clyster, quem valde commendat Valeriola.

3. Sequens vero clyster infirmum aquarum copiam educit.
4. Pulpe colocynth 3-1 Infunde per noctem in vini albi
3-111. Colature adde decoctum utrinque veruere thal- giei
communis 3-1 alais poure hafi Voc. lacti fortis cochl i. Fini
clyster. Vel

†-Pulpæ colocynthis 3.i.furfuris mætri M.i. Decoquan-
tur in vino albo-& fiat clyster. Vel

ꝥ Sem. earth. Vnc. i. agarici opt. Vnc. ß. pulpe colocynth.
 ʒ. iii. iol. coccineæ minor. chamæd. & abfinchi vtriusque.
 an. M. ß. Coquantur ad th. In colat. diffolue oiei chamemel.
 rutæ & de cappar an. Vnc. i. mellis rosæ. Vnc. ii. Fiat clyster.
 Vel

ꝑ. Decocti emollient. ibi vini emetici turbidi Vac. iv. dia-
phoen. Vac. i. Fiat clyster.

Veneficatio in hoc affectu merito reijcitur, nisi fiat a sup-
pressione mensium, vel hemorrhoidum. Et tunc etiam, non
nisi ab initio morbi vena est aperienda, antequam hepar
frigidam diathesim contraxerit.

Cantheria, vesicæ atroxia, & scarificationes in hydropicis gâ-
grynâni sæpe affere solent, quia calor partium Pusillus facili-
tè extinguitur. Ideoque satius est ab huiusmodi remediis
procurus abstinere, licet nonnullis aliando profuerint.

Paracetempe est quidam, peritumum calidum, et di-
quies ex pauca operatione, ubi heri noluit, iam confirmato mor-
bo, quousque succedit corruptis viceribus, nulla (saluta) p-
est. Ideo, ut plurimum, secundo, aut tertio ab operatione
die, interante Prudentiores volunt apertionem esse facien-
dam in principio, vel augmento morbi, antequam vici-
labem contraxerint. Sed neque tunc tempora necessaria
est, cum alius remediis, inque tutioribus, morbus adhuc le-
uitur curari valeat.

Inter eam uacuam ressedia huius affectus proficiat reſeſ-
ſe fudoſifica, quæ ut in analiſi perſepto profundius in-
ſympnatiſis, æſcit aliquando nocent, ſi nempe hepatis
ſiccitas, ut non tarò huius morbo originem dederit. Adde
quòd in hydroſis ſudorem elicere vtipurium impoſſi-
bile eſt. Si tamen illa hepatis ſiccitas abſent, fudoſifica in
omni ſpecie hydroſis conſentire poſſunt, præcipue in decli-
natione morbi, ad ſerotiſimum, reliquas per habitum
diſtendit. Sic Valerius inſert a le caratam aſcitem de-

costo lignisanti per 40 dies exhibitio. Vile autem erit
idem decoctum cum aqua chalybeata & vini albi portione
componere. Chymaci commendant antimonium diapho-
reticum.

Martinus Rulandus sudorificum parat ex bacis juniperi, quæ cum urinas etiam mouendi vim non exiguam habeant, vtraque ratione plurimum prodesse poterunt. Illius compositio talis est.

¶. Granor. iuniperi contu. M. iii. Vini generosi q. f. Deco-
quantur ad medias, & exhibeantur Vnc. vi. singulis diebus
mane, coram sole optimè regatur.

Horatius Referus apud Scholtzius, fide multos pueros & nonnullas mulieres anasarca laborantes curasse gloriatur viū fyrupi sancti Ambrosijque sudorificis elixirijque descriptio habetur in vteri dispensatorio, quod Lummare manus anociatur, aut ita se habet.

g. Mulu excocturati Vnc. ii. aqu. fontis th. § Bulliant donec vnc. iii. vel iv. illas aqu. superint. Quæ percoata, cum equali vini albi generosi portione misceatur, deturque calidum hydropicis copiosissime enim sudabit, si tectis diliger.

At verò cæteris præstant medicameptis, quæ per urinas
serofos humores euacuant, & felicioꝛ vtiplurimum curatio
hac via solet succedere.

Inter præcipua habetur succus cherefolii, cuius vnc. ii. exhibentur manè cum vino albo per plures dies.

Vina aperientia diuretica in hoc casu plurimum etiam conferre solent; quorum exemplum tale esse potest.

po-Rad enule camp-appi i ceniculi & i rids, i ficcarum an-
ni sem-rad, valeriana, gentiana alari, scille, un Drach-i
cortica med sambuci & ligni fassifras, un Drach-vi, ol-
abstio, agrum chamædæ camp-ven siccor-an Drach-i, sum-
mit-centaur, mus & flor xepilli ana Drach-i, lem-petrolei
ameos, anethi, un Drach-i, lem-cinamomi Drach-i, pica-
nardi Drach-lem, Consequenter omnia & infundamur
j vini albi mensuris i. vel ii. per aliquot dies; deinde hoc vi-
no vltatur omni mane.

In eandem viam referri potest vinum chalybeatum compositum, in obliuatione hepatis descriptum.

Inter diuretica etiam confendum est decoctum Juniperi supra relatum. Quod etiam si nimia eius caliditas timeatur, in aqua parari poterit; eaque spiritus vitrioli tantillum admisceri.

Fofoeca commendat vſam terebinthinæ cum aqua hor-
dei lotæ cuiusque vnc ſem. c. habet his in ſextimana.

Ac denique spiritus salis, tartari & vitrioli, nulla dosi exhibiti, cum apocemate, aut aliquo docto aperiente per aliquot dies, muranda praesentantur summa tenuitate predicti in omnem corporis meatus facile penetrant, eosque aperiunt. Idem praesentant sales abinthii, iussiperi, stipitum fabarum, & similes cum vino aliquo exhibiti. Vel saluum defusum lixivum ex eorum cineribus parata sufficiunt.

Mathioli ad cap. 87 lib. 1. Dioctrid. Lixinium, inquit, ex vino albo, & sumptis cineribus arum 4. aut 5. uncias pondere potum, valentissimè vitæ periculis a vi venenalis videtur hydroticus hic tantum auxilium ferat.

Præterea in toto curacionis decursu roborantia hepatis nunquam amittenda. Quia frustra aquas educimus, nisi novam carnis generationem inhibeamus. Quod non nisi hepatis relicto et ad præstatam temperiem revocando consequi possumus.

Inter precipua roborantia recenſeri debet aqua cinamo-
mi. Curus cochleas vnam mané vel ante cenam interdum
exhiberi poterit.

At maxime laudatur a Galen. 8. *xij* *terre* electarium cyphoides, ab Arabibus *de vno* appellatum. Cuius vnc. sem. mané exhiberi poterit. Illius compositio ab Hollerio correctā ita se habet.

gē. Psidul. corinth. mundat. ʒ. sem Coquantur in vino
veteri generoso ad pulvis confitentiam. Tulas excoerere
per letaceum. Tuen admisce confere anthos. corac.
citricondi, cinam. acuti inter ana Drach. puluer. aro.
mar. roiat. diamagr. & calidi, diacina. ana Scrup. ii. ligni
alos odori. Drach sem croci. 3 sem. Misce. fiat electuamum
molle.

Opata ad obstructions hepatis præscripta etiam erit utilis.

Potum etiam valere conferua abfinthij ponticis ex vna parte conarum ulius, & tribus faciliari partibus composita. Cuius vii nonnullis hydropicos percuratos fuisse testatur Matthioli cap de abfinthio.

Potius opatam componit ex conferua rosarum specifice stomachico, croco nartici, & ol. vitrioli, quo folio remedio si hydropicos crasse gloriatur. Specificum autem stomachicum est ananionum fixum.

Ceterum in potu hydropicam maximam versatur curationis momentum. Illud idcirco curam exactam habere, opus est, ut parcissime bibat, & situm toleret quantum potest. Multos enim omnimodo potus abstinencia & afflorum viuisque alio remedio consualius notum est. Pro potu vter ut vino emulato, vel abfinthio, vel iuniperino, vel chalybeato, vel predictis etiam chalybeatis lubet. A uscenna ne aquas quidem videant hydropici, si tamen nimis calefactio non efficitur metuat, vel æger sit abilemus, ut poterit decocto iuniperi, ligni sancti & salisars. vel decocto rad. rubiæ tinctorum, quæ vinas poterit moueri, sique vel folijs vel cum vino albo permittit. Cum autem, ut antea dictum est, potus abstinencia maxima esse debeat, si tamen admodum vigeat, illa per vices fallenda est, vel oris collutione, cum aqua chalybeata & aqua, frequenter mandendo grana aliquot mafiches, vel quodvis ciuidera facultatis. A quam enim plurimum in os eliciet: Non ut quibidam videretur, & capere solent ex ventriculo, & ex abdominali capacitate, sicque multis est veniens profutura.

De cibis, hoc tantum dicemus, siccoris esse eligendos, & dulcia, ut psetum, esse fugienda.

Dum remedia interna celebrantur, externa etiam adimplenda sunt. Illa cum non parum conferunt ad ventris tumorem discutendum. Ad hanc rem componuntur fomenta, facculi, vnguenti, cataplasmata, & emplastra, quorum præcipua in hunc modum se habent.

1. Rad. althææ, liliorum, & pericoronæ, rad. cappar medij, nigræ, tamarici, bulbuli serpentariæ maior, an. j. iij. fol. abfinthij, grimonij, maioranæ, origani, calamentij, pulegij, rucæ, anethi, chanarpi abortivi & lambuci, ana M. semper, rosel. anethi & cumini ana Vnc. iij. ros. chamæ. melior. & gentiæ, ana. P. iij. pice nardi. Vnc. iij. alor. nucis mochat. caryophylli & cinnam. ana Vnc. sem. salis & aluminis, ana lb. f. Fiat omnium decocto in aqua lactata & cineribus quævis, vel fermentorum, quæ foment totus venter & calidè ante cibum, cum spongia in ea imbuta & expressis. Vel.

2. Vinæ pueri mond. lb. iij. falis prunellæ Voc. iij. Bulliant ad tertiam partem consumptionem pro lotu.

Aqua pendens aquam calicem prædicat, in aqua spongiam noyau, quæ rotum abdomen comprehendat, exprimit, eamque superligat. Sic enim aquas hydropicorum infensibiliter absumit, & frigidam humidamque viscera temperiem tollit, & benem induratum aliquando sanari affert. Claudium verò calcem in aqua thermali, salia, sulphurea aut nitrofa extinguit, spongiam in ea expressam facilius arde vtriusque aligat, & diu ibi detinet, subindeque permutat.

Facculi parati possunt ex materia prioris fomenti, in vino albo decoquiti, & calidè venter adiuuati.

Possunt etiam liniunt venter ol. anethino, rutaceo, iirino, cum pulbere ammoniaci, galangæ, anethi, baccharum lauri & sinuiperæ.

Iniunctio ex ol. scorpion. Matthioli, cum paucis oleo rosinæ maris utilis est.

Multi vnguenti & linimenta componunt ex purgantibus validioribus, quæ hydropicorum aquas potenter detrahunt, & dissilunt abdomen remittunt. Verum in illa periculosa sunt. Inferna namque musculis & membranis vis purgatoria lethale læpè aut prostruunt ciet.

Possunt linimenta, vel etiam vi omnis, cataplasmata vel emplastra imponi potuerunt. Sequens præstatissimum est.

3. Rad. cucum. agrest. optime contulæ & in aceto scilicet per 24 horas macerata, lb. iij. mellis depurati lb. iij. Misce, & pulu. ad consilij cythari carati, & in sine adde cumini sub-

tiliter puluerat. Vnc. iij. Fiat emplastrum abdomini applicandum, & singulis diebus renouandum. Vel.

4. Stercoris boum ficiat lb. iij. sulphuris visci, sem. cumini puluerat. an. Drach. iij. apæ vel vrinæ pueri q. d. Fiat cataplasma.

Cataplasma ex raphanis contusis vmbilico, & lumbis admotum, alium, & vrinæ mouet.

Galenus commendat cataplasma ex cochleis cum suis testis contusis, quod venter admotum ibi detinendum est, donec sponte cadat, itaque hydropicorum poterit abfinthio.

In emplastrum formam redactum tale componitur a Valeriano.

5. Stercoris vaccini lb. iij. ster. caprini lb. sem. Bulliant simul in aceto fortissimo, & in mortario contundantur, addendo sulphur. vna Vnc. iij. alumin. Vnc. iij. cor. thymelæ & eboli recent. extra. cor. thymelæ Vnc. iij. larin. lupin. & corbi. ana Vnc. iij. puluer. soldanell. quart. j. anisi, marathi, cumini, ana Drach. iij. lais cum. torrefacti Drach. iij. terebinth. Vnc. iij. pice nardi, Vnc. iij. Misco. fiat emplastrum.

Observatione dignum est, quod sibi experientia compertum esse testatur V. versus & Variagius, bulonem syluestrem, qui in memoribus reperitur, per ventrem scitum & rebus obligatum aquas hydropicorum per vinas edere, & cum ampullis euacuare volumus, applicationem esse renouandam.

Petrus verò refert eisdem bulonem puluerem in chibano siccato, & calcinatum. Drach. sem. pondere in vino, vel alio liquore propinatum, per vinas hydropem misce expellere. Cuius experimenti inuentor primus, mortis acceleratione ex eo querens, inspirato consiluit. Sequens etiam ceratum ex bulone paratum vtilissimum est.

6. Bulonem lb. iij. olei eboli lb. iij. olei lb. iij. Ceræ lb. f. Bulliant in olla lutata ad medietatem consumptionem. Colentur fiat ceratum, quod extendatur super alutam & regioni liliens applicetur, itaque omnes euacuat.

Toto curationis decursu roborantur ventriculo admoventur. Et in primis hepatis, dum tumor subsidere incipit, aut non est ita insignis, ut topiorum penetrationem, ad hepar impedire queat.

7. Ol. flor. arancorum Vnc. iij. olei de spica Drach. iij. vnguenti rosæ, cerati stomachici Gal. an. Drach. iij. ol. mafich. lb. iij. an. j. iij. fol. abfinthij, tal. 3. i. ol. nucis mochat. Drach. iij. Ceræ albæ parum. Misco, fiat linimentum venterale applicandum.

8. Comar abfinthij pontic. 3. iij. marrobij, rosifem. ana Drach. iij. rosar. rubr. P. u. flor. chamæ. fol. laurum M. f. ext. arancorum, ligni aloes odorif. an. Drach. iij. rad. cyperi, sichenanthos, spica nardi, ana Vnc. sem. Cum vini optimi partibus duabus, aquæ abfinthij & agrim. an. parte vna, fiat decoctio, quæ toneatur regio hepatis cum spongia vino abfinthio clota.

9. Vnguenti rosæ, cerati fantal. ana Vnc. iij. rosar. rubr. sem. endiu. & acet. o. an. Drach. iij. spinæ nardi, sichenanthos, abfinthij fici, lityrac. calament. an. Scrup. iij. ol. mafich. vel de abfinthio q. d. Fiat linimentum applicandum eidem parti post lotum.

Vt plurimum in hydropice crura, tibie & pedes edematotumore afficiuntur, ad curamque discutendum conuenientissimum in quo rad. ebuli & eulæ camp. folia rosifem. majoran thymali, origani, salis & alumen incocta faciant.

Quamvis autem, vti plurimum proposita curatio vixenda sit, aliqua nido tamen minus conueniens est, quando nimium hydrops in calido & siccis temperamento, a causis calcaciens calorem naturam dissipantibus, productus est, quemadmodum in febribus biliosis & vehementibus solet accidere. Tum enim hepatica frigida cum aperientibus minus calidis conueniunt, quæ in febribus diuturnis viurpant solent. Tum etiam lyprus magistralis præ decripsit, ex succis rosar. cichorii & agrim. compositus in hoc casu maxime conuenit.

Pro potu sumatur decoctum rad. cichorii, & calcitræ gustu non ingratum, vel aliorum aperientium temperatorum, sed liberaliore quantitate, quam quæ supra proposita est, quæ nimium situm leniat, & scoris ardorem temperet, idque

lique reficcitum humectet. Quam doctrinam (quamvis ab Auenenna, Tralliano, aliisque sancita est, quia tamen nonnullis paradoxa videtur, & magni est in vñu practico momenti) non erit inutile insigni exemplo confirmare, a Baptista Montano relato conf. 163 his verbis. *Vid. inquit, Venetis religiosum quendam Ordinis Predicatorum, hydropicem esse affectu, & tympanite, qui fuit curatus. Adferunt mirum excellentissimi Medici plures scilicet Papensis, Eugubini, Tricarinensis, atq. Habebatur, ut dicit, affectum tympanitidis, & talem cum febre bellica. Operiebat tum existeret & humellere. Quare crassus in maxima discordia. Ego volebam ut multum ibiberet, sed qui aperiret, quia habebat plurimas obstruiones graues, ut humellaretur, quia ad tabem penetrasset. Or dabam ego syragram acrisum cum omnibus que prouocant urinam Eugubinus nebat, quiaquam esse ibidendum, & narrabat de quodam historiam, qui per sicca fuit curatus papensis, ut licet derideretur, conclusit, neque liberaretur, neque omnino nihil esse ibidendum. Res curabatur usque ad mortem. Deducebant nobiles vinum quoniam Medici ad suam symbalam ibi tum papensis, quod antea dissimulauerat, conuersus ad magnificum quendam, dicit: & i vultis curare hunc, dominum profecto non alind erit faciendum, quam quod consulat Baptista Mantanus.*

In hoc etiam casu maxime conuenient medicamenta ex chalybe, tartaro, & vitriolo, quia citra insignem calefactionem potenter aperiant & vias mouent.

At cæteris remedijs palmam præcipue in hoc casu aqum minerales acidule & vitriolæ, quæ viscera potenter deobstruunt, aquas per vias euacuant, & viscerum intemperiem corrigunt. Vide experientia constat, multos hydropicos quotannis aquarum Spadanarum vñu percurari.

Narrat Auenenna cap. de cura affectus, historiam mulieris cuiusdam quam hydropis affert, ut ipse loquitur, & significata est super eam, & ipsa mulier comedit quæntiam, malorum granatorum, tam maxime quod eius relatio in credibilis, & sanata est.

Ex Varignana refert ex Platario, quod quædam vetula coxit in olla laccu plantaginis ad medietatē & dedit hydropico de causa calida, ad ibidendum quotidie, & curatus fuit.

Quibus exemplis patet hydropem aliquando refrigerantibus curari. Hisque addere possumus Christophori a Vega testimonium, qui lib. 3. art. medic. sect. 3. cap. 2. Tympanitē inquit, quendam & a calida interea intemperie natam, quem refra, gerantibus curauimus, perit, superueniens si scissus euacuat, & chery cum pauco aceto, & ciborum eandem dante, atque cō-

PRAXEOS MEDICÆ

LIBER DVODECIMVS.

DE AFFECTIBVS LIENIS.

PRÆFATIO.



Vennus lien omni morborum genere tam similis, quam organico, & communis officina. Iam: nos tamen est sollemnitas qua in praxi frequentius occurrere consueuerunt, explicare decreuimus, eo quod sex capitulis comprehendere. Quorum primum erit de lienis inflammatione. Secundum de colore. Tertium de obstruione & tumore seu inflatione lienis. Quartum de melancholia hypochondriaca. Sextum de febribus affectis.

CAPVT PRIMVM.

De inflammatione lienis.

Inflammatio lienis eiusdem est nature cum hepatitis inflammatione. In eo tantum differt, quod rarius fit a sanguine puro frequentius a sanguine melancholico. Eandem etiam habet causas tam coniunctas, quam antecedentes. Diagnosim verò diuersa est.

Signa igitur infamati lienis sunt, tumor & dolor in sinistro hypochondrio, qui interdum ad diaphragma & finistram humerum extenditur, grauias etiam adit, & pulsatio in eodem hypochondrio sebris afflicta, cibi fastidium, sitis, lentor nigricans lingue adhaerens, molestus dexter decubitus, propter viscosi grauitatem vetriculo incubantis interdum etiam finistralis si tumor ingens fuerit, quia compremittit tum a ventriculo & hepate: tumor interdum lienis figuram retinet, interdum totum finistram hypochondrium implet; interdum etiam infra umbilicum apparet, multa tipicaria materia, & inflammatione vicinas partes precipue vmbilicum occupante.

Intensiora autem remissiora prædicta signa apparent, cū aliqua etiam varietate, pro varia humorū miscella. Si enim sanguinem melancholicum bis admixta sit, vñe sunt rubicundiores, os amarect, sitis intensior, febres ardens, & tertio die ingrauescens, vigiliae tensæ, & interdum deliria. Si sit admixta pituita, color est pallidus, febres æstus minor, ac dolor remissior. Si verò sanguis melancholicus purus sit, duri-

tus maior est, color corporis nigricat, & interdum vñe, aliaque dominantis melancholiz indicia apparent.

Prognosis ferè eadem est, quæ hepatitis inflammationis, atram paulo minus periculosa, cū hepar fit nobilissimum. Si ægrum non interimit, vel crisi terminatur, vel resolutione soluitur, vel suppuratione, vel induratione, quæ in scirrhum degenerat. Crisus bona sæpe contingit per hæmorrhagiam naris finistralis, vñe vel alui profusum.

Curatio huius affectus eadem instituitur, quæ in hepatis inflammatione fuit propofita, si sequentes tandem adhibeantur differentie.

Primo, quod venæ scdio, liene inflammato, in brachio sinistro celebranda est, & non ita frequenter vt in hepatis inflammatione: quia hepar, fons sanguinis largiori indiget euacuatione. Quod verò de apertione salustellæ ab Autoribus circumfertur, quam licentem peculiariter exonerare aiunt, superfluum est, & iam ferè in vñu practico obsoleuit. Volens enim multo è basilica vena ad omnes impledas indicationes, sanguis detrahatur.

Secundo, quod topica, quæ inflammatione hepatitis hypochondrio dextro admouebantur, hic sinistro apti centur.

Tertio, quod in diætæ topicorum vñu, alstringentia non sint tanta cura: tam diu continuanda: quæ cum lien fit pars minis principis, illius robori tantopere studendum non est.

Reliqua ex inflammatione hepatitis curatione desumuntur.

CAPVT II.

De dolore lienis.

Dolor interdum, lienem affligit circa febrem & duri- tiem, quæ tactui resatur, ique a statu exoritur, qui non solum lienis substantiam, quæ ferè insensilis est, sed etiam membranam ipsam veltentem distendit.

Ab inflammatione facillè distinguitur per febrem & remittentem absentiam. Difficilius verò a colico dolore, quia colon intestinum pleni subicitur, & in umbro distinguitur tamen, quod dolor plenius graui sit, & in vñu loco

fissus colicus verò distendens, acutus, mobilis, & ad totum ventrem excurrens.

Curatio huius doloris perficitur clysteribus carminantibus, purgatione conuenienti fomentis que emolnentibus ac discutientibus adiecto. Tum etiam linimentis compositis ex olivoli chamæmæ capparum, absinthij, cum modico spice & aceti.

Si post horum remedium vsum dolor persistat, cucurbitula sinistro hypochondrio erit admoventia, modo nulla inflammationis aut fluxionis suspicio fuerit.

CAPVT III.

De obstructione tumore, seu inflammatione lienis.

Lien obstructionibus obnoxius est non minus, quam hepatis, imò & frequentius, quandoquidem crassiori sanguinis parte recipere destinatus est, ac magis laxitate, quæ ideo facilius in venis illius retinetur, vel in meatibus interstitijs hæret, propter molliorem & laxiorem partem caliorum humorum receptioni magis idoneam. Et quando humor crassus (substantia lienis hæret, tumorem in parte efficit ac inflammationem. Et quidem si humor ille diuturna mora crassescat, ac duritiem nanciscatur, scierim generare solent, quandoquid verò huiusmodi materiam admi. ptuit, ac odematosi tumoris naturam accedit, qui illis præcipue familiaris est, qui in locis plurimè humidis quecunt, vel qui in gelidis alimentis veltunt, aut rigide potu largiori vtuntur. Si vero tumor ille mollior, & laxior fuerit, infarctio simpliciter appellatur, cuius causa est materia partim purior, partim larvulenta. Huiusmodi obstructions tumores, & inflammationes affecti, lienosi vulgò nominantur.

Causæ lienis obstructions generantes eadem omnino sunt que in hepatis obstructione fuere propofite, & hanc vltimam partem afficiunt, prout magis vel minus dispositi sunt ad eas recipiendas. Non raro autem vtinque viscus simul afficitur. Vix enim humores crassi possunt in vno vlcere luxuriare quin portio eorum ad alterum deferatur.

Distinguitur obstructio lienis ab obstructione hepatis, ex situ partis affectæ: granitas enim percipitur in sinistro hypochondrio, & intermedium doli præsertim in cursu, vel concitatore ambulacione, aut equitatione, & contractandò hypochondrium, tensio & tenetitia quædam inuenitur, cum color faciei liuidus percipitur, & reliqua melancholiz dominantis indicia apparent.

Affectus est petiurus, & diuturnus, ob partis molliorem & laxiorem, cuius ratione ab humore imbibro se facile expungere non potest, & si in vterulatem abeat, nec erit curatur in scirrhum degenerat.

Curatio eadem conuenit, quæ in hepatis obstructione, a fuit propofita, addendo quæ peculiariter lienem respiciunt, S. humori melacholico præparando, expurgando, que dicta sunt.

His autem puluiz de ammoniaco sequentes, tanquæ efficacissime addende sunt, & in frequenti vsu habenda.

℞. Ammoniaci pinguis in aceto fisticilio soluti vnc. i. extracti aloes vnc. i. & illi tart. Drach. iij. myrræ, croci an. 3. i. emulsi. li. ch. benjoni. salis traxini, & absinthij an. 3. Cum ox. mel. scilicet, fusa massa puluiz. Dosis Drach. sem. b. in sepiimana, purgationibus interiectis.

In apozemat, alijsque aperientibus remedijs liquidioribus ox. mel. simplex, & facilitatem vultu diffunditur, ad præparandum & tenetites humores potenter dilecandos.

Praeter ceteris autem remedijs, quæ ex chalybe componuntur, ad lienis obstructions referandas sunt efficacissima.

Imò verò pro potu ordinato aqua ferratæ, vel chalybeata vsurpanda est, quæ, si non immittitur, vt inquit Cellus, ex eo epopsiunt, quod ea animalia, quæ apud fabros scartarios educata sunt, exiguæ lienis habent.

Fomentis accipi ad parit loco vino à l'ipiquo maiore penetratione conuenit, quæ necessaria est in humore crassiori. Adde quod Gal. in affectibus lienis acetum valde conueniens, in remedijs suis interius cum ære vsurpatum.

Carapalmatis addatur cicuta, tanquam efficacissima ad tumores emolliendos & discutendos.

Ethac fiet cataplasma ex nucosana viridi cocta in oleo & vino albo.

Ex oleo etiam cocto cum nicotiana & vino albo, ad tumorem emolliendi, prolium latus admodum efficitur.

Amatus Lufuraz, 6. cent. 5. curatio lienis proponit obstructions lienis quæ quartana febre relata, quæ sublatæ est ex decocto rad. chinæ, per 3. dies, post conuenientes purgationes vsurpato.

CAPVT IV.

De Scirrbo lienis.

Materia lienis obstructionem efficiens, diuturna mora crassescit magis ac magis, & scirrholam duritiem contrahit. Cum autem eadem sit natura scirrhi lienis & hepatis, quæcumque de hepatis scirrhu à nobis dicta sunt, hanc etiam locum transire possunt.

Diagnosis etiam scirrhi lienis eadem est, cum scirrhi hepatis, in quibusdani quod in illo durities & tenetitia percipitur in sinistro hypochondrio.

A tumore fistuloso, seu inflammatione distinguitur, quod in scirrhu maior est granitas, quam in fistuloso tumore, qui etiam digitis compressus cedit, & murmur ac sonum edit, quæ in scirrhu non permittuntur.

Si a sole mela cholia aut insignia alique euidencia præminant, melancholia signa apparent, verò puritatem admixta habeat, cachexia puriora in toto corpore appareat.

Prognosis etiam eadem est, cum hepatis scirrhi prognos, nisi quod lienis scirrhus faciliorem aliquantulum curationem obicit, prope, rea quod viscus ignobilis fortiora citra noxam tolerat relinenda.

Ac denique curatio scirrhi lienis eadem omnino est, cum ea quæ pro hepatis scirrhu fuit propofita.

Quia tamen per gradus inuenda curatio est, & a mitioribus ad valentiora progrediendum: ea prius remedia vsurpanda erunt, quæ obstructions hepatis & lienis conuenire diximus, & inter medicamenta chaly. beata ibidem laudata, maxime conueniunt puluiz ex chalybe, ammoniaco, alijsque compositis in obstructione hepatis descriptæ.

Inter remedia verò pro hepatis scirrhu propofitis, magno in pretio habenda sunt puluiz ex aloë, ammoniaco, & mercurio dulciori, tamen non abundè satisfaciunt. Optata leues vtinque paginam implet, nisi morbus sit prope incurabilis.

℞. Gummi ammoniaci, opoponacis, & bdellij, an. 3. j. Dissolvantur in vino albo, coquantur, & coquantur, deinde adde confect hamech, & diaphan. 5. i. catholici dupl. 3. i. pilular. scind. 3. i. Fiat opiata, de qua caput 3. §. addendo mercurij dulcis gr. x. continuo per plures dies consequenter, & tumore, & durities euanciscit.

Ac præter illa remedia & præcepta, in prædictis cutationibus propofita, sequentia in hoc morbo obseruanda veniunt.

Primo, quod de sanguinis missione valde dubitetur. Hæc tamen difficultas resoluatur, concludendo eam conuenire potius in principio. At morbo inueterato minime prodelle.

Secundo, inter specifica remedia commendatur a Sole laudato & Fosseca viruta mortua, quæ galiposij dicitur, seu lamium Plinij, Itali herbam lienis vocant. Hanc cum vino tenui decoctam ad 3. i. exhibent, vel pulueris illius 3. i. cum eodem vino, aut alio liquore idoneo, solè affusa succedit. Tercio præter fomenta ibi enumerata, Aqua pendens in Chirurgia abdominis focium ex spongia in aqua calca ex pressa admodum prædicat, eoque scirrhum lienis & hydropeum curatum affert.

Quarto præter vnguenta dictis locis propofita, sequens tanquam mirabile laudatur ab Amato Lusitano, cuius vis scirrhum lienis curat, si gloriatur, quæ a Medicis Ferrariensibus accipere solet.

℞. Ol. com. 3. i. medullæ crurum bovis 3. i. butyri recentis 3. i. succi bryoniz, & ex clama. an. 3. i. Bullant lento igno.

igne ferē ad consumpt. succorum. Colaturz adde cere cit-
rum. j. vñ. pulu. ceterach. cortic. capparis. tamarici. sem-
an. calsi. an. 3. iij. Misce. fiat vnguentum.

Ita describitur ab Amato. Sed nimis est illius quantitas
pro vñco egrotante. Poterit ergo amittiri in hunc modū.
℞. Ol. com. 3. iij. medullz crutis bouis j. l. butyri recent.
3. sem. iussu. rad. beroniz. & cucumer. agreit. an. 3. sem. Bulli-
ant lento igne. red ad consumpt. succorum Colaturz ad-
de cere citra. Vñc. j. pulu. ceterach. cortic. capparis. tamarici. &
semin. gñi. calsi. an. 3. iij. Fiat vnguentum.

Quotū. cataplasmata sequenti maxime sunt efficacia.
℞. Rad. cucumer. agreit. lb. 1. ol. maluz & violar. aoa. M. iij.
Coquantur ad putrilaginē. Contundantur & traiciantur
per ieracum; deinde adde ol. de cappar. & tamarici. ana
Vñc. j. aceti. scellis. parum. Fiat cataplasma.

℞. Ferment. acrisis lb. ij. Coquantur in aquis partibus
ola & vini ad formam cataplasmatis.

Denique præter emplastrum in scirrho hepatis propo-
litum sequentia erunt efficacissima.

℞. Gummi ammon. j. iv. Dissolvantur in aceto forti. po-
stea colentur. & bulliant ad consumptionem aceti; deinde
adde cere parum. Fiat emplastrum.

℞. Cicuta M. v. ammoniaci lb. 3. Infundantur in aceto
dici octo; deinde bulliant dum ammon. solatur. hinc per
pannum lineum valde exprimitur; iterumque expressus
liquor ebulliat parum & adiecta cera & olamygd. fiat em-
plastrum.

℞. Succ. maluz. cressonis. caulium & rad. ficis. an. Vñc.
j. pñ. un. ammoniac. Vñc. iv. aceti parum. Dissolve simul
lento igne. postea coquantur. postremo colentur tandem
recoquantur ad lyrupi consistētiā. & cum 3. l. ol. de cap-
par. ious. & cere q. l. fiat (panadrap region) bene applican-
dum; & tertio quoque die reuocandum.

Aqua pendens loco citato. Jemes insudatus sequenti
emplastro pluris sanatus fuisse asseritur. quod fit ex dua-
bus partibus ammoniaci ex aceto dissoluti. una succo dico-
tini. vna resina pini. terebinthi. & lucci. ebuli. vna ol. de
cappar. & cere q. l. fiat emplastrum seu cerati. Iocmani adipe-
scendum.

CAPITULUM V.

De melancholia hypochondriaca.

Licet omnes partes hypochondria constituentes in hoc
morbo afficiantur; licet tamen pars affecta præcipua
censetur. cum fit humoris melancholici conceptaculum. vt
non inepte inter morbos hunc collocari valeat.

Fit igitur hæc affectio a melancholia præternaturali. quæ
atra bilis non natiuit. & ex alijs humoribus exultis ac cor-
ruptis generatur; præcipue sanguine. aut bili. aut melan-
cholia naturali.

Hic tamen humor melancholicus. purus ac sincerus non
efficit. plerumque alijs humoribus. &que vitiosis permix-
tus. puta biliosis. pituitosis. ac ferosis. ex quibus magna
symptomatum varietas exurgit. inferius referenda Gene-
rantur verò humores illi vitiosi in liene præsertim calidi-
ori imperie affecto. tum etiam in hepate pariter intem-
perato: vnde fit vt cibum & potum crudum. & non satis
coctum ad se trahant; & quidem tenuem. & aquosam chyli
partem maturas; crassam verò tardius: hinc postea cras-
sior vehiculo destituta. in venis melancholicis subsistit. ibique
diutius hærens vitiosius iucralit. & sepeque adurit; &
postmodum ad prædicta vlcera perueniens non recte con-
coctio humorum viscerum quæ in statu naturali per elatio-
nem fieri debet. ab illis insuper per affusionem potius
fiat. vnde humorum aditus maior consequitur. Fieri ta-
men potest. vt extra viscerum intemperiem hæc affectio ge-
neretur. prævis scilicet alimentis. & sanguine melanco-
lico producendo idoneis: Imò verò ex ipso sanguine lau-
dabili diutius in vasis retento. & quantitate superflua. quod
in suppressione mensium. & hæmorrhoidum contingit.
qui quidem sanguis in prædictis vasis diutius moram
trahens. exurit. & atre bilis naturam induit.

Oriri etiam potest hæc affectio ex vitio ventriculi ali-

menta probè non concoquentis. sed ea in nidorolam cru-
ditate conuertentis. ex qua deinde in hepate. & liene vitiosi
illi succi generantur. Imò verò Gal. 3. de hæmorrh. c. 7. Dio-
cletem sequutus. censuit. propriam melancholiam hypochon-
driacæ sedem esse in ventriculo. ex eo quod vt plurimum
in hoc affectu ventriculi laborantis iudicia apparent. Vi-
riatim tamen magis consonum est ventriculi frequenter
secundario affectu. hepatis aut lienis vicio ipsi communicato.
vt in sequentibus clarius ostendimus.

Colliguntur autem vitiosi illi humores in venis & arte-
riis. quæ in infimo ventre continentur; ramis præsertim
venæ portæ maioribus. splenicis. mentericis. epiploicis.
gastricis. & gastropiploicis. In quibus magnas. & sæpe hor-
rendas fermentationes patiuntur. vnde anathymales ter-
ræ. & malignæ ad cerebrum. cor. & diaphragma eleuantur.
quæ symptomata varia in his partibus excitant. inferius
enumeranda.

In ipsis etiam visceribus humores prædicti continentur.
liene præsertim & pancreate. glandulisque in mesenterio
resistentibus. præter omniū partium lubilitatē molis-
se & spongiosa prædictis humoribus facile imbutis. & semel
inhibitis difficillimè deponit. Præterea glandulæ per to-
tum mesenterium dispersæ. vt venæ & arteriæ succulen-
tissimæ. & firmamentum sint. & obliquæ ut illæ a repletis at-
testentur. vel alia de causa comprimentur. Si præter modum
intumescant. ipsæ vasa comprimunt. & liberum humorum
commœtum impediunt. vnde obstructions in illis ducti-
bus generantur.

Pueri & adulescentes huic affectui minime obnoxii sunt
propter humidum temperamentum. humoris melancholici
generando ineptissimi. in ætate consistētiæ frequentis-
sime contingit. quia humores in iuuentute a calore actiore
aduruntur. & ubi calor illa deservit. tenuioresque partes
exhalantur. magnus fit humoris melancholici proventus.

Causæ huic affectui antecedentes & præcædentes sunt
primò. cibi prauis. & concoctio difficilis. & qui gene-
rantur humoris melancholici idonei sunt; vt panis furti-
ceus. aut non bonè fermentatus. aut crassus eius. legumina.
caleus. oua indurata. & frigida. & aquæ aquaticæ. carnes bouis.
cervinæ. leporeinæ. & omnes lævæ & fumo indurata. & alia
innumera alimenta crassiori & duriori substantia prædicta.

Secundò. animi pathemata graui. & diuturna. præcipue
mœror & mœlinitas. ad hunc affectum generandum maxi-
mam vim habent. ab his enim maxima fit spirituum dissi-
patio. cuius ratione coctiones debilitantur. & magnus fit
crudus humor proventus. quæ a visceribus calidioribus exu-
lit. in humorem atrabiliarem degenerant.

Tertiò. quies & otium huic malo producendo occasio-
nem præbent. quia efficiunt. vt plurius excrementa in cor-
pore retineantur; Imprimis si meditationes plurimæ. ac
lucubraciones accedant. Vnde literati. & qui vitam sedenta-
riam agunt. huic affectui maxime obnoxii sunt.

Denique suppressio mensium. & hæmorrhoidum. non
solum ratione quantitatit vt antea dictum est. sed etiam
qualitatis. morbum hunc producere potest. Cum enim per
venas hæmorrhoidales sanguis melancholicus a natura
excuarct. & solat. & cum eo multi humores saevi & adulti:
tum in purgationibus mensium multi etiam humores
vitiosi educantur. si vacationes illæ subsistant. fit refluxus
illorum humorum ad hypochondria. qui huic morbo oc-
casionem præbent.

Diagnosis huic affectus ex symptomatibus petenda est.
quæ illum conueniunt. & sunt: conuulsæ maximè illi humo-
res; etenim omnes propemodum corporis partes in hoc
affectu labem aliquam percipiunt; quando is ad summum
exaltationis gradum peruenit. Eorum seriem & replicatæ ag-
gredimur. hoc præs admonendo. non omnibus agris con-
tingere. sed alia in his alia in illis. pro varia humorum pec-
cantium natura. & variis partibus quæ afficiuntur.

Primo igitur ventriculus vt plurimum laborat. non qui-
dem primario affectu. vt Galenus ex Diocle censuit vi-
sus est. sed potius secundario. quando scilicet sanguis pro
nutritione ventriculi & venæ portæ ramis effluens non be-
nè se habeat: vnde ventriculus male nutritus. male alimen-
tum concoquit. idque in aëriam. & vitiosam substantiam
conuer-

conuerit. Hinc reciproca quedam & circularis noxa exterridum hepar & lien prauium sanguinem ventriculo nutriendo fuppeditat; & ventriculus demum prauium chyli generat: ex quo iterum sanguis vitiosus producitur.

Ventriculus igitur in hoc affectu plerumque cibos male concoquit; & bonam eorum partem, in matrem nunc aequam, nunc acidam, vel acerbam, nunc viscidam mutat; quæ cum ab intestinis, & venis melastricis vtpote alondo inepta non attrahatur, in ventriculo moratur; & nunc solum repens, linguam & os salia & humiditate aquea replet, vt continuo ægri ex pueri cogantur, sæpe etiam per vomitum humores illos in ventriculo collectos rejicere.

Sæpe etiam materia in ventriculo contenta ebullit, & fermentatur; vnde flatuum copia excitatur, qui non solum ventriculum, sed etiam vicinas partes distendunt, ac tantum in præcordiis molestant parium; vt ægri interdum in hypochondria incident. Interdum verò flatuum illorum pars per superiora, & inferiora rejicitur, pars verò per infensilem transpirationem diffunditur, aut eorum materia per vomitum excluditur.

Aduertendum tamen est, non omnia quæ vomitu rejiciuntur, in eo generari; sed etiam non raro a liene aliisque partibus transmitti. Humores etiam interdum eorumque tanta aciditate præditi, vt fluporum dentibus afficiantur; quos è hene in ventriculum per vas breue transfundi, minime dubium est.

In aliis sanguis è liene in ventriculum per vas breue, cum humore attrahibili, aliisque vitiosis humoribus transmittitur; qui partim per vomitum, partim per scæculum rejiciuntur, vt in vomitus sanguinis theoria fusius exposuimus.

Rudius etiam frequenter hoc affectu laborantibus tum etiam rugitus & murmur hypochondriorum, solent contingere, propter copiam flatuum, qui ex crudis, & melancholicis humoribus generantur: vnde ab antiquis hic morbus, affectio flatuosa, nominatus est. Quomodo autem illatus ex melancholico humore fuscitur, in tympanite dictum est.

Doloris etiam non raro in ventriculo, & hypochondrijs ab ipso flatibus excitatur, & interdum ad dorum & lumbos extenditur, vt nephriticos emulenter præsertim si vri na rubra, & crassa, hypochondriacis familiaris exeat.

Alius adstricta sepe est in hoc affectu: quando nimirum cibos in materiam ac glutinosam committitur; quæ cum intestinis hæreat alii constriktionem parit, cum facultas expultrix viscidum illum humorem ex eicere nequeat, nisi a medicamentis adiuuetur. quò fit, vt huiusmodi melancholici frequentius cathartici, aut enematis alium resoluerent, cogantur.

Alii fluxus etiam interdum contingit: si humores acrimonia acquirant, & bilis, aut feruida melancholia addita itam habeant.

Astus in hypochondrijs percipitur, & inflammatorius quidam affectus, cum ardore & feruore interno, nunc in vno nunc in utroque hypochondrio ægros affigente, ex humoribus calidis ac feruidis in eis contentis. Est soler iste calor, ac æstus sepe magis exere, quando humores isti calidi ab aliqua causa interna, vel externa commouentur, & exagitantur; ita vt ex vaporibus inde e causis facies incalcescat, ac robore sustineatur: immò interdum febri ephemera excitetur, ex ipso vaporibus in totum corpus diffusis.

Vrina in hoc affectu varia est, nunc tenuis, nunc crassa. Tenuis quidem, quando humores crassi vrine vas obfident, per quos illa quodammodo transcolatur, vt partes tantum renouat & serosæ permeare valent. Crassa vero, rubra, & turbida, ob materiam crassam admixtionem, quæ multo sole saturata est, & ideo tartarea nominatur, tum in fundo naturalis insit scidimenti crassioris colligitur, vel etiam quedam illius portio maturæ parietibus adheret insit arenularum rubrarum, quæ malis calculi metum incurant, quomodo immerito, cum huiusmodi arenæ non in renibus sed in hepate generentur ex materia crassa & salina. Cuius rei indicium est, quod huiusmodi arenæ digiti armitate facile dissoluntur, lais insit; quod in arenis a renibus oriundis non contingit.

Cordis palpitatio in hoc affectu interdum accidit, quò va-

pores ad cor ascendentes, quod dum expellere nititur, ipsum violentè, & mordacitè mouetur: & tunc ægri se in magno vitæ periculo constitutos existimant, & auxilium anxie requirunt.

Pulsatio in sinistro hypochondrio nonnumquam peritur, quando scilicet humores feruidi in eis locis exagitantur, & vapores inde excitati arteriarum systolem & diastolem maiorem efficiunt; ita vt tum ab agrotantibus tum ab assistantibus manum hypochondrio admoventibus, pulsatio illa percipitur, quæ tum in primis commouetur, quando ægri ab ira, motu vehementer, aut meri largiore pota, incalcescunt. Et hæc in primis palpatorio in arteria costica fit, quæ insignior est in illa parte. Aliquando etiam contritus est, & indefinens in morbo inueterato, & quocumque tempore manum admoventis, perpetuo pulsationem aduersus, quod morbum habitum, & incurabilem significat. Continuum autem illam pulsationem interdum sequitur aneurisma ex arterie costicæ, aut alterius cuiusdam arterie insignioris dilatatione, a sanguine feruidiori in ipsa contenta, qui valde attenuatus, & molis, ac feruidis spiritibus permixtus, arteriam continuo dilatat ac distendit, donec aneurisma integrum contraxerit, quale obseuatur Fallopius, lib. de numeris pr. term. c. p. 14. In vetula quadam, cuius cadauer aperto, inuentum est aneurisma in abdomine, in quod pugnum amittere poterat; & immisit. Vbi obiter notanda est semina nature procludentia, quæ arterie disrutionem præueniunt ex nimia dilatatione, tum cum illius adeo indurauerit, vt osca apparet: sicut annotauit Fallopius loco citato. Pars etiam lib. 6. in operis cap. 28. similem historiam refert aneurismatis, non quidem in abdomine sed in thorace reperi, scilicet in arteria venosa, quæ in eam amplitudinem distensa erat, vt manum in pugnum complicatam capere poterit: tum etiam tunica illius interna osca euaserat. Et non iam similem casum ante duos annos in hac vrbe vidimus, nempe æneurisma in pectore, ex arterie dilatatione, quæ pueri quiddecim annorum pugnum recipere poterat: tunica verò arterie catillagineam crassitatem, ac duritiem acquisierat.

Vapores autem retrii ab hypochondrijs eleuati ad partes superiores, quæ phurina (symptomata produciunt: ad palatum enim & linguam transmissi, eas partes excoriant, & scitum leuoni inducunt: diaphragma vero & pulmonem obfident, difficilem respirationem efficiunt: dum vero ad membranas cerebri feruntur, dolores capitis inducunt: & dum cerebrum ipsum impetunt, autium tinnitus, oculorum caliginem, vertiginem, metum & morbiu, & delira melancholica diuersa inter se consequuntur. Quod si vapores illi humani acrimoniæ, aut malignitatem induant, epilepsie causa efficiuntur: si vero idem vapores neruos occupent, in eis etiam consensiones generant: ac si virtute narcotica præditi sint, torporem, & paralysim spuriam inferunt, tum etiam comatosos affectus, & apoplexiam, si cerebrum penitus euadant. Si autem vapores illi calidi & ficci fuerint, cerebrum excitant, & vigilas molestas, aut sons nos perturbatos, insomniæque terribile efficiunt. In primis vero vigilæ post mediam noctem plerumque infestare solent. Et tamen etiam post median ad median noctem, aut paulò vterius, satis bene dormiant, postea tamen euigilant, & alij diuibus vel tribus horis vigilant, & iterum mane circa horam certam vel quartam dormire incipiunt, alij vero iterum dormire non possunt. Quotum euentum rationis reddenda est, quod humum dum chyli ad partes secundæ confectioni destinatus vel influentia deservit, tum humores vitiosi in membris & vasis laentes agitantur, ex his quæ vapores eleuantur, qui per venas & arterias ad caput delati vigilas excitant; & si breui discurrant, somnus iterum reuertitur, si vero diu pericueuerent, reliqua noctis pars insomnis transigitur.

De his omnibus symptomata antea dictum est, & iterum repetendum, omnia in omnibus non reperiri, sed præ, vel pauciora, pro humorum & partium affectuum varietate.

Hoc etiam annotari debet, non esse de essentia melancholice hypochondriæ, vt in hypochondrijs tensio, durities, dolor, & tumor percipitur, cum mali fomes plerumque in ramis vnae portæ, & arterie vicinis hæreat, & inde vapores ad cor,

ad cor, & cerebrum transmittat. Sæpe tamen tensiones in hepate vel bene reperiuntur, quæ humores in illis partibus hærentes significant: si vero nullæ aduerunt, signum est humores vitiosos in venis mesentericis, omentis, pancreatibus, & ventriculi latitare. Ventriculum autem præcipue affici debent, namque nautæ illius symptomata, vt nidorosi, acidi, vel nidorosi, nauisæ, vomitus, apæxis, & interdum alii fluxus.

Quod ad prognosim attinet, affectus iste vltimum lethalem non est: sed longissimus esse consuevit: & sæpe toto vitæ decursu perleuat, vt vult dicitur opprobrium medicorum, ex eo quod non satis feliciter curatio succedat: & si tandem post multa remedia ægri conualecere videantur; postea tamen intra paucos menses malum recrudescit, & omnia symptomata redeunt. Dicitur eni flagellum medicorum, quia humorem melancholicum noua quotidie postulant remedia, ita illatum fatiantur, & afflicti quærimonijs medicos insistant, eosque lapsissimè mutant.

Hæmorrhoidum fluxus melancholia hypochondriaca laborantibus superueniens, plurimum iurat, modo fuerit moderatus: si enim diutius duret, periculum portendit.

Vrina crassior melior est in hoc morbo, quam tenuis, & aquosa, quæ crassos humores in corpore retineri arguit. Nigræ quoque vrine sine febre hæc morbi solunt. Alium in hoc morbo latam habere, bonum; alitram verò habere, malum. Vomitus quoque cum æpæsi sæpe vtilissimus verò perleuat, periculosus.

Vertigo, & diuturnus capitis dolor in melancholia hypochondriaca, in epilepsiam, vel cæcitatem, vel apoplexiam degenerat.

Curatio huius affectus in tribus potissimum indicationibus versabitur, obstruccionum apertione, intemperiei vicerum correctione, & humoris peccantis euacuatione, non omittis roborantibus, quæ dictarum partium vires reficiant, & insistant. In hunc finem frequenter remedia, adhibito sapientis medici iudicio, & delectu, vsurpari poterunt.

præmissio clystere sequens pocio primum exhibetur. R. Sennæ mandata Vnc. sem. lemnis anisi & crem. tart. an. 3. i. bol. borrag. fumar. acetosæ. ana. M. liquir. 3. iij. Coquantur ad 3. iij. In colatura dissolue rhubarb. in aqua bulgiodi cum spica insu 3. i. sem. cathol. dupl. 3. iij. syr. de cichor. compof. Vnc. i. Fiat pocio, cuius adde vtiliter licet in valde melancholicis confect. alkermes 3. i.

Postridie potiois phlebotomia celebranda est, et altero brachio, prout hepar, aut lien magis laborare videbuntur, sed præcipue è sinistro.

Postea sequentium iusculorum vsum æger aggrediatur. R. Rad. asparagi, gram. & cichor. an. Vnc. sem. fol. agrim. ceterach. capill. ven. bulgiodi, & cichor. ana. M. sem. crem. tart. Drach. i. Coquantur cum pullo gallinaceo, & fiat iusculum per x. aut xij. dies continuandum. Ad magis refrigerandum, & efficacius obstruccionem aperiendam, vtiliter addi possunt spirit. vitrioli gutt. iij.

Predictis etiam simplicibus addi possunt in diuturnis obstruccionibus, radic. chinæ, lignum salisatæ, fantalum album, radic. apii, folicis maris, fol. betonicæ, scabiosa; semen coriandi præp. passule, & similia.

Si alius fit additæ, aut cacochymij copia, in tertio quoque iusculo tenæ Vnc. 3. cum sem. anisi vtiliter infundi poterit.

Vel loco iusculi ad materiam peccantem potius educendam, apozema sequens erit conuenientissimum.

R. Rad. bulgiodi, asparagi, cichor. & acetosæ. ana. 3. i. cortic. median. irax. ana. & tamaricæ, ana. 3. i. fol. agrim. ceterach. capill. ven. culcure, cichori, fumar. asparagi, bulgiodi, & borrag. ana. M. sem. quatuor frig. mar. anisi & feniculi ana. 3. iij. vsuatur corinth 3. i. sennæ mundat. & polypod. querc. recent. ana. 3. i. epithymi 3. i. agarici recenter trochisc. & rhab. elect. leorim insuato cum cinam. ana. Drach. i. macis. & caryophyllana Drach. i. fol. i. cordial. ana. P. i. Coquantur ad quartariam quinquæ. In colat. dissolue syrapi de cichorio compof. cum rheo. & rosat. solut. an. Vnc. ii. Fiat apozema clarificatum, & aromat. Drach. ii. fantali citrini, pro iij. dosibus matutinis.

Loco apozematis vtiliter subrogari potest decoctum galli veteris, in hunc modum compositum.

R. Rad. asparagi, bulgiodi, cortic. rad. capparis, & median. tamaricæ, ana. Vnc. sem. fol. agrim. ceterach. capill. ven. ana. M. sem. insuicicæ, card. bened. ana. Drach. i. sennæ mundat. Vnc. sem. fol. pod. querc. & epithymi, ana. Drach. ii. cinam. Scrup. i. cry. stali tart. Drach. i. Coquantur omnia focundum artem cum media parte galli veteris: fiat iusculum, quod capiat manè per iij. dies.

Post sufficientem purgationem, balneum aque tepide conuenientissimum est, per aliquot dies vsurpandum. Vtiliter in eo coquantur herbe refrigerantes, cum bona quantitate pomorum redolentium. Vel fieri non raro solet ex hordeo, & amygdalis confusis in faculo inc usis, & in aqua decoctis. Frequenter interdum elasti tempus anni fuerit opportunum; quandoquidem Gal. refert 8. de loc. aff. cap. 6. folis balneis aquarum dulcium fere multos melancholicos curasse absque alio medicamento. Si tamen æger ferre frequenter nequeat integrum balneum, semicupium subrogari poterit.

Ex ne licio frequens ventriculo nocentia ingressu balnei iungatur ventriculus oleo nucis moschatæ, aut alio simili linimento.

Ab exitu balnei iungatur hepatis regio cerato sancti, vel vnguento resacæ in onyctæ lous.

Post vitium balneum proutemur hæmorrhoides, subditi balanis ascribunt, vel cum conficcando solis fructibus, aut panis lineis asperis, & afflicti partibus emollientibus hirudinibus duabus aut tribus, extrahant sanguinis 3. vi. vel vj. Eademque hæmorrhoidum prouocatio vere & auctum. imò interdum singulis mensibus iterari debet.

In iis qui affecti sunt pati fluxum hæmorrhoidum, qui tamen iam diu suppreffi sit, & ubi hæmorrhoides non apparent, admota ano cucurbitula putescit.

Si postquam hirudines saturatæ ceciderint, sanguis nimium profluat, vt non raro contingit, situlæ lato, aut carbonis pulueris, aut araneorum tela, aut gyphi puluiculus, aut pulueribus asfringentibus, ab eo, & itupis exceptis.

At si hæmorrhoides commodè apteri nequeant, opportunum erit ex venis interioribus sanguinem detrabere, vt sanguis faculentis per ea loca deruatur quæ.

Cauticum tibus finitæ insuatum ab humoribus excrementis hinc, & illuc viscera repurgat: ideoque non erit omittendum.

Quia verò hic affectus contumacissimus esse consuevit, & post vniuersales euacuationes, nouus prætorum succorum cumulus temporis progressu solet succedere, purgationes periodicæ instituende sunt, vt per intervalla ab eorum noxa corpus liberetur. Quod commodissimè fiet syrupo magistrali, in sequentem modum composito.

R. Succor. recenter exprell. & per residuum depurat. ex fol. borrag. bulgiodi, endiuæ, cichor. fumar. & oxalidis it. iij. succi pom. redolent. recenter exprelli & depurati it. iij. polypod. querc. recent. it. 3. sennæ mund. 3. viij. epithymi 3. iij. agar. recenter trochiscati 3. i. ximab. & caryophyllana 3. i. iustindantur & decoquantur, vt ar. eff. donec colatura superest quartaria quinquæ. In quibus dissolue expressionem Vnc. i. rhab. in predictis succis cum cinam. leorim insuato, sacchari albi quartaria quinquæ. Fiat syr. periclitæ colus, clarif. & aromatiz. 3. i. puluer. elect. stant. qui seruetur in vase vitreo, & de eo capiat Vnc. ij. bis aut ter in menie cum iusculo pulli, vel heduli, fol. endiuæ, acetosæ, borrag. & pimpinellæ laterato.

Vel loco syrapi puluæ vsurpari poterunt, hyemes præsertim tempore quales in hepatis obstruccionē fuerunt pro posse; et si eorum nimia ciliiditas metuetur, sequentes magis correctæ in eundem vsum componi poterunt.

R. Polypod. querc. Vnc. sem. rad. alari, summi, genitæ, ana. Drach. i. pulu. corinth. Drach. iij. cry. stali tart. Drach. i. fol. bulgiodi, & borrag. an. P. sem. Coquantur in aque font. q. l. Decolat. optulenti capite sem. succi pomor. redolent. opt. depurati Vnc. iij. In quibus infunde sennæ mandata Vnc. iij. turbiti & agar. ana. Drach. iij. macis, caryophylli cinam. & epithymi an. Drach. i. Digerantur per quadratum in 8.

In B.M. Postea colentur, & exprim. Colat. adde extrafacti aloë, facti in aqua codiuz & acetosæ. Vnc. myrrhæ in vino ad ignem dissolutæ & colatæ 3.ij. falis tart. 3.ij. Euporeum omnia, & infundantur ad lentum ignem, addendo sub finem dum ferè euaporata erit materia, (species. diarthod. abbat. tart. Gal. & trochile dialæ ca. an. 3.ij. Reducuntur in massæ pilularis consistentiæ, de qua capiat æger ʒ.ʒ. semel in septimana duabus horis ante prandium.

Pereda sequenti pulvere multos melancholicos curatos esse testatur, eumque benedictum & diuinum appellat.

ʒ. Epithymi 3.ʒ. lapid. lazuli opt. & agat. recent. trochilæ. ana 3.ij. icammon. 3.ij. carophyllorum xx. Misce, fiat pulvis de quo capiat ʒ.ʒ. bis aut ter in mense, cum sero lactis vel aqua borraginis.

Si purgantia medicamentis satis frequenter exhiberi nequeant, aut æger morbi diuturnitate fracti allumere nolint, consilio saluum erit clysteres, alternis diebus inijcere aut vapores sursum se effluentes recullantur, & humoris peccantis portio educatur. Si enim intellectus penitus lubricus, a venis melaicis maiorem illius partem exhauriunt. Nouimus enim quendam nobilem vitam affectione hypochondriaci diu, & grauiter affectum, qui ex clysteribus frequenter micis ita leuatus fuit, ut omnino curatus videretur, cum multa alia remedia frustra vixisset.

Dum purgationes periodicæ viurpantur, intermedis temporibus curandum est, ut corpus vniuersum balneis humedetur, aut saltem semicupis, vel fomentis, quibus & humoris peccantis inclementia frangat, & euidemque reliquæ conuertantur, & corpus humidus ac lauis reddatur.

Roborantia etiam intermedis temporibus viurpanda sunt, quæ simul obstruktionum apertioni inserviunt, eaque frequenter componi solent in formam opiatæ, vel eleusarij solidi in tabellis redactam hunc modum.

ʒ. Conserue rad. buglossi ʒ.ʒ. conserue flor. borrag. viol. ana 3.ij. conserue ros. & cortic. citri conditi, ana 3.ʒ. myrob. conditi, ana 1.ij. conserue alkerm. 3.ij. raiæzæ choris. cornu ceruic. & lapidis bezoardi ana 3.ʒ. puluer. elect. laus. Gal. & diarthod. abbat. an. 3.ij. corall. præpar. & margar. præp. ana 3.ʒ. ambre grise. ʒ.ʒ. mouchi opt. gr. v. fol. auri numero iij. Cum syrupo de pomis, vel conditæ citri facti opiatæ, de qua capiat magnitudinem cantinæ, horis duabus ante prandium singulis diebus, superbibendo vini albi parum.

Simplicior & gustui grauior opiatæ fit ex parte vna conserue alkerm. & quatuor partibus conserue flor. borrag. Ad potentiùs obstruktionem aperiendâ, si calidiora non multum metuantur, addi possunt opiatæ conserue flor. tamarisci, raiæ emule campæ, fol. ablinthi capill. ven. & sales ablinthi tamarisci, &c.

Tabellæ in sequentem modum componi poterunt.

ʒ. Pulv. diambæ dissimulati dulcis, & lenti. Gal. an. 3.ij. conserue alkerm. Drach. iij. sacch. aqua borrag. & rosar. soluti Vnc. iv. Fiant tabellæ auræ poud. 3.ij. Capiat viam singulis diebus, horis duabus ante prandium. Vel gustus grauioribus ita parabuntur.

ʒ. Conserue alkerm. 3.ij. ambre grise. scrup. i. sacch. aqua naphæ & rosarum dissoluta Vnc. iv. Fiant tabellæ.

Ambra grisea sola ad gr. v. vel vi. singulis diebus exhibita cum vino, aut aqua rosarum, & spiritus & calorem natuum visificat & cor maximè exhilarat.

Autores nonnulli lapidis bezoardici vsum valde probant & auctores omnes morbos melancholicos, vtpote qui vires cordis mirum in modum reliquit, eiusque grana v. vel vi. cum aqua rosar. aut alio huiusmodi exhiberi debent.

Corpori sufficienter expurgato tempestate idonea, nimium vere aut æstiferum lassus videretur exhibebitur per 15 aut 30 dies, licet enim viscerum obstruktionem aperiant, & calida eorum intemperies emendabitur. Extrahetur autem serum lactis per ebullitionem & clarificationem, in eoque commodè inuidentur per noctem epithymi 3.ij. v. Vnc. sem.

Quantitas illius ad robur ventriculi metienda est. Si tamen facile venas iam aliquatenus apertas persuadere queat, & per aluum & vias eni in maxima quantitate exhibitur mista aquæ mineralis, vel in calida hepatis intemperie docetur, in iunium prodegit, hac cautione adhibita, ut ventri-

culus muniat, facculis, aliisque remediis infra describendis, & vespertinis horis opiatæ roborant singulis diebus exhibeat. Loco autem epithymi aliquando permiscitur sero succus cichorii & borraginis aut alij refrigerantes, & appropriati in hunc modum.

ʒ. Seri lactis capilli ʒ. iv. vel v. succi limon. recent. Vnc. iv. succi pomor. redoli. nouiter extracti Vnc. v. conserue rosar. aut violar. aut sacchari albit. vnc. i. cum duobus albuminor. clarificetur. Capiat mane pocula tria, vel quatuor, vel plura, si stomachus ferre valeat.

In corporibus valde emaciatis, refrigeratis aliquantisper obstruktionibus, lassus animi viis concutire poterit, cum sacch. rosaceo, & si obumbrantia sunt hypochondria, tantillum aromatici rosati, vel diarthod. abbat. erit vtilissimum.

At cæteris remedijs præstant aquæ minerales acidulæ & vitriolatæ, quæ viscerum intemperiem corrigendo obstruktionem reiciant potentissimè. Tales sunt in Occidentia nostra Meynenses, & Vallenfenses illæ magis refrigerant. He calidiores quidem, at obstruktionibus tollendis, & humoris terrento attenuando ac deterendo multo efficaciores.

De potu aquarum thermalium non leuis est inter Auctores discrepancia. Nonnulli, ut Sennertus, omnino probant, quod humilmodi aquæ, quæ minet alia, a quibus vias habent, & primas vias eleuant, & viscosos humores qui in ijs hærent, per alium & vias educant, ventriculum calefaciant, hepatis & lienem roborant. Calefacti enim autem & exsiccationem ab humilmodi aquarum externo vsum, non autem interno esse metuendum. Alij, ut Claudius, omnino reijciunt, propter dictam exsiccandi vim. Alij denique nec omnino reijciunt, nec omnino admittunt humilmodi aquarum vsum, ut Montanus, qui eas conueniente sentit, propter frigiditatem ventriculi, quæ huius affectus comes est indidua, & obstruktionis. Ratione autem hepatis calidioris, & feruidi sanguinis, vult mendum esse hepatis & lienem vngento refrigerante Gal. Tum etiam viueriam lumborum regionem eodem vngento inungendam. Hoc modo aut nocere aquam, quæ niagrus figur. in ventriculo & locis frigidioribus alia verò viscera solum pertransit, nec in ijs moram facit. Non verò earum aquarum vsum concutire posse censimus, si ventriculus frigidior magnam crasse & viscidæ pituitæ copiam cumulet, & non admodum insignis lucet caliditas. Cuius partis noxa maiori ex parte decunat, poterit, si non solum vnguentum prædictum admoveatur, sed etiam iuscula refrigerantia post eiectionem aquæ exhibentur, & post integrum earum vsum balnea refrigerantia & humedantia per aliquot dies viurpentur.

Non parum præstare consueverunt ad obstruktionis hypochondriacæ aperendas medicamenta ex chalybe composita, qualia in obstruktionibus hepatis, & lienis fuerunt propolita: vnaquod tamen ea, quæ multum calefacere aut exsiccare valent, limo vero in corporibus calidioribus conuenienter chalybem cum sulphure aut aceto preparatum, una conserue borraginis & cichorii ad formam opiatæ permiscere.

In delicatioribus conueniet syrupus ex chalybe prædicto loco descriptus, aut ipsius quæ manet in vale vitreo post vini pluries calidiori euaporationem, cum dictis conseruis permixta.

At cæteris omnibus remedijs palmar. præcipit sal, seu vitriolum martis, quod obstruktionis apertæ, viscera corroborat, eorumque calidam intemperiem emendat. Dosis illius est a gr. x. ad x. cum liquore idoneo, syrupo, aut conserua. Sed quia sapor illius admodum ingratus est, solet ego in puluis reducere cum mucagine gummi tragacanthæ. Vius illius debet esse diuturnus, & ideo magna illius quantitas habenda est, quæ facili compari non potest modo a Beguino, aliisque descripto. Nos facillimum illius compositionem paucis cognatam hic subnectemus.

ʒ. Olei vitrioli aut sulphuris ʒ. ij. spiritus vini ʒ. i. ponantur in fartagine noua, & manda & aslere & conuertatur iuxta quindecim dies fiet per se salina concretio, quæ soli postmodum exponenda est, ut oratione efficeatur, mouendo interdum cum spatula ferrea. Hyeme potest exsiccari supra ignem leuissimum, aut in holocausto. Sal probe exsiccaturum in

tum in

tum in phiala vitrea recondatur, bene obcurata. nam acri-
e: posita facile humedatur. Pulvis etiam ex eo composita
cum macilagine tragacanthi diutius fieri debent. adden-
do puluerem ipsius tragacanthi. ac poluimodum in phiala
recondi, aliqui humectant. Per mensem vnum vel plures
potest continuari huius remedij usus, non solum inno-
xio, sed semper cum utilitate summa.

Ad obstructions sensum aperiendas, & humorem me-
lancholicum sensum purgandum ac contemperandum, lau-
dat. Foenicula pilulas sequentes, quas distartatam appellat.
S. Scenn. puluerat. & salis tartari. an. 34 cinam. puluerat.
S. Item. Cum si rupo de limon. fiat massa, cuius capiat pilulas
3. pond. 5. sem. per horam ante comam, vt bis, aut ter deij-
ciat. Habet enim sal tartari magnam vim dissolvendi humo-
res melancholicos & acrios; nam trahit ad se proprietate
quadam acroteritates, vt videre est quando permiscetur ace-
to: aut spiritui vitrioli, quorum aciditates tollit. Sciendum
autem est. Foenicam per salem tartari crystallum intelligi-
re. Attamen non minus efficaciter lenia inlundi poterit
cum sale tartari: & guttis aliquot spiritui vitrioli in liquore
idoneo.

Ad dictas obstructions aperiendas, nonnulli Autores
commendant decoctum radicis chinæ, vt in obstructione
hepatis dictum est; quod a prudens Medico vultet inter-
dum in vltum reuocari poterit.

Alij vero laudant succum abinthij concretum in forma
pulsularum, per fevel cum gummi ammoniac exhibitum,
cuius latam ox. n. el. factum ex decocto rad. alari ac liquor.
superinfunditur. Alij vero testantur decocto abinthij aut vino
abinthie per 3. vel 4. dies vsurpato melancholiam hyp-
ochondriacam fuisse curatam.

Succus buglossi non quidem ad obstructions aperi-
endas; quemadmodum abinthium; sed ad humorem astrabi-
lariu contemperandum efficacissimus est. Ideo illius 3. ij.
vel cum vini optimi equali portione per x. aut xii. dies ma-
nente vltiter exhiberi poterunt.

Inter precipua huius curationis hoc habendum est, vt
alios scilicet laxa lertur. Ideo aeger plura medicamenta
habere debet familiaria, quibus frequenter vtatur ante ci-
uibus modum hoc modo illo. ne vltum ei veniat in fastidium.
In hunc finem vsurpari poterunt si rupo magistralis, & pu-
luis prædicta; ium etiam ea que ad alium astrictam supra
descripta sunt. Quibus addere licet ex Montano, terebinthi-
nam cypriam, quam deglutendam esse precipit ad quan-
tatem ouellæ. tribus horis ante prandium, semel, aut
bis, aut ter in singulis septimanis. Nam præterquam quod
alium mollem efficit, ventriculum etiam purgat, obstruc-
tiones aperit, vrinam prouocat, calefacit ventriculum, ne-
que propterea hepar lædit; imò & illi mirum in modum
confort aperiendo, obliterando, & mundificando.

Pro gotu ordinario vti poterit aqua exunctionis auri,
vel infusionis tamaricis, agrimon. pumipelli. cum vino te-
nui simplici, vel medicato tempore vindemiarum cum
rad. buglossi. & borrag. adiectis floribus anchos in parua
quantitate, & fantalo cibos.

Decoctum radicis cynobatis pro potu ordinario a qui-
busdam plurimum laudatur, aperit enim, & roborat partes
omnes naturales.

Decoctum ligni nephritici viscerum obstructions citra
villam manifestam corporis alterationem reflat. At fre-
quentius vsurpatur aqua ex infusione chalybis parata. Quæ
omnes aquæ, vel decocta cum vino commodè misceri pos-
sunt.

Dum remedia interna propolita, aut eorum nonnulla
vsurpantur, externa etiam adiuuenda sunt, minimi so-
lomenia, & vnguenta in hypochondriis, qualia ad obstruc-
tiones hepatis & lienis descripta sunt, vitando calidiora.

Ventriculo etiam taborantia adiuuenda sunt: quoniam
illa pars in hoc affatu perpetuo laborat. Ideoque solum
vnguenta, emplastris, & scuta in affectibus ventriculi pro-
posita in vltum reuocari poterant. Tum etiam interna, quæ
sunt par minus calefacere possunt, ac præcipue puluis pepet-
cus a pulvis sumendus. In paroxysmo, quando vapores
ab hypochondriis eleuati cor, cerebrum, aliaque partes
afficiunt, & grauis si symptomata producunt, vt animi dele-

ctiones, palpitaciones, tremores, conuulsiones, dolores ca-
pitis & similia; ea remedia vsurpanda sunt, quæ in syncope
& affectu hysterico vsurpari solent. At inter cætera lauda-
num prouident vsurpatum miranda præstat.

CAPVT VI.

De Scorbatica affectione.

Scorbatus septentrionalibus regionibus familiaris est, &
non paucis earum plagis endemicus. In nostris verò
meridionalibus hæcenus fæte incognita; ita vt omnes
Medicæ prædictæ scriptores, qui in indicam artem exer-
cuerunt, nullam illius mentionem faciant, & nos etiam ip-
sum penitus omittere debere videamur, qui in huius libri
præfatione professi fuimus, nos morbos tantum leuiss
vitatores, & qui frequentius in praxi occurrere consue-
runt, esse descripturos. Verum viis nos docuit, hanc no-
stram regionem hoc affectu non omnino carere, qui si om-
nibus circumstantijs inspectus non sit, quæ ab authoribus
septentrionalibus resecuntur, quodam tamen symptomata
præ se ferat, ad alius naturam stabilendam sufficientia.
Siquidem prædicti auctores vnicum symptomata scorbuto
peculiare fuisse aut ad morbum ipsum detegendum.
Nos verò læpè huiusmodi symptomata non pauca in plu-
rimis ægrotantibus animaduertimus. Quia tamen scorbati-
sim hinc regionibus, vt antea dictum effuon est familiaris,
& nos ideo profus ab immunis esse omnes Medici nostras
existimant, volumus cum absolute scorbuto nomine
donare; sed satis esse duximus affectionem scorbaticam
appellare; quæ scilicet ad scorbuto naturam proxime acced-
dat, verus tamen scorbuto non sit.

Est autem scorbuto nihil aliud, quam affectio hyp-
ochondriaca peculiare quemdam malignitatis gradum
adepta: a qua quidem malignitate nonnulla symptomata
oriuntur supra illa, quæ in affectione hypochondriaca so-
lent contingere. Illa vero malignitas fit ex humoris mel-
ancholici corruptione, non qualibet, siquidem læpè corruptus
ac putrefact humor melancholicus, ex quo alij affec-
tus prodeunt, non autem scorbuto, vt febris quartana.
& abesse illius meleniter, aliarumque partium: sed pecu-
liari & propria cum tali malignitate analogæ. Hæc autem
malignitas inuoluit ex contagio, quod in hoc affectu re-
peritur; siquidem contagiolu esse ab omnibus authoribus,
qui de eo scriperunt, sancitum est. Quemadmodum autem
omnes malignitatis gradus & species in humoribus
latentibus, ex quibus varij morbi produciuntur, nos latent
& humanam cognitionem effugiunt, sic malignitas scorbati-
ca etiam occulta est. Et certe natus est, quanta morbo-
rum varietas emergat ex varijs malignitatis gradibus in
humores introductis; ex quibus febres malignæ, pestilen-
tes; variolæ, & morbilli cancer & elephantiasis, lux vene-
reæ, alique quamplurimi ac diuersissimi, affectus oriuntur.
Est ipsoctum elephantiasis ex malignitate quadam pecu-
liari, in humore melancholico residente, ducit originem.
Scorbuto etiam ex peculiari malignitate in eodem humore
re melancholico latente prodeunt: cum tamen isti duo
morbi toto corde differant inter se, & nemo posset, va. 105 il-
los malignitatis gradus explicare.

Magnam scorbuto & melancholiz hypochondriacæ si-
militudinem ostendunt si symptomata vatriæ affectui
conueniant. Quoniam enim symptomata superioris capite a
nobis enumerata, quæ in melancholia hypochondriacæ re-
periri docuimus, in scorbuto etiam reperiri solent; vt cru-
ditates ventriculi & dyspepsie, saluaciones frequentes, vo-
mitus matæ, & priuolæ, acide, aut nidoroze; murrura &
rugitus hypochondriorum, eructaciones, & flatuum per in-
feriora explosiones, langunis vomitiones, & per alium ex-
cretionibus, dolores ab iustibus in ventriculo, & hyp-
ochondriis excitati, alius aditum interdum, & alius alui-
lus; alius hypochondriorum, vrinæ nunc tenuis, nunc cras-
sa, cordis palpitatio, pulsatio sinistri hypochondrii, fitis, &
oris siccatas, difficilis respiratio, dolores capitis aurium tim-
pitis, oculorum caligines, vertigines, metus & mentis, &
delirij melancholici diuersæ conuulsiones, epilepsie, tot-
poris.

Latera etiam interdum inuadit scorbuticus iste dolor, pleuriticum emittens, a qua tamen facile distinguitur, quod febris non adit, aut saltem admodum lenta: respiratio parum leditur, nulla tussis, nulla anacatharsis neque dolor est continuus, sed per intervalla recurrens.

Articulus etiam inuadere dolores istos scorbuticos, antea dictum est. Sed quomodo a vera arthritide distinguatur, explicare oportet. Arthritis enim scorbutica, siua & permanens non est, atque in vno & eodem loco consistens, sed per varios articulos vagatur, & ab vno in alium, acque alium eundem vel oppositum lateris translocatur: interdum etiam euacuatis ac subinde reuertitur, vt qui iam a dolore protius liberatus, & integre sanitati restitutus videbatur, iterum & ex improposito dolore, cum & sine tumore, corripiatur. At vera arthritis locum raro mutat, & ad solationem vique; partem quam apprehendit, obducere non desinit. Habet etiam hoc peculiare arthritis scorbutica, quod plerumque cum leui parafy si iuncta est, ob quam membrum affectum mouere nequeunt, & illa cessante dolor cessat, eoque redeunte reuertitur.

Octauum signum delimitur ex varijs motus lesionibus. Interdum enim contingit in humiliori aegrotantibus (sua quidam parafy), cum exempla quauam in obierationibus nostris propoluitus, & a vera parafy si iungitur, quae hac permansens est, neque vlla habet interuallum in illa vero tempore accidit, vt qui huius pedem vis loco mouere poterat, hodie quibus insitit, & leui admodum nutu ambulant; paulo post vero omnis motus iterum priuatur. Deinde cum ea coniunguntur tempore motus tremuli & convulsivus quod in vera parafy non contingit. Fit autem humilior parafy si a materia ichorea, vel vaporosa nervos ac musculos inuadente. Quod si materia illa acrimonia parateps fuerit, partes nervosas vellicando, tremore, & convulsiones efficit.

Non solum autem in parte aliqua peculiari conuulsiones contingunt, sed etiam interdum in toto corpore, epilepsiae characterem referentes, vaporosa aut ferola materia, acrimonia atque malignitate praedita, ad cerebrum eleuata, quae discussa saepe inducias dat, atque iterum collecta novas conuulsiones inducit.

Contractio membrorum in hoc affectu etiam contingere solet, interdum omnium, vt aegri nullum articulum habeant quem extendere valeant; alias vero vnum, aut alterum; & hoc praecipue in cruribus contingit, tenuibus ad crus mouendum difflinatis, duris ac rigidis in poplite enatibus. Talis autem contractio inde exoritur, quod tartareus humor multo ferro illius ad nervos & tendines deferretur: parte vero ferola & tenuiori, succellu tempore discussa crassiores exsiccantur & indurantur, inde contractiones nervorum ac tendinum efficiuntur.

Interdum etiam contractio in oesophago contingit, vt aegri cibum cum summa difficultate deglutiunt, & in strangulationis metu versantur. Quod fit ex vaporibus istis pituitis oesophagum contrahentibus.

Nonum signum delimitur ex alui fluxu, vel simplici, vel sanguineo. Sive plex a vulgari alui fluxu in eodantem distinguitur, quod excrementa in eo crassiora tenduntur, & maiori parte thoracica, ac ciborum assumptorum quantitate superante, cum vulgari alui fluxu, liquidior sit, & ex solis, si re humoribus conspissus. At sanguineus alui fluxus a dysenteria distinguitur, quod sine ventris dolore ac torminibus efficitur: utque a sanguine crasso & feculento, qui per venas melaricas in intestina effunditur. Interdum etiam vix hemorrhoidales sanguinem istum seculentum recipiunt, & per alui fluxum euacuant. At si diutius alui fluxus persequeretur, venae illae varicose euadunt, & dilatatae non solum corporum sanguinis, sed etiam multos alios humores tartareos, & mucilaginosos educunt.

Decimum signum est, oris grauis anhelitus, qui omnibus scorbuticis familiaris est, vt testatur Esgalenus; ita vt affantes eum vi ferre possint, & aures avertere cogantur.

Vndecimum signum est, horror, frequens, quem nullus, aut minimus calor sequitur, & quodam die bis,

ter, vel etiam pluries inuadit.

Duodecimum signum petitur a febris intermittenibus, quae interdum scorbuticis accidunt, & characteres habent a vulgari febre scorbutica charactibus longe diuersos. Pulsus enim in istis debilis est, tardus, & inaequalis, praeterquam in declinatione; in vigore enim plerumque magnus & durus esse consuevit. Praeterea in principio accessum tantum plerumque sunt membrorum in varijs partibus, cruribus praeterquam, vellicationes, vt carnes laetari atque diuelli videantur; quibus interdum motus convulsus iungitur. Ac licet nonnunquam quotidianam, tertianam, aut quartanam typum sequantur, saepe tamen rariores, & inordinatos paroxysmos habent, vel semel tantum, aut bis in mense sine certis periodis inuadunt.

Decimum tertium signum petitur ex tumoribus, qui in varijs partibus varij contingunt, nunc duri, nunc molles, & vesicarum speciem referentes, nunc ad erysipelas naturam accedentes.

Decimum quartum signum, est atrophia, quae tanta interdum in hoc affectu contingit, vt nihil praeter ossa & pellem in aegris remaneat, & sceleton repraesentent, praeterquam affectu diu periclerante. Quod fit a vixto sanguine, & a naturali statu valde recedente, ita vt partibus aliendis assimilati nequeat.

Flura alia scorbutici signa proponuntur ab Esgaleno, Sennerio, aliisque, quorum nonnulla quam plurimis alijs morbis communia sunt, quae nos suppeditata censuimus, ne confusio quaedam in hac diagnosi inducatur. Ac licet (vt ab initio diximus) scorbutus in hac regione familiaris non sit, vt in Polonia, aliisque locis septentrionalibus, imò apud nos ferè sit incognitus: si quis tamen, in Medicina facienda, omnia melancholicorum symptomata penitus inuelligit, quodam reperiet ad scorbuticam affectionem accedentes, in quibus nonnulla ex superioribus symptomata scorbutico peculiariter apparebunt.

Quod ad prognosin spectat, morbus iste curatu difficilissimus est, quoniam admodum omnes ab humore melancholico oriundi, Sed hic multo magis in quo humor melancholicus prauum atque malignum qualiter adeptus estque corporis economiam crudeliter euerit, & proximam temeliorum partem continuit.

Peculiarior etiam est, quia aegros non raro in atrophiam aut hydropem deducit, alios morte subitanea, per apoplexiam, syncopem alioque acutissimum morbum subripit.

Curantur tamen non raro, qui pro deploratis habebantur, magis in hoc morbo, quam in alijs quamplurimis. Et nos vidimus nonnullos in omnimodam atrophiam perductos ex durioris doloribus, aut contumacia alui fluxu sanguineo (quos affectus ex multis circumstantijs scorbuticis censuimus) feliciter conuulsisse.

Praeterea saepe deludit pulsus, qui in febribus paroxysmalis praecipue, alia frequens, paruus, & inaequalis interdum fit, vt aeger inter paucas horas moriturus videatur, qui tamen huius paroxysmi surgit & lecto, & ad conuicta munia reuertitur: vt peculiariter annotauimus in studio Hollandae, ad quem vocati in vigore paroxysmi, cum breui mortuum exilissumus: postquam vero eum postmodum bene habentem vidimus reliquis morbi circumstantijs dignis exanimatus, cum in scorbuto laborare conperimus, quem ille ex patria iam, in qua frequentatissimus est, ad nos attulerat.

Curatio huius affectus eadem instituenda est, quae in hypocondriaca melancholia sit propofita, quandoquidem, vt ab initio dictum est, ab eodem humore generatur, sed a statu naturali magis recedente. Ideo plerumque potentioribus indiget remedia. Quia tamen haec est generalis nuedendi regula, vt omnis curatio a lenioribus incipiat, ad fortiora postmodum progrediendo, si illa non suffecerint, optimum erit in hoc affectu integrum melancholice hypocondriacae curationem insinuare, & remedia proprio capite a nobis descripta sigillatim viurpare; quoadquod morbus ille chronicus & contumax, non nisi longo remediorum via euacui potest. Et morbi penitus extirpare nequeuerint, ad eandem reuocandum erit, quae proprietate specifica

illum oppugnare creduntur. Non erit tamen inutile, etiam ab initio nonnulli eorum illis admiscere.

Alia autem remedia specifica antiscorbutica dicta, plurima proponuntur ab authoribus, qui de hoc morbo scripserunt: quorum vis precipue dependet a fale quodam volatilius, cuius magna copia in ipsis reperitur. & cuius opera humorem illum crassum, terrestrem ac tartarum attenuant, & fluxiliorem reddunt, ac taudem dicuntur. Imò vero virtutem quandam alexipharmacam habent contra venenum illud scorbuticum humoris melancholici impetum. Inter illa autem primo loco laudatur cochlearia Betanica, que in nostris regionibus non reperitur. Alia vero sunt, astringentia vtriusque (prester tamen aquaticum) becabunga, seu anagallis aquatica, raphanus rusticus, chelidonium minus, absinthium, & lumaria. Quibus etiam adduntur alia quæ simplicius, sed minoris efficacis sunt: que ea omnia, que melancholicum humorem præparare, corrigere, & edomare valent. Vnde non sine ratione dictum est a nobis, curationem a duobus melancholicam hypochondriacam institutam, hic etiam plurimum conuenire. Illa autem sunt: arduus benedictus, ceterach, & capillares omnes. hylophorus, chanidrys, betonica; ager monia, borrago, buglossum, radices enim campanæ, alari, oxylapathi, polypodium quercum, cistites caprarum, fraxini, & tamarici, flores euldem tamaricis, bulbi, & epiphyum.

In harum autem plantarum decetum hoc perpetuo obseruandum, ut illæ quæ calidiores sunt, minori dosi vsurentur: frigida vero aut temperata semper admiscantur, idque vti plurimum in maiori dosi, præter tum in nostris plagis meridionalibus, in quibus humor melancholicus adultus est, & ad atræ bilis naturam accedit. Ac præter capillares herbas, borraginem, buglossum & agrimonium super enunciatas, vbi lectis adeli, aut calor magis metuitur, addi possunt endiuia, cichorium, acetosa, succus citri limo-

nium, arantiorum; imò & spiritus sulphuris, aut vitrioli: aut etiam serum lactis.

Ex prædictis autem plantis quamplurimum remediorum formæ parari possunt, que omnes a Senerto collectæ sunt, & ab omnibus authoribus excerptæque vniuersique pro arbitrio suo imitari poterit Hoc saltem diligenter enotandum, quod ab omnibus authoribus proponuntur, plantis prædictis efficacius operari, si ex pressis earum succis vsurpetur, vel in coctis redigantur: quia sal illud volatilem quo tota eorum efficacis refidet, per decoctionem euacuetur, si planta exsiccat, maiori parte resoluatur.

Nos vero formulas sequentes felicitè vsurpauimus.
Succorum depuratorum nasturtii aquatici & becabungæ, an. j. succi fumarie j. 4. sacchari albi j. 4. fiat pocol. Vel
Succi fumarie & nasturtii aquatici an. j. 4. Mille. Vel
Succorum acetosæ fumarie, & nasturtii aquatici an. j. 4. Mille.

Succus acetosæ augeri potest, si impensius refrigerare est animus, tum succus limonis, alique refrigerantes addi.

Major erit remedii efficacia ad dissoluendum tartarum illud tenax, & glutinosum, si sal tartari addatur ad 3. i. cum spiritu sulphuris, aut vitrioli ad 3. i. vel 3. 4. Et qua in via huiusmodi remediorum purgationes frequenter vsurpandæ sunt, optimum erit in prædictis succis lenne 3. i. vel ii. per noctem infundere, & singulis vel alternis diebus, vel tertio quoque die exhibere.

His vero chalybeata remedia per vices adiungere oportet, præter illa, quæ in melancholicam hypochondriacam curationem propolia sunt, tum etiam opusæ roborantes & aperientes, aliaque remedia ibidem descripta interuenientia, pro prudentis Medici arbitrio.

Ac denique aquæ minerales acidulæ, & vitriolite conuenienter, & debito tempore vsurpantur, ad huiusmodi curationem plurimum conferre poterunt.

P R A X E O S M E D I C Æ

LIBER DECIMVSTERTIVS.

DE AFFECTIBVS MESENTERII;

Pancreatis, & omenti.

P R Æ F A T I O.

C A P V T P R I M V M.



In explicandis Mesenterij, Pancreatis, & Omenti affectibus, antioribus admodum fuerunt, & maior pars illorum, penitus eos omiserunt, quod cognoscere difficultissimum fuit, & maior parte non nisi ex diffinitis cadaveribus non secantibus, ut ex his vix constet a Senerto, de cetero, quæ collecta. Frequentissimum tamen esse consueverunt. Vnde et ceteri Eternus asserit, se in mesenterio latere plurimum unum morbum casus vi cholæ, melancholia, diarrhoea, dysenteria, cachexia atrophica, languor, lentum errantemque febrem, vomitionem, dolorem colicorum, tumorem, & abscessum. Si laus vero mesenterium inferiorem morborum parentem nemo abarab nisi autem, Adedcorum intra-cula vocatur. Idem de pancreate, & omento duci potest, sunt enim partes illæ ignobiliores, et vix corpus sentio, ad quam membra in bilis extremam usque deponunt. Læti autem prædictæ partes, quemadmodum & reliqua totius corporis, omnibus morborum generibus affici solent, & similibus, organici, & communibus vtriusque inde symptomata emergunt. Nos tamen h. tantum intererunt, que ad vsum prædicti maxime faciunt: inuenerunt hunc tractatum quoque comprehendendum, sapienterque primum erit de obstructions mesenterij, secundum de inflammatione mesenterij. Tertium de abscessu, serbulo, & vltimo mesenterij. Quartum de morbis pancreatis, Quintum de morbis omenti.

De obstructions mesenterij.

Obstusiones in mesenterio ab iisdem causis generantur, quæ in hepatis & lenis obstructionsibus propolite sunt, sed frequentius, & facilius contingunt, propter venarum melasraicam angustiam, & præcipue lactearum, quæ chylosam materiam deuehant ad secundæ concoctionis officinas; cum illa materia chylosa crudioris & crassioris succo sæpe repleta sit, ita liberum conuenientum non habens, in illis venulis hæret, & obstructions pariat. Venæ etiam melasraica obstruuntur ab humoribus crassis, ab hepate, liene, alijsque partibus transmissis, ibique diutius remorantibus in qua mora maiorem in dies crassitudo acquiritur, ita ut interdum tumorem scierholium generent. Cum humoribus etiam interdum flatu crassus commiscetur, qui grauius innotum symptomatum causæ esse solent. Ad obstruendum etiam, vel potius angustiam illarum venarum referendum comprehensioem, quæ sit a glandulis, per totam mesenterij lubantiam dispensis; illæ enim præter modum incrementis, ut in illiusmodi dispositionibus contingit, venas melasraicas comprimunt, & tum chyli,

chylis, tum sanguinis comectatum impediunt.

Signa obstructionum diagnostica in tres classes dividenda sunt, vt in hepatis obstruccionibus factum est; que scilicet morbi speciem, vel partem affectam, vel causam, eum producentem significant.

Signa morbi (speciem indicantia, id est, obstruccionem in hypochondrijs latentes, tum etiam earum causas, communia sunt obstruccionibus hepatis, lienis, & mesenterij: ideo et diagnostici obstruccionis hepatis repetenda. Quae vero mesenteriorum peculiariter affectum significant, sunt, sensus & renitentia in medio ventre, & sub ventriculo, ac regione umbilicali: grauitatis sensus in eadem regione, & interdum dolor obtusus, nonnumquam etiam acutissimus, quando flatus in ipsius partibus continentur: dolor etiam aliquando in dorso percipitur, propter ea quod mesenterium huic parti alligatur: murmura & rugitus in ventre sunt, ructus & excitatus, vapores in caput attolluntur, vide varia symptomata contingenti ac denique ea omnia, quae in melancholia hypochondriaca accidere consueverunt, mesenterij obstruccionibus produci ac foueri.

Quod ad prognosin attinet: affectus ex se periculosus non est, quia pars ignobilis grauiam male ferre potest sine vix periculo: deinde remedia generatim ad illius curationem adhiberi possunt, quae eo inueniuntur adiuturata, & exoptatum est, ut vtrumque plerumque consequatur, nisi melancholia hypochondriaca inde exorta fuerit, quae opprobrium Medicorum vocari consuevit, propter rebellem humoris melancholici naturam. Cum tamen haec pars sensu exquisito donata non sit, & obstruccionis plerumque graue incommodum & agrotantis non afferat: saepe negligitur, & aliorum morborum maxime periculorum causae esse solent.

Curatio huius affectus eadem instituenda est, quae in hepatis obstruccionibus fuit propoita, eaq. inde repetenda.

CAP V T II.

De inflammatione mesenterij.

Cum mesenterium, vt antea dictum est, sic velut sentina, ad quam partes nobiles superfluitates suas depontunt, quo postmodum per vomitum aut cecum, a natura excluduntur; vt in nonnullis videre licet, insignem vigorem humorum copiam per interualla vomitu aut secretionem vacuationis ille impediunt, obstruunt vias per quas ferri solebant, vel ab alia quapiam causa, humores illi retenti, & diu in parte commorantes, calorem praeternaturalem concipiunt, vnde putredines, inflammationes, febres variae, & abscessus oriuntur. At inflammatio specialiter concitatur, quando sanguis in venis mesaraicis cumulat, per aliquos rami aperturam in mesenterij substantiam effunditur: cum autem in ipsa venis, propter obstruccionem maxime cumuletur; ideo omnes obstruccionum causae, ad inflammationem causas etiam referri poterunt.

Ad hanc etiam inflammationem efficiendam plurimum confert humorum congestio acrimonia, & erosio; lapsus aut percussio regionis hypogastricae: facultatis hepatis attractio, concoctio, aut reuicentis debilitas: corporis calcificatio nimia, vel refrigerantium vias intempestiuus, & motus crassius naturae in febribus malignis; aut variolus, humores peccantes in hanc sentinam demandantes; diarrhoea, vel dysenteria intempestiue suppressa.

Signa inflammationis mesenterij diagnostica sunt, febris languida, occulta & lenta, atque sitis & grauioribus symptomatibus anorexia, tensionis & grauitatis sensus subter ventriculum, citra magnam duritiem, & quae non nisi paruis doleat, citra dolorem etiam, saltem effatu dignum, quia pars obtusa sensu donata est: egeliones chyliae, quas plerumque ichor tenuis consequitur: sine vilo dolore sensu, modo seorsim ac singulis, modo iunctis permixtus.

Mitiora sunt omnia symptomata praedicta, si mesenterium solum inflammatione afficiatur: si vero hepar, aut lien, aut intestina simul inflammatione tenentur, vehementia sunt omnia symptomata: ac praeterea peculiaria praedictarum partium affectuum signa apparebunt, ex his

capitibus desumenda. Cum enim huius partis inflammationes, & abscessus maxime lateant, si solitarij sint, propter obtusum partem sensum, & quia nullam in corpore cutis actionem, cuius lesio internocii valeat: sed vnum tantum habeat, chylis & sanguinis distributioni inferuentem, ideo oblique magis, quam directe, & artificiose coniectura, intermolenda sunt; si nimirum praesente febre, alioque symptomate, nulla affectui hepatis, lienis, aut intestinorum signa appareant. Speciatim vero iustitia simul cum mesenterio inflammari ostendit febris haemorrhagica, quae in obstruccionibus plerumque harum partium in inflammatione exoritur. A mulciorum etiam abdominis nullam oratione desumitur hic affectus, quod tumor, ac dolor secundum eorum ductum, figuram, ac positum protenditur. Plerumque vero illi mulciorum abdominis tumores oblongi sunt aut per totum ventrem diffusis, & partes externas nigri occupantes, vt leui contactu statim percipiuntur, & malignum dolorem ac febrem inferre solent.

Denique distinguendus est hic affectus a diaphragmatis tumoribus, qui paucissimis haecenus Medicis innotuerunt, in illis autem perpetuo insignis est respirandi difficultas, hypochondria reualia, pulvis durus ac paruos, citra omniem tumorem in hypochondrijs sensum aut apparentiam. Tum si tumor fiat a sinistra calida, febris acuta, dolor intensus, & citra, & conuulsioniones insequuntur, quae symptomata in mesenterij inflammationibus solitarijs nunquam contingunt.

Quod ad prognosin attinet: periculosissimum est hic affectus, qui plerumque in abscessum degenerat, vel putredine, ac corruptio mesenterio inducitur. Saepius etiam interitum moribilia alio a natura transmutatur, non tamen plane tollitur, vnde malum recrudescit, & saepe ad multos annos, & per totum vix tempus persequitur: nunc febres redeunt, nunc eadem in colicos dolores permutat, ac inflammatione, vel phlogosi saltem redeunt.

Curatio inflammationis mesenterij, ab hepatis, & lienis inflammationis curatione absumis non est, illa ideo a suis capitibus huc erit transferenda.

CAP V T III.

De abscessu, creta, & scirrhus mesenterij.

Inflammatio mesenterij saepe in abscessum degenerat. Omnis tamen abscessus mesenterij non fit ab inflammatione, sed plerumque a vitiosis humoribus in ea parte conuulsi, ac putrescentibus: ita vt humiliori abscessus sensum producant sine febre praecedente, aut alio graui symptomate; quaedammodum videmus in alijs partibus atheromata, fistulomata, & melicerides, & alia abscessuum genera sine inflammatione praecedente generari. Et dum illi abscessus dirumpuntur, euacuat pure, vicus remanet, quod difficilem curationem recipit. Si vero illi humores va de putrosi sint, aut melancholici, & putredini ac corruptioni resistent, concreuerunt non raro & indurantur, atque in scirrhum degenerant: vno vero interdum lapideam duritiem acquirunt, propterea multorum obstruccionibus constat lapides in mesenterio fuisse repositos.

Diagnosis abscessuum mesenterij interdum facilis est, interdum vero difficilior. Si enim ab inflammatione eundem parui fiat, ac antea percepta, signis superiori capite propoitis, & durities perseuerante, indicium est inflammationem discuti non potuisse, sed iussu suppurationis in abscessum conuersam. At vero quando abscessus ab humoribus prauius in mesenterio duo commorantibus, ac tandem putrescentis exoritur, difficiliora est illius diagnosis, ita vt plerumque aures, quae talium abscessuum obseruationem scripserunt, eos non nisi post mortem, & dissecta caedera in, nouisse referant. Licet enim vtrumque tactu dignoscivaleant, aliquando tamen tam alte (epulsi) sunt, vt neque ipso tactu deprehendi possint, & parvis sensibus adeo est obtusius, vt nullo dolore icie interdum prodant. Quia tamen, ista variis modis contingunt, in sequentem modum distinguenda sunt.

gustis, oppressio, & grauitas in regione ventriculi percipitur; & hoc signum veluti pathognomonicum scorbuti, ab Engeleno, Scimero, alijsque proponatur.

Abcessus etiam in pancreate repertorum historię nonnulli apud autores reperiuntur, qui viuis agrotantibus detecti non fuerant. Attamen ex symptomatibus quibus affecti fuerant aliquatenus interni possunt, quorum nonnulli cum predictis scirrhum eiusdem partis indicantibus communia sunt, sique addi possunt febris lenta abcessum internum (saltem maiori parte) comae indidua; vigilię iugę, ac somni breuitas: ab ijsque labores, apothymia, & suores frigidi.

Curratio obstructionis, scirrhii & abcessus pancreatis, eadem esse debet, cum ea, quę isdem morbis hepatis, lienem, & mesenterium affligentibus adscripta est. Ea ideo ex illis capitulis err deprehendenda.

CAPVT V.

De Affectibus Omenti.

Cum omentum pars mollis sit, & adiposa & recipiens humoribus aliunde confluens propter laxitatem maximę idonea, pluribus etiam morbis non minus ac mesenterium, atque pancreas, obnoxium est qui tamen ab authoribus non describuntur, quia vix ac ne vix quidem in viuendis discerni queant, sed ex apertione cadauerum tantum innotescunt, vt ex historijs quibuscum in observationibus propositis videre est. Sic narrat Vesalius se in dissecto cadauere omentum vidisse adeo tumefactum, vt quinque librarum pondus aequaret, cum naturaliter se habens vix libę semis pondus excedat. Roussetus lib. de

partu caesario, refert Lutetia in aperto cadauere insignem abcessum in omento fuisse repertum. Riolauius in Anthropographia se omentum nobilis adolescentis 19 annos nati vidisse testatur, multas glandulas repletum quibus insignem humorum illauiem exceperat, mesenterio & pancreate ex abiectione parietalibus, & hinc valde imminuto, ac penę consumpto. Nos veró in Canonico Monipheni omentum vidimus scirrholum totam Epigastriam regionē occupans, & quatuor digitorum transuersum & rassitudinem æquans: ille autem tumor, hinc colorem referebat, vt verisimile fuerit humorem melancholicum a liene in eam partem translatum & cumulatam fuisse, cum æger temperamento valde melancholicus donatus fuisset. & via patentissima sit per ramos splenicis a liene ad omentum; per quos etiam ramos in hydrope non raro (vt docuit Hippocrates) aqua fertur a liene ad omentum, a quo in capacitatem abdominis sensim extillat.

Cum autem omenti tumores a mesenterij tumoribus nulla arte distinguantur, ideo certa illorum diagnosi status non potest. Verum quidem est tumores omenti primo contracti facilius percipi cum potest, cito immittat subiectum sit; mesenterium vero profundius obtineat situm. Sed tumores mesenterij glandulosos ad peritonæum ascendunt; ita vó cum eo, & multum Epigastrii ita interdum vniuntur, vt suppuratio facta per vmbilicum aut partes alias externas expurgentur.

Hec tamen diagnosi difficultas curationi non officit, quandoquidem omnibus tumoribus eiusdem speciei, ventris inferiores partes occupantibus, eadem adhibetur medela: quę tamen in omento infestius succedit, quandoquidem non habet vias ita idoneas, quemadmodum reliquę partes, per quas expurgari valeat.

P R A X E O S M E D I C A E

LIBER DECIMVS QVARTVS

DE AFFECTIBVS RENVM, ET VESICAE.

P R E F A T I O.

Renes, & vesica variis & omni generis patiuntur affectibus, similes, organici, & communes; ex quibus varia etiam symptomata, tum in aliis morbis, tum in vnijs excretionibus, oriuntur. Nos horum affectionum præcipua nouem capitulis complectemur. Quorum primum est de calculo renum & dolore nephritico. Secundum de calculo vesicæ. Tertium de inflammatione renum & vesicæ. Quartum de multa sanguinante. Quintum de vlcere renum, & vesicæ. Sextum de diabete. Septimum de vrina incontinentia. Octauum de siccitate & stranguria. Nonum de dysuria seu ardore vrinae.

CAPVT PRIMVM.

De dolore nephritico, & calculo renum.

Dolor nephriticus ille nominatur, qui renes aut vterque affligit. Apud vulgus colica nephritica dicitur, propter maximam affinitatem, quę ipsi cum colico dolore intercedit: ita vt sæpè non parum difficile sit verumque affectum inuicem distinguere, vt in diagnosi patebit.

Multiplex huius doloris causa statuitur, frequentissima tamen est calculus, aut purita crassa. Calculus in rene moram trahens dolorem, aut nullum, aut obstruendum efficit, propterea quod renum substantia obstruendi sensu donata est. Si veró in caput vrinæ demittatur, vel illius canalem subeat eumque distendat, neque ad vesicam properat magnitudinem propelli valeat, tunc doloris atrociter mouet, & agrotantem mirum in modum excruciat. Purita vero crassa

vreribus impacta, eos etiam distendit, & dolorem nephriticum producit.

Minis vero frequentes causę sunt, grumus sanguinis vreribus impactus, vel pus crassius a renibus, aut alijs partibus superioribus in vrerem deductum. Interdum etiam status in vrerem cavitates se se infundunt, & dolores atrocissimos inducunt.

De calculo, doloris nephritici præcipua causa, & magis ordinaria, quamplurimę apud autores agitantur controuersiæ, quas accuratè persequi iustitiam ratio non patitur. Sed ea tantum attingemus, quę ad illius naturam & causas stabilendas necessaria sunt.

Ac primum dubitatur, sub quo affectum genere calculi consistendus sit. Galenus inter morbos in numero collocat, eorum quę sunt toto genere præter naturam, quemadmodum & lumbricos. Licet eam præter naturam in numero respiciat partes viucentes, quarum numerus auctus vel imminutus, morbum illum organicum constituit, ea tamen quę præternaturaliter addita sunt numero eorum, ex quibus corpus naturaliter componitur, ad morbos in numero reiciit debent; ita vt etiam qualitates nodę interdum ad morbos in numero reiciantur, quando immutatae actiones laedunt, vt color flauus in oculo icterici, sonitus excedens in aure, & sapor excreta in lingua.

plerumque tamen calculus inter causas morificas collocandus est, quatenus obstructionē, vel distensionem parit.

Inter symptomata etiam collocari potest, excreta crassius, & retenta. Si enim in renibus, vreribus, aut vesica retineatur, cum excreti melius foret, ad præter naturam retenta reuocandus esset, vno excreta, ad excrementum toto genere præter naturam est referendus.

At verò circa calculi causam, tum materialem, tum efficientem maior est difficultas. Galenus cum affectis censet, causam calculi materialem esse materiam pituitosam, crassam, viscidam & lentam, concretione idoneam, & vt recentiores loquuntur, saculentam, limosam & tartaream: efficientem vero calorem, materiam illam exsiccantem & indurantem, atque in lapidem tandem conuertentem. Quæ doctrina grauius in pugnat rationibus.

Primo quia si ex materia pituitosa, viscida & crassa calculi generantur, in cerebro & ventriculo frequenter prodirentur, in quibus talis pituita maxime redundat. Neque subest dicere, in illis partibus calorem non esse sufficientem ad concretionem efficiendam. Si quidem ex Hippocratis & Galeni doctrina, calor tenuissimæ actione datur, sufficit ad concretionem efficiendam. Et hanc ratio petitur, par lenes ad calculorum generationem sunt magis dispositi, cum iuvenes habeant renes longe calidiores, quia nimium in materia calculi diutius moratur in renibus seu in propter subcillaritate facultas expultricis, & ita diutius coquitur a calore renum, ab eoque tandem induratur, licet longe tenuior sit.

Secundo, ex Aristotele 3. meteor. cap. 4. quæ concreuit a calore, liquatur ab humido: si sic lura a calore solis induratur, in humido liquatur. Calculus autem nunquam dissoluitur in aqua. Neque obstat dicere, fortem calorem tantam concretionem efficere, vt in humido solui nequeat: quemadmodum in lateribus contingit, qui probe cocti in fornace, postmodum in aqua non soluantur. Nam primum in corpore humano tantus calor non reperitur, deinde laterum concretio ab aqua non solubilis, minimè dependet a calore interiori: sed potius a dispositione argillæ, ex qua lateres coniciuntur, quæ habet materiam lapideæ consistentiæ, & indissolubili acquirende idoneam. Lutum enim ex terra vulgari conflatum, quantumvis coquitur in fornace, nunquam lateritiam consistentiam acquirit, sed perpetuo in humido liquefit.

Tertio, ex eodem Aristotele ibi est, calor concretionem efficiens debet esse sic, ut hoc enim præstat per exsiccationem & partium humidarum resolutionem. At perperam sit humiditatis serotina effusio in renes & vesicæ. Ergo talis exsiccatio & induratio in ijs partibus non potest fieri.

Quarto, in fluxu & fontibus lapides generantur, in quibus nullus est calor, immò vero in cauetis & speluncis frigidioribus nonnullis, aquæ illians condensatur in lapidem, vnde pyramides & alie figure exurgunt. Ergo alia causa efficiens inurenda est præter calorem, & alia materia præter humorem viscidum ac glutinosum.

Quinto, pituita indurata glycæm induit naturam, & temperat friabilis est, vt in topis articularum videre est. At calculi non ratò friabiles sunt, quam consistentem esse pituita obuiere non possunt. Neque tantus calor in corpore humano reperitur, qui sufficiens illam consistentiam tali inatque indere possit.

Omnium faculorum Medicos deceptæ muscosa illa pituita, quæ in multorum calculosorum renis reperitur, ipsamque proximam calculi materiam esse putauerunt. In quo, tamen longè a veritate aberrant. Nam primò in reni calculo muscosæ illæ vires vitæ plurimum non apparent: sed frequentius in calculo vesicæ. Si autem hæc esset calculi materia, in vtriusque partis calculo æqualiter appareret: sed frequentius vesicæ prope & peculiari hæc materia maxime dependet. Est enim vesicæ vesicæ malè affectæ excrementum; hæc autem vesicæ affectus talis est. Docuit autopsia in eorum cadaveribus, qui ex calculo vesicæ obierant, & humorem illum musculum dum multumque cum renis excreuerat; vesicæ corpus carnosum cassile, & digitis aut pollice crassum, item depreum esse. Itæ vt totam illius cauitatem interius impleat, & ipsum calculum proximè amplectatur, donec tandem vrinam supprimeat, ægrum misere angustet. In ijs vero qui vrinam tenuem, claram & æqualem reddiderant, vesicæ substantia membranosa, & in statu naturali conficta apparuit. Quorum euentum ratio depulsiuit ex Hipp. Aphor. 66. sect. 5. Si in vulneribus præter sanguinem, & pus non apparuit, ingens malum. Ratione reddidit Galenus, quia suspicio oritur humores, qui ob dolo-

rem ad vulnera defluunt, iam ad partes principales transire. Præterea omnibus partibus iustum est, docente eodem Galen. lib. de differ. cap. 1. 2. vt quæcunque robustior est, id quod noxium est, aut superfluum, ad debiliorem transmutetur, nec cesset ille transmissio, donec ad imbecillitatem ventum sit. Cum autem pars vulnerata admodum debilis sit, ac proinde ad excipiendos humores maxime disposita, si illi ad eam non deferantur, signum est alias partes admodum esse debiles, quæ talen transmissiõnem moliri nequeant: aut alias esse vulnerata debiliores, ad quas humores deferantur. Non folium autem humores vtriusque ad partem vulneratam deferuntur, sed etiam sanguis laudabilis, quæ natura maiori copia ad partem afflicta transmittit, vt illi suppetas ferat quantum potest. Hæc omnia locum habent in vesica a calculo oppressa. Calculus grauior, aut inæqualis, vel aculeus præditus, vesicæ tunica interiori vellicat; vnde dolor, & imbecillitas parti accedit. Natura vero illi suppetas ferens, solito copiosiore sanguinem ad eam mittit; tum relique partes robustiores, superfluitates suas ad eam deponunt. Hoc humores vesicæ substantia concoquit & assimilant quantum potest, sicque ex copiosis sanguinis copiosis sumens alimentum accrescit, & crassior atque carnosior euadit. Cum autem totum sanguinem adhaerentem, multo minus humores vitales sibi assimilare ut queat, inde multa exoritur excrementorum illius, quæ ex propria partis natura, pituitosam illam ac mucilaginosam formam induere consuevit. In ijs autem calculosis, qui vrinam claram, tenuem, & æqualem reddunt, vel quærens calculus dolorem non parit, vel tale attractionis causa fit; vel alia sunt partes vesicæ debiliores, ad quas reliqua membra se se conerant.

Quia vero hæc doctrina præconcepit multorum faculorum opinionem, denique luculentè vtri exemplo roboranda est. Vtri substantia sicut & vesicæ membrana est at in prægnantibus tota penè carnea euadit, atque ita crassa, vt pollicem mensuris duorum digitorum crassitiam æquet. Quia natura toto gestationis tempore multum sanguinem ad vterum mittit, sicut nutritiæ gratia, qui cum a seculo totus non absumitur, porro quedam illius vire apponitur, & inde cum tota ad partem, vique continuo augetur. Idem in vesica contingit: quia vt præternaturaliter (cum in vtero naturaliter idem) vt quando maior sanguinis quantitas ad eam confluit; portio enim illius in propriam substantiam conuertitur, & illa inde maiorem crassitiam acquirit. Si vero contingat, vtra grauiditatem, vterum intemperie aliaque infigni, aut alio quouis affectu laborantem, debiliorem reddi, tum humores superflui ab alijs partibus ad eam transmittuntur, qui cum sufficienter assimilari nequeant, multa inde emergit excrementorum illius, quæ per fuorem muliebrem, seu menstrua albe quotidie expurgantur. Et ille fluxus albus mulierum est proprium vtri excrementum, quemadmodum mucilaginosæ vrinæ portio est excrementum vesicæ. Idem in renibus contingit, quævis non ita frequenter, vt quando a calculo, eorum substantiam impedit, dolor atque imbecillitas ijs inducitur, ad eos natura multum sanguinem, multoque humores demittit, qui cum parti assimilari nequeant, saltem maiori parte, in excrementum crassum ac mucilaginosum conuertuntur, quod magna copia cum vrinis excremitur, idque affantes, ac Medici vulgares putulentam materiam esse putant, quæ tamen mere putrescens est, aut saltem exiguo puri permixta, quando scilicet a calculo, per attritionem vicis in renibus generantur.

Recentiores nonnulli prædictis rationibus conuictam causam materialem calculi statuerunt, scilicet lapidecentem: efficientem vero spiritum quemdam lapideum. Succum lapidecentem vocant humorem quemdam, innata & peculiari vi præditum, vt in lapidem conuertatur. Hunc vero probare conantur ex generatione lapidum quæ fit in maiori mundo. Si quidem quamplurimas historias constat, non paucis autoribus collectas, aquas quorundam fontium in lapides & saxa conuertere alias, quæcumque iniiciuntur ligna, stirpes, animalia, intra paucos dies crassa lapideæ producere; liquores in quorundam aquarum cæuissimis, in illis

in fibras & columnas conuertitur: denique videmus quendam vini portum calami lapideum duritiem acquirere, quæ dolorem parietibus adhaerere, & tartarum nominatur; tum etiam in ipsâ urinis, quæ clara ac limpidæ redduntur, postquam refrigerata sunt, in lapideum quendam substantiam concrefcere, & matula parietibus adhaerere. Quamuis autem peculiaris illa materia aptetur, ut in lapideum conuertatur, istis cognata non solumnulli tamen eam inuenisse putant dicentes, hoc & falibus proserente, cum terras quidam portione permixtis. Sales quidam soli facile concrefcunt, sed in humido etiam facile soluiuntur; ac si cum materia terrestris aut iulosa sibi analoga coniungatur, easque efficientis vi lapideam naturam acquirunt. Sic videmus in vino salem istum cum materia faculenta portione mixtum, in lapideum duritiem iuxta dolium concrefcere: tartarum enim calcinatum, totum ferè in sale abire, quod ostendit illud ex sale porrifimum coagulari. Sic etiam in urinis plurimum salem in se continentibus, præcipue illis, quibus limosa, ac iulosa materia permisceatur, tartarum ac lapideum materiam concrefcere, videmus, matula parietibus adhaerentem. Hæc autem salina materia, quæ cum urinis permisceatur, promittit ad calculum & potulentiæ, quæ huiusmodi salibus abundat, quæ corpore bene se habentibus conuincitur, neque in renibus retinetur absente præferunt causa efficiente, quæ siue potens fuerit in ipsâ materia; siue ex propria renium diathesi dependens calculorum concrectionem promouet in renibus & vesica.

Caulam igitur efficientem calculi vocamus spiritum lapidificum; Fernelius vero appellat calculorum dispositionem; quæ renibus indicat eî, hæreditario iure ut plurimum adepta, cum illis affectibus inter hæreditarios principem ferè locum obtineat. Nos vero iactas esse dicimus causam illam efficientem spiritum lapidificum appellare, quæ immo latius patet, quam calculosa illa Fernelij, arenosa quæ renium dispositio. Nam primo in ijs qui talem a natura, aut hæreditario iure, renium dispositionem non habent, calculi etiam generantur, si alimentis continuo, & maxima copia vitantur, quæ plurimum succo lapidescentis in se contincant, aut aquas bibant tali succo abundantes, quia in illas aquas aut cibis non solum adest causa materialis, sed etiam spiritus lapidificus illis infusus est, qui feminis multar, lapidas formam inducit: vnde non male Hermetici causa lapidum efficientem ad propria femina reuertunt, quæ in materia disposita huiusmodi lapidem producant.

Præterea à spiritu quodam lapidifico calculos generari ostenditur historiis luculentis, à varijs autoribus relictis, hominum laborum, aliarumque rerum, à spiritu quodam et terra exspirato, in lapides & laxa conuersoriam. Sic apud Auentinum lib. 9. *Amal. B. maris*. legere est, anno 1343. ex terre motu plures quales quinquaginta rufficos, item vacas emulgentes, cum ipsi vaccis extinctis diriguisset, ac corpora in salinas ac lapidas statas redacta fuisse. Sic narrat Oretius in *descriptiõne Rossie* de pecudum gregibus & armentis illis putrefactis. Sic pater Cameracensis de auro meridionali certis anni temporibus flante in locis montis Prociacis Chalcidus in Armenia; cuius afflatus integræ equitum turme in statuas lapideas subito conuerse sint, iterumque in via eo acci ordine quo ante metamorphosin erant dispositæ.

Ille autem spiritus lapidificus non solum in calculosorum renibus residet, sed etiam in succo lapidescente ab eculentis & potius separato, ut dum potentior non est, vtiuisque concursus necessarius fit, vnde multi reperiuntur, qui cibis viuentis ad calculi generationem aliquantulum idoneam, calculos producant; concurrente calculosa renium dispositione, vel spiritu lapidifico renibus infuso. Si verò renes à spiritu illo immunes sint, ex talibus calculi non fiunt, quia vi illorum lapidifica satis potens non est, ut sine renium concursu, materiam illam in lapideum duritiem, conuertere valeat. Contra verò si vi lapidifica longe potentior sit in ijs, quo alimuntur, & frequens fit eorum vis calculi producantur, etiam si renes tali dispositione, aut spiritu lapidifico orbatu sint. Sic videmus in quibusdam locis, ubi aquæ vel vini succo lapidescente plurimum abundat,

maximam incolam partem calculi laborare, et de Ciconibus apud Ouidium videre eî his veribus.

Flumen habent Cicones, quid potum sacra reddit.

Vesperaque totum inducit marmoris robur.

Et vice versa, si vi illa lapidifica in renibus calculosis maxime vigeat, ex quolibet alimentis, quantumvis laudabilibus, calculos generabit. Sic ante triennium mihi videre contigit, virum quemdam, qui per tres aut quatuor menses plurius duodecim calculos exiguis fingulis diebus cum urinis reddebat, cum tamen toto illo tempore solis iulculis aut panatella lecto affusus & grauior laborans, velociter.

Causæ calculi antecedentes & procatartice, vel ad materiam calculi suppetendam faciunt, vel respiciunt constitutionem renum ob quam calculi facilius concrefcunt.

Materia calculi generande ac cumulande plurimum cõferant ventriculus, hepatis, & chylus. Ventrículus primus si non bene concoquat, crudus chylus in hepate deducitur, indeque impuri, ac terrestres succi cum sero in renes deuantur. Hæc pars calidus materiam chyliformi torret, & calculo generando idoneam reddit; tum etiam trigridus sanguinem crudum producit, huic etiam operi aptissimum. Latet debilis vel obstructus, aut quoquo modo intemperatus, faculentam sanguinis partem insufficientem non expurgat, eamque portione ad renes amandat, quæ ad calculi materiam elaborationem facilius disposuit. Ac denique præter causam conuertendam, quæ est calculosa dispositio, duplici nomine causæ antecedentes rationem habere possunt, scilicet ratione temperaturæ, vel conformationis. Ratione temperaturæ calidioris, materiam calculi olam attrahunt impensius, cum magis incalitranspiratione verò conformationis illi venæ emulgentes laxiores sint, ut materia illæ crassæ, & tartareæ facilius in renibus recipiantur, vterque verò angustiores, & vala ferream materiam ad eos transmittunt, ut materia illæ crassæ liberum exitum non habeant, sed in renibus retineantur.

Præcipue verò materiam calculi suppetunt alimenta crassa & viscosa, sallogæ excremento repleta, carnes bubulæ, porcine, & porcinæ, asinæ, & quæ sumo aut tale conditæ sunt, pilices laticis duriores, & otracitæ & anguillæ, legumina, calcus, omnisque lacticiæ, oua indurata, cactæ, pyra, cydonia, melpila, panes asinus, & oryxæ, vinum crassum, auterum, & egrum, vel osseum, & nondum delicatum, aquæ lacustres, aut succo lapidescente replete.

His adduntur alimenta valde calida, ut piper, zinziber, allia, cepæ, vinum vetus, & potens, quæ hepatis & renes impensè calefaciunt; diuretica nimis lortia, quæ materiam moribicam potenter ad renes deturbant; vestimenta densiora, lecti plures, nimis calefacientes, balnea venus immoderata, quæ renibus est inimicissima, exercitium vehemens præsertim a pallidissima repleto, aut famis diuturna, ita vehemens & alia animi pathemata.

Signa calculi diagnostica leorism spæciata equiuoca sunt, & alia morbis communia, tamen omnia simul & conuenientiam considerentur, certam diagnosis efficiunt.

Primum signum est dolor fixus, & stabilis circa lumborum regionem, quæ ut plurimum grauior est, quâ do calculus iustus est, parochy matu illud cum obductione lenis donatum grauiorem doloris percipit. Quoties verò calculus in caput vterius sele infinat, tunc dolorem acutum & pungentem excitat, qui dolor nephriticus appellatur, tandem perferreus, quando calculus illi hæret, neque agrum ex cruciata desinit, donec calculus aut in vesicæ causam proculus fuerit, aut in tenuis causam remaneat.

Secundum signum est, urina cruenta, quæ fit ex aperitis venulis aut erosis, in renis substantiam dispersis, aut attritis, neque fit à calculo ipsius parochy matu inherente. At si paucissimus sanguis excreatur, colore sanguinis amittit cum urina permixtus, & urina, liliuinum representat. Perpetuum non est istud signum, & ab alijs causis non raro dependet. At quando apparet, vinum ex præcipuis est quod dolorem nephriticum à colico distinguit. Excitant autem solæ abequatione, ambulatione multa, & alia quauis & exercitatio vehemens, quia tunc calculi illi asper & angulosi sitis illa lode dimouit, teneramque renis carnem profundius ac dilacerat.

Tercio

Tertium signum est, urina tenuis, aquosa & pauca circa initium paroxysmi nephritici, quæ interdum suppressio integra consequitur, si ambio venter fuerit obstrictus. At dum soluitur paroxysmus, & calculus venter impactus in vesicam demittitur, urina crasse, turbida & copiose excremuntur, arenarum sedimentum habentes.

Quartum signum est, arenularum & lapidulorum frequens excretio. De calculis res ipsa loquitur. Si enim æget nonnullus antea excreverit, quantumvis exiguis, quoties doloribus affligitur, a calculo ædectum provenire certa coniectura est. At de arenulis non ita certo pronuntiari licet. Plurimum siquidem videre est, qui tanta vias multas arenulas cum urinis profundunt, nunquam tamen calculo laborant. Non raro enim arenule proveniunt ab humore adulatione, que in hepate ac venis fixæ illæ vitri parietibus adhærent, nec in fundo subsident, ut illæ que a renibus proveniunt. Præterea digitis contrita, dissoluntur, & salinam substantiam resecunt, cum alie digitis non cedant, & dissolutæ in nullo modo valeant. Ac denique cum huiusmodi arenule salinam habeant substantiam, in calida urina dissoluntur, neque viro modo in ea apparentem adhuc calida est: postquam verò refrigerata coalescunt, & matule parietibus adhærent, sicut ac crystalli tartari, quæ in aqua calente dissoluntur, dum illa refrigeratur, concrevit, & valis parietibus adhærent, ita vt valde similis sit huiusmodi arenularum, & crystalli tartari natura.

Quintum signum est, & omnium certissimum, calculus excretus. Si enim aliquid signum ex superoerioribus, quantumvis æquivoce appareat, & aliis calculus ab ægro excretus fuerit, calculorum esse ædectum certo pronuntiare, potuimus.

Sextum signum est, stupor cruris & directio renis laborantis. Calculus enim grandior neruum illum comprimit, qui in musculos lumbares inferitur, renibus subleuatis, & ab Anatomicis *phæ* nominatis, qui masculi ad coxam deferuntur, mori, & cædentes inferuntur. Talis stupor percipitur ex fessione supra femur, ubi compressionem, vel etiam in præcio ex decubitu supra illos duntaxat.

Septimum signum est, citius & tractatius, citius lateris in quo dolor est. Renes u. & venter doloris acerbitate irritati, se vehementer contrahunt, simulque vasa spermatica, & partes omnes vicinæ contrahunt, que quidem vasa telicolum fibri ante cum lumbis retrahunt, vt igitur aliquando inflexus videatur. Est illa partium prædictarum retractio vique ad vesicam & intestina extenditur. Si quidem in summa doloris acerbitate urina, & alui excretio suppressitur, ita vt tunc temporis medicamenta purgantia nihil operentur, contractione illa eius actionis obstante.

Octauum signum est, nauſea & vomitus, & connectio nem renum cum ventriculo per membranam a peritonæo mutuatam, & per neruum hæc coniugationis, cuius duo rami a stomacho in tunica renum interioriorem deleruntur. Ideo cum partes illæ sentientes vellantur in renibus, ventriculus comparens ad res non excludendum irritatur, & primum pituitam reicit, mox bilem liliuam, ac postmodum æruginosam, malem protrahatur: quandoquidem ex duris doloribus & vigilis sanguis in venis alteratur, & portio illius magis disposita in bilem æruginosam commutatur.

Denique dolor nephriticus cum colico dolore tantam habet similitudinem, vt Galenus ipse in eorum distinctio se deceptus fuerit, sicut a nobis relatu est in colico doloris diagnosi. Vbi etiam signa propoſuimus, quibus illi duo affectus a se inuicem distinguantur, vt non opus sit ea hic repetere.

Signa hæcenus propoſita æquiuoca esse diximus, & vix vnicum eorum certam diagnosim posse constituere. Alia tamen nonnulla a quibuldam authoribus proponuntur; quæ adhuc magis sunt æquiuoca, & valde incerta, cum alijs adiecta diagnosim adiuvant, illa ideo equicare non erit inutile.

Hipp. Aph. 3.4. sect. 7. *Quibus, inquit, bulla in urina natans nephritica mala, duntaxat ægro admodum significat.* Fuit enim huiusmodi bullæ, a crassis humoribus liliu crassiori reſectis, qui vel in cubus congeriuntur, vel aliunde in eos

transfertur. Materia autem illa calculis gignendis idonea est, & non nisi longissimo tempore domari potest, vt de nocturna ægritudine significat. Galen. com. huius Aph. dicit, ab acritudine urinarum aperiri ora arteriarum, quæ renibus condonantur, acque ita prodire spiritum aliqueum, qui urina permixtus, bullas facit. At tamen verisimile non est, ex arterijs spiritum ita crassum & stabilem emanare posse, vt urina etiam refrigerata per longum tempus permixta valeat, quemadmodum videmus bullas huiusmodi per multas horas urinis immare. Deinde apertis arteriarum oculis ab urina æruginosa sanguis ab his etiam effluere. Imò verò officina venarum tenoris tunica constantium facilius aperitur, & ita perpetuo vrinæ cruentæ cum huiusmodi bullis apparere.

Idem Hipp. Aph. 7.6. sect. 4. *Quibuscumque tum urina crassa, tum uel parua, uel multa capilli quidam exeunt, is & renibus externatur.* Capilli uel ab vlcere renum exeunt, de quibus infra dicemus. Filamenta uero a Galen. com. referuntur in crudam lentamque pituitam calore renum intentior in oblongam & teretem figuram conglobatam. At tamen idem Gal. loc. Aph. 3. palam profectus, post antea & tradidit venationem, causam tantæ longitudinis nefare. A uicenna dicitur filamenta liliu fortiori longitudinem in vasis renum vel alijusmodi enim per duritiam fenestre, lateant, quæ ægro, antea le ex renibus laborant in renibus formam nanciscitur credibile est. A uicenna præcisè ad venteres refert. Quando enim renum sinus pituita abundat, cum urina ad venteres labitur, & lentore suo infans venteribus adhærens, tum præ calore crassescens, liliu ac teretem effigiem, pilis similis acquiri. Fenestula uero scribit se animaduertisse ea filamenta & vasa parafatis derivari in quibus teretem & pilarem formam fortuiturque feminis materia que vi morbi sensum deliens, calore crassescit: apparere autem plurima in is, quæ lenda, exulceratque gonorrhœa non ita pridem effecti fuerat, & is mulieribus, quibus albicantes menses profluunt, aut vterus lenda colluue target; item & sepe numero in vrinæ, quæ prima ita a concubitu. Alij denique arbitrantur, crassos eiusmodi & lentos humores, & quibus illa filamenta nascuntur, in venis quidem primitus procedunt, sed conflantem ab effigiem pilorum accipere in angustis renum meatibus, per quos veluti per cribri foramina capillaria tranſiunt, postea vero descendere in venteres, in quibus adhuc magis efficiantur, donec a lotio in vesicam protrudantur, neque oio renacitatem disrumpunt.

Quidquid sit, citum ex communiori autorum sententia colligit, hæc filamenta a pituita crassa in renibus genita vel ad eos ab alijs partibus tranſmissa provenire, certum est eam in calculum coagmentari posse, si causa efficiens calculi generandis idonea concurrat. Atque adeo illa filamenta signum calculi æquiuocum suppeditat.

Quod ad prognosim ipse citat. Calculus renum valde periculosus est; grauiſima enim mala, vt inflammationem, exulcerationem, dolores atroces, vigilas, virum deiectiones, vires, vrinæ suppletiones, aliæque lymphomata perniciosa interire conſuevit.

Si affectus hæc dicitur in fit parentibus & contraxit, incurabilis est.

Cum vitia renum & vesicæ in senibus difficulter curentur, ex Hipp. Aph. 6. sect. 6. Calculus renum in ea ætate, curatu difficilior vel potius insanabilis est.

Si dolor nephriticus ad plurimos dies perseueret, neque viliſis medicamentis curari valeat, mortis adeſt periculum, & equalem in propinquo est, cum frigidas partes extremas, & fudor frigidus faciem occupat. Vrinæ quæ primum tenues, postmodum verò crasse apparent & ærenæ in fundo reſiſcent, morbi solutionem portendunt.

Calculus cum vlcere renum coniunctus, incurabilis est: illa enim que lapidem frangunt, vix valde ea temperant.

Curatio doloris nephritici, & calculi renibus aut venteribus inheretis perficitur, viarum dilatatione ac relaxatione, calculorum, aut aliteris materie dolorem trictionis exclusionem, cause antecedentis reuſione, ac (sublatione) & doloris ipsius mitigatione. Quibus indicatibus frequentibus satietur remedijs.

Rad.althee & lilior.an.5. fol.malve, violar.parietar.
branc vrfior.an.M. fem.in. lin. & lenugrreci, an.Vnc.8. fi-
cum pinguium par.ij. flor.cham.& meliloti, ana Pj. Co-
quantur ad th. in colat. diffolue caffèa & cartholice.an.3. rj.
ol. litor. & violac.an. Vnc. i. 8. butyri recentis Vnc.ii. Fiat cly-
fter, iungendus itatem.

Remedio clyftere aperitur vena basilica cœbi dextri vel
finiftri, & mittantur lingua. Vnc.viii. vel i. pro viribus aut
pleuritide agrotantis: maxime enim neccellaria eſt phle-
botomia ad præcauendam inflammationem, quæ a dolore
perſeuerante excitari poterit.

Post vena ſectiõnem clyſter ſequens inſiciatur.
Flor.chamem.& meliloti. ſumunt. anethi, parietaria-
rutz, an. M. 6. ſem. anifiſceniculi: utrum, an Voc ſem. Fiat
decoctio ad th. i. In qua diſſolue diaphenici Vnc. ſem. tere-
binth viſello cui diſſoluitur vnc. 4. ol. anethini & ſcorpionum
an. vnc. ii. Mille, fiat clyſter.

Ad magis emolliendam, & dolorem leniendam, ex oleis
compoſui poterit, in hunc modum præmiſſo lauantæ.

Olei anethini & chamemel.an. ſem. ol. amigdalæ.
dulcium 3. 4. olei turaci vnc. i. Mille, fiat clyſter.

Eodem tempore totus admoñeatur parti dolenti ex de-
cocto primi clyſteris (additis ſemenibus anifi & ſcniculi) ta-
cto in hyſterico, cum ipongiis in eodem extrectis.

Ol. ſcorpionum compoſiti 3. butyri recentis, xan-
thæ galbæ, ol. lilior. & amygd. dulcium, an. vnc. i. Fiat lim-
mentum, quod illinatur parti locum. Vel itæ cataplaſma ad-
moñeatur.

Fol. malur. pariet. an. M. ii. petroleſini cum rad. M. i. rad.
taphani vnc. ij. Decoquantur ad putrilaginem, & contun-
dantur, addendo cepas ſub cineribus coctas an. ij. ol. lilior.
amygd. amar. & butyri recentis, an. vnc. ij. Fiat cataplaſma,
quod duobus linteis raris incluſum venter applicetur cali-
de ſecundum longitudinem venteris, & quoties refrigerit,
recalcet in fartagine.

Applicari etiam ſolet placenta ex parietaria vel ſola, vel
cum oleo permixta, itæ in fartagine cum oleo chamæ-
nel, amygdalamar. ſcorpionum, linteo raro oboluto.

Vel fieri poterit etiam plaxta ex cepis minutim diſſectis
in fartagine frictis cum alungia porci, aut oleis prædictis,
additis ouis v vel i. calidè applicanda.

Quia verò magna crudorũ humorũ ſabura hunc af-
fectũ plerumque conſtituit ſolet, poſt aliquot clyſteres
medicos (qui ſubinde repetendi ſunt dolore perſeuerante)
purgans aliquot medicamentum exhibendum eſt, præci-
pue in forma bolusæ tam facile reuoñatur, quia humido-
res agrotantes plerumque ſolent eſſe naſcibundi.

Caffæ recentè extractæ cum olamygdali, dulcium,
vnc. 3. diaphenici 3. 4. 1. habet. pulv. 3. 4. Cum puluere liquiritæ
tragacanth. fiat bolus.

Si egger non poſſit bolum deuocare, diſſoluatur purgan-
tia in decocto maluarum.

Diligenter autem animaduertendum eſt, purgans medi-
camentum non eſſe exhibendum, priuſquam dolor fuerit
aliquantulum remiſſus. Nam dolore valde urgente, cathar-
ticum exhibitum necem vehementem, ſæpè non purgat, quia
tunc temporis omnes partes ſeſe contrahunt, & medica-
mento non opitulantur.

Attamen eo tempore vomitus poterit conuenire, quo
etiam ſabura humorum educatur, & ſic reſultio à parte
affectæ non raro natura ipſa per le. urgentibus doloribus,
hanc moſtur euacuationem, & eaque abioluta leuamen ſub-
ſequitur.

Vomitorium blandum itæ compoſui poterit, quod & do-
lorem demulcebit.

Aque tepide Vnc. iv. ol. crudæ Vnc. i. ſyrupi acetofi
ſimplicis Vnc. i. ſi fiat vomitorium.

Si vehementioribus vii libeat ad ſalem vitrioli, aut mer-
curium vitæ conſurgendum erit, quibus ſe nephriticis do-
loribus citò luguante Anguſta ſala pluriatur.

Ante & poſt purgationem, per os exhibenda ſunt, quæ
vias laxant, & dolorem leniunt. Cui viſi conſert (ſyrupus de
althæa ſemel frequenter exhibitus). Sed quia hic ſyrupus
ſemper non habetur in officiis, ſimplicior in hunc modum
parari poterit.

Rad.althee Vnc. iij. Coquantur ad th. in colatura diſ-
ſolue caffèa, ſem. Vtatur frequenter.

Lulepus ſequens ad vias leniendas frequenter exhibendus.
Hordei integri P. i. cicor. rub. P. 6. ſem. malue & althee,
an. 3. n. em. quantor frig. malua 3. 4. ſicum pinguium pa-
ria iv. ſebelen paria iij. liquiritæ. rad. Vnc. ſem. Coquantur ad
th. ſem. In colatura diſſolue ſyrupi capivi. vnc. V. Detur
in quatuor doſes 8. aut ter in die.

Pro poti decoctum ex rad. althæ. Vnc. i. ſem. hordei P. ij. li-
quirit 3. vi. in aquæ th. rad. th. conſumptionem, erit viſi-
ſimum.

Vel ſiant iulcæ ex malua, althæa & cicoribus rubris,
cum multo butyro & modico ſale: vel eadem decoquantur
in aere pingui.

Vel exhibentur emulſiones ex quatuor ſem. frig. malui-
ribus paratæ.

At præ cæteris remedijs vias emolliæ & laxat, decoctum
lenit ol. amygd. dulcium recouert extractum quod ad 3. iij.
vel iv. per le. vel cum vino albo, aut decocto malue, althæe,
liquiritæ & cicor. rubrorum exhiberi poterit. Vel fiet potio
ex olei amygd. dulc. & amarum paribus æqualibus,
qua amygdalæ amaræ ad pellendum calculum etiam con-
ſerunt.

Pottero die ab hac vena ſectiõne, vena etiam poplitæ,
aut malloca appendenda eſt ad directo partis affectæ. Sic enim
ab ipſa ſic deruatio, ex eaque viſplurimum egrotañtes le-
uamen maximum ſolent percipere. Quod præceptum ab
Hippocro. traditum eſt 6. epid. part. 1. Aph. 6. & ab Actio
lib. i. cap. 5.

Imò verò affectu vitæialis procedente, à pertio hamo-
rhorum ex viſplurima, iuxta Aph. Hippo. 1. ſect. 6. M. ſem.
cholicis & nephriticis hæmorroides iugiter uerſe pñunt. Nam
ex eodem ramo pluriſco vena ſanguinis ad renes, veſicam
& hæmorroides.

Si ſomentis, linimentis & cataplaſmatis prædictis dolor
non ſatis leniatur, in ſemicupium æger demittendus, ex de-
cocto emollientium compoſitum, addito vino albo: hoc
enim mitelcit dolor viſplurimum, ſaltem quando æger in
eo reſidet. Non tamen frequentius ægti demergendi ſunt,
quandoquidem vires diuturniori balnei vii admodum
evoluuntur.

Ac denique dolore nimium ſeuiente, ex quo vigilie dia-
turnæ, ac virium exolutio ſequatur, ad narcotica conſu-
gendum eſt, & philoni romani 3. iij. clyſteri admixcenda,
vellaudani opiat gr. v. aut vi. Vel ciuſdem laudani gr. iij.
aut iv. per os exhibenda. Vel denique ſyrupi de papauere
3. 4. an iul. po conueniunt.

Pædictis topicis viſurpat, in dolore diuturniori non
parum proderit emplaftrum de meliſtoto, cum ol. chamæ-
nel anethino malaxatum.

Hiſce remedijs, aut etiam eorum nonnullis methodicè
viſurpat, dolor nephriticus viſplurimum curari conſueuit,
iterata etiam purgatione ſi opus videatur, aut medulla caf-
ſiæ frequenter exhibita. At verò ſi poſt eorum viſum dolor
adhuc exacerſcit, certum erit calculos grandiores renes &
viteres obſtrugere, qui diuretici remedijs, & calculum ſra-
gentibus & ex pellentibus, deturbandi erunt. Quorum ta-
men remediõrum delectus habendus eſt vii primò miora
viſurpentur, & magis temperata, antequam ad ſactoria ve-
niatur, quæ ſanguinem & renes inflammatione valent. Vbi etiã
corporis habitus ratio inuenda eſt. Nam obetum corpus
magis tenax, & gracile verò minus perſtere poſſet.

Horum autem remediõrum calculos inuimementum
ſragentium, vel expellentium materia inſuſa penè repe-
ritur apud authores, nos ſelectiorem tantum hic propone-
mus.

Rad. apii, petroleſ. bruſci, gram. & alparagi, ana Vnc. i.
rad. malue & althæe, ana Voc. 8. fol. parietariæ M. ſem.
anifi, ſcniculi, anethi, carui, dianthi, amoni, carthami, rutz,
cumini, 3. bacc. laurina 3. ii. chan. omniſ. meliloti, anethi &
ſiſachodon. an. P. i. Coquantur in vino albo ad medias. In co-
lat. th. i. diſſolue butyri recentis 3. iv. mellis roſæ 3. iij. caffèa
rubri Vnc. i. benedictæ laxatiue 3. 4. viſellum ol. nucum i.
olei nucum, anethi, vel limi Voc. an. Mille, fiat clyſter, qui re-
tinetur quibus horis ſi fieri poſſit.

q. Aquae fragariae, & saxifragae an. Vnc. ij. vini albi generosi Vnc. vi. colamydulae Vnc. ij. spirit. vitrioli 3. j. Misce pro tribus doibus. Prima datur calidae quantum ferre potest. Post horas lex deur secunda pari modo. Si etiam hac inefficax, quod raro contingit, tertia propinetur.

Paratu facilius fit rulepus ex aqua saxifragae, & syrupo violaceo, cum spirit. vitrioli guttis 15 aut 20.

q. Succ. i panetari sine igne extrahit 3. ij. succi limonum recentis, & olei amygdulicis extractis sine igne, an. Vnc. 3. j. Misce, fiat rulepus qui datur tribus aut quatuor vicibus mane, & sero Vel

q. Succ. limon. & vini albi, ana 3. iij. facchari candi 3. 5. Capiat loco iulepi.

De succo limonum hoc notandum est, cautum esse debere illius usum, quia frequentius aut nimia copia exhibitus, aphthas facit in ventriculo, unde licentia succo dicitur.

Pulule frequentes sunt efficacissime.

q. Salis prunellae, crystalli tartari, salis baccarum hederae, folia struisti, ana partes aequales. Cum syrupo aliquo appropriato, vel terebinthina, fiat massa pilulae qua capiat 5. j. singulis diebus mane.

Pulus sequens a Quercetano valde commendatur in Pharmacopoea.

q. Tincturae interiorum ventriculorum gailinae, & stercoris albi eiusdem an. vnc. dem pulueris pelliculae interioris, quae in putaminibus ouorum reperitur, 3. j. sem. herniariae, citrini an. 3. iv. nucleor. melip 3. ij. sem. anisofeniculi, ana 3. i. Reducantur in puluerem tenuissimum, de quo capiat 3. 5. vel 3. i cum vino albo.

Cum corticum ouorum adustorum a 3. 5. ad 3. exhibitus cum vino albo, potenter expellit calculum in vrinae meatibus haerentem.

Sanguis hirci praeparatus ab hominibus, tum antiquis, tum recentioribus commendatur, tanquam remedium excellens ad dissoluendum calculum. Dosis illius erit a 3. 3 ad 3. 4. Aqua ex sanguine hirci delibata per vitrea organa in B. M. miranda praestat. Sed hircus per mensem nutriendus est saxifraga, pimpinella, baccae nupiperis, petroleo, aliisque diureticis sine vilo potu.

Hartmannus vrinam hirci, tanquam stupendum remedium, commendat. In obstruente renum a calculo reualuol vrinam ubi preterea & vesicae a calculis in eam rationem detrahit omnia facit obstruere, non gustu quidem vrinae probe possit esse antisepticum est, si vrina hirci, recentissime ex vrinae ad hoc hircum cum vesicae extrahit potanda deur, & omne cum integritate, pulvis per se non fuerit applicatum. Sic enim calculus repente conuulsi sunt sine laesione vasorum, & pariter liberabitur.

Pulus millepedum ad dissoluendos calculos praestantissimus est, illiusque visus docebitur in calculo vesicae.

Insum etiam millepedum in vino albo paratum & diu continuatum ad idem restitit.

Vinum alkekengi ad Ariand Villamouane maxime commendatur, eo quod materiam calculosam ita educi refert, vt manu colligi possit. Fiquae hoc vinum contundendo frustus alkekengi cum vino albo, & colaturam exhibendo.

Sequentia vero in conueniunt vinu reuocari poterant.

q. Lapid. iudaei, pulv. lithotriptici lulliani an. 3. i. nucleor. perisicorum gummi tragacandae & nucleor. cerasiori, an 3. 5. Reducantur in puluerem, & cum terebinthina fiat bolus, qui deur in tres doses, mane & sero sumendus.

q. Raphani acerrimi dersi 3. ij. vini albi 3. iv. Macerentur per aliquot horas, deinde fortiter exprimantur. Colaturam capiat aeger bis ante ter horis conuenientibus.

Aqua labinae ad 3. i. vel 3. iij. sumpta calculum & arenulas potenter expurgat.

q. Rad. bismaluae in vino albo mundat 3. v. rad. bardane & grammis, an. 3. iij. rad. asaf. petrolei, valeriani, tenculi, contusuram, an 3. i. fol. capill. vepetris, saxifragae, pimpinellae, virgae asae, betonicae, an. M. u. sem. basilici, bardanae, carui benedicti, silenis montani, nucleor. capill. & perisicor. an 3. i. anisi folis 3. i. lapidis lyneis, iudaeorum, 3. 5. terebinthinae 3. i. languinis hirci praeparati 3. i. 5. croci 3. 4. vini albi 3. iij. Contundenda contundantur, & misceantur omnia. Desillentur in B. M. Huius aquae capiat

aeger 3. i. tribus horis ante cibum, superbibendo vini albi 3. iij.

q. Coriand. card. affini 3. i. liquiriae 3. iij. Coquantur ad Vnc. vi. Colaturam capiat per multos dies Calculosis & atenuatis renibus inherentes mirabiliter expellit.

q. Cepurum albatum minimum concurum 3. iv. facchari albi 3. i. vini albi 3. iij. Desillentur in B. M. ad fuscitatem. Dantur mane Vnc. i. vel tres per multos dies.

Apud praedictos commendatur cinis leopordum ad 3. 4. exhibitus cum aqua grammis, panetari, aut vino albo, cuius tamen visus rarissimus est. At frequentius usurpatur oleum leopordum Matthioli, cuius 3. i. per os exhibitum praedictis liquoribus calculi & retentionem egregie accelerat.

Chymici suos sales ad calculum exsolutionem maxime praedicant. Inter quos non nisi num locum obtinet sal silicatum & spiritum salarum, cuius 3. 5. cum vino albo egregie operatur. Idem praestat tartarus vitriolatus eadem dosi. Ad idem etiam laudatur spiritus salis vitrioli, & mercurius unicus, cum propriis vehiculis usurpatur.

Externus vero calculus in excusio adiunari potest si tota renum & vterum regio calculosis membris, oleo leopordum sumat, & afflicto p. dicitur.

Tum cucurbitulae plures, a rene afflicto ad pobem descendendo, secus sunt longitudinem vterumque scarificatione applicentur.

Illud re denot eadem pars ol. leopordum Matthioli, cui canthar. subtilissime puluer. portulicula addatur. Vel fiat linimentum ex oleo cerasi, de terebinthina & leopordum paribus aequalibus, maxime penetrans & summe efficacis, modo renum inflammatio non timeatur.

In viro medicamentorum calculum fragrantum & expellentium, iussu, quandoque non semel ex aut bis esse usurpanda, sed pluries, donec vis obstruere fuerint relaxata. Dum autem exhibentur, renis & vesicae fouendi fons balneis, fomentis, vasis, & cataplasmis, quod facillime negotio operentur. Nec non liquores aliqui tenuissimi partium, quales est vinum album vinolus, propianus sunt viciissimae usurpanda sunt ignis emollientia, laxantia, & vias lenientia, vt vias dilatentur, & aliorum remedium acrimonia temperetur.

Hic remediis curatur dolor nephriticus, & calculorum dissolutio atque exclusio promouetur. Quia vero huc afflicti dispositio & curatioque solent recedere ideo illius prophylaxis institienda est, vt quantum fieri potest, recidua inhibeatur.

Ac primum, si plethora adhaerit, vel calida hepatitis & renum interperies, confect venae sectio vere & autumno celebrata, praestantissime, aut leuiori aliquo cathartico. Deinde materia calculo generando idonea euacuanda est, antequam ad renes deducatur. Quod fieri poterit vomitibus, aut ter in mense excitato in is, qui facile vomunt.

Vel purgatio institienda est bolus cassia, diaphenico & rhub. compositio, in curatione descripto, cuius conuenienter alio medicamento singulis mensibus, aut bimetris, vel trimetris ipatio, secundum aegri habitum & humorum compositionem, in vrinae luteae quadra commodus fiet.

Vel si cacochymia magis vigeat, apozemate conuenienter vere & autumno viurpato ex purganda erit. Eo enim non tantum aniecedens causa, & remota subrahatur, sed etiam coniuncta portio quaedam, tum obstructions viscenum, quae hunc affectum frequenter comitari solent, admittit incidentibus & detergentibus, conuenienter dissoluantur.

Vel apozematibus vice decoctum galli veteris usurpanti poterit, in hunc modum compositum.

q. Polypod. querc. sem. cathartici, ana Vnc. i. 5. thymi, & ephrym. ana 3. i. sem. cumini, anisi, anethi, hor. icudi, carui, cardui benedicti, ana 3. i. fol. fenae Vnc. i. 5. rutib. gummi mosi Vnc. sem. cinam. 3. i. crystalli tartari Drach. i. Contundantur & misceantur simul ex qua mixtura vter galii veteris eufuerati impleatur, deinde coquantur, donec galii caro ab offibus separetur. Colatum iuleum capiat aegri quatuor doses maturas.

Vel usurpanti poterit pulvis sequens a Sennandro commendatus.

datus, cuius viū testatur multos a doloribus nephriticis fuisse praeteratos, in quo vero liberatos, in dolore praesente eum exhibet cum successu.

¶ Folium vici 4. hab. opt. 3. 6. turbich. Drach. 6. hemo-
dactyl. 3. 4. polyopod. 3. 6. cinna. zin. 6. m. l. m. l. m. l. a. x. i. r. a. g. e.
sem. genit. an. 3. Pulverem subfinit. Dosis autem
a 5. j. ad 3. 6. cum vino albo, vel rubello tenui semel in
merid.

Carolus Pifo pulcris frequentibus singulares effectus praedicit.

¶ Anisi, marathi, cui cumini, an. 5. j. cortiandri prepar.
5. liquiric. sem. bardanae, an. 5. j. sem. cinna. galange. ana
3. 6. sem. milii folis, genit. an. 3. 6. pul. diatr. frig. 3. 4. di-
gridj 3. 6. fennae orientalis ad popos omnium, fiat pulvis.
Dosis 5. j. cum infuso ciccerum rubroetum.

¶ Vel syrups magistralis in hunc modū componi poterit.
¶ Rad. alparag. gram. althae. bruici & petroleini, ana
vnc. j. fol. betonicae, pimpinellae, laxifrag. parietariae, adian-
thi, polychrichi, an. 3. 6. sem. ocymi, petrolei, macedonici, milii,
folis, genit. bardanae, fennae montanae, an. 3. 4. liquiric. ra-
f. sp. paulularum mundatarum & pelypod. querc. an. vnc. j. Fiat
decoctio ad 3. 6. sem. in colat. inunde fennae mundatae vnc.
3. 6. agarici albi vnc. 4. 6. mezberia Scrup. 4. Bulliant parum,
& fiat & pressio in qua dissolvat sacchari albi 3. 6. Fiat sy-
rups pericōdo coctus, de quo capiat vnc. 3. 6. semel, aut bis in
menſe, cū decocto hordei, granis & ciccerum ruborum.

¶ Vel in magna cacochymia fiant pulv. ex aloë & agarico,
quorum dup. vel tri. affluantur alterna diebus ante pran-
dium.

¶ Post purgationem quaedam diaretica vsurpanda sunt, vt
materia muſculaginoſa, tum etiam aeneſis calculi vias vrina-
rias oberrantes educantur.

In hunc finem parari possunt decocta ex diureticis, in
syrupo magistrali descriptis, compoſita, & cum saccharo in
sulepi, vel apozematibus formā redacta. Vel etiam cum pul-
lo galinaceo, vel carne hodiina, aut vervecina, parari pos-
sunt infusa in multis diebus fumenda, bis in anno post pur-
gationes vniuersales.

Tum post singulas purgationes nonnulla ex frequentibus
vsurpari poterūt, & semel aut bis in hebdomada cotinuari.
¶ Caudicum & flor. labarum 3. 6. calitrape 3. 6. Con-
tundantur, addōdo sacchari candi 3. 6. succi limonum 3. 6. 6.
fucci anarumum 3. 6. Decocto maluae althae tacta forti ex-
pressionē 3. 6. melleis 3. 6. 6. Destillentur lento igne, & non
permittantur comburi, neque liquores ex toto consumi.
Huius aequae capiat 3. 6. 6. mane, vt dictum est.

¶ Nucleeor melpul. & pulv. elictor. diatr. gacanthi frig. an.
3. 6. rad. ononidis sicca, liquir. raf. sem. melonum & milii fo-
lis, an. 3. 6. 6. laxifrag. genit. raphani, bruici, calitrape,
an. 3. 6. 6. althae & alparagi, an. 3. 6. 6. sacchari candi 3. 6. 6. Fiat
omnium pulvis, de quo capiat cochlear. 4. 6. mane, & singulis
mensibus nempe circa novilunium, plena luna, & media;
superbibendo parum vini albi, aut decocto ciccerum rubro-
rum, rad. eryngii & glycyrrhizae, fortiter postea se agitando,
aut deambulando.

Carolus Pifo et simi laudat pulcrem sequentem, cum-
que cum pulvere purgantē super ex co descripto, vsurparū,
phlores pyxides fragmentorum lapidum excussisse refert in
quodam praefide Lecharingo.

¶ Sem. althae & violarum, an. 3. 6. 6. milii folis & rad.
liquirit. an. 3. 6. lapidis Iudaei & lapid. spong. an. 6. 6. vi. pul-
id. dactylorum, melpulv. an. 6. 6. ceroforum, an. 3. 6. 6. sem. me-
lonis 3. 6. 6. Fiat pulvis. Dosis 3. 6. 6. fumenda cum pane azy-
mo vino albo madefacto, tribus diebus interlunio cuiusque,
& superbibendo infusum ciccerum rubror. alteratam rad.
althae, tenuiculis, & yngi, ononidis, petroleini, & granis ru-
pensis confusus, addendo vinum album, mel, butyrum &
fiscum limonum.

¶ Siccatum sequens a Zappata describitur insignis ef-
ficaciae.

¶ Sem. hyperici probē calcificati & in tenuissimū pulcre
redacti 3. 6. 6. confreg. rolarum aut violat. 3. 6. 6. melle, fiat ele-
ctuarium, de quo capiat aequ. 3. 6. 6. mane per biduum, tribus
horis ante passum, duabus primis septimanis; postea semel
in septimana per 15. dies, ac deinde semel in mense, vel per

longiora intervalla, secundum affectus virginitatis.

Conferua rolarum melioſa, quā cōtigit odorem terebin-
thinae a femine hyperici impressam, licet conferua viola-
rum renibus magis consensat.

Tabellarum sequentium vias poterit esse tutissimas, &
efficacissimas.

¶ Quatuor sem. frig. maior. mundat. glycyrrhizae, an.
3. 6. 6. sem. pimpinellae ocymi, petrolei, macedonici, cuius mo-
sch. an. 3. 6. 6. pul. aromat. rolar. 3. 6. 6. sacchari in aqua alkenen.
g. dissoluti 3. 6. 6. Fiat tabella pond. 3. 6. 6. Capiat vnam ma-
ne tribus horis ante passum, superbibendo aequae ononidis,
aut herniariae 3. 6. 6. cum vini albi 3. 6. 6.

Vinum aliquando in curatione descriptum, si per inter-
valla exhibebatur, omnem materiam calculorum educere
asserit Villanovanus.

In omnium diureticorum viā hoc perpetuū obseruan-
dum, ea non esse frequenter vsurpanda, quia trahunt ad par-
tem affectuā, deo semel aut bis in menſe, vel aliquando per
maiora intervalla exhibere iusticia, corpore tamen prius
purgato, ne aliari partū cacochymia ad renes deducatur.

Attamen terebinthina in vsum frequentiorē venire po-
terit. Retest enim Amatus Lusitanus *curatioe 68. cent. 2.*
monachum quendam, cum articuli morbo, simul & ne-
phritico corripi soleret, & pulv. mediorum generis, mul-
tis frustra tentatis, comaleſceret, tandem terebinthinae viā
intra sex menses liberum a dictis morbis curavit. Deglutie-
bat autem singulis diebus terebinthinae particulam nucis
magnitudine saccharo admixtam. Ratio autem cur tere-
binthina frequentius vsurpata non noceat, ficit alia diu-
retica, ea est, non iudicio, quia vrinam movendo ficit alium
laxatū, vt crassiores humores per alium disturbentur, qui
ab aliis diureticis ad renes deducuntur.

Vulgo autem vsurpari terebinthina per intervalla, quae
modum aliū diuretica, tum sola, tum aliis medicamen-
tis admixta, in hunc modum.

¶ Terebinthinae in aqua laxifrag. vel parietariae decies
lotz 3. 6. Cum saccharo hat bolus. Vel

¶ Calit. recent. extracta 3. 6. terebinthinae 3. 6. 6. pul-
liquir. 3. 6. 6. Melle fiat bolus Vel.

¶ Terebinthinae 3. 6. 6. pul. lithontripici 3. 6. 6. Melle, fiat
bolus Vel.

¶ Terebinthinae 3. 6. 6. pul. 3. 6. 6. Melle fiat bolus. Vel

¶ Terebinthinae 3. 6. 6. Inaurat. in lamina ferrea candente
vt possit in pulverem reduci, cuius dosis erit ad 3. 6. 6. cum li-
quore idoneo.

Zacutus Lusitanus *observ. 98. lib. 2. Prae. admir.* balsami na-
turalis vires ad calculos expellendos mirē praedicat, coque
liberatum esse virum sexagenarium, qui per dies odon-
cim vrinę suppressione a copia calculorum passus fuerat.
Is primo guttulis aliquot balsami cum oleo amygdalino
hauriens, dosim vtrinque augendo singulis diebus, iuxta vt
tandem ad balsami 3. 6. 6. olei amygdal. vnc. 4. 6. ascendit.
Intra decem dies calculi sex excrevit, & eisdem auxilii
beneficio in posterum praeteratus est, dimidiam ol. amy-
gdalini vnciam, sex balsami guttulis permixtam ieiunio sto-
macho absorbens, cuius praedicti olei, subulolam vrinam ex-
cremens, in multis annis vitam produxit. Si balsamum
Orientalē desit. Peruvianum erit vsurpandum. Idem Zacu-
tus in eadem observatione, aequam nicotinae praedicat
his verbis. Ademum me plures calculos magnos, penum cōta tena-
cter impatiē, vsu filitris aquae ex mentana viridi extra-
cti in potum exhibita, per vrinam desturbat. Si ea desit eius
decoctio vtero cum vtilitate multa.

Septuaginta Vazandaeus praecceptor meus, mirum in
modum probat, ad prophylaxiam huius affectus, vsu aquae
nostratrum Balneicanarum, cuius etiam nos admirā-
dos sepe vidimus effectus. Huius autem verba summo iudi-
cio exarata, ex duacuna magni illius viris experta de-
prompta hic subnectemus. Nilum est, inquit, me quidem
iudici potentius praestant in vno remedio, pōt aliaturam cor-
poris purgationem, ad vias istas excrementis suis liberandas
& mundificandas, quā potius aquarum nostrarum Balneica-
narum, quae enim calore ex bituminali vrina profleſcit, fundant
liquorē, quosque crassiores mucus, & vsu calculos, si ad-
huc sint teneriores, intra 4. autem subsistens abradunt, quasi
Q. dicit.

et detergent fordes istarum viarum, & quantitate miris quæ affumuntur solent impuræ esse non tantum intestinarum, sed etiam renum & vesicæ quæ torrente quadam abire. Unde incredibile est dictum, quantum viderimus ex calculis istis hominibus fabricari, alluviam potum, cum virus derubatur. In quibus autem tantumvis calcificationem viscerum, præsertim tunc temporis virus adhuc inest, quædam quæque pullorum, verbi refrigerantibus temperata, autque temperantia & similia. Quibus ita consideratis, non veremur etiam potiusque ac propter homines, dummodò firmi sint viribus, non balneum dictarum thermarum præcipere, semel tantum in die circa auroram, munus prius renibus & hepate proprio quibusdam inunctionibus concitatis, usque istis relaxatis, incrementum huiusmodi capere vacentur. Locutus etiam posset, dum erunt domi si ita videretur mercedis, quæquæ empyratum contraxerint, quæ balnea demersis, ex aqua dulci, & refrigerantibus de humeribus parant.

Conferunt etiam non parum ad huius affectus præcautionem, aquæ minerales acidulæ & vitriolatæ. Quia non solum materiam inuiclaginosam atque tartaream, ex qua coagulantur calculi, dissolvunt & arenulas deturbant, sed etiam hepatis & renum calidam intemperiem corrigunt; ideoque in calidioribus dictarum partium intemperaturis huiusmodi aquæ erunt convenientissime.

Cum autem nature calidiores à prædictis remediis diureticis maiori ex parte calidis, aliquantulum laedantur; eorum loca sola magis temperata illis habebunt poterunt, quorum præcipua sunt.

Aqua liohorum, & filiquarum fabarum recentium, vel aqua hermarie.

Aqua limonum deßillata etiam commendatur. Limones integri in taleas diuiduntur & deßillantur in B.M. Ad magis refrigerandum cum lacte deßillantur vitlter.

Conferua fructus cy noerhodi, quæ diuretica est, ita tamen refrigerat, & a Cratone in hoc calculo laudatur.

Conferua flor. altheæ, vel malux, quæ leniendo & humefcendo vias urinarias, arenularum excisionem adjuvat.

Succus portulacæ inspilatus, & in pulvis redactus, 3j. pondere exhibui, renes potius detergit.

Flores granatorum calcificati, & 3j. pondere sumpti calculosam materiam expurgant.

Idem præstat spongia bedegaris exsiccata, & pari pondere cum liquore idoneo propinata.

Butyrum recens cum saccharo cando partibus equalibus mixtum, quotidie manè sumptum ieiunio stomacho, vias vrine lenit & abstergit, calculi generationem impedit.

Idem præstat anij gdaleæ amare, siquodæ xj. aut xij. comedantur.

Nec minores sunt efficaciae nucæ auellaneæ ante passum comelæ, quæ a Cratone commendantur, dicente se comperit habere, non paucos laus cruciatis calculi duæ affectus, vias auellanas liberatos. Quod quidem differet confirmat Amatus Lusitanus curat. 78. cent. 7. ubi sic loquitur. *Per qui neque istam patiebatur, & renibus non raro calidioribus per viam melleam, multum quærebatur; lumborum namque & videretur, mox totius ventris dolores & rigoris sine febribus. Pro quibus abegimus symptoma, melleis est usu remediis, frustra tamen. At cum præter spem ex curâ commendarimus, auellanas in vasis introierit, liber & sanus à tantis affectionibus evasit. Considerat autem illi vir quidam, si morbum præstigatum vellet, auellanas cum internis suis membranis comederet, ita ut primum & tunc, Caterum ille remedium considerant familiare, non solum intro mense eas comedebat, sed medio & fine Quorum assidue usa ita valuit, ut nunquam postea morbum perferens. Addit Amatus Lusitanus in scholio. Non solum vir hic de quo agimus, per auellanas eam sanus ex hoc mala affectione fuit, sed plures alij. Sunt autem auellanas hæ vulgariter, pontica nucis dictæ, quas Avic. inter eas medicinas quæ lapidum renem materiam absumunt præcipit. Sed quæ facilius operantur, dubium est. Anferit si sua fecerit, & facit ita in membranis interiore comperta. Sed non de iure alij, qui hoc operari sua nuclea parie elegit, emendat.*

Chymici spiritum salis laudant, illiusque guttas aliquot

manè cum iusculo, aut alio liquore exhibent.

Aqua tepida excocta à Zechio commendatur, sex, vel septem vicinarum pondere, ante omnem cibum bis, aut saltem in die pota; nihil enim, inquit, adeo rines à refrigerantibus viscosi & temperatis reddit. Ignosce enim eorum calor a quo tempore tandem extinguitur, ita ut in posterum ea tales præcreare non possint.

Pro potu vitatur æger vino tenui & paucifeco, cum decocto radicis eryngij. Quod quidem decoctum pro potu ordinatio Cratoni commendatur. Et nos egregios illius vidimus effectus. Sed eryngium marinum vulgari multo præstantius est.

Nunc illi à calculo præferunt sunt vfu ad potum ordinarium vini expressi ab vis acidulis, quæ vulgo apud nostrates rines non manant, ita ut vineam ex illis vis ad hunc vlium de industria condiderit.

Ad prophylaxiam etiam huius affectus non parum conducit renem intemperiem calidiorum corrigere cui rei proderunt remedia, in calida hepatis intemperie descripta, quæ etiam renem intemperiem emendare valent. Præterquam quod caliditas immodica renibus non raro ab hepate communicatur.

Inter cætera verò serum lactis per mensem integrum verno tempore visuratum præstantissimum est. Tum etiam aquæ minerales acidulæ & vitriolatæ omnia vliera inter se potenter refrigerant.

Inter externa balneum aquæ dulcis tepidæ frequenter visuratum, & natatio in illiusmodi caliditate tempore erit convenientissima.

Epithema lequens renibus etiam frequenter admoventi poterit.

Æ Aquarum lactucæ, nymphæ, & rosæ, an. 3. iij. acetici rosacæ 3. i. Mifce, admoventur valde tepide manè & sero.

Conuenit etiam lequens linimentum, præcipue hyemis tempore.

Æ Olor. nymphæ & violat. in aceto & aqua rosac. loturum, an. 3. musilag. altheæ extractæ in aqua parietaræ 3. vj. ccc. tantumlibat linimentum pro victione renium manè & vespere.

Temperat & renem caliditas immodica, lamina plumbea perforata, supra regionem renem continuo gestata.

Ac denique quia ventriculi cruditates materiam supeditant calculi generantur, istius etiam ratio habenda est, & roborandus ventriculus sumptis & admotis in illius partis imbecillitate descriptis.

C A P V T II.

De calculo vesicæ.

Quamvis ordinis ratio postulare videatur, ut omnes renum affectus senatim persequamur, tamen odor doctrinæ postulat ut eadem renium, vesicæ calculum subnectamus, eadem vtriusque sic naturæ & condicio; & maxima pars eorum quæ de calculi renum generatione diximus, eadem etiam calculi vesicæ conueniant.

Cautè igitur materials & effluens calculi vesicæ eadem omnino sunt, quæ ad calculi reni productionem concurrere supra retulimus. Hæc tantum in eorum generatione differantia annotanda est, quod pueri magis calculo vesicæ laborant, senes verò calculo renum magis efficiantur. Cuius euentus ratio à Galtradita est in 6. epid. sect. 3. quia nimirum crassiores, vrinarius, quæ in pueris frequenter ob ingluviem contingit, calore illorum blando dissolvitur, ac final diffunditur; nec in renibus moram trahit, adiuuante facilitate expultricis renium, quæ fortior est in ea ætate: sed lapsa in viciam abi residet, ac moratur diutius, quia pueri lucidius intenti, & diuturno somno indulgentes, longiora tunc morandi intervalia; adde quod vrinæ minus actis, vesicæ expultricem non irritat, donec copia grauius efficiatur: & sic lex ista retinetur, neque potest deinceps commodè expurgari per exiguum adque vrinæ canaliculum; præterea vesica ab vrinæ copia valde distenta, non potest tam eracæ se se contrahere, ut totam vrinam euacuet, sed aliqua eius portio in fundo remaneat, quæ est crassa illa, & cal-

culis

culis coagulantibus idonea. Senes contra frequenter emungunt eam materiam, quæ in vesica continetur, ampliorque ductus patet ad eius expulsiōnem. In renibus autem crassamentum illud moratur, quia viscidus est, necque potest dissolui ab effectu calore, aut transcolari obfistatē et quasi ariditatem in renibus iam contractam; unde Hippoc. in *Contra vitæ lapidem* in vesica non generari a decimoquarto ætatis anno, usque ad sexagesimum, nisi prius extiterit.

Fernelius novam de calculi vesicæ ortu opinionem proponit, dicens omnem calculum in vesica contentum rudimentum et renibus trahi et in vesica postmodum incrementum sumpisse. Quando nimium calculus et renibus excidit per dolorem nephriticum, si grandisculus sit, in vesica subsistit, ibique novæ materie appositione sensim accrescit. Adferit etiam se in contritis vesicæ calculis nucleum quemdam in medio repositæ et renibus exturbatum, diuisti a reliquo integumento coloris et substantiæ. Neque viquæ sit aliquam offensus calculum in vesica habere, qui nephriticis doloribus antea dixerunt non fuisse.

Verum hæc sententia à probatis auctoribus non paucis rejicitur, quia experimenta prædictis contraria afferunt; quæ plurimos naturam calculos ex puerorum vesicis extractos, et vassæ allicentes nucleos habentes, à reliquo integumento, nec colore, nec substantia vilo modo diffimilis. Et certe vulgaris experientia nobis aperte demonstret pueros calculo vesicæ laborantes, nunquam doloribus nephriticis affectos fuisse, quod læpissime contingeret, si calculorum rudimenta à renibus extraherentur. Verum quidem est in adultioribus non raro, calculos à renibus deturbatos in vesica contineri, et per quæ materie additione paulatim incrementum. Sed illud semper ita fieri negandum est, et constanter asserendum quæ plurimos calculos eorumdem sumere in ipsa vesica.

Diagnosis calculi vesicæ difficillima est, præcipuè in principio quando calculus exiguus est; grandior enim factus, lætas evidentes notas præ se fert. Nos vero eam quantum artis beneficio præstari potest, elucidabimus.

Primum signum est. Dolor in collo vesicæ, qui circa finem mictionis exasperatur, et ad glandis extremum exporrigitur, omnino similis, qui in dysuria contingit, et ab ea vix distinguitur in principio, donec alia signa apparet incipiant.

Secundum signum. Præuritus in pudendo, qui ægros cogit illud sæpe valde, et contrectare, ac veluti discerpere, molestant illam asserere conatus.

Tertium signum. Pondus in peritonæo & tota postin regione, cui dolore graue, quod fit a calculo grandiori.

Quartum signum. In calculo grandiori summa mingendi difficultas, cum summo conatu, partientium more, & vix suffulcilio guerant effluenti, cum mictione frequenti.

Quintum signum. Vrinæ suppreffio inter mingendum, vt in medio cursu subito supprimatur, calculo ad vesicæ orificium cum vrina delato, illudque obturante.

Sextum signum. Facilis exitus vrinæ resupinato corpore, quia calculus in ea positus à canali vesicæ longius recedit. Tum quando vrina inter mingendum supprimatur, si corpus relinquatur, & concutatur, liber fit vrinæ exitus, calculo ad vesicæ fundum translato.

Septimum signum. Frequens vix ærethio, quæ tum à retentione vrinæ procedit, tum à phlogosi vesicæ, quæ calculi attritione inciditur.

Octauum signum. Tenebris ac frequens desidendi cupiditas, quæ mingendi cupiditatem sequitur, propter consensum sphincteris ani & vesicæ, vno enim irritato, alter etiam irritatur, quia ramos recipiunt eodem nervo.

Nonum signum est, quod ægri quiescere non possunt, & in vno loco manere; sed valde inquieti sunt, crebro moventur, & cura alternatim exigantur; & si maior sit calculus, vix recti stare possunt, equitare vel ambulare per salebrosa loca, quia tunc temporis cervice vesicæ à lapide commodo valde contumitur.

Decimum signum est, quod ægri à nullo remedio leuantur, sed vt plurimum paues habent. Quia medicamenta quæcumque vrinæ vias perstringunt, vel novam materiam ad

vesicam deducendo, malū augent, vel pituitam abstergent, quæ lapidi circumducta, cum mitione reddit, & contra à denudatis aeris mordet tunica in vesicæ interiore.

Vnde dicitur signum si ex eo deprimatur, quod cum æger doloribus nephriticis obnoxius fit, & in fine paroxysmorum calculos excremere soleat, quos eorum dolorum causas fuisse certum est, si aliquando post dolores illos calculum excreuerit, vt antea solebat; signum est eum calculum, qui dolorem efficebat, in vesicam fuisse detrusum, in eaque retentum; vbi sensim incrementum sinit, & prædicta symptomata sensim auferunt. Ideo si quis à dolore nephritico liberatus, nullum calculum excreuerit, & post aliquod tempus vrinæ difficultate vix incipiat, maxima est retenti calculi coniectura.

Duodecimum signum desumitur ex Hipp. *Ap. 79. scilicet. Quibus in vrina arenas subsidentibus vesicæ calculi laborant.* Quæ Aphorismus multorum ingenia torfit Gaïenus in *illis commentis*, dicit, cum manifeste manum esse, quod Hipp. diuidiam illius partem omisit; siue enim in renibus, siue in vesica calculi generentur, arenas cum vrinis simul egrediuntur. Et ipse Hippocrates huic contradicit Aphorismis *lib. de internis affectionibus*, vbi veteres medicos reprehendit, putantes arenas esse signum calculi in vesica. Cardanus in *comment. vixidæ. Aphorismi* testatur se ab annis triginta arenas primo rubras, postmodum vno albas quotidie & copiose excreuisse, sine vlla calculi renium aut vesicæ suspitione. Adferit etiam vix & decem vnum reperiri, qui arenas cum loco non excreant, rari tamen esse, & qui renem calculo laborant, ac rariore multo qui vesicæ. Relectus etiam Hispanus magna ex parte arenas cum vrinis excremere, qui tamen parum lithiasi obnoxii sunt.

Nos superiori capite arenas distinximus, quæ calculum significare possunt ab iis quæ nullo modo indicant. Sed diximus esse signum valde æquiuocum. Fit enim plerumque vt robore calcitantes exputricis arenule alie penitus excludantur, nec vilo modo retineantur in renibus & vesica. Et quamvis huiusmodi arenule ceruus indicarent in aliquam tamen soli vesicæ tribui possunt. Atque adeo Aphorismus, vt verba illius sonant, semper falsitatem continet.

De his Aphorismi interpretatione si maxima orta est inter Beuerotium & Salmasium (viros doctissimos, & in autorum sententiis obliuionibus, aut mutilatis retinendis peritissimos) quæ integra vtrique peperit volumina. Notitum non est, neque instituti nostri ratio patitur in iis diutius immorari hoc vix itatentes, per omnium criticarum dissolutionem resolutionem, autorum sententias, quæ prima fronte veritatis, & quotidianæ experientie contrarie videntur, ad eum perpetuo sensum esse retrahendas, qui veritati magis conformis, & consentaneus est, etiam si termini sententiarum eum sensum pati non possint; qui in tali casu consensu sunt suppositi, & ab alijs (forte imperitis) adiecti, aut forte illas sententias integras, esse ab alijs inertas, vt sæpe Galenus dicit de quibusdam Hippocratis sententiis, quas ab alijs adiectas pronuntiat, vt ipse Hippocrates maculat per se minime ferentes. At verò Beuerotij interpretatio circa arenas subfidentem ad mentem Hippocratis non videtur insituta, neque magni vix in actu præcæto. Primò non videtur menti Hippocratis respondere, qui in præcedentibus Aphorismis signa desumit ex vrinæ contentis; quod suum propositum sequens sumit eam signum ex arenulis in vrina subsidentibus, quas dicit calculum vesicæ significare. At Beuerotius sensum illum inuertens, dicit Hippocratem esse intelligendum de arenulis, quæ per vrinas antea excremi solebant, si subsistunt in vesica, id est, retineantur, & non amplius excremantur, signum est illas arenulas etentas calculum in vesica coagulare. Hæc interpretatio, vt dictum est, menti Hippocratis non respondet; deinde nihil conuertit ad vnam præcæto. Illi enim qui arenas cum vrinis emungere soleant, quando habent intersticia in quibus tamen non sit calculus in vesica. Neque magnam habet vim quod Beuerotius notat in alijs Aphorismis Hippocratis, vbi ponit signa ex vrinæ contentis desumenda, non vti verbo subsistentis potius excretionis, V. g. *Quia prius aut sequentius mungunt; Quibus cum vrina crassa sursusque exeat, &c.*

At hic videtur nomine subsistentia, ut aliud quiddam significare videatur.

Verum nos ad vltimam artium omnia reuocantes, dicimus Hipp. in hoc Aphorismo non potuisse vii nomine quoddam excretionem tantum significante, quia distinguere debebat illas areulas, quæ calculum significant. ab illis quæ nullo modo cum medicare possunt: illæ autem areolæ (vt cap. superiori diximus) subsistent in fundo matris, aliz vero minime, sed tantum in parte parietis adherent. & ideo recte Hippocrates, vt illas areolas ab illis distinguat, dicit quibus lapidosa subsident, quæ alie areolæ, quæ non subsistent, non sunt calculi medicari.

Quandocumque igitur hic Aphorismus ad veritatem, & vltimam artium reuocandus est, quantum fieri potest, exillimus interpretacionem a Ioanne Zecho (in artis operibus exequatillimos), propositam, reliquis omnibus esse, antequodamque, cuius beneficii signum pathognomonicum stabiliter calculi vesicæ, & magnus Aphorismi vius elicitur in Medicina facienda, cum secundum omnes alias interpretaciones, mutatis reddatur. Atque vt debuit honor Zecho reddatur, a quod eo quicquid operibus caret, opere pretium duximus, ipsa illius verba transcribere, quæ habentur in libro consultationum medicarum, consultatione 38. Hippocrates, inquit, aph. 76. scilicet, a nullo, neque ab ipso Galieno haerens, vt docet, & expatit, bene prestat sententiam. *Quibus in vrina sabulosa subsident, hi vesicæ calculi laborant.* Quamquam sententiam, si tracione ad naturam, quam interpres Galenus sequitur, subsistens esse ex eo facile cogitur, quod in istis, ferè in vniuersis vrinis sabulosa, vix eorum vltima tempore, magis est effectus (vt vix ex illis sum) extra tamen vltimam vltima istius in puerum, & quæ alie post ipsum, vt propter aduocant, quæque tantum pueris ad Medicinam seruandam Aphorismus, vel non inuolueret, quod quidem vix addere possumus, vel fieri ex aliquo ex eo ambiguntur diffinita. Tota autem proposita diffinitio explicata ex illis verbis, (subulosa) proprie significat puerum diffinitum: itemque hoc voce, sabulosa, Græcè *ἄσπερος*, nihil aliud sonans: Hippocrates intelligere voluit, quod in istis, sine affluuio, vltima terra pinguis sit admixta, hoc est, istum, sine argillâ quid, veluti parum mucus, matris fundo tenaciter adhærens. Signum sanè lapidis in vris in vesicæ calculi pathognomonicum. Sed quantum in vris humanis, nihil est perpetuum, mirari non oportet si vndeque casibus effecti laborantes hoc signum deseruant, quod lapsi in vesicæ fistula exiunt, vt in illis, scilicet a Reuerendissimo Card. male Baluta obseruamus. Casum autem huius casus excrementis alie subsistens excrementum, hæcnon Zechus. Vbi autem coacti illius excrementi causam reddiderit, compertum nobis non est. Nos vero eam dilucida expostimus capite superiori, vbi ostendimus nonotam illam materiam, & sic vesicæ malè affectæ propriam excrementum, quando nimirum sanguinis coagulum, & supelliculæ humores ad se transfusos concoquere, & assimilare non potest, eo quævis mucilaginosam, aliam materiam conuertit, & aliam prout vesicæ distrahens a calculo vltimam excreant. Relegimus illam in hoc loco, quia ad eorum quæ supra dicta sunt, melius etiam plerumque lucere.

Sed vix adhuc reminet difficultas, quod nonnulli attingendo materiam puerilem, & mucilaginosam quodcumque vix excreant, quamuis a calculo vesicæ immanes sint. Et relet Cardanus loco supra citato Leonem quendam mucosum dum Angulim tantum pituita lente in matrice concreta sepe illi offensus, vt omni auctoris magnitudine lupare, & tamen lapidem nonquam habuisse.

Cuiusmodi respondemus, materiam mucilaginosam & vesicæ productam, eo distinguere ab illa quæ ex alijs partibus procedit, quod quæ a vesicâ, magis tenax & glutinosa sit, ita vt in fundo matris aut vni oreolæ potius tenetur adherere, nec post vix excreant vniuersis coactione excutitur. Quæ vero est ab alijs partibus, fundo matris non adheret, sed ea materia statim cum vix effluit. Hoc vix nos docuit, quod a nullo auctore hactenus est animaduertum, illa autem glutinosa maior excrementis vesicæ, &

propria illius natura dependet, quæ membrinæ est, & glutem hinc producentem idoneam, quæmodum videmus ex pelibus membrinæ aliorum animalium, glutem seu colla ceruicæ firmillimam ad vix vix mechanice idonem.

Hinc autem materiam glutinosam (ita argillam) vt vocat Zechus, a praua vesicæ dispositione ex calculo contracta provenire, nos inde probare possumus, patet ea superior capite dicta sunt, quod alibi citamus puerum duodecim annorum calculo vesicæ laborantem, quæ quorundam vix vix negotabat materiam glutinosam in fundo vtri adherentem. Polliam vero calculi vesicæ ademptus est, puer ille per mensem integram materiam post vesicam cura vix excreant, postmodum vero nihil tenuit. Quod aperte demonstrat, illam materiam ex vesicæ malè mala dispositione prodire, quæ cum non aliud post excisionem curari poterit, sed per aliquod tempus periclitari, illam etiam continuantem materiam glutinosam excreant, sed vix vesicæ curato, namquam amplius apparuit talis materia, quod ostendit eam non aliud, quam & vesicæ prouenire.

Sciendum etiam pro corone, hanc quidem materiam mucilaginosam prædictis conditionibus supputat quociens apparet calculi vesicæ presentiam indicare, non tamen, contra, quando non apparet, eundem absentiam significare; quia læpe contingit, vt calculus levis, & depositus, & nulla alperat donatus, aut quantitate minor, vesicam tantopere non offendat, vt inde praua illa distrahens oriat, & tunc vix clare perpendi reddunt. Igitur signum illud pathognomonicum dici potest, quatenus presentis, calculi vesicæ presentiam indicat; quamvis absentia eundem absentiam non significat.

Neque præterea digna est viro cordato hic obiectio, vel potius casus, quod ex nostra obseruatione supra, proposita talis materia cum vix excreant, quamuis calculus non elier in vesicâ quæ ante per excisionem ademptus fuerat. Sufficit enim calculum antea & nuperit aduoluit, quæ huiusmodi causa fuerit. Atque adeo talis materia significat calculum, qui vel iam adit nuperit aduoluit.

Altemum difficultas istius diagnosi signum, petri ab exploratione quæ sit per cathetere, & efficit in anum immisionem, ad quam tandem consuegendum est, vt illa omnino indubia reddatur. Quod etiam intelligendum est de eo quod vltimum contingit non de illis quæ semper. Aliquando enim calculus substantia mucosa, vel etiam cylindrica obnoxiu est, vt circa illius exoratio fieri non valeat; & lithocoma, vltima illi de oculo videmus.

Quod tamen de cathetere præcipue audiendum est: nam exploratio quæ sit per immisionem digiti in anum, longe verior est, & non solum calculum adeo offendit, sed etiam illius differentias quod magnitudinem, figuram, & nomenclaturam præstat.

Prognosis huius affectus, non nisi laboriosa & periculosa illatur potest. Laboriosa quidem, ex eo quod minimi tantum calculi per angustiam vesicæ meatum excludi possunt: grandiores vero, si durescit vlturi filici, conteri ac dissolui nequeunt: si vero molliores, & plures topheæ, ut alio quodam modo tribales, distoluti quidem possunt, longo effluuio remediis vix, quem vltimum aggrotantes ferre nequeant, & ideo vix curatio rarisime succedat, vt sapienter ad sectionem veniendi sit, quæ quæ plerumque quædam ceteris euentis docet cum plurimi ex illa operatione moriantur. Vnde Hipp. in iuramento, discipulis sacra monuit, hæc hanc sectionem aggrediantur, sed eam lithocoma perforandam relinquunt. In mulieribus tamen facillior est operatio, & periculi expers, quod lithocoma habere meatum vniuersum, & nulla sectione, sed simplici dilatactione perficitur.

Curatio calculi in vesicâ concretæ valde habent intentiones, quæ supra in reatu calculi curacione propositæ sunt, vt nempe materia illius antequam euacuetur, & resoluatur, quæ quæ generatio generatio probatur: materia vero conuulsa, quæ calculus ipse immutatur, atteratur, & dissoluatur. Quibus intentionibus prout remedia etiam ibidem proposita.

Et quibus maxime est effluuio aquæ ex corpore defluat, cuius

calus vñ per 40. dies continuo, nos calculum fabæ magnitudinem superante est vesicæ excrescitum vidimus.

Atamen & grauiſſimorum auctorum ſententia, & quotidiana experientia docet, medicamentis oꝝ aſſumptis vix æ ne vix quidem calculum veſicæ diſſolu poſſe. Vnde fit, vt ad lithothomiam, ſeu calculi chirurgicam extractionem, vñ priuſimum conſueſcantur. Quia tamen, nonnullæ inueniuntur huiusmodi calculo laborantium per medicamenta curatoꝝum, nos præcipuus hæc annotabimus vt cuique liberum fit efficaciore experiri remedia, priuſquam periculoſiſſimæ, & terroris plene Chirurgiæ ſeſe committat. Adde quod reperitur aliquando calculi ita molles & arenofi, aut recentior concreti, vt eos diſſoluere non fit impoſſibile. Nam durorum & fulceorum diſſolutio minime ſperabilis eſt.

Horatius Augenius ſem. 2. epiſt. medicinalium lib. 6. epiſt. 9. Ego, inquit, his in hunc diem calculum veſicæ ſtrictum vidi, prima caſu, mox deliberatione aqua matuta conſultatio. ne addita. Caſus fui. Filium ſancti Petriſci typographi Romæ expurgandum ſeſperamus, vt poſtea tutor ad inſanabilem accideret. Tentauerat enim antea omnia remedia vñ genera, tum à Mediciſ Venetiſ, tum Florentiniſ, præſcripta. Cum vix nullam vtilitatem ſubſequi deprehenderet, ſecuri cupidoſi ſacerdotis inſiſſe accedente, vt ſi ex ſectione moreretur, animæ ſuæ ſuſcit conſultum. Reſponſum fuit ex Societate Jeſu quæ audita conſeſſione ab agro, & ægrotæ morbi genera, præcipue illi pharmacum, vt dicebat, magna viſi, de quo & in ſe ipſo, & in alijs periculum ſeſſet. Exſperius placuit, neque ſaſti peruenit. Nam qui præcure incido debebat, liber ab omni calculo mox die ſuit. Pharmacum autem à Jeſuita ei datum hoc erat.

℞. Pulv. millepedum ʒ. i. ad ſummum ʒ. iv. aquæ vitæ Vñ ſem. auris cicurum rubroꝝum Vñ. ix. vel x. Capiat horis ante prandium quinq̃.

Ego vero inueniæ auctorum 18. calidæ & ſiccæ temperamenti totius corporis coratari, & aſſumendum quantitatē aquæ vitæ, & ubi ſingulis diebus datum aliſſi vix antedictum, hunc autem dari inſiſſi, & pro refrigeratione totius corporis, aqua fabarum & fragorum, ana Vñ. v. propuſari intermedio die, cum gutt. vii. olei de thalictanthe, & Vñ. x. ſolepſiſ violati. Hoc autem modo pharmacum præbebam.

℞. Pulv. aſſellor. præp. ʒ. j. aquæ vitæ ʒ. ij. decoct. cicur. rubr. Vñ. viii. Miſce capiat horis ſex ante cibum. Hac Augenius.

ſennetius cap. de calculo veſicæ, memorabilem hiſtoriam ref. et V Vilhelmi Laurebergii Profeſſoris Roſtochiens, ſi æ eodem acceptam, qui proſtricta iam ætate calculo veſicæ affectus, ac ſectiõis auxilio periculoſiſſimæ ſe ſe committere nolens, de alijs remedijs cogitare cepit. Primò ergo liquorem illum nephriticum celeberrimum, magno quæ apud Principes in pretio, & vix habitum expeꝝtus eſt, quia ita parat.

℞. Salis tartari albi Vñ. i. Aſſunde aquæ petroſel. ℔. j. Miſce, & per chartam bibulam cola, & liquor color crocoꝝ corticibꝝ arantiorum coſcolletur. Viſupauit etiam gemmam illam iudicam, quæda Hæſpania dictam ad calculum frangendam celeberrimam. Sed vñſiſ remedijs nullam vim deprehendit. Ergo inter reliqua, quæ ad calculum comminuendum commendantur, pharmacum ex aſſellis experiri voluit, quo duos adoleſcentes veſicæ calculo laborantes ſcilicet ſanatos eſſe. Horatius Augenius proſequitur.

Ad cuius imitationem, præmiſſis vñuerſalibus, & exquiliſta vñus ratione inſtituta, accepit aſſellor. præparat. ʒ. i. ſpiritus inſerpi ʒ. iii. iuris cicur. rub. Vñ. x. quo manè aſſumpto, prima & ſecunda vice à ſumpto medicamento, tribus, aut quatuor horis, quandam poſteriora compreſſione percepit, & quaſi imminens animi deliquium, vt neceſſe haberet theriaca ʒ. i. potioni admiſcere. Atque ita remedio hoc totos 15. dies vñſiſ. Sed toto hoc ſpatio, ne minimum ſubuli expurgari reperit. Itaque alia addenda ratus, ſequenti medicamentu vñſiſ eſt.

℞. Aſſellor. præp. Vñ. i. lepoſis præpar. ſangu. hirci præpar. ſpongæ rotæ. ſylueſtrum, ſem. viol. purpur. ana Vñ. i. ſpecierum lithontri ʒ. ii. Miſce, fiat antidotum. Cuius accept ʒ. i. decocti duntaxat Vñ. x. ſpiritus iuſſupci

ʒ. ii. Quod medicamentum vbi mane hora quinta hauſiſſet ſecunda vice, poſt horas plus minus quatuor, ſub pubis oſſe ad regionem olii veſicæ, magnos ſentire cepit dolores. Paulo poſt parum vrine profluſebat, & cum ea lamelle exigue, inſtar quædam piſcis ſubſeque: quæ licet aliquam viciſſitudinem habere viderentur, ad tactum tamen in labium reſoluebantur. Ita vt maniſeſtè apparetur tunica, vel cruſſam eſſe, à maiore calculo ſolutam. Cum medicamentu vñſiſ cum continuaret, interdum quarto, nonnumquam quinto die huiusmodi lamellæ & aſſiores & fragmenta ſepe grauiſſcula profluſerunt præſertim vbi lauſto aquæ dulcis vteretur. Cum vero & à calculo, & ab eius fragmentis oriſcium veſicæ eſſet ſanctum, ad leniendum dolorem medicamentis vñſiſ eſt. Atque horum medicamentorum vñ, 17. ſeptimanarum ſpatio à calculo liberatus eſt. Decodum hoc ſuit.

℞. Rad. glycyrrhiz ʒ. iv. altheæ, gram. ononidis ana Vñ. ſ. baccar. balicabi num. xv. cicur. rub. Vñ. v. var. paſſar. Vñ. i. ſem. quatuor ſrigid. maior. ana ʒ. i. bordei M. ij. Coque in aquæ alkæſſor. ononidis, fragorum. flor. fabarum, ana ℔. i. ſem. Colaturæ adde ſyrupi de althea Vñ. iv. Millepedes na præparatur.

℞. Aſſellor. vñuotum ℔. ii. Abluantur aqua ononidis, & à ſordibus purgetur, deinde vino Hæſpanico Petroſifimo diſſo indubitanter, coque leniſſimè, conſuſantur in ollis vitæ, quantò plures, tanto melius, cum in vñam, ollam coniecti, circa combuſtionem vel putrefactionem difficulter exſiccari poſſint. Hæc oleo lute diligenſer occuſe in furnum, à panis coctione calente collocentur, vt moderato calore exſiccentur, & in puluerem redigi poſſint. Huic pulveri ruſum inſunditur ſenſim vñum Hæſpanicum quantum ambire poterit, & ruſum exſiccatur. Itaque imbibito & exſiccato tertio repetatur. Quarta vice hoc liquore irroretur.

℞. Aquæ fragor. Vñ. iii. ſpiritus vitrioli ʒ. ſ. Miſce. Iterum pulueriſſeſſetur, & tenuiſſimè contritus, in vitro vñu ſeruetur.

Præter dicta remedia, vñſiſ aquæ ex ſanguine hirci diſſillatæ, vel vrine hirci recentior maſſati, tentari poſſet, modo in calculo ruſum propoſito.

Si medicamentis calculus frangi nequeat, ad operationem deuenire, quantum ſpericuloſiſſimam, neceſſitas exigat, ne æger cum grauiſſimis & diuicinis doloribus tandem conſicetur. Ea autem petunt artiſtem, & valde exercitium ſollicitudinis, vt debetè adminiſtratur, ſic enim, vñ priuſimum ſolet ſuccedere, nolique quamplurimos hoc modo ſanatos vidimus.

Medici autem manus hac in parte eſt, ante operationem corpus præparare per vene ſectiõem, purgationem vñ, tamque idoneam, proꝝ rei ſtatu indicabit. Notandum autem, minime periculoſum eſſe in mulieribus calculi extractionem, quippe quæ ſola meatuſ vñarij, qui breuiſſimus eſt, dilatione perſicuit.

Si æger curationem per ſectiõem reformidet, aut deſiſ peritus Chirurgum, etiam ne hepatitis veſicæ æruſſem, in quam ſepe incumbit, aſperitate ſua exulceret, lenientia remedia viſupanda ſunt, quæ ſua pro ardore vrine inſiſ deſcribentur.

Quod ſi forte lapis in æruſſem veſicæ inſiſ a ſus vrinam ſupprimat, lupino decubui, cruribus eleuatis, & corpore agitato decubitus eſt, den. totu aut inſiſ emolliente, tñ catheterè introſiſſo, quo lapidem in capacitatem veſicæ impellat.

C A P V T III.

De inflammatione renum, & veſicæ.

Q Via inflammatio renum, & veſicæ iſſdem curatur remedijs, ideo vñramque in eodem capite incluſimus, quoniam in diagnosi quandam habeant differentiam, quæ in ſequentibus explicabitur.

Eſt autem inflammatio renum & veſicæ, tumor illarum partium, ex aſſuſſu humoris ſanguinei, vel biliſi in propriam illarum ſubſtantiam eſſuſſi.

Non admodum frequens eſt partium illarum inflammatio.

Vñ i. 10

rio, ob substantiam earum solidam ac densam; interdum tamen fictile, quia renes carneo præditi sunt parenchymate, sanguini recipiendo idoneo: vesica verò licet angustior, & perperam sit, cum tamen sanguinem ad sui nutritionem, per ventrum propagans recipiat, non est dubium, quin illo nimia copia influente & extravalato inflammatio fieri possit: quemadmodum in alio corporis membranis, ut in meningibus cerebri pleura, mediastino, aliisque contingit.

Diutius illas inflammationes ex affluxu humoris sanguinei, vel biliosi produci, quandoquidem puritas, & melancholia in sanguine redundans, alium crassorem reddunt, quomodo densius earum partium substantiam subire possint: aut saltem exigua debet esse crassiorum istorum, humorum portio sanguine cum permixta, ut huic affectui producat, eodum etiam rarus contingat.

Causa hunc affectum producentes ex rebus naturalibus, non naturalibus, ac præternaturalibus desumuntur.

Ex parte rerum naturalium, minutius istarum partium congesta, & a parentibus contrita, vel magna substantia earum laxata, & rarior, & caliditas excedens illis ad ortu imposita, cuius ope humores copiosius attrahunt: atque juvenilis & senilis, ad inflammationem inducendum plurimum conducit.

Ex parte vero rerum non naturalium, ad huius affectus productionem plurimum possunt veniæremedica, partim per se, ut de bitum. & plurimum sanguinem, alioquin, ut viscositas ad eas afflicta, crapula, & vitæ vini generosis & interdictis; item, eorum saltem & pip-ratorum, annui perhorum grauiora; stupor decubitus in locis, in quibus excrucians vehemens, aut laboriosus, iniquum cucurbiturum, suppositiones, ut nensis, hæmorrhoidum, aut hæmorrhagie & naribus, quæ causas internas: plethoram scilicet & cacochymiam, multiplicat, & humores ad interiora viscera quasi relluxu quodam propellit.

Res denique præternaturales ad huius affectus productionem concurrentes sunt: sicut aut vulnera, renem, aut vesicæ regioni inflata, compunctio nimia, aut contusio istarum partium; febres continuæ, impuritates humorum, vel aliquid partium suarum illarum expurgantium per vias, ut in pleuride, emphysemate, leucis obliuione, metenterio, indurata, & similibus contingit: ac denique ipsarum partium affectus peculiare ad inflammationem in his accessum plurimum conferunt, ut calculus, dolor vehemens, & quicumque causa excrucians, exasperatio, urina ardor, vel suppuratio, & similia.

Signa inflammationis renem diagnostica sunt. Dolor in renis regione grauis, & aliquando pulsans, si locus in quo sit, atque affligitur, & ille dolor ad partes vicinas extenditur, ut agri neque sele erigere, neque pedibus inni valeant: tum etiam difficile in latus oppositum sele convertere, neque in illud, neque in ventrem decumbere possunt, quia incedit pars inflammata: idcirco perceptio in diuersa ratione agitur, & si interitum, vel aliquid corporis commota accidit, dolor valde exasperatur. Scrupulis autem doloris in quocumque latere percepti, ob notum, qui inde ad crus tendit, condimentum. Dysuria grauis laborantem agros, ab ardore urinae commutatione, & schoræ exasperatione a parte inflammata emouetur. Urina in principio tenuis est & flua, in progressu vero rubicunda & crassior eundem, sibi afflida, & acuta, acrotum affligit, quam sepe lequuntur, vigilia, delirium, atque grauis (supra) notata: hæc, & vomitus sepe affligit, quo bilis, pituita, ac varia reiciuntur.

Color infusus in aliquod inflammationis affligitur, quæ si partem occupet quæ renibus vicina est, similia propter symphoniam in eodem distinguitur, quod in quibus inflammatione, dolor ad costas, mochos, dorsum, & vesicam se extendit: sed vero inflammationis magis versus ventrem & maior apparet mutatio in aliis dietis, quibus, quam in renem inflammatione.

In vesicæ vero inflammatione dolor pubis regionem occupat, & perizoni, in quibus etiam paribus talis, & in talibus talis apparet. Ardor urinae perperam est, sed illa

etiam supprimitur, adstrictio vesicæ ductu à timore parit, Rectum intestinum affligitur propter viciniam, unde crabra defendendi cupiditas cum ardore proceperit: aliquando etiam alui suppresio, intestino à vesica inflammata compresso. Adiant etiam alia symptomata communia, quæ in renem inflammatione enumerata sunt, ut lebris, vigilia, delirium, sitis, & alia huiusmodi.

Prognosis horum affectuum non nisi mala, & valde anceps propterea potest: Interne enim inflammationes, præcipue in partibus ad vitam necessariis, perpetuo mortis periculum minantur. Magis autem letales sunt, si us delirium, aut comulio, aut grauis alia (symptomata) succedant. Ac si sudores frigidi, ac perfrigerationes extremorum appareant, mors in propinquum est.

In tenum inflammationem si hæmorrhoides superueniant bonum.

Si renem inflammatio suppetur, & rupe abscellu per urinae vias per euacuetur, saluti sper præbet. Si vero per emulgentes ad hepatis, & intestina viam moliat, periculum est.

Leuis vesicæ inflammatio cum hypostasi in urina, alba, & equali spem salutis pollicetur. Vesicæ inflammatio soluta aliquando, erysipelate in cure repente oborto, & urina copiosa emissa.

Curatio inflammationis in renibus & vesicæ, perficitur remediis resistentibus, demuantibus, refrigerantibus, ac modice repellentibus, modum, si vis, refrigerantibus, vel suppurantibus, si opus fuerit, aliis quæ quorum materia, & vtendi modus sequentibus exponitur.

Ac primum phlebotomia maxime necessaria est, apertendaque basiliæ reprensens affectu reni, bis, ter, quater, & paries modò vires consent, aliq. deinde fluxio consistat, quod ex dolore remissione cognoscitur. In vesicæ vero inflammatione eligenda est par dentra propter hepat ex quo velut sanguis fonte presumatur eiusmodi materiam profluere.

Dempta sanguinis multitudine, & facta resoluzione sufficienti per vias superiores, inferiores autem aperienda sunt deriuations gratia in poplite, vel in alio loco, tum etiam hæmorrhoides aperienda, postmodum si tumet, & aut promanens appareant.

Ad resolutionem etiam non parum conferre poterunt cucurbitule superiores & inferiores paribus a domo cum scarificationis, incisionibus, & ligaturæ dolorificæ externarum partium ad reuocandos versus exteriora humores.

Ante & post vesicæ fotionem, clyster emolliens & refrigerans iniiciatur, ac moderatè laxetur, cuique parua si quantitas ne tumores comprimatur, hæc forma.

Rad. altheæ 3. j. solanæ, violæ lactucæ ana M. j. prun. doic. paria 4. v. hord. mundat. & flor. violæ ana P. j. Fiat decoctio ad 3. viii. vel 3. iiii. oster. distille collas, vel diaphrami simplicis 3. j. violæ 3. j. vitellus ouorum maza. Fiat clyster.

Sanguinis ferme inhibetur iulepis & exalationibus ab hoc modum compositis.

3. j. aquæ endiuæ, lichen, & portulacæ, an. 3. vi. syrugi granat. 3. i. (syrugi) nymphae 3. i. M. i. lico, siue autem pro ist. doctibus, manet & lico huiusmodi. Vel

3. j. illud, acetosæ 3. j. solanæ, planta g. portulacæ, & endiuæ, ana M. j. iiii. papau. albi M. j. iiii. sem. & lico, ana 3. j. flor. borrag. A. iiii. & nymphae, ana P. j. Coquantur ad 3. i. deinde adde succi gramæ 3. vi. Vel

3. j. Amygdalæ & lico, ana 3. j. pincorum rostemum 3. j. sem. lactucæ, acetosæ, portulacæ, & papaueris albi, ana 3. j. m. Concoquantur, ut ante est, tendit affundendo aquæ hordei, vel lactucæ portulacæ 3. j. l. in colat. distille, sacchari rosæ 3. j. Fiat emulso pro 3. i. doctibus, in qua omnia iuranturissima frigida manent, quia diuretica cum dunt, aliq. vna si sita partes deducere possent, præcipue dum illa vi adhiecti in motu; nam in declinatione ex via esse poterunt. Vtiliter etiam addiderit emulsionis syrupus de papau. ad fluxionem potentius cohibendam.

Per clysteres etiam partes inflammata refrigerari possunt, paratos ex decocto nymphae prædicti cum olei rosæ aut violæ 3. j.

In principio harum inflammationum purgatio non conuenit, quia metus est, ne exagritati humores magis præcipitentur ad partes affectas: ita vt etiam alui fluxus ingens eo tempore superueniens, cohibendus sit, propter eandem causam. At sedata aliquantulum inflammatione, & inclinata morbo, purgatio conuenire poterit ex benignioribus composita, vt *maia, cassia, rhubarbarum, diaprunum, simplacatholica*, & *lynnæo* rosaceo, cum decocto *lactis, portulacæ*, aliorumque refrigerantium in aulepis descriptorum. Vel ex predictorum nonnullis bolus componi poterit.

Externus vero, ab ipso motu inditus, adhibenda erunt medicamenta refrigerantia, & modice repellentia, vt *epithemata liquida*, ex aquis vel succis *plantaginis, acetosæ, endiuæ, solani, rosarum*, cum pauco aceto, *luteo rubro & camphoræ*. Linimenta ex oleo rosaceo *omphacino, violacæ, cerato sanali*, vnguento albo refrigerante, vel *populeone, solis*, aut mixtis, addito pauco aceto; quæ applicari debent partibus prædictis singulis horis subfrigidæ.

Vel poterit fieri linimentum ex oleo integro fortiter agitato, affundendo parum olei & aceti rosacei.

Vel poterit parari optimum ex oleo rosaceo *omphacino*, cum aceto & succo *pylagoni*, aut *portulacæ*, cui etiam addæ, si libet, recentem oui vitellum. His imbuti panis admodum epithematis & linimentis parum opus & croci dissolueret.

Si dolor acerbissimus vtgeat, non erit alienum in huiusmodi epithematis & linimentis parum opus & croci dissolueret.

Poterit etiam fieri cataplasma ex farina hordei, cum succo *intybi, portulacæ, & solani*, adiecto oleo rosaceo, & vnguento *populeone*. Sed illud frequenter immutandum est, priusquam incalascit.

Hic autem tria diligenter obseruanda. Primo non effe diu immorandum in illis refrigerantibus, ne impediatur materiam coniunctæ diaphoresis, vel ne tumores isti scitibent. Secundo in vesicæ inflammatione minus astringentia, & refrigerantia esse admodumenda, ne accidat ichthura, quod symptoma per se est valde frequens in hoc malo, ac valde periculosum. Tercio cataplasmata in vesicæ inflammatione minus condensare, quam vnguenta, & linimenta, quia partem ponere suo grauant, ita vt difficilis multo dilatare valeat.

Potissimum igitur per breuissimum spatium refrigerantibus huiusmodi remediis vius fueris; si dimissis, post iteratam, scilicet phlebotomiam, & fluxione magna ex parte cohibita, ad mollimenta, leniter resoluentia, & chalybeata dicta veniendum. Talia erunt somenta ex decocto rad. *althææ, sol. maluz, violar, parietar. sem. lini, fenugr. maluz, bombacis*, cum flor. *chamæmelis, melicori, anthos & rosar.* ad robur partus seruandum.

Deinde admodumenda erunt linimenta ex oleo *linor. rosar.* cum pauco *chamæmelino*.

Inter chalybeata autem, & anodyna simul, non est præstantius vilius cataplasmate de *maia panis*, quod in hunc modum componitur.

℞. Medullæ panis albiss. ℞. i. Coquatur in lacte caprillo ad pulvis consistendum. Deinde addæ vitellos ouorum nu. in. olei rosar. Vnc. v. croci ʒ. sem. Fiat cataplasma, sepe immutandum. Poterit tantillum opi, & camphoræ, si dolor fuerit acerbior.

In vesicæ inflammatione, si metus sit gangræna, conueniunt cataplasma corroboreantia ex farinis *fabarum, orobi, lupinorum* in vino decoctis.

Vbi iam maxima pars inflammationis sedata videbitur, tum purè resoluentibus decoctis, & linimentis vtendum, vt reuicæ abstantur, quod est maxime optandum.

In toto morbi decursu symptomatum grauioribus, vt febri, dolori, vigiliis, suppuræ, vrinæ, & alio; ventriculo, aliisque partibus compatiens acurate propiciendum.

Est quidem quod ad febrem, dolorem & vigiliis attinet, certum est vacuante, & alterantia proposita plurimum facere ad illorum mitigationem. Illis tamen addi possunt epithemata, linimenta & oxyrrhoda, quæ hepatis, cordis, & cerebri regioni admodum solent nec non lumina vrgente necessitate, narcotica usque assumpta, cum per clysterem inieciat.

Peculiariter vero ad vesicæ dolores leniendos parari pos-

sunt glandes anodynæ; vel nodali ex vitellis ouorum cum pauco opio, & succo *hyoscyami*, vel similibus confectis, in anum immittenda.

Ichthuræ vero, aut dysuriæ vesicæ inflammationi frequenter accidere solite, remedia ex propriis capribus erunt desumenda.

Si renum inflammatio propositis remediis discutiri non poterit, sed ad suppurationem tendat, quod dignoscitur ex febris, doloris, aliorumque symptomatum augmento, tum etiam horrore & vomitu, pondere circa partem maiore, tum præcipue apparente, cum æger in partem sanam, inclinat; & motus naturæ adiuvandus est admodum cataplasmatibus ex radicibus, & herbis emollientibus, iem. *lini, flor. chamæmel.* Quibus coctis, tuis & cribratis adduntur *latræ, butyrum, æunguæ*, & olea idem viribus prædita. Quibus nisi abscissus ruptus cum vrinis se se expurget, pus in abdominis capacitate irrumpt, vnde motus repentina, vel febris hecica succedit. Aliquando tumor foras prodit, tumque vel cauterio potentiali, vel scalpello aperendus est.

Contingit etiam aliquando tumores illos indurari, & scitrosam naturam adipisci cessante febre, dolore tamen persistente, cum pondere sensu maiore & circumdaturum partium quodam stupore. Quod malum plerumque insanabile est, in cachexiam & hydropem hominem coniciens. Tentanda tamen illius curatio esse emollientibus, irridicentibus & digerentibus remediis, qualia in scitri hepatis curatione faciunt proposita.

CAPVT IV.

De Milla sanguinis.

Sanguis à multis partibus ad vrinæ vias transferri potest, & vrinæ permisceri, tamque sanguinolentam reddere; sed cum id raro contingat, & nos hic tantum renum, & vesicæ affectus elucubremus, de illa tantum vrina cruenta agere instituemus, quæ à renibus ad vesicæ vitium contingit. Est autem sanguis ab illis partibus quemadmodum ab omnibus aliis (vt in hæmorrhagiis narum, hæmoptysi, vomitu sanguinis, & fluxu hæmorrhoidali diximus) per anastomosis, nimis, aut diabolos, rarissime vero per diaporesim venarum, quæ ab illis partes deferuntur.

Causæ frequentiores sunt, sanguinis copia vel accimonia, vel calculus renibus impactus: à copia sanguinis præritim ruptio venarum potest contingere; ab accimonia erosio, vel apertio, seu anastomosis; à calculo etiam, erosio seu attritio venularum, & ipsius renum parenchymatis, quando calculus ei impactus per equitationes, ambulationem celerem, aut alium quempiam motum celerem commouetur, & in eo motu partes illas asperitate sua dilacerat.

Aliæ autem causæ præter repletionem, aut sanguinis copiam, ruptionem valorem efficere possunt, vt calidus, iustus, ponderis grauioris eleuatio, vel gestatio, motus corporis vehemens, & similia.

Qui à plethora inducitur fluxus sanguinis per vrinas, non tempet morbosus est, aut symptomaticus, sed interdum contingit bonis agri rebus, natura onus superfluum per illas vias deponente, sicut refert Aetæus, nonnullis per quosdam circuitus sanguinem mingere, eoque circuitu cessante, capitis dolores, oculorum caligines, & vertigines excitari.

Vesica etiam sanguinem effundere potest, si à calculo asperiori vulnereatur, aut humore acro erodatur; sed paucæ est illius quantitas, quia vesica membranosa est, & vnguis. Si autem sphincter muscularis afficiatur, aut vitæ canalculus, inde copiosior sanguis emanare potest, vel cefrenata venire interdum contingit, in primis si proflatum inflammatio ex gonorrhœa adferat.

Diagnos huius affectus respicit illius speciem, partem affectam, & causam illam committentem. Afficunt species sensibus obuia est. Facile enim est sanguine vrinæ permixtum agnoscere, est enim loturæ carni similis, & interdiu exquiri quidam thrombi in eius fundo resident. Aliis vero vrina litiuuo similis est, quando diutius moratur in vesicâ, siquidem

in illa maiora sanguis denigratur. Partem affectam sitis doloris ostendit, si enim in regione lumborum percipitur æquem affectum significat; si vero in regione hypogastrii, vesicam. Deinde sanguis a renibus profertur, vixit exquisitè melleus: ex vesica verè potius frequenter, & mepetixtus effunditur. Hanc diagnosi exprellit Hipp. iacobus Aphorismi, nempe Aph. 75. *vel 4. Quotiesque ipse, & repente sanguinem mingunt, ut a renibus venula rupa significatur; & Aphor. de calculo febribus. Si sanguinem mingant, aut grauius, vel si lividum urina habent, & dolor sit in uno, indicat vesicæ, & petinem, & perineum, ad vesicam labor est.*

Si a calculo metus sanguis procedat, illius signa apparebunt, capite proprio relata. In horum delectu coniectandum est, sanguinis copiam vel acrimoniam hanc afflicti producere. Copia sanguinis ex signis pueriorum apparebit, acrimonia vero ex signis biliosis aut in lancholia humo- ris in corpore dominantibus; tum etiam pueria illa, quæ per vias excreatur, grauius dyliariam, & multum sanguinis efflicere consuevit, quod in iunioribus frequenter contingit, huc pueræ salte generanda vaide obnoxia. Et hac ratione præteritis discernitur metus sanguinolentia, quæ fit ab acerbis humo-ribus, ab ea quæ fit a calculo, quod in hæc nephritici dolores, aut etiam lapillum excretionis præcellunt in illa veto æger nonquam antea calculo laborauit, & vixit clare, & limpide, nullis heterogeneis contentis infectæ appareat. Et non solum ab excretis immo- dicis, (quod vixque causæ commune est), sed etiam a solis animi pathematis affectibus excitatur, quando ab humo-ribus acerbis procedit, qui humulmodi pathematis maximè commouetur, ita vt huic affectui obnoxii possit itam, aut mororem, aut animi contentiorem, grauiem, in multum sanguinis plerumque soleant iacere.

Quod ad prognosin spectat. Copiosa vel frequens sanguinis per vias excreatur vaide periculosa est: potest enim in tabem, & hydropem agrotantem deducere. Si vero duratura sit, vulcus excreare potest in ea parte a qua sanguis emanat. Si aliam sanguis via vice coniungat, metum est ne periculum exiret lichuriam in vesica, coarctetur, vel alia graui symptomata pariat, in eadem concretens, & præuim inducens qualiteratem.

Curatio huius alii pro varietate causarum varianda est.

Ac primum si a sanguinis copia, vel acrimonia producat, curandus est primum phlebotomia, è directoris affecti celebrata, parca manu & frequenter vt maior fiat reuulsio. Cui etiam conferre poterunt eucubitalæ frictions, & ligaturæ in partibus superioribus. Immo si sanguis copiose fluat, eucubitalæ hypochondrii erunt adinuendæ.

Ad derivationem verò sectio malleoli, & apertio hæmorrhoidum consensite poterit.

Quando humores feruli, aut biliosi sanguinis excretionem pronouent, illi expurgandi erunt purgationibus in hæmoptoe propofitis, per interualla repetitis. Quibus etiam sequentia pro Medici a bitrio, lubrogari poterunt.

§. Rhab. parum torrefacti puluerat. Dr. i. coralli præp. 3. sem. fen. capilli, aut aquæ plantag. Vnc. iij. fiat potio. §. Castiæ recenter extractæ Vnc. sem. pulpa tamarind. Dr. vi. boli armeni orient. 3. sem. Cum saccharo fiat bolus. Post hæc reuulsiones & excretiones, vel etiam dum illæ celebrantur, si res vrgeat, ad ea veniendum est, quæ cohære sanguinem, ac venas contringere, & glutinare possunt. Quæ tamen statim apparente sanguinis fluxu vif-panda non sunt, ne citius quam par sit cohibitis, metastasibus alibi grumescat. In hunc vltimè maxime comendatur succus plantaginis recenter extractus ad Vnc. iv. vel v. exhibitus, mane & sero luptus, qui etiam ad quamcumque hæmorrhagiam vtilissimus est. Si tamen nimia ventriculi refrigeratio tinnatur, cum saccharo naphthæ decoquendus est.

Hæc oculum maxime laudatur à Foresto lib. 24. obferu. 13. Sape inquit, sanguis multum solo lacte oculis, nempe (samen) lactis ros. lactis, & Drach. 3. boli armeni vtriq. parat. Hoc idè expertum à Castanaia, Qui tamen precipit. ac post eius

assumptionem aliqui dormiat, neque se exercent. Laudant etiam Hollerus, & Duretus ex Hippoc. & Auicenna.

Decochiones etiam ex centaurio, æquales portulacæ, & lummaribus rubi ad hanc rem sunt efficaces, addita tertia parte succi granatorum acidorum, vel cydoniorum.

Vel ad iterum sanguinis temperandum, vtatur apozemate in plures doses mane & sero, in hunc modum compositum. §. Folior. lactucæ, portulacæ, plantag. & consolide maior. ana M. i. sem. dringid. maior. & minor. ana 3. i. iulib. par. iij. liq. ros. Vnc. sem. i. bol. i. mphæm. violar. & rosar. ana P. i. Fiat decoctio ad th. i. sem. In colat. distillat. gummi trag. acanthæ Drach. iij. sem. syrapi violæ. & de ros. ficis. an. Vnc. i. sem. talis promelle Vnc. sem. trochiscor. alibengii sine opio Drach. iij. fiat iulep. pro quatuor diebus.

Ad magis ineralandum, & sanguinem potentius cohibendum, possunt addi prædictis ayozemati syrapi de pup. vnc. i.

Pulueres etiam sanguinis fluxu cohærentes, vt coralli rubri, lapid. hemat. boli armen. terra sigillatæ, exhiberi possunt cum aqua rosar. & plantag. aut decoctis prædictis. Si morbus fit diuturnior, optata in hunc modum parari poterit.

§. Conferat rosar. & rad. fymphyti maior. an. Vocat. terra sigillatæ, boli armen. sanguinis draconis, corall. rubr. lapid. hemat. & trochisc. de carabæ, ana Drach. i. hypocistidos, granor. kermes & sem. plantag. ana 3. i. Cum syrapi de papauere & myrrina, ana part. æqual. fiat opuscula, quæ capiat magnitudinem callicæ masi & sero, i. superbibendo parum aquæ plantaginis.

Affectu etiam perleuerant, conuenientissimum est ægro per interualla exhibere decoctum myrrabalanorum, in sero lactis, aut alio liquore paratum.

Hollerus affirmat, & cum eo Duretus, ad multum sanguinis curandum trochiscos Gordoni esse infiar communem. Chrilophorus à Vega trochiscos de carabæ commen- dat, cum aqua plantaginis exhiotis: ilique senel tantum hora somni exhibita le hanc afflictum curasse affirmat.

Pro potu ordinario consensit nihil lenius cum vino mixtum, quod etiam mane infiar iuleporem exhiberi poterit. Huius compositio talis erit.

§. Lenticis sicci minutum concisi Vnc. i. aquæ fontis th. iv. Infundantur per horas xii. in B.M. valde tepido, vaide bene clauso. Colatura seneretur ad vltim dictum.

Quæ vero sanguinis grum nonnquam in vesica retineri solent, & grauissima symptomata inducere possunt illorum dissolutione consensit posca tepida, bibita per interualla, ex aqua maluz & aceto non valde acris. Acetum vero sit in minima quantitate, vt vix gustu sentiantur.

Externus vero topica adinuendur regioni lumborum, refrigerationis & constitutionis renum idonea.

§. Rad. bistortæ & fymphyti maior. an. Vnc. folior. plantaginis, portulacæ, æquale. polygoni, burse pastoris, ana M. i. malicor. Vnc. ii. granor. lumach. m. r. iij. poscid. an. Dr. iij. calycum glandum. lantali rubri & citrini an. Dr. i. rosar. rubrarum P. iij. Coquantur in aqua lerrata, & pasc. aceto. Colatura foueatur renibus tepidulæ.

Et eodem decocto poterit fieri inlelius, aucta dosi simplicium.

§. Vnguenti comitissæ & refrigerant. Gal. an. Vni i. sem. Abluantur oxyrato diligenter, & inungentur lumbi frequenter. Vel ad magis contringendum.

§. Succi plantaginis, gingiuaræ, an. Vnc. i. aceti Vnc. sem. olei omphacini Vnc. i. Bulliant ad succorum confum- ptionem. Deinde adde sanguinis draconis, mastiches, cort. granat. ana Dr. ii. camphoræ Dr. sem. vnguenti comitissæ Vnc. iv. ceræ q. l. Fiat linimentum, addendo aceti panacæ vinctiōis tempore.

Lamina etiam plumbea multis foraminibus perforata, & supra renes gestata, hæc vix est vaide idonea.

In eo sanguinis mætu, qui fit ex humorum acrimonia, jecoris ratio inuenda est, episthemata vnguentis, illius re- gioni applicitis.

Quando a calculo & arenulis fit sanguinis mætu, præ- missis excretionibus reuulentibus, & acrimonia demulc. & vix propofitis ad decedendum est, quæ leniter absterge- do renes ab infectu liberare possit. Huiusmodi sunt sequenti- §. Melle

q. Masse pilular.de terebinth. rhab. vnc. j. Capiat Drach. sem. mané cum syrupo de alba cochlear. q. alternis diebus.

Diebus verò vacatis ab usu pilular.umat ager alternatim puluerem & moriulus sequens.

1. Glycyrrh. rafa Drach. j. sem. 4. frigid. maior. mundat. ana Drach. sem. portulac. lactuca, ana 3. sem. trochilorum de carabe. ac cornu cerui vili purparata ana 3. j. sacchari ad pondus omnium fiat puluis reus, de quo capiat 3. j. cum aqua malua, in qua semen cydoniorum aliquandiu infusum erit.

2. Amygdalar. excorticat. & pineor. m. undat. an. 3. sem. alba a. alk. kengi. ana 3. j. sem. lactuca. papaneri albi, ana 3. sem. amyli. tragacanth. an. 3. sem. glycyrrhiz. Drach. j. sacchari vnc. v. Cum aqua parietaria, fiat confectio in moriulus. Capiat mané & vespri vni sem.

Efficaciora diuicta non conueniunt, vt pote quæ sanguinis fluxum promouere valent.

Ac denique aquæ vitæplote ad sanguinem cohibendum, renes refrigerandos, & calculos expellendos sunt efficacissime.

CA P V T V.

De vlcere renum, & vesica.

VLCUS in renibus & vesica tribus excitatur causis, abicessu diuturno potiù inflammationem suppuratam; humorum acrimonia, qualis est ea quæ mactam cruentam efficit, quæ interior facit, aut durans diutius, eas partes exculerat, aut a calculo asperodictas partes erodente. Potissima hæc causa frequenter efficit, hæc ordinaria; reliquæ vero infrequentissime.

Inter signa diagnosticæ, primum ac præcipuum est penis erectio, cum vna, quæ diutius periculis renibus in partibus vniuersis latens certissime ostendit. Verum verò renes, an vesica vlcere afficiantur, cognoscitur ex situ doloris, propt vel in regione lumborum, vel in pube aut per mero anitit. Præterea per a renibus procedens, velius coctum eisbalbum (sichetiaue, & minime lendum, quia parenchyma renum carnosum melius concoquit, tum pus copiosius efficit, vnde magis permixtum, quæ lacti similit, profundius totum longe potius inuicem pus ab ea separetur, & in partem residet. Est vesica vero emanans purulenta materia, pauca effluatque melius vni per mero, neque adeo coactas crudas, variegatas & grauiolens: pars enim exanguis & debili calore prædita, materia sufficiens elaborare nequit. Ex collo asperum vesicæ, aut meatu vniuerso, sine quo pus absque vniuerso sepe exoritur. His adde quod in vlcere vesicæ, aut aliis ceruicis, perpetua adest dysuria, & continuus doloris sensus partem istam iustitiam, quod in vlcere renum omnimò fieri solet, sed dilucida sunt dysuria & doloris interualla.

Profundiori vlcere existente, sanguis interdum copiosius effunditur, qui difficiliter cohibetur, lapsusque ramenta parum cum pure, vel sanguine excremento, neque caruncule ex renibus minutule vltimum, aliquando crassiores, quæp vterque difficiliter transiunt habentes, dolorem nephriticum parant, vlcere verò squamule, vel pellicule membranosæ, ac veluti furfuraceæ crustulæ dimanant.

Ac denique in vlcere vesicæ diuturno & calloso mucosa illa pituita producit, quæ in calculo vesicæ descripta est.

Quod ad prognosin attinet: cum omnia vesicæ interna pericula sint; ista etiam formidolosa & curatu difficilissima censeantur; quandoquidem perpetua sit ad eas partes humorum affluxus. Licet enim lenius suapte natura detergeret vi prædum sit, hoc tamen locum habere potest in statu naturali, quodolensur alienis qualitatibus infectum, non citius verò prauis humoribus, acres & salii cum eo permiscantur, exquirat rationem efficere, camque lousse possunt.

Reuocata renum & vesicæ vlcera curatio nem recipiunt; inueterata vero incurabilia sunt.

In sensibus non curantur renum & vesicæ vlcera, in iuuenibus aliquandoque non nisi magno labore.

Vlcera quæ a calculo sunt & fouentur, non nisi prius extracto calculo curari possunt.

Dolor, aliaque symptomata quæ vlcera prædicta committunt, vigiliis patitur, corpora consumunt, homines tandem in cachectiam vel atrophiam deducunt.

Curatio vlcium renum & vesicæ, quemadmodum & omnium aliorum vlcium, detestione & exsiccatione, seu consolidatione perficitur. In hunc finem sequentia valiter vsurpari poterunt.

Ac primum, si plethora adfuerit, vel in parte afflata inflammation quædam, phlebotomia celebranda est primum in brachio, potè verò in poplite.

Postmodum purgatio instituida est, eaque frequenter repetenda, vt vitiosi humores in toto corpore redeundantes, & ad partem affectam confluentes, educantur. Quæ tamen fieri debet medicamentis blandioribus, & tantum lenitibus, vt cussia, ana nna, syrupo rolar. hab. & aquarum, in formam bolus aut aliam solidiorum redacta; quæ in forma liquida ad vias vniuersas facilius deferantur, eiusque acrimoniam augent. Sic opiatæ sequens vsurpari poterit.

3. Polypod. querc. & glycyrrhiz. raf. an. vnc. 4. sem. quatuor frigid. maior an. 3. j. hor. viol. & borrag. an. 3. sem. iunibar. p. v. prunor. damasc. p. j. passilar. minor. vnc. sem. fenug. mundat. vnc. 4. Infundantur in aqua hordei per noctem. Masse bolusant & colesur. Polica distulose manne, in quanto liquor decocti soluit, & colatæ vnc. sem. cassie recenter extractæ vnc. 4. Coquantur ad opiatæ consuetudinem, addendo in hoc rhab. puluis, vnc. sem. Dosis erit vnc. j. semel in septimana, duabus horis ante passum.

4. Cassia vnc. ii. maneg. vnc. i. sem. pulpe sebest. & tamarind. ana vnc. 4. mucil. sem. p. j. j. Drach. vi. quatuor sem. frigid. maior ana 3. j. luccæ liquir. 3. ii. Cum syrupo, colat. solut. fiat opiatæ.

Vitiores erunt opiatæ prædictæ, si addatur mercurius dulcis, aut alius opone præparatus. Si quidem mercurius extrinsecus vim habet omnia vesica interiora & externa mundificandi ac consolidandi.

Inter purgantia recollentur terebinthina, & in hoc affectu valde commendatur, quia simul alium laxat, & viciis abstergit. Eaque cum puluere liquir. exhibenda est ad vnc. sem. cum aqua plantaginis loca. Præcipue vero conuenit, quando vniuersa valde crassa & mucosa est.

Vomitus in hoc affectu valde commendat Aniceana, rap. de vlcerebus renum. Africus, inquit, quæ renum vlcera curantur, est vomitus, præterea quæ mundificat, & euacuat, & trahit ad extrinsecam partem renum. Accius verò, & de separata renibus: Si quis, inquit, vomu mensis and. iter vomat, foris & renum vlcus, & quicquid inde mali accideret, possit dissoluat. Hos sequuntur necrosis complures, quorum nonnulli aque & olei repetitis ante partum exhibitione vomitus euacuant. Quo solo remedio sepe repetito, refertur hunc affectum curatum fuisse. At Rondeletius vult a cibo id fieri, cum a cibo melius vomant, & aquam tepidam exhibet, cum pauco oleo, simul inungendo os ventriculi oleo litor. ad eisdem relaxationem. Aduertendum tamen vomitum, progitandum esse in ips tantum qui iacile vomunt; nam vehemens vomitus vias irritat.

Potè debitas euacuationes & reuulsiones, ac detergentiam vniuersam progredierendum est. Quorum præcipua sunt: lactis, mucus horis in magna copia exhibitus, hydromel tenue, quod etiam mane iuxta potest ad vnc. vj. vel vii. & in potu ordinario vsurpari. Decoctum hordei & liquoris cum saccharo, eodem modo etiam vsurpantur. Cui pro potu hydroscacharum simplex substitui poterit. In hydromeli autem caliditas illius mercurialis, immensa frigida maior; vel ad magis leniendum, radix liquirit. & formicæ, malug. incoqui poterunt. Lac etiam assinum non solum detergit scroia sua parte, sed & callosa consolidat. Non tamen exhibendum præsertim febri. Vel ad detergendum simul & leniendum decoctum sequens componi poterit.

5. Rad. altheæ vnc. sem. iol. plantag. agrimon. capili. ven. & humitarum malur. ana 3. j. sem. alba. & melonum, eua. corticibus contusor. an. vnc. sem. granor. alk. kengi 3. j. visquirat. raf. vnc. i. hor. integri p. j. Coquantur ad m. in colat. distille mellis rosæ. vnc. j. sacchari candidi vnc. 4. Fiat iulep. de quo capiat vnc. vii. mane per decem dies. Quæ ad renum, vesicæ & vteri affectus exhibentur, magna diu sunt.

Præscribenda, ne eorum vis in media via dissipetur.

Loco illorum omnium, vilius usurari possunt aquæ minerales aluminosæ, & terræ, quales sunt aquæ nostræ Menesies. Quorum diuturno usu corrigi potest intemperies calidior, viciis mundificanti, & ad cicatricem perducit.

Nonnulli commendant, ad xhores viciis fontes ab humedibus, internaque vlcera expurganda & consolidanda (in ægris potissimum temperamenti pueri, totiusque viciis veneret aliquando infecti fuerint, & febri ac sanguinis fluxu non adfuerit, decoctum sudoris humi ex rad. chinæ, allapariæ, aut ligno fassifras, vel etiam guaiacæ, per triginta, aut etiam plures dies exhibitum; cum decocto secundario ad potum ordinarium, victuque tenui & exsiccante. Inter ea tamen ne vlcera nimis inflammantur visu illius decocti, iusculis refrigerantibus circa vesperam exhibitis, & mundificationibus tenuem ex vnguentis refrigerantibus temperari possunt.

Tutus & vtilius in quolibet casu decoctum sequens usurari poterit.

℞. Rad. (alsepar. vnc. iij. raf. ligni lentisc. vnc. i). ligni fassifras vnc. i. raturæ cboris, & cornu cervi. an. 3. v. iusculis & febri. an. Vnc. sem. ligni nephris. Vnc. vj. bord. mund. 3. j. Insud. per hor. xij. in aqua fontis 3. v. Coquantur ad 3. iij. pro v. doloibus bis in die sumendum, & stomachicis 3. j. cinnamomu.

Post usum detergentium, vbi vlcus satis mundificatum fuerit, (quod cognoscitur quando pus cum vna minore quantitate exsiccatur, idque album, & æquale, ac minimè foridum) ea quæ exsiccant, attringunt, glutinant & consolidant, exhibenda sunt; quales sunt trochisci sequentes.

℞. Boli armen. terre figill. & coralli rubr. an. 3. ii. gummi arabicæ & tragacanth. an. vnc. sem. Cum aqua agrimon. fiat trochisci pond. 2. ii. Capiat vni mane & sero cum lacte ouillo vitulato, vel decocto lymphæ majores.

At reliquis præterea, ut in illar omnium habentur ad vlcera renum & vesicæ detergenda & conglutinanda. trochisci Gordonii, qui simul dolorem leniunt, & ardorem vniæ temperant. Eorum dosis est ad 3. iij. in cum hydromelle, vel decocto hordei, quodam magis est detergendum; vel cum lacte caprisolæ, aut potius ouillo, cum magis glutinandum est.

In eundem usum opiatâ sequens potest usurari.

℞. Conferæ rosæ liquæ Vnc. iij. sem. portulacæ, plantag. myrrhæ boli armen. terre figill. sang. draconis. an. 3. j. raturæ cboris, & trochisci alkæ kengi. ana 3. sem. Cum syrupo, de ros. ficis, fiat opiatâ, de qua capiat magn. catinæ 3. bis in die.

Iulepi verò consolidantes in hunc modum componi possunt.

℞. Rad. lymphæ maior. vnc. iij. sol. plantag. & pilosellæ, an. M. j. summit. maluræ & capill. ven. an. M. sem. liquirit. raf. vnc. sem. amyli. gummi arabicæ, tragacanthæ, boli armen. an. 3. iij. sem. lactucæ & portul. an. 3. j. sem. rubr. P. j. Fiat decoctio in aqua pluviali ad 3. j. sem. In colat. dissolue sacchari Vnc. iv. pendiat Vnc. ij. Fiat iulep. de quo capiat Vnc. viij. mane per 2. aut xii. dies.

Pulvis etiam sequentes non parum conferre poterunt.

℞. Terebinth. aqua plantag. lotæ 3. iij. succi liquirit. & gummi tragacanth. an. 3. j. boli armæ, & trochisci alkæ an. Scrup. sem. Cum succo quisei, hanc pulvis, capiat 3. sem. mane & sero.

Maioris sunt efficacie in sequentem modum compositæ.

℞. Rad. althææ, & lymphæ maj. ficar. ana 3. ii. gummi arabicæ, cerassi, & prunor. ana 3. ii. obolus. myrrhæ, ana 3. iij. sem. papav. alb. & alkæ an. 3. i. 6. campore 3. j. Terantur omnia subtilissimè, & addita tertia parte ponderis omnium, i. cerussæ, autem seu diaphoretici vulgaris finissimi, cum q. i. terebinth. Venetæ, fiat massa pilular. de qua capiat 3. i. mane, & sero longè à pasto, superbibendo parum aquæ potus ordinarij.

Si doloris fit operatio terebinthine, eius loco succus liquiritis sumatur, in aqua panaturæ dissolutus ad formandam massam.

At præ cæteris lac vaccinum recentem multum ad eryth. virus quantitatem, cum boli armen. veri 3. 6. haultum, singulis diebus matutinis maxime coasere testatur Fore-

stus ad vlcis consolidationem. Dicitque hoc vnum esse, ex arcanis præceptoris sui Hebdæ, quod & vlcus expurget & simul consolidet.

Quercetanus in Pharmacopœia, commendat aquam ad gonorrhœam. Quæ cum vlcera ex gonorrhœa contracta consolidet, idem in tumbis præstare potest.

Hartmannus verò laudat opiatam, confectam ex confer. raf. partibus duabus, & pulvis sem. hyperici parte vna, in fine curæ per aliquot dies vesperi exhibitam. Idem curationem vlcis feliciter absolvi posse asserit visu mercurij dulcis ad gr. iij. in aqua plantag. quotidie semel atque iterum exhibiti.

Maioris est efficacie mercurius diaphoreticus et astra, & se frequenter calcinatione paratus, vt hucus tandem euadat & igni satis valido resistat, qui in omnibus vlcibus internis persanandis, iusta dosi, ac diu usurpatus mirabiliter conducit.

In vlcibus admodum inueteratis decoctum aristolochiæ rotundæ in vino albo paratum, & saccharo addito, multum confert.

Præterea animaduersione dignum est, quod scribit Garcias ab Horto, in vrbe Goa alio probe tulum & cum lacte mixtum is propinari, qui vlcere renum, aut vesicæ laborant vel qui purulentes excreant vrinæ, & egros illico curari.

Exterius vero, ad consolidationem vlcis adduandam, sequens vnguentum admodum poterit.

℞. Succi plantag. & solanij 3. iij. ol. rosæ. omphacini 3. iij. lacti 3. i. litharg. yri tenuiss. puluerat. 3. i. 6. cerussæ lotæ 3. 6. tuthiæ subtilissimè pulueratæ 3. ii. sang. dracon. 3. 6. Kedacantur omnia ad formam murtis.

Sequens etiam admodum poterit absente inflammatione.

℞. Olei rosæ, mastich. & lentisc. an. 3. ii. myrrhæ, aloes, sac. cocollæ, sang. draconis. an. 3. i. amyli, tragacanth. an. 3. iij. dyrracalamit. 3. i. ceræ albæ q. i. Fiat vnguentum.

In vlcere vesicæ peculiari conueniunt iniectiones bis in die usurpæ, primum detergentes ex hydromelle, sero lactis, aut decocto hordei, cum pauco melle rosæ; postea vero adstringentes & consolidantes ex aqua ferrata, in qua rad. lymphæ, myrrhæ, alumen, sac. cocollæ, & tragacanthum bulliant. Maxime verò conferent trochisci Gordonii in lacte diluoli.

Fabricius Hildanus vlcus infigne vesicæ iniectione sequenti, cum omniulis alijs remedijs, curauit ob. 69. em. 3.

℞. Rad. consolid. maior. 3. i. horden integri M. i. fol. agrimonij, veronice, (cordi. alk. h. myrrhæ, laniaculæ, ana M. 6. Coquantur ad 3. i. In colat. dissolue mellis rosæ 3. ii. Misco, fiat iniectio.

Aduertendum, iniectiones istas non tantum per syringam immittendas esse, vt vulgo fit, quia in vesicæ cavitate non penetrant, obstante multo liphinere exquisitè clauso: sed immisso in vesicam cathetere syringa aptanda est, sique iniectio ad locum situm facile deteretur.

Quia vero in huiusmodi vlcibus dolores plerumque infestis esse solent, eorum mitigatio in toto curationis decursu, quoties vrgerint, mouenda est anodynis internis & exterius usurpatis. Interna erunt iyrupus de papauere, laudanum opiatum, & hinc visu peculiariter delapsati trochisci alkæ. Tum etiam eniulsionem sem. frig. cum sem. papav. albæ additis opus fuerit, ipso papauere syrupoque denique confectâ florum althææ frequenter exhibita.

Exterius vero fomentum sequens admodum poterit regioni renum.

℞. Rad. althææ 3. ii. sol. malur. parietariæ, violariæ, an. M. i. sem. lini, tenagur. alkæ kengi, an. 3. ii. flor. chamem. neldor. nymphæ, an. P. j. Fiat decoctio, quæ fouatur pars cum filtris non autem cum spongis, propter faldetinem, quam à mari habent.

Post forum linimentum sequens ad moueatur.

℞. Olei violac. & amygd. dulc. an. vnc. i. 6. ol. rosæ. Vnc. iij. mellis. althææ & tenagur. an. vnc. i. 6. croci 3. i. Fiat linimentum.

Ad vesicæ dolores sequens iniectio parabitur.

℞. Sem. fenugr. & cydo uor. an. 3. i. Macerentur per horam in 3. i. decocto hordei. Postea per linteam exprimantur.

tur. Fiatque mucilago satis liquida. Cui adde ol amygdul. vnc. iij. sicut rosat. colat. vnc. i. sic fiat in decocto.

At vero hoc tepere recentem multum frequenter inieciunt. & ita nullum. est anodynum. In quo si trochisci Gorgopii dissolvantur, omnes scopi tum doloris sedandi, tum vlcis curandi adimpleri poterunt.

CAPVT VI.

De Diabete.

Diabetes est celerrima ac copiosissima potus non transmutata per vrinam emissio quam sequitur sitis intensa ac indefensa, & totius corporis colligatio.

Dicitur diabetes in 7. *de alimtis*, a permeando seu transleuando ob celerem vring transiitum, seu traductionem sicut aqua per peristolem traicitur, quam Mechanici, teste Columella, 2. *de rebus vocant*. Dicitur etiam *diabetes* a siti inextinguibili, & hydrops ad marium, propter vrinam copiam, que assidue profunditur. Rarissimus est affectus, quem Gal. se his tantum videri retere *6. de diff. 3.*

Causa proxima & immediata huius affectus ex eodem Gal. dicitur, & omnibus illis leuacibus, est calida renum, intemperies, cuius opera saltem a venis copiosissime trahunt, & ad vetricum transmittunt, tantum eius copiam retinere nequeunt: veng exhalat & ab hepate eundem trahunt materia hepaticae ab intestinis & vetriculo. vnde sitis continua & potus putique ingens cupiditas, qui simul atque alimptus est: a vena aetere & renibus denique abripitur, & copia sua ex pectus in artibus, ac reteritur in grauius denique ad vetricum deturbatur.

Nonnullis hanc causam videtur insulsiuens, cum calida renum intemperies frequenter sit affectus diabetes vero rarius sit, adeo aliud aliud valeat inrequens hic contingere autem nempe humorem acrem, aut saltem renem pariter, materiam bibulam, id est bilem aut puricam salam, que vetricum pariter attractricem continuo irritat, quemadmodum in febribus biliosis paroxysmus continui sitis viretque nullo potu ledatur, ex humore bilioso iunctis vetricum impatio, aut vaporibus biliosis a partibus vicinis (ubi bilea stagnat, & in paroxysmo febrii continuo uener, eleuatur, & vetricula impetitur). Que lentius, probabilis est, sita tamen hoc addi potest exiunamus non, solos renes in hoc causa tentari, sed bilem, & si humores adulti in hepate prius generentur, atque ita eos non posse magna copia re renes influere, quoniam hepate eadem, in 3. nuptis, eodemque vicio afficitur. Imo vero si viceris nobis in re obscura, & in natura silencio recondita per analogiam ratiocinari liceat, potius dicere venena quendam qualis aem huc symptomati generandi idoneam praecipue concurrere. Cum enim illud serpentis genus, quod dupfacos appellatur, & in Libya praesertim reperitur, moriu suo venenum quoddam in homines insinuat, a quo sitis inextinguibilis mouetur, simile etiam venenum in corporibus nostris, & certa ac peculiari humorum corruptela generari potest, ad similitudinem inducendum idoneum; cum ipso Galieno autore, venena vari generis in corporibus nostris generari possint, & ita viciis adhuc praesidit, si venenum in corporibus nostris generari possit, maximum & horrendum potus auerfionem inferens, quod in hydrophobia contingit, vix agni ne vsum quidem aueat, aliter tunc rei potest, legimus quod, quidem etiam aliud venenum contrariis doloibus praedictum generari potest, vi lumenque & incomprehensibile potus appetentiam excuset, inde etiam ratio delectum potest, cur ille affectus adeo rarus sit, a quo nimirum rarissima est talis veneni generatio, cum tamen bile & putrefacta salia productio, & theobi ad in omni frequentissimi contingit. Ac denique quia lames causa diabete comparatur, quod in ea sit infatigabilis ciborum cupiditas, & oculi eundem qualitate a cordationibus ascribitur, sic etiam immane sit potus desiderium, qualitate eundem peculiari & oculi eundem potest.

Signa huius affectus diagnostica, ex in quo dicta sunt satis elucelcent, quando scilicet nimidum addit vring prolium, cuius sita impetitur, que alimptus potu nihil sedatur

quia statim atque affimptus est, subito seijciatur, & totum corpus celeriter conuulsetur: cum materia enim potulenta humiditates corporis alibiles simul excernuntur, facta totius corporis colligatio. Licet autem non raro vrinat praefluus copiosa contingant in febribus acutis, alijsq; casibus, illa tamen ad diabete referenda non sunt, quousque in us symptomata praedicta, vt sitis inextinguita, corporis colligatio, aliaque non reperiuntur.

Prognosis huius affectus non nisi funesta iudicari potest: malum enim incurabile est, nisi in principio curato adhibeatur, & hominem ad tabem celerrime perducit. In senibus etiam periculosior est; tum etiam si post admodum reuerentem, aut febres chronicas contingat.

Illius curatio consistit in calida renum, aliorumque viscerum intemperie corrigenda, eorundem imbucillitate ac laxitate reparanda, humorum ad eos confluxum emulsa, inextinguenda, & maligna qualitate oppugnanda. Quae omnia frequentibus auxiljs praestari poterunt.

Vene sedio in principio morbi, viciis adhuc satis validis existentibus, remissionis & refrigerationis causa conuenire potest, parua quantitate, & parvis viciis celebrata. Si tamen vitis iam delecta fuerit, aut hanc affectus alteri succedet, non erit locus huc remedio.

Evacuatio excrementorum per coalescentes & lenientes clysteres mollienda est in hunc modum compositos.

1. Fol. lactuca, portulacae maluae & plantag. ana. M. 3. hordei mundati & rosarum ana. P. 3. Fiat decocto ad 1/2, sem. in colat. dissolve diaphm. simpli. Drach. vi. modis rosas. & colophacin. ana. vnc. i. Fiat clyster frequenter iniiciendus.

Tum etiam purgare blanda infusum illa est cum modula cassiae, & pulpa tamarindorum, vel decocto plantag. portulacae, tam arid. & myrob. cum syrupo rosaceo.

Vomitus etiam a nonnullis commendatur, ex decocto seminis raphani, & etuli, cum oxymelice, qui rariet, & reuelit a partibus vrinariis.

Ad intemperiem acrius dictarum partium corrigendam, humores inextinguendos, conuenient aulepi ex aquis, vel decoctis lactuca, portulacae, plantag. cum syrupo myrob. cydo. & similibus, atque etiam de papaueris in modica quantitate addendo puluerem diarragacanthi frig. trochilos terra sigillata, & similia.

Vel ad magis altingendum in hunc modum componi poterunt.

1. Rad. consolid. maior. & plantag. ana. vnc. 3. fol. plantag. M. 3. balustior & myrob. citrinas ana. 3. sem. plantaginis & portulacae ana. 3. sem. rube. rub. P. 3. Coquantur ad 1/2, in colatura diluile 1/2, rupy cydonior. vnc. i. Fiat huiusmodi modis.

In eundem finem palais, vel opiata confici poterit in hunc modum.

1. Sem. plantag. portulac. orandi praep. & rosarum rub. ana. vnc. i. coralli praep. boli armen. margaritarum praep. & radis tormentillae ana. 3. iunctis molebas 3. sem. Mille, fiat palais.

2. Conserue ros. antiquae vnc. vi. boli armeni. coralli praep. & cornu cerui vbi, ana. 3. i. Cum mase cydonior. fiat opiata.

Eratis valde commendat frum puer. radice phlypti maioris, & prunis lyuelleribus coniectis, in quem te summa cum iugurate. & prunis lyuelleribus coniectis: quem te summa cum iugurate in affectibus hunc modo similibus vix pale tellatur.

Narcotica etiam, vt theriaca acetos, & syrupo de papauere, & ladano optimo praesentent vixurata, in hoc affectu plurimum prodesse poterunt.

Periculaque affectus lac ouillam aut bubulum, aut asinum erit conuenientissimum, & modo prius leuam abstinere, inestis frequenter stibicibus cadentibus. Eoque ager vi poterit mandaprovi in alio affectibus aditum est.

Sedonibae etiam ab Autoribus commendatur, quibus serolis humor ad corporis superficem euocatur, & ita tamen suspecta merito esse debent, quandoquidem iam tum cum diaretics cognationem habent, viceruntque intemperiem augent. Si tamen is locus aliquis vngui alie videatur, ex temperatoribus, vt pice rad. chinae, aut salis parillae, cum

in his endit, boirag acetosa decocti parari poterit: imò verò in consumptis fieri poterit ex decocto pulli, aut gallinæ junioris, ut simul relictioque corporis consilietur. At verò totius esse consensus externis remedijs sudores elicere, potè vapore decocti consensu in ligneo instrumento (ut vulgo fieri solet) nudo corpore suscipere.

Prædictorum sudorificorum loco maxime conveniunt diaphoretica, quæ simul malignam qualitatem oppugnant possunt: qualia in febribus malignis propostia sunt: ex quibus olivoli præcipuum est, quia ad sitim extinguendam, alvum cohibendum, & malignitatem infringendam præstantissimum est.

Pro potu utatur ager aqua ferrata, cum syrupis acidis & astringentibus; vel decocto prunorum, sive iussitum & cortice interioris quercus. Cuius remedijs sit solo se hunc morbum in puero curasse testatur Erasius.

Externis verò admoveatur lotus regioni lumborum, ex decocto rad. acetosæ, fol. plantag. cortic. granat. fern. fumich. & similibus, quibus aqua parum addatur. Vel, quod vitius est, parietur infusus ex eodem decocto.

Eademque pars inungatur vnguento rosaceo, santalino, & comitisæ simul mixtis, vel sequenti linimento.

℞ Olei rosæ & myrrin. an. 3. j. lantali rubi, rosæ, rubr. & corall. rubr. ana 3. j. succi plantag. 3. j. ceræ q. s. Fiat vnguentum.

Denique symptomata huic affectum comitantia, ut sitis, vigilia, consumpcio alique, remedijs in proprijs capitibus descriptis mitigantur.

C A P V T VII.

De vrina incontinentia.

VRINÆ incontinentia in retentis vesicæ actionis laesione consistit; quemadmodum diabetes in vicio attractricis, & dyuria in expultricis. Illa verò duobus modis potè contingere, vigilantibus nempe, & tunc causa graviore est, aut morientibus, quod levis esse consuevit, quandoquidem tunc temporis functiones animalis minus libere exercentur, hoc etiam duobus modis fit, nempe debilitate, & laxitate musculi sphincteris vesicæ, quod pueris omnibus lætens, multis deceptis, & quibundam adultis accidit; aut imaginationis errore; non pauci enim reperiuntur, qui vel ex nimio potu aut exquisitior sensu vesicæ, aut acriori vrinam lectum permittunt, concurrente quodammodo voluntatis imperio, dum per somnum imaginantur, se in parietem aut alium locum vrinam effundere; & huc vicio ita assuecunt, ut si sine velle vesica aut sphincteris eiusdem prava diathesi, id fiat, neque tam medicamentis liberentur, quam prava illius imaginationis mutatione, ut in pueris flagrosi vel in adultis, si locus ille, quem per infomiam permangere putant, rebus quibundam preciosis aut venerandis exornetur, & illis sæpe spectandum proponatur.

Affectus autem præternaturalis, & verè morbosus, vrinæ incontinentiam comitatur, in musculo sphinctere consistit, qui vel sympathice afficitur, vel idiopathice. Sympathice quidem varijs modis, ut quoties accidit summa totius corporis imbecillitas, & caloris nativi exolutio, sicut in morti proximis; vel quando totum corpus aut dimidia illius pars afficitur paralyti, aut ille tantum nervorum propagines, quæ ab oïle sacro exoritur, rami vesicæ communiunt. Fit etiam aliquando hanc musculi relaxatio, ob simplicem condolentiam & vicinitatem, ut in gravidis mulieribus, ubi tunc tumorem vel doloem, & in maioribus recti intestini afflicto.

Idiopathice vero musculus sphincter varijs modis afficitur: per vulnera scilicet illi inflata, ut in lithotomia contingit; aut vicia profundiora, illius contrahentium & occlusionem impediunt. Partissima tamen causa, & frequentissima, est frigida & humida intemperies, quæ ad partem istam debilitandam & relaxandam aptissima est. Ad quam intemperiem producendam plurimum conferunt, narium temperiem frigidam & humidam, ætas puerilis, aut senilis, leues muliebres, & morbi totius corporis, aut quatuordecim partium, frigida & humida intemperies oriundi; quibus addi possunt causæ externæ huic intemperiei producendæ idoneæ, sæpe aliis recensitæ.

Hic tamen dubitare licet, quomodo contrarij affectus ab eadem causa producantur. Hippoc. enim in *Concreta* frigida intemperie vrinæ suppressionem fieri pronuntiat; & *refrigerat autem angust, interceptio vrinæ, pessima*: incontinentia verò interceptio contraria est. Dicendum est, quando frigida intemperies solam vesicæ sensum immutat, vel abolit, fieri suppressionem vrinæ, quia vesica non irritatur ad expellendum; si vero frigida motus ledatur, quæ est in musculo sphinctere, ab eadem intemperie fieri incontinentiam, eo musculo relaxato.

Signa huius affectus diagnostica alia sympathicum affectum demonstrent, quæ delumenda sunt ex affectibus incontinentie vrinæ producendæ idoneis, supra commemoratis, quæ si adiuvant, inde affectum exoriri conijciendum est illis autem abientibus, & idiopathico affectu cogitandum est: qui si a vulnere, vicere, aut alio affectu consensio sphincteris procedat, facile cognoscitur, aut verò si nihil horum appareat, ad intemperiem partem frigidam & humidam animus convertere debet: itaque deprehendi poterit ex causantibus tam internis, quam externarum constitutionibus, & effectibus, qui ab illis dependent, quales sunt, totius corporis molities, color albus, nervosi fenis, & partium genitalium laxitas, aut lenitas, aut senilis, cacochymia, picuitia, & similia.

Quod ad prognosin spectat: affectus iste in senibus immedicabilis est, ob exuperantem humiditatem, & caloris nativi evolutionem, quæ irreparabilis est.

In febre acuta excretio vrinæ insolentia admodum periculosa est, vel enim a delirio procedit, vel a summa facultatum omnium exolutione, quæ caloris nativi extinctionem consequitur.

In pueris curatur vrinæ incontinentia, ætatis mutatione, cuius beneficio humiditas superflua sensim affluit, & partes laeviores confinguntur. Si vero ætas 15. annum non curetur, immedicabilis est.

Curatio incontinentie vrinæ ad frigidam & humidam intemperiem, & musculi sphincteris laxitatem corrigendam dirigenda est. Quæ enim per sympathiam ab alijs primarijs affectibus procedit, ad illorum affectuum curationem referenda est. Iam eriat quæ a vulnere, vicere, alijsque affectibus consensio exoritur, ab eorum curatione dependet. Hanc itaque curationem ita proponemus, ut cum pueris, tum grandioribus sufficere valeat, modo reuociorum delectus a perito Medico habeatur. Ut nempe leuiora tantum in pueris viurentur, & pro maiori vel minori annorum numero, eorum quantitas, & efficacia augeatur vel minuat.

Primo igitur phlebotomia locus hic raro esse potest, cum frigida intemperies & pruitosa illius hanc affectum producat. Nisi forte totius plethora in iuuenali corpore eam suadere videatur.

Purgatio autem in hoc affectu semper necessaria est, eaque componatur ex phlegmagogis medicamentis, quibus adstringentia quædam miscantur, non solum alterantia, sed etiam purgantia, ut rhab. myrobalani & similia.

Potica verò ad efficaciam materiam illam pruitosam partemque relaxatam, ut vitrentur, pulueres, opiate, vna medicata, & similia viarum possunt, in hanc vel finitalem modum compellita.

℞ Nucum cupressi, & myrtilli, torrefact. rasuræ doloris, corandri præp. coralli rubri, & Karabæ, ana 3. j. (podij) 3. j. rad. cyperi & galangæ, an. 3. ss. Cum syrupo conditure citra, fiat opiate, de qua capiat magni castaneæ mane & sero, superbibendo parum vini rubri.

Vel pulvis ex prædictis, aut eorum nonnullis constat ʒ 3. sed ʒ 5. cum vino rubro exhibatur bis in die, longe à palu.

℞ Rad. consolid. maior. 3. ss. rad. cyperi, galangæ, ana 3. j. fol. plantag. equiseti, pentaplylli cum rad. ana M. j. nucum cupressi, calycum g. lantidum, ana 3. iv. sem. rutæ, agni casti, thuris, & rasuræ ebors, an. 3. ss. rosæ, rubr. P. j. vini rubri, ii. Infundantur per 24. horas. Coleantur per manicam Hippocratis, addendo cinam. 3. ʒ. lachnarum quanto sufficit Fiat

elaretur, de quo caput 2. iii. vel iv. bis in die.

Multa se specifica proponuntur ab authoribus, ad huius affectus curationem maximè conducentia. Galen. *in modo camentis leucis* et *in lib. de facie parvulorum*, laudat cerum et rebus leporis combutis. Item cochleam cum sua rella combutam potandam exhibet. Recentiores hunc leporis præbent, cinerem marium tollorum ungulam apertorrefactam, cinerem offium dactylorum, auellanas affas; puluerem coracum oorum. Sed præ cæteris laudam pulis agnominis, et tunice interius ventriculorum galline exsiccatæ, quæ foetum, vel simul mixta exhiberi possunt cum vino rufino.

Teletatur Solenanders se felicissimum vidisse successum ex medicamento, a Gilberto Hollandi Medico Romano celebratissimo in visum reuocato Accipiebatur guttur galli vrbat, vt non confusum esset totum, exsiccatumque teri posset. Exhibebat puluisculum ante quam cunctantio vini subri, & si per visum non posset, cum haultu oxycrati dulcissimi misceri per aliquot dies iterabat.

In grandioribus ratione caule antecedentis ad explican-
dum totum corpus, conuenient decocta ludorifica per xx.
dies viurpata ex ligno guaiacano lailaris parata. Quibus
& lubitius poterunt thapsia conica, & in primis theriac
sulphurea, & nitrore, quales sunt uolfræ Balercane.

Pro potu viuent æger viro drobro autzito. Nacti non vel
pauca aqua ferrata diluto. Hy. dropus viro sola aqua ferrata,
vel in qualibet comendat. ac cum lacte mista. hinc
herit. Vi denique ad magis altringendo, aqua in a
quid decoquens igitur extracta faceret. Eademque aqua
omnes cibi decoreque polluit. Parum autem bibendum est, præ
sertim ut in corpore. Iam in nigrellis lecti vnum rediat æger, ac
rursus medea necesse. Excuset ad mangendum, nec morietur
ante auroram. Hoc non minimum facere poterat ad man
dandum in lecto conuictum immutandum.

Externis vero, publicilicet & peraneo . topica admo-
uantur, quæ calefaciant, roborent, & exsiccent in hunc mo-
dum composita .

Rad. Ensatæ camp. calami aromat. rad. acori. cypri. ana
 ʒ.ʒ. foli. menthæ foliæ. origani. calamenti. abfinthij. an. M.ʒ.
 ʒ.ʒ. m. cupressi. myrtill. gallæ. & balsamiflor. an. ʒ. i. colar. ru-
 br. ʒ. i. Quæquantur in æquis partibus aquæ fabror. & vini ru-
 bris ad M. ii. In colat. distillat. falis. & aluminis . an. ʒ. i. Fouet-
 tur regio pubis & percrinet. calidè manè & terò .

Vel ex eodem decocto, ~~ad~~ ^{ad} dosi simplicium, fici poterit infusus, per multos dies vii mandus.

Poil focum, vel fomicupium magis poterit eadem par-
tes inmento parato ex oleis vulpino, rutacco, irmo, vi-
ngentis martiato, aregon-cum pulvere malliches, cyperi,
myrtallorum.

Vel admodum potest vitæ storax liquida, vel balsamum
indicum, paucis vino dissolutum; vel pro diarræis moschi
& zibetæ grana aliquot in oleo moschatino dissolera.

Vel emplastrum sequens dictis partibus applicetur.

℞. Ladani, melleches, ana ʒ-i. ligni aloes, styrac, calamite,
cinam, cerebinth, an ʒ-i. myrrulor, rad. cyperi, an ʒ-i. ꝑ succi
menthe & equiseti cum vino rubro extract q.ſ. Fiat empla-
strum.

Denique, si fluxus à capite in partes inferiores delabi videatur, quæ infirmitatem illam conciliet, deriuatur errhiner medicamentis caustico occipiti, vel brachio admoto, aliisq; remedia in catarrhi curatione proposita.

CAPVT VIII.

Desclera & fragaria.

Vrinę luppreſſio omnimoda *lypſis* ab authoribus nominatur immenſa verò mungendi actio *επυρρησ* dici ſolete quæuis hoc vocabulum latius multo patet, & *lypſis* ipſe omne vrinę hallucinatio comprehendit; quod ſi abque dolore fiat, & vrinę hallucinatio effluat, etiam cum aliquo conſuetudine effluat *elichuria*, ſi verò fiat cum dolore, ad dyſuriam potius ſeu vrinę ardorem referenda eſt.

Elichuria igitur, ſeu omnimoda vrinę luppreſſio, duplex eſt, una ſcilicet, ſeu legitima, quæ fit viciis plena et

fiens, & non ha scilicet spuria, quæ sit cum vesica vacua est, nihilque ad carnem de rebus descendit.

[illegible]

Tertia causa est, angustia cervicis velice virine, et non-
nem perpediens. Humoresque tres affliguntur causa
Gal. 1. de cr. aff. ca. Aut enim striculus cervicem velice
circumdans in rursu tumorem attolitur, ut meatus inde
occupetur, vt si veliam inflammatione, vel scirrho, vel abscessu,
vel alio quopiam tumore affectus sit; qui in mentu carinula
quedam adhaerens ex procedente viore; vel calles, aut
alia quidam res, ex cauto locoque humore pusillum
longo tempore tractu generant. Oculorum etiam mem-
braculo, crudo calloque humore, grumo sanguinis, vel
putre.

[illegible]

Notha vnde ihericia illa nominatur, in qua vrine fuppi-
muntur, vrine vacuante, quia nihil ferri adeam defuit,
& decidit. Causa cur nihil ferri ad veficam defcendat,
duplex: cil; vel quia renes vrine materiam non attrahunt,
deorulumque demittunt, vel quia vretres non fufcipiunt.
Retum igitur attrahit, vel expulit, ledit. Attrahit le-
dunt vel leda facultate, vel errore obiecti. Facultas ledit
valida intemperie, frigida preformi: vel impeditur ob ali-
quam obftructionem in renibus, aut vens emulgentibus
refidentem. Fiumt autem illa obftructiones a calculo, pitui-
ta craffa, vel pure ab aliqua parte fuperiore ad illas ven-
tu confluenti. Fit etiam interdum obiecto vniu venarum emul-
gentium a repletione nimia, ex languine, & ferro copiofo in
collethofculis re hiliariam habemus in obftructionibus

Quodam vido remum attractione laeditur, cum ferum vel abluantur, ut in febribus ardentibus: vel ad alias partes transmittitur, ut in hydroce continetur.

Expulsiō similiter leditur ab iisdem causis, intemperie scilicet obstruione & sciculo, languis' grumo, pure, vel cruore crasso: vel ab infumatione.

Vetiores feram non sulciunt, nec ad vesicam demittunt, propter inflammationem, vel obstructionem e calculo sanguinis grana, pure vel pusilla crassa: vel ob compressionem a tumoribus iudicium vichariam.

Notandum est verumque renem, aut utrumque debere affligi, ut omnimoda urine suppressio contingat: alterum enim apertum, & libero existente, urina fluere potest.

Causæ omnes prædictæ si grauiiores sint, integrum virg retentionem facere possunt;que illic harie nominatur;si vero remissiores, partialem tantum & imminutam excretionem efficiunt;que stranguria dicitur. Vterque autem affectus ab eisdem causis per magis & minus tantum differentiis dependet.

Diagnoscitur vera, & legitima ichthuria ex pondere & tensione hypogastriacæ tumore circumscripto, vesicæ figuram referente. Cause illius dignoscitur ex rebz prægressis & concomitantibus. Si enim fiat ex quantitate urinz collectæ copiosior, quæ vesicæ contractionem impeditur, & relatu ægrotantis percipitur, illud ob diuturniorem equitationem, loci aut perionarum præsentiam & dignitatem, mictionis officium longiori temporis spatio cessasse, & nullum antea in illis partibus affectum habuisse. Si verò descriptio, paralysi, aut alio affectu laborantis ex ipis qui in causis enumerati sunt, illis merito urinz suppressio erit referenda.

Altitriones quæ fiunt à tumoribus illarum partium, aut vicinarum, vel alijs causis supra propofitis ex proprijs illorum affectuum indicantur. Obstructiones verò canalibus vesicæ ducenferunt immixta candelæ, vel cathetere, quæ si penetrare non possunt in via subsistunt, calculum aut carunculam, aut aliam quampiam materiam obstruentem adesse demonstrabunt. Et ille materiz ita distinguetur, quod nimirum si calculus adfit canali impactus, dolores nephritici præcedunt, alii à renibus, fit deciduus; aut si in vesicæ genitus, vel duc commodatus fuerit, signa præcesserint calculi vesicæ, saltem leuioia, qualia suo loco propofita sunt. Si caruncula urinz commotum impedit, præcessit gonorrhœa virulenta, aut vlcus in meatu virgæ longo tempore materiam purulentam emittens. Si denique sanguis grumus, pus concretum, vel pituita crassa obstructionem efficit, & potiusculæ quedam eorum per virgam excreptæ, vel immixto cathetere adherentibus facili patescunt.

Spuria verò ichthuria ex eo cognoscitur, quod nulla tensio, nullus tumor, aut pondus exsistit in pubis regione, sed potius vacuitas quedam in ea percipitur, nullum adesse desiderium, nullaque irritatio in vesicâ, & immixto cathetere, liber canalis aditus reperitur, & nulla urina, educitur. Præcesserunt autem signa calculi in renibus, aut vteribus inflammationis, aut magnæ plenitudinis; aut potius largior præcessit, quem non leuata est urina copiosa, unde venarum nimia repleto potuit contingere; aut denique febris ardens, vel hydrops præsentia, fetoræ materiz auferentem testantur.

Prognosis quod attinet, urinz suppressio valde periculosa est; & si septimum diem excedat, certum affert interitum, dum tætuum in venis, iecur opprimitur, sanguinem inficit & inquinat, ac in totum corpus reppugatur, suffocationis periculum infert, & ad cerebrum delatum, comatosum affectum inducit.

Suppressio urinz, quæ ob fasciatum spium, aut casum, aut verbera, luxationem accidet, incurabili est. Si odor urinz natibus & ore ægrotantis emittatur, lethale procul est.

Venz suppressioni si tenelms supervenerit, in septimo moriuntur. Eadem singultus iuperueniens mortem proximam denotat.

Curatio suppressionis urinz, siue illa totalis sit, siue partialis, ad causarum sublationem dirigenda est. Ac primum illa quæ spuria dicitur, & à tenui aut vterum affectibus dependet, ex inflammatione, dolore nephritici, aut calculi renum curatione desumenda est. Quæ verò fit à tepleione venarum, emulgentium, largæ sanguinis missione, & hydragogis medicamentis curanda est. Legitima vero ichthuria, curatur remedijs causam eam producentes auferentibus. Ac primum si fiat à vesicæ, aut partium vicinarum inflammatione, remedia ex vesicæ inflammationis curatione mutanda sunt.

Si verò suppressio fiat à calculo in vesicæ ceruicem impacto, sequentes remedijs auferenda est.

Primum æget supinus, collocetur, cruribus elatis, mox plurimum diuque concutatur, vt calculus in vesicam relabatur. Et si hoc modo decubari nequeat, immixto cathetere inspicatur. Si verò calculus altius penetraverit in penem, mecum commoda illius exclusio procuranda est, digitis moliter impellendo, & deducendo, ad extremum virgæ: tum virgam in aquam tepidam, aut in lac tepidum demittepido, aut ægrum in semicupium mergendo, vt meatas laxetur, & amplius fiat. Si verò neque foras extrahi, neque in-

tro impelli valeat, docent Practici ligato penie in superiori & inferiori loco, partem sectione facta aperire, & calculum eximere.

Obstrusio verò colli vesicæ, quæ ab inflammatione fit, proprijs inflammationis remedijs curabitur. Interim tamen si vrina diutius teneatur, candelæ ceræ, oleo amygdalulicium illatibande immitti poterit, omnino vitando cathetere, ne dolore excitato inflammatio auguratur.

Quæ verò à caruncula fit vrinz suppressio, arunculus ipis exurpatione cutatur. Hæc autem remedijs appropriatis peritur, per candelæ ceræ immixtas, quæ à perito arisunt, in humiliori Chirurgia apprime exercantur, ac denotatæ sunt. Virgente tamen symptoma, & quandoquæ caruncula interdum intumescit, & tutiori canali obstitit necessitas cogit immixto cathetere vrinam educere, quamvis periculum sit, ne irritata pars magis intumescat. Prus tamen tentandum est remissionibus, per venæ sectionem, & vomitoria celebratis, tum repellentibus publi & perinæ adhibitis, caruncule inflationem imminuere, vt retentæ urinz via pateat.

Si à pituita crassa oriatur urinz suppressio, conveniet primum purgatio ex diaphorone cum thab. in boli formam reducto, & deinde terebinthina, cum puluete liquiritæ frequenter exhibita, polimodum tamcum aperientium decoctum, cum cayniel aut tyropo byzantino exhiberi poterit. Non omnis interim cysteribus fomentis & semicupis emollientibus & aperientibus, siquæ omnia consequunt, quæ ad calculum dissolvendum & expellendum fuerunt propofita. At inter cætera peculiaris efficacia sequentia conferre experientia docuit.

1. Benedicte latius 3. ss. trochisc. de myrrha 3. ss. de oxi fabine Vnc.ij. Melle, hat potus, quæ urinz suppressio in quadam muliere brevi curata est.

Si tedundantia pituitæ copia in toto corpore, vel capite luxuriare videatur, purgatio vniuersalis per apocremata atres, vel quatuor dies instituta, ab ipso morbi principio, erit vtilissima, & nimia phlebotomia.

Non parum etiam huic affectui prodesse potest iuleps, ex succo panætæ, iussculi marini, & limon. cum ol. amygdalulicium, in curatione calculi renum descriptus. Syrtupus Ferriels de raphano, ad Vnc.ij. per vices exhibitus, est etiam vtilissimus.

Relett Dodonæus lib. 4. de feb. cap. 48. quandam octogenarium, luxuriante ouorum testis in euenit testiculæ, cum vino Rhenano permixtus, semel tantum allumpso, ab urinz stillicidio integrè fuisse liberatum.

Actualius Vilianovanus vinum alkekengi commendat à sequenti historia in libro de vniuersa conscrip. Est tempore meo Casidialis quidam, qui iam per quadriduum vrina obagationem passus esset, urinzque & vt dicitur, deserta, & nullis alijs præsentibus medicamentis, qui de consilio parvi Medici per vnum vinum alkekengi liberatus est, & saluta est orna in quantitate, vt impleatur quasi cuncta vna. Ex eo solo experimento, Medicus ille cum populo scietus & papper, salis est mixtus, & dicitur: 7. multos quidem Deus dicit gratias, & effert vitulæ, & centrid, & turum effi, quæ videtur Des ab ipis multis. Fit autem humilmodi vinum, vt ibidem docet Amaldus, accipiendo fructus alkekengi & aut 7. aut plures, & coquantendo cum vino albo, postea colando & exhibendo.

Alelli etiam cum vino albo trin & exhibiti, ad vrinam promouendam efficacissimi sunt. Oicum (scorpionum Marthio ad gutt. vi. vel vj. exhibitur cum iuleulo, aut alio liquor, vrinam potenter educit.

Chrytalli mineralis vltus frequens suppressam vrinam, mouet, præcipuè vbi meratur inflammatio, quæ ab ipsa vrina duc retenta sepefime conatatur in tunica interiori vesicæ.

Spiritus salis idem prestat, & multo efficacius.

Ex vulgaribus succis panætæ depuratus ad Vnc.ij. exhibitus cum iacchari Vnc.ij. multum prodest. Illi admixti potest sal prunelle, vel spiritus salis.

Si humilmodi suppressiones vrinz à materia pituitosa oriundæ frequenter recurrant, nihil erit prestantius, a quo thermalibus utrosq; & sulphureis, quæ iussu nostro, Balearicæ, quæ tum potant, balneo, materiam illam mucic-

agrosos dissoluere, abstergero, & absorbere facili poterit. Quamvis vir nobilis huius verbis, ab vrinae suppressione multos dies perferente, post alia remedia frustra tentata, sequenti die itere iniecit; & per duas horas retento liberatus est.

Re. Kad. apij. petroseli. bruci. gram. asparagi, maluz. bif. maluz. an. 3. j. parietar. M. 3. sem. anisuli. cuculi. anethi. carni. dauci. aneas. carthami. rutae. cumini. & baccarum lauri. Vnc. sem. fior. chamem. melior. anethi & thechad. an. P. 3. Coquantur in vino albo ad medietatem. In colatura 3. j. dissolue butyri recentis vnc. iv. melius rotas. Vnc. 3. sacchari rubri Vnc. 3. benedicti. laxat. vnc. 3. vitell. ou. n. j. olei nucum, anethi. & sem. lini. an. Vnc. 3. filiter.

Chymici sua etiam remedia ad hunc affectum praedicant niturum spiritus salis, verisoli, sulphuris & terebinthinae; quos ad 3. 6. exhibent cum aquis appropriatis, vel iulculo pului. Commendant & salem tartari, & salem stipticum sabarum, a 3. 6. ad 5. j. exhibentur.

Nec non ad resuscitationem humorum a parte affecta, vomitoria viurpant: eorumque beneficio uno paucos fuisse consensu liberatos gloriatur.

Toto cuius actionis decursu fomenta, linimenta, cataplasmata, cupia, aliaque externa viurpanda sunt; quae non alia esse debent, quam quae ad dolorem niphriticum superfuere propolita. Inter cetera valet cataplasma parietariae finae cum butyro, vel melius cum oleo laurum. Item vesicae, oleo lenipena: melius erit si in hoc oleo cantharides coquantur.

Vulgo admoventur regioni pubis & lumborum cataplasma ex cepis fixis cum axungia porci, additis oleis quibuslibet.

At longe efficacius operantur cepe albae crude in mortario tuitae, addito oleo in formam cataplasmatis, & renibus admotae, atque vtrebibus & regioni pubis.

Cataplasma ex raphanis confusis idem praestare potest.

Quando a grumo sanguinis ischuria produciatur, illius dissolutioni incumbendum est. Exhibitis itaque id praestare apta nata sunt. In hunc cenum reuertitur trochiscus de carabe, coagulum hedyleris, mullus, oxymel simplex & scilliticum, & syrups acetosus & similia. Externis vero iterum bubulum mira praestat, iuxta sententiam Actij tetr. ab. 3. term. 3. cap. 27.

Cum denique a pure vrinae suppressione, aut filicidium produciatur, efficacius & incidentibus opus est, qualia potissimum in renum & vesicae viciore propolita sunt.

CAPVT IX.

De dysuria seu ardore vrinae.

Dysuria seu vrinae difficultatis nomine, omnem dolorificam mictionem intelligimus, quam etiam nomine ardoris vrinae recentiores enuntiare solent. Cum itranguria ferè conuidentur a quampluribus Autoribus, in hac dolorificam etiam mictionem conuident, sed eam a dysuria in hoc tantum differre volunt, quod maior vrinae quantitas in dysuria excretaur, minor vero in itranguria, quae etiam ea ratione vrinae filicidium nominatur. Verum malum non clarioris doctrinae gratia, vrinae quantitatem immutata, quae sine dolore sit, itranguria nominare; & sub vno capite cum ischuria comprehendere, ex eo quod vtrique eadem curatio adhibenda sit: omnem vero mictionem dolorificam sub dysuria nomine in hoc capite explicare, propter quod ab iisdem causis omnes producantur, iisdemque remedijs curentur.

Causa proxima & immediata mictionis dolorificae est flosio continui in musculo sphinctere, vel canali vesicae. Atque adeo quicumque solutionem continui in illis partibus inferre valent, dysuriam seu ardorem vrinae excitare possunt.

Inter illas causas, praecipua & magis frequens est vrinae acrimonia, aliquando simplex, & sine aliorum humorum participatione, quain vicerum, vel totius intemperies calidior, acriorum & calidiorum ciborum vius excitatur; saepius vero ex permixtione humorum acriorum, vt bilis, & pituitae salis, comparatur. Aliquando pus ex renibus aut vesicae vicibus emanans talem vrinae concipiat acrimoniam. Nonnu-

quam etiam materia alba, & quasi lactea cum vrina copiose emittitur, & ardorem vrinae inducit, quam quidem materiam vulgus Medicorum purulentam esse existimat, & a renibus occidit. Quam sententiam reprobant Senectus, huic innixus rationi, quod nimirum, etiam si toti renes in pus resolerentur, non posset tanta eius copia, quam a interdum per aliquot septimanas singulis diebus excretaur, inde suppeditari. Sed arbitratur ipse hanc materiam provenire ex vitata coctione, prout quidem ventriculi, deinde etiam hepatis, cum error oris coctionis non possit corrigi in secunda, vadit chyli, & postea etiam sanguis crudus relinquitur, neque a paribus salis & tartareis mundatur, quae in prima coctione separari debent, & illa postmodum a renibus attrahit, & ad vesicam transiit, & dolorem inter mingendum parit. In eam sententiam re deductum esse probetur, ex eo quod viri quidam docti, qui per aliquot septimanas ardore vrinae laborabant, & vrinam quidem satis copiosam sed tali materia alba ita repleta, vt dimidium vrinalis occuparet, cum maximo dolore excrebaret, & varijs adhibitis remedijs nihil leuamini sentiebant, tandem folius vini maluaris potu curatus fuit.

Calculus etiam in vesica latens, vi inter mingendū ceruicis vesicae aliditur, dolorem excitat, quod etiam praestare possunt arenulae crassiores canalem in exitu vellicantes.

Inflammatio denique, vel vicius istarum partium vrinae ardorem excitat, quandoquidem sensus exquisitus in illis affectibus redditus, ab vrina etiam bene temperata grauiter afficitur; quemadmodum videmus partes internas inflammatas aut viceratas, ab obiectis ita inter proportionatis, vel leui contactu, dolores affici. Sic in gonorrhoea, quando adest paritatum inflammatio, ardor vrinae continuo percipitur.

Diagnosis huius affectus ex se manifesta est, dolor enim inter mingendum ita euident est, vt egri non raro ex illius molestia euolare cogantur. At signa causarum ita distinguenda sunt.

Si ex vrinae acrimonia procedat, illa tenuis apparebit, ac intenso colore, atque interdum fiammeo praedita, vel admixtio biliose, pituitose, aut purulenta materis conspicua fiet, vicerum aditit intemperies, vel alimenta calida & acris, aeris zelus, & similes causae calefacientes praecedent.

Calculi denique, & inflammationis illarum partium ex proprijs suis locis innoscunt.

Quod ad prognosin attinet, hic affectus per se periculosus non est, sed magnam affert laboranti molestiam; & pro varia causarum dispositione difficile non raro curatio recipiatur sensus praesertim, qui si decrepiti sunt, cum morbo commoritur. Atque in quacunque etate, si diutius persequeretur, vesicam tandem em, & illius ceruicem exulcerat.

Curatio primum ad causae sublationem dirigenda est. Atque ita si a calculo inflammatione, vel viciore vesicae, aut ceruicis illius dysuria oriatur, ex proprijs capitulis eorum affectu curatio delumenda est, licet tamen symptomata, quae inferius proponuntur, plurimum conferre poterunt.

Quae vero ab vrinae acrimonia & humoribus calidioribus, ei permixtis oriatur, sequentibus remedijs oppuganda est.

Ac primum phlebotomia ad hepatis aliarumque partium intemperiem corrigendam, necessaria est. Eaque pluries repetita, pro plethorae magnitudine, aut inflammationis periculo, ex brachio dextro primum ad euacuationem, & renuisionem; postmodum vero ex venis interioribus ad deriuationem a parte affecta; cuius ratione Hipp. eumque sequutus Galenus in omnium partium infra renes postularum affectibus, venas inferiores aperire praecipuit.

Purgatio etiam in hoc affectu conuenit, sed ex lenientibus tantum & refrigerantibus composita, alioqui ardorem vrinae maxime exasperaret. Ideoque multo blotius ex casta simplici non audent transigere. Et illa certe reliquis praetulerunda. Magis tamen refrigerantes efficiuntur, si pulpa tamarindorum etiam adijciatur. Vel dilatum cassie, ex decocto lactuce, portulacae & lummatum malus paratum ad plures dies exhiberi poterit, vt acres humor. in partes vrinarias confluentes ad intestina sensim deriuentur. Si tamen humorum prauorum copia maiorem purgationem postulare videatur, ad frequentem potionem transigere poterimus.

X x

x. Fol.

P R A X E O S M E D I C Æ

LIBER DECIMVS QVINTVS

DE MORBIS MVLIERYM.

P R Æ F A T I O.



Orbi mulierum appellantur hi qui mulieribus proprii sunt, & a vitio illius partis emanant quæ mulieribus propria est, vteri nimirum de quo non sine ratione dixit Democritus in epistola ad Hippocratem, cum sexcentarum arumnamus, & summorum calamitatum autem esse. Nos igitur vi affectus vteri præcipuum, & in Praxi Medica frequentius occurrentes, quædam metho de experiamur; ens ut duodecim, ut aliæ a vasis vteri dependant, aliæ in ipso vteri corpore, illiusque causate residuant; aliæ vero præcipuum illius adveniant, & opus nobilissimum, nempe generationem respiciant. A vasis vteri male affectis, & causis præternaturalibus ea obidentibus dependent chlorosis, mensium suppressio, & fluxus immodicus fluore albi seu siner multiteriatur vterum, & hysterica passio. In ipso vteri corpore illiusque causate residunt, infirmitas, vlcus, scirrhus, cancer, gangrena & sphacelus, præterea vteri præcedentia & clausura. Illi autem affectus generationis quidem officere possunt sed tantum per accidentia. Affectus vero totius generationis opus, nempe conceptionem grandæviam, & partum respondentem sunt, sterilitas, morbi acuti, & chronici prægnantium, abortus, partus difficilis, facis mortuus secundum cæcæ, siner locum in modicum, suppressio loquutionis, tormina à partu, & morbi acuti perperarum. Quos omnes affectus brevissima ratione, quantum rei dignitas ferre poterit, elucidare aggredimur.

C A P V T P R I M V M.

De Chlorosi, seu pallidi virginum coloribus.

Hic affectus ab Hipp. chlorosis, à recentioribus febris alba, icteris amatoria, morbus virginum, pallidi virginum colores, & icterus albus appellatur.

Definiri potest, vitiatus corporis habitus ab obstructione venarum hepatis, ac menteris, & præcipue earum, quæ sunt circa uterum, quam sequitur plerumque gravitas membrorum, appetitus cordis, difficultas parandi, rerum absurdarum appetitus, & alia symptomata.

Pendet igitur hic affectus immediate ab obstructionibus partium intimi venteris, præcipue earum venarum quæ sunt circa uterum, quæ liberum sanguinis affluxum ad uterum impediunt, unde illa copia luxurians in virginibus, quando mensitruæ purgationes apparere incipiunt, si ab illis obstructionibus impediatur sanguis refluat ad partes superiores, & cor, hepatis, ac menteris, diaphragma aliaque partes optineat, earumque calorem natium obruit, & vasa obstruit, unde vitiosa sit in viceribus concoctio, & hinc crudi humores in toto corpore cumulantur, qui ad habitum corporis delati, cachectiam excitant in reliquis vero partibus varia symptomata producant. In hypochondriis enim viscerum intumescunt parit, quia diaphragma comprimitur, unde difficultas spirandi emergit. Quia verò sanguis crassius & stultioris spiritus per vene cæcæ & magnæ arteriæ ramos ad cor deferuntur, quorum noxam exartere contendens ne subducatur, frequenter arteriarum motu elucatur, unde palpitatio cordis emanat, quoniam etiam temporum pulsationes frequenter consequuntur. Præterea cibi fastidium huiusmodi virgines frequenter corripitur, quia ob malam concoctionem, & distributionem, & in venteris magna crudorum excrementorum copia refluens est. Quæ excrementa visiolam, ex peculiati quadam corruptela, qualitateque

adepta, pravorum adoliorum, limo & rerum absurdarum minime alibilium appetentiam inducunt, ut salis, stomatium, & ypsi carbonum, cinerum, & similium, qui affectus pica & malicia nominatur, à nobis inter affectus venteris capite proprio suo explicatus est.

Causæ obstructionum, quæ in venis vteri & hypochondriorum contingunt sunt humores crassi, viscosi & crudi, ex prava puerumque vitio ratione generati. Virgines enim, i. ite largo aquæ frigida: pocu horum, vel manè ieiunio stomacho vitantur, alia acetum, olea, fructus immaturos, vel ipsam niuem & glaciem audissimè deorant: vnde callos partium natus obruitur, & magnus sit crudorum excrementorum proventus, alia nimio somno indulgent, alia orio immundumque, suendi causa, pulvinaribus toto die alia, & maximo lepe frigore torquentur, alia intempestivis vigiliis & excitationibus utuntur, & choreis statim à passu, quæ in longam nodam, cum his amissionibus perducunt, quibus vitium accedunt grauitissime curæ, & varia animi palpatione, ex quibus coctiones ordinariæ plurimum evertuntur, & multa cacochymia inducitur.

Diagnosis ex sequenti symptomatum serie manifesta, evadet.

Primo sese offert faciei & totius corporis color pallidus & subalbidus, interdum vero plumbeus, liuidus aut virefcens. Cum enim in hoc affectu humores crudi, pituitosici, serosi abundent, & ad habitum corporis deferantur, colorem toti corpori imbeant, & si pituita, bilis, aut melancholica permisceatur, color inde subliuidus, virefcens, aut liuidus efficitur.

Secundo inflatio, & quædam intumescencia in facie & palpebris apparet, præcipue post somnum; quia per noctem conclusus calor plures vapores eleuatur, quam dissipare poterit. Crura quoque & pedes præcipue circa maleolos intumescunt, totumque corpus laxum & molle cadit, ob eandem pituitosorum ac serosorum humorem abundantiam.

Tertio, gravitas & segnities totius corporis adest, erum ac pedum tenuia lassitudo, deuolutus sua gravitate humoribus ad partes illas declinatio.

Quarto, respiratio difficilis est, præsertim cum se vehementer mouent, aut loca alta, & accubitus ascendunt. Tunc enim sanguis crassus incalefcit, ex eoque multi vapores eleuantur, qui difficultatem spirandi parant.

Quinto, cordis adest palpitatio, & pulsio in arteriis temporum, dum corpus commouetur & exagritur, propter eandem euaporationem, quæ ab humoribus crassis excitatur aucto per exercitationem calore.

Sexto, dolor capitis grauis ac diuturnus sepe egrotantes affligit, & interdum in occipito, dum vterus conpuitur, in scapula vero ac fronte, dum ab hypochondriis magis vapores eleuantur.

Septimo, pulsus est celer, & frequens, vi febricitare videntur, & ideo hic affectus dicitur febris alba; propter illam pulsus frequentiam, quæ talis efficitur, quia cum facultas vitalis debilis sit, vnde pulsus parvus emergit, natura paratur frequenter cogitur compendare.

Octauo, somnus grauis est, & profundus, ita ut ad meridiem vigiliam producant, nisi expergulantur, qui à vaporibus crassis ac corpiosis ex illius pituitosa eleuatur excitantur.

Nono, ingens adest ciborum, præcipue eucymorum fastidium, propter maximam crudorum in ventriculo, ac vicinis partibus collectionem; qui humores deteriores tandem conditionem adepti pica, & rerum absurdarum appetitum inducunt.

Deniq; malo ingruente, & multiplicatis obſtructionibus, ſuppreſſio menſium tandem conſequitur, quæ propeſſum aſſectum, ac veluti confirmatum offendit.

Quod ad prognofin attinet. Affectus iſte vtiplurimum periculofus non eſt, & ad longum tempus perſeuerat. Si tamen nimium negligatur, & alias radices agere permittatur, ita vt magna nutritionis deprauatio contingat, partium naturalium graues aſſectus, vt ſcieriſſi alique tumores tum etiam propriæ ſubſtantiæ corruptiones contingunt, quæ per hydropem, febres longas, alioſque graues calūs, ad interitum perducunt.

Quando leuior eſt affectus, & ad venarum vteri obſtructionibus potiſſimum humoribus, in iuueniculis virginibus coniugio ſcilicet curatur.

Mulieres quæ durius hoc affectu laborant, aut ſteriles ſunt, aut prolem morboſam, debilem ac parum vitalem edunt.

Magna ſalutis ſpes elucet, quando menſtrua ſtatas periodos repetunt, & debita quantitate ac qualitate donata, progrediuntur.

Curatio huius affectus perſicitur obſtructionum aperitione, viſcoſorum humorum ex toto corpore vacuacione, & intemperiei viſcerum correptione, eorumque roboratio-
ne.

Obſtructiones auferuntur iſdem remedijs, quæ in obſtructionum hepatis & lienis curacionibus hære propoſitæ addita nonnullis quæ vterum reſpicunt, & ad venarum, quæ obſtructiones referandas magis appropriata ſunt.

Primo igitur medicamentum purgans exhibendum eſt, laborantis naturæ & temperamento congruum, ex benignioribus compoſitum, vt primam tantum regionem euacuet, idque permilſo chyſtere, ſi alius non ſit libera.

Poſtea vero venæ ſectio erit celebranda, ſi affectus non fuerit intertratus admodum, & puella valde exanguis vel ad cachexiam inclinans. Vena autem brachij ab initio erit aperienda, quatenus menſtrua ſuppreſſa fuerint. Si enim ex pede ſanguis tunc temporis detrahatur, maiores ſicet venarum vteri obſtructiones, aucta eorum plenitudine. Ex brachio denique ſimilro ſanguis detrahetur, ſi lien magis obſtructus ſit, & dextro vero, ſi hepar obſtructionibus magis impleatur.

ſeducta ex ſanguinis quantitate, quæ neceſſaria fuerit ſolennis purgatio inſtituenda eſt, apozemate aperiente & purgante, quale in obſtructionis hepatis curacione fuit propoſitum. Cui adduntur herbe viro peculiare, vt artemiſia, matriarica, pulegiū, & ſi lien obſtructus fuerit, additiā poterunt, quæ illum peculiariter reſpicunt, vt cortex capparis, cetrachū, colopendrium. Si vero biliolum fuerit temperamentum, & calidioris & ſiccioris hepatis indicia apparuerint, calidiora omnia ſimplicia ex apozemate erunt detrahenda, & aperientia frigida eorum loco ſubſtituenda.

In puellis delicatioribus loco apozemat, ſiſcula in diſta curacione obſtructiōnis hepatis deſcripta vſurpari poterunt, cuiusdemque ſimplicia immutari, vt de apozemate dictum eſt.

In ierem. ſotus & linimentum dicto loco deſcripta admodum debent, non ſolum regioni hepariſſe etiam, lienis & vteri.

Peraſta ſolenni purgatione, pariter ſequens balneum, ad vaſa aperienda & relaxanda, & materiam obſtructionum ſuſcendam atque dirigendam. Cuius tanta eſt efficacia, vt aliquando viderimus quibundam agrotantibus menſtruas purgationes in tertio, aut quarto balneo profluere incepiſſe, quæ per longum tempus antea deſitauerant.

Rad. althææ, liliorum, enulæ campane, byroniz, cucurbitulæ, poſeig, matriaricæ meliſſæ, ana M. i. v. feminis lini & ſemine ſauri contraiſan. Vnc. i. Coquantur in aqua fontis pro balneo, quod ingraduat tepide bis in dieſino ſudore, longè a paſſu, per bidui ſanguis debet de decocto renouari.

Poſtinde victim balnei, ſi menſium ſuppreſſio adſuerit, aperiantur venaſ inferiores, & emittatur ſanguis ad vnc. iij. lōque bis, aut ter repeti eo tempore, quo menſes fluere ſolebant. Aut ſi nunquam adhuc apparuerint, quo tempore ægra magis afflicta, & grauius laborare ſolita eſt,

Abſolutis hiſce remedijs ad viſcra roboranda & obſtructionum reliquias contendas, conueniet opiata aperientia & roborans, dicto loco deſcripta. Cui vſitetur ſecula byroniz & ſal artemiſiæ ad ʒ. iij. vtiſque addi poterit.

Quia verò non tatò adeo contumaces ſunt obſtructiones vt penius remedijs non cedant; in hoc calu ſyrupus magiſtralis parari poterit, ex materia apozematis præſcripti, aucta purgantibus doſi, quo vtetur ægra bis aut ter in menſe.

Pluiz etiam viſuales erunt efficaciſſime, quales in dicta obſtructionis hepatis curacione fuerunt propoſitæ, quibus vſitetur addentur remedia ex tartaro, vitriolo, & chalybe compoſita iſdem deſcripta.

Zacutus Luſitranus, in lber. 99 lib. 2. proponit hiſtoriam cuiuſdam mulieris, quæ chiorſim per decennium cum menſium ſuppreſſione paſſa erat, & varijs purgantibus & aperientibus remedijs, quibus chalyb etiam acceſſerat, curari non poterat. Hanc ipſe curauit conſeſſa artemiſiæ, triginta diern ſpatio exhibita, ſuperbibendo aquam ſtillicem labini, in qua per noctem rhubarbarum maderit.

Idem Zacutus in lber. 117 lib. 3. aliam proponit hiſtoriam cuiuſdam virginis, quæ multo ſate ſeſe ingurgians, ex diuturno atque aſſiduo illius viſa incidit in diarthem biliſiam cum tæbe implicatam. Quam ipſe curauit poſt tonus produmant lacte caprino chalybtrato, & frigidis hepatis applicitijs.

In contumaciſſimis & diuturnis obſtructionibus, taſticum ribe dextræ, vel ſimilæ (prout hepar, aut lien afficitur) inſuſum, plurimum conſistere poterit.

Referatis magis ex parte obſtructionibus humores pituitoſi ac ſeroſi in venis reſiſtunt, præcipue in habitus corporeſe ſtagnantes, per ſudores reſoluendi ſunt. Cui viſi conueniet decoctum gnaici in naturis frigidiſſimis, vel radices chinæ ac ſalſeparillæ, in calidiſſimis, per quindecim aut viginti diea exhibitur. Hac cauſione adhibita, vt quarto aut quinto quoque die intermiſſo ſudore, cartharicum detur, quo humorem circum viſcera collectum præparatum, ac concoctum (ad ſudores ineptum) per aluum detrahat. Alioqui intus ſi reſiſt, ibi obduſcens, & purſcens, febris & aliorum morborum occaſio erit. In eundem finem thermæ ſulphureæ vſurpari poterunt, quales ſunt noſtræ Balneucnæ tam potu, quam balneo. Poſt enim illarum aquarum expeditis prius, & liberatis viſceribus antea propoſitis, detegitur excluditurque humor in prima & ſecunda corporis regione contentus, per alut & vrinæ profluuium: tertia vero regione excitatis a balneo ſudoribus, ab humorum ſarca liberetur.

Ac denique congreſſus, ſi legitime fieri poſſit, poſt obſtructionum remedijs humerit viſiſſimus: illo enim calor naturalis in partibus naturalibus multum excitatur, quo vteri vaſa impende dilataunt. Et docet experientia, interdum prima coniugij nocte pallida iſtis menſium fluxum & excitare, alijs vero, quæ optima fruuntur valetudine, tempus conſuectum anticipari.

C A P V T I I.

De ſuppreſſione menſium.

Menſium ſuppreſſio addeſe dicitur, quando in femina ætate matura, quæ nec leſa, nec grauida eſt, ſanguis per vterum euacuat, quæ naturaliter ſingulis menſibus fieri conſuevit, varijs aut patcijs procedie, aut omnino ſupprimatur.

Cauſa illius ſuppreſſionis, vel ad vterum referenda eſt, vel ad vaſa illos, vel ad ſanguinem, qui per illas ſunt aut fluere debet.

Vteri varij morbi ſuppreſſionem iſtam efficiere poſſunt; intemperies nimirum frigida & ſicca, denſitas & conſtringendo corpus vteri, vel calida & ſicca partem eandem exſiccando, vel euſdem alimentum excrendo, unde prauis humoribus generantur, qui partim inſixi liberum menſium effluum prohibent: Morbi etiam organici cuiuſdem eſſæ, nempe inflammatio, vel ſcirrhus, diſtorſio oculi interioris, vel compreſſio facta a tumoribus partium vicinarum, aut omni crassiſſis: ipſius vteri denſitas & crassiſſis n.

nia, vicerà & cicatrices ab his relietis, aut exalacratione co-
tyliconum in violento abortu.

Vaia vteri non raro obstructions patiuntur, quæ fre-
quentissima est causa mensium suppressionis, ab humoribus
frigidis & crassis oriendo. Interdum etiam a consti-
tutione earum venarum (suppressione hæc contingit, quæ fit a
parvis vicinis distentis, vel tumefactis, vt de ipsius vteri
altrictione dictum est).

Sanguis quantitate, qualitate, vel motu peccans, causa
esse potest suppressionis mensium. Quantitate peccat aucta
vel imminuta. Aucta, si nimia copia in venis redundet: tunc
enim venas nimium distendit, vt sefe contrahere nequeant
ad expulsionem; quæ admodum vesica nimis repleta vrinam
emittere nequit ob eandem distensionem. Imminuta
verò, quia paucus & immixtus sanguis in corpore retine-
tur ad alius nutritionem.

Sanguis qualitate peccat, dum crassior & viscidior est, ex
se, & propria natura, propter frigidum hepatis alarumque
partium interperiem, vel ex humorum crassiorum pitui-
dorum scilicet aut melancholicorum permissione, unde
plerumque obstructions oriuntur.

Motu vero peccat, cum per alias vias excernitur, vt per
nares, vomitum, peruram, vrinam, hæmorrhoides, & multas
alias partes. Vidi puellam pusillam habentem in capite,
quæ linguis mensibus aperiebatur, & lætis copiosum lan-
guinem fundebat. Multis vero vidimus languinem perio-
dicum per pulmonem reiicientes, quæ euacuatione purgationis
menstruæ vicem gerebat.

Causæ ex quibus suppressionem sanguinis promouentes
fontia frigida & frigida, vt Aquilonia tempellasi ingres-
sus precepit in aquam frigidam, aut nimia in ea mora, præ-
cipue dum suam purgationis mensibus peribi pauciores, vel
copiosiores, crassiores & frigidiores, vel alitringendi vi præ-
dictis calidiores etiam ad faciunt, vt nimius salis visus, & aro-
matum, medicando hepatis, alarumque partium subtilita-
tem, & sanguinem ipsum absumendo, atque exsiccando,
unde crassius acquirit, obstructions efficiendis ido-
neis, ut citationes vehementes & vigilie immodice lan-
guinem & valde absumentes: fomus diuturnus & otium im-
modicum calorem nativum enervans & cruditates multi-
plicans, excrera & retenta nature limites excedentia, vt hæ-
morragia narium, aut hæmorrhoidum, diarrhoea, aliaque
euacuationes diuturne per vomitum, vrinam, aut sudores.
Ac denique animi pathenata grauiora, vt iracundia, vehem-
entia, timor, subitus, moror perseverans, zelotypia grauis
& similia.

Diagnosia suppressionis mensium ex ipsius ægrotantis
relatu, notanda est. Sed quia illa vel a causis præternaturalibus
procedit, vel a naturalibus, pura grauitate; signa
vtriusque in suppressionis distincta, proponenda sunt; ne
Medicus a mulierculis grauiditatem ex illegitimo concubitu
contractam regere conentibus, decipiat; neque reme-
dia menses promouantia grauidæ mulieri temere præ-
scribat.

Primo igitur grauida vt plurimum naturalem retinet
colorem, qui in alijs valde immutatur, & pallidus ac fuscus
efficitur.

Secundo, symptomata, quæ grauidis in principio accide-
re solent, in dies paulatim mutentur: contra vero in simplici
mensium suppressione, quod diutius menses subsistunt, eò
magis symptomata augentur.

Tertio, grauida post tertium mensem, a motus & finis
infantis sensibilibiter percipitur, adnotata venter inferiori ma-
nu: in alijs vero sentitur quidem aliquis tumor, sed edema-
tosis, ac minime durus, qui circumscriptionem non habet
semper cum vtero limitatur.

Quarto, si osculum vteri interiori a perita obstetrice tan-
gatur, non ita exactè clausum, vt in grauidæ percipitur, sed
potius durum, contractum & quodam dolore affectum.

Quinto, grauidæ vt plurimum bilares sunt, & parum in-
animi pathenatis mutantur: contra vero in suppressione,
mensium plerumque moestas sunt, & tristitia afficiuntur.

Signa causarum in hunc modum se habent.

Vteri varia quæ suppressionem mensium efficere valent,
in sequentibus capitulis erunt explicanda: maxima tamen

pars eorum ex relatu ægrotantis, inspectione & contractu
earum partium percipi potest.

Obstructions & angustiae valorum vteri cognoscuntur
ex labore & molestia, quæ in lumbis & partibus vtero vi-
cinis insilant: potissimum menstruæ purgationis tempore,
percipiuntur: & si quid tunc temporis affectus, mucosum, in-
balbum, aut subingens appareat. Affectus vero partium
vicinarum, quæ vteri os aut venas occludere possunt, ex
propria signis apparebunt.

Sanguis in venis redundans sefe euidenter profert ex ve-
nis admodum distentis in cruribus & brachijs tum si signa
camofior & rubicundior euaserit, cibusque lantioribus
sefe per multum tempus impleuerit. Defectus vero sangui-
nis erit coniiciendus, si femina obefior fuerit, si febrem diu-
turtum, longam inediā, aut cibi fastidium passa fuerit.
Præterea vero sanguinis qualitas, ex prano corporis habitu,
hepatis aut alarum partium vicio, & præsertim ex ipsius lan-
guinis consideratione, si tantillum ex eo effluat, inno-
teret. Motus vero sanguinis præposterus, quando nempe
per alias vias effluat, per se satis sensibus manife-
statur.

Quod ad prognosin attinet; mensium suppressio pe-
riolofissima est, ex eaque multi atque grauissimi morbi
oriuntur, & quidem alij in ipso vtero, vt tumores,
abscessus & vlcera; alij in toto corpore variique partibus
vt febres, obstructions, cachexie, cibi fastidium, hy-
drops, cardiagia, tussis, difficilis respiratio, hypothy-
mia, ophthalmia, mania, melancholia; capitis dolor,
arthritis, & alij non pauci. Progressum morarum, quæ
ex suppressione mensium oriuntur, eleganter propoliit
Hippocr. lib. 1. de morbis mulierum, his verbis: *Tertio men-
se post suppressa menstrua incipit sentire suffocationes & hor-
res, lumborum grauitatem, & quandoque febrem*. Quod si
suppressio diutius perseverat, iam illi obdurefcit venter,
vrina copiosior mingitur, cibi fastidium, & vigilie in-
grauescunt, ita vt inter dormiendum denubis frideat:
& si adhuc retineatur, quinto mense, his omnibus, &
maximè doloribus vgetetur grauis, sed sexto mense in-
sanabilis morbus redditur, qui antea curari poterat. Ee
cum hoc anxia fit, & animo inquietur, pituitam vomit;
si magna vexatur, dolebunt partes ventris & pectus,
lebris accedit, lippimeiturque alij excrementa, atque
vesicae, ipsa dorsi dolore vexabitur, etique & quasi
balbuties. Post hæc autem intumescunt crura, pedes;
venter, & vrina mingitur rubra, sanguineaque, & do-
lor totum occupat corpus, maximè collum, ipsamque,
et inguina atque sic moriuntur, scilicet ex hydrope. Hæc
Hippocrates. In hoc contextu dubium facit, quod ad-
citator sexto mense morbum esse insanabilem: contra-
rium enim docetur experientia, & ipse Hippocr. Apud
referit ancillam quandam cui per septennium suppressa
fuerant menstrua, illis tandem redeunibus sanata fuisse
relinquit. Conciliari potest Hippocrates tum seipso,
dicens, vitæ lex menses morbum esse insanabilem, quan-
do mensitua in ipso corpore aut canitate vteri retinentur,
quia ibi patreunt, aut lupparunt, vt in reteritis locis
contingit: hoc tamen non de quacunque suppressione esse
intelligendum.

Minus periculosa est illa suppressio, quæ a multitudine
sanguinis laudabilis exoritur, vel a pinguedinis copia, hæ-
morragia, & vacuationibus aliuscausæ enim illæ, si non
multum inualuerint, tolli facile possunt.

Difficilius vero curatur, quæ a lacorum grauitate, vaso-
rum obstructions, vel angustia dependet; quæa rebus illo
humor in penitiores os meatus insinuat, non nisi agilis
remedus, & diuturna operaculo mulierculæ fur valde
impatientes, educi potest.

Suppressio mensium, quæ ex proprio vteri affectu pro-
ficiscitur, omnium pessima est; quia pars illa per idio-
pathiam sefe, difficile curari potest, ob perpetuum & cremen-
torum affluxum, quorum receptionem ea maximè disposita
est: vt corporis totius sentia ac cloaca non nonnullis no-
minetur.

Curatio huius affectus pro causarum varietate varie
instituta est. Ac primum si a nimia copia sanguinis suppressio

X x 3 otia:

exhiberem. Magis tamen proderit, si pulvis trochisc. de myrrha, dictamini, aut similis permisceatur.

Decocta viciatissima sunt, eorumque vtilissima in hunc modum le habent.

℞. Rad. petrolei & rubie maioris an. ʒ. ij. cicero rub. P. ij. Coquantur ad ʒ. iij. In colatura diluole pulueris cinam. ʒ. i. croci ʒ. ʒ. mellis q. d. Misce, capiat ʒ. vi. calide mane, bis in die, antequam menses protrahantur; vel etiam ʒ. iij. fluere incipientibus, si leniter procedant. Vel

℞. Rad. apii, alparagi, feniculi an. Vnc. ʒ. sol. matricarie, capilli veneris, capilli pulegiana M. ʒ. Coquantur ad ʒ. ii. Colat. Vnc. ʒ. iij. adde lyrypi de artemisia ʒ. i. Babat calidum bis in die, vt inpra. Vel

℞. Rad. cypri, angelice, valeriane & rub. tincl. an. ʒ. ʒ. sol. artem. pulegiana, an. M. ʒ. sem. dauci & celestean. an. Drach. dictam. cretici Drach. ʒ. cinam. electi ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. Fiat decoct. ad Vnc. ʒ. iij. In colat. diluole lyrypi de artem. & de hyssopo an. ʒ. ʒ. Fiat iulep. pro dosi vna, quæ alternis diebus exhibetur.

Quercetanus in Pharmacopoeia vnde decocta valde commendat in quorum primum ita le habet.

℞. Malij folia, anisi, vici quercini, ana Drach. ʒ. dictamini cretici Drach. ʒ. croci ʒ. i. Contundenda contundantur & macerentur per viginti quatuor horas in vino a. b. o. generoso. Dein parum bulliat. De hoc decocto exhibere Vnc. ʒ. iij. Alterum decoctum ita describitur.

℞. Splenem bouis integram. Huic in frusta incisum in phialam vitream capacem injecta, ita vt medietatem vixi amplectur addendo cinam. crasso modo confusi ʒ. i. caryophyll. ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. vini albi optimi q. d. ad humectandam solum materiam. Vas probe clausum ponatur in B. M. feruentissimo, adeo vt ebulliat per viginti quatuor horas, donec splen in particulas minutissimas coctus & consumptus fuerit, magnoque iuris exquisitissimi cocti & fragrantissimi copia restet: de quo ægra capiat mane Vnc. ʒ. iij. continuando per quatuor, aut quinque dies, cum menses fluere debent.

Aque stillatice cæteris liquoribus præferenda sunt, vt potest gustui gratiores, & quæ propter substantiæ tenuitatem facilius penetrant ad vala vteri obstruata. Præ cæteris sequens a Metcato, Roderico a Castro, Sennerto commendatur.

℞. Panem ferè ad fermenti naturam redactum, medio-criter coctum, & calidum, cum ablato cortice adde mellis ʒ. ʒ. pulueris seminum vertice dauci, amoei, anisi & feniculi, an. ʒ. i. trochisc. gallic. molch. myrrhe rubee, an. ʒ. i. cocule scitide ʒ. ʒ. Infundantur omnia in ʒ. ii. infrafcriptæ decoctionis, quæ recipit phaleosorum rub. cicero rub. an. P. ʒ. seminis iuniperi Vnc. ʒ. rad. tubæ, ruli, raphani siluestris, alparagi, apii & petroleian. Vnc. sem. chamæ recentis M. ʒ. amoei, anisi, feniculi, an. Vnc. ʒ. Coquantur omnia secundum artem. Deinde in B. M. stillatitiam liquorem extrahes, cuius Vnc. ʒ. iij. summo manè laboranti portages. Adde etiam postea ʒ. iij. rupos capli. ven. de duabus rad. de artem. Desis etiam sequentibus diebus augeri potest, si ventriculus non offendatur.

Guaiacum, assasiss decoctum in pituitosis corporibus vtile est, etiam cum dictatmo cretico: ʒ. per duodecim, aut quinquedim dies sumatur sine sudoris prouocatione. Illius experimentum refert Iacchus in nonum Rhafis, cap. 66. *Ego inquit, liquum Indicum coxi, & aduanc de latumum, & Indis molui, quæ iam per quinque annos nihil purgauerat, & steriles erant & purgationem turbata & partum.*

Chymici commendant tartarum vitriolatum, spiritum tartari mixturam (pituitalem) sales artemisie, melisse, radice chelidonie, valeriane.

℞. Aqua theriacalis sequens ad hunc visum mire est efficax.

℞. Theriace vet. Vnc. ʒ. iij. myrrhe rubæ Alexandr. Vnc. ʒ. iij. cinam. electi, croci orientalis, an. Drachem camphoræ Drach. ʒ. Attunde optimum vini spiritum, ad eminentissimum digitorum, & in leni calore tincturam extrahere. Cui per inclina: nonen effuse adde spiritus tartari sextam partem. Dosis cochleari, cum vino, aqua appropriata.

Dum præcisa remedia videntur, clysteres frequenter inieci maxime conueniunt, ob incumbentem secto-inte-

stino vterum, & ita componi possunt.

℞. Rad. ʒ. Vnc. ʒ. iij. caros, valerianæ, Vc. ʒ. mercurialis, M. ʒ. artem. sabing. an. M. ʒ. iij. cham. ʒ. iij. an. P. ʒ. iij. sem. caros, nigellæ, an. Drach. ʒ. iij. Coquantur ad ʒ. ii. In colatura dissolue lucra simplices & benedicti laxatiue, an. Vnc. ʒ. olei cheirini Vnc. ʒ. elect. de bacis lauri Vnc. sem. Misce, fiat clyster.

Imò vero purgationes per intervalia repetite erant præstantissimæ, quæ variis modis institui possunt.

Ac primum laudanum maxime à Galen. pulvis de hiera simplices & compositæ: quia præterquam quod educunt conuenienter humores superfluos, habent etiam facultatem vias aperiendi, & expurgandi vterum. Vel

℞. Aloes Drach. ʒ. iij. melle pulu. coch. min. ʒ. i. Cum succo sabine formetur pilule xx. de quibus exhibantur vni ʒ. ante prandium, tertio quoque die. Vel

℞. Aloes Drach. ʒ. iij. elect. ʒ. ʒ. diagryd. ʒ. i. m. ʒ. r. ʒ. i. rad. alari, an. Drach. ʒ. i. ipice ʒ. i. Cum lyrypi de artemisia fiat massa pilul. Dosis ʒ. ʒ. ii. ad Drach. ʒ. i. Vel

℞. Mailz pilular. cochiar. minor. Drach. sem. mercurij dulcis gr. xx. Cum lyrypi. ros. lotur. formetur pilule v. vel vi. capiat summo mane.

Exterius vero mensium suppressionum prosecutio aduerti solet topicis sequentibus, ad vias dilatandas, humores attenuandos, & facultatem expulsiuam excitandam.

℞. Radicem byronie, lilior. cypri, valerianæ, angelice, alari, iteos, & petroleianæ Vnc. ʒ. i. fol. artem. lauri, rutæ, sabine, thym. minor. pulueris pulegiane, malus mercurialis an. M. ʒ. i. lor. lambuci, cheir. cham. an. an. P. ʒ. i. gran. iuniperi Vnc. ʒ. i. Coquantur in aqua & vino albo. Colatura foueatur venter & inguina cum Ipongia.

Eodem decocto, aucta dosi, potest parari fœmicipium, in quo ægra vmblico tenus sedeat, & herbe coctæ sacculo includat venter applicentur. Causat tamen a sudore, qui menses potius sistit.

℞. Ollul. aneth. & rutacei, an. Vnc. ʒ. i. sem. vini generosi Vnc. ʒ. i. iuniori dorati, rad. cyclam. angelice, anilol. r. ʒ. i. fol. alari, an. Vnc. sem. Coquantur ad vini consumptionem. Coletur & exprimat oleum, quæ iungatur regio pubis, & padendorum calidè post forum, vel fœmicipium.

Suffus humidus sunt ex vapore decocti lotus & fœmicipii, quod modicè calens operatur patella perforata, cui annexi debet stibula oblonga, quæ collum matricis attingat, excipiatque summum manè & serò vestibus coacta.

Siccus suffusus ita conici potest.

℞. Caryophylli cinam. macis, an. Drach. ʒ. i. bacc. iuniperi Vnc. sem. seminis nigelle Drach. ʒ. i. styrac. calamit. Drach. ʒ. i. Fiat pulvis crassior, quæ carbonibus iniiciatur, fumusque excipiatur vt supra. Vel

℞. Styrac. calamit. ʒ. i. thuris ʒ. i. benioini, alipet. molch. an. ʒ. i. sem. caryoph. ligni aloes, cinam. an. ʒ. ii. Cum mucilag. gummi tragacanth. extracta cum aqua cinam. fiat trochisci pro subuigilio.

Pellaria in hunc modum fieri poterunt.

℞. Fol. mercurialis, conful. M. ʒ. i. polueris hieræ picræ & benedictæ lazaræ an. ʒ. ii. pulu. arif. Jongæ ʒ. i. mellis & sacci mercurialis ʒ. i. Fiat pellarium. Vel

℞. Agarici, myrrhe, ana ʒ. ii. galbani ʒ. sem. croci ʒ. i. Cum melle de spumato fiat pellarium, quod linteo raro inducatur & non diu in vtero relinquatur metu inflammationis.

Pilule cochiar. minores in parui pelfarii formam redactæ menses egregie mouent.

Iniectiones etiam in vterum fieri solent, quæ metrenchyta, seu clysteres vterini appellantur; abluunt enim fœdore vteri partibus adherentes, & osticia vasorum interna referant. Parantur autem ex decocto lotus præscripti, dempsit acrioribus vel siccum pangium cum artemisia, pulegio, mercuriali vel ex folo succo mercurialis deputato, in quo parum benedicti laxatiue fit dissolutum. Ad acciorem, enim ascendere nefas est metu inflammationis. Imò possit vium alferum, quæ intus per horum tantum viam morari debent. vtile erit decoctum maluæ, hordei, & violarum inque, vel parum hydromeli. Eius capitulo distat.

In affectu inueterato cautèræ tubij admodum plurimum conseruare poterunt. Quamuis enim illa à Sennerto repro-

bentur ex eo quod ab utero potius deriuit & humoribus, qui cum sanguine ex utero fluere solent, aliam viam concipiunt, & inclinationem eorum ad uterum prohibeant. Attamen maxime professe Mercurialis, Varandæ & aliorum, frequentibus et peremptis conprobatur est. Per ista enim vasa vasa lutea humores perpetuo vacuantur, & humorum cursus ad inferiora dirigitur. Ac tantum abest, ut humorum superfluum derivatio ab utero fluxum mensium auctet: quin potius cum procreet, sanguinem putiorem, & nature regimini magis obediens efficiendo, qui cum dictis humoribus ad cauteria non retrahitur. Adde quod isti humores nisi per has vias educantur, retenti in venis obstructions geminant, & ita suppletionem augent. Exiguam tamen, relictis mensibus purgationibus ad naturalem statum, cauteria esse occidenda, vel natura per uterum superflua excludere alicuius est.

In prædictorum remediis vñ quædam præcepta notata dignissima observanda sunt.

Primum, Nunquam utendum esse remedijs mentes moventibus, nisi præmitti vacationibus vniuersalibus; ne humoribus ad venas veri copiosis promoti obstructions augent, aut valde attenuati ad partes alias irrumpant & grauiam mala producant. Quoadmodum narrat S. henckius in observationibus, quædam Medicum Venetum mulieri suppletionem mensium laboranti, non euacuatam prius picuita, venas obstruente, apertam quoddam dedisse, quo assumpto paulo post illa in paralyin incidit.

Secundum, in mentes moventium exhibitione a leuiores esse incipiendum, ad validiora sensim progrediendo.

Tertium, Medicamenta mentes moventia in maiori copia esse exhibenda, quia eorum virtus retardatur in via a ventriculo ad uterum.

Quartum, Medicamenta prædicta esse exhibenda vel horis matutinis ieiuno ventriculo, vel etiam aliquando in ingressu, aut egressu balnei: enim in calidum ac solum corpus illabens medicina, vires suas potenter exerceat, & paulo adhuc efficacius, si tunc venarum inferiorum aperitionem illa exhibeantur.

Quintum, Pessaria, & clysteres uterino nuptis, & viro vti vti sunt duntaxat prædicti debere, & virginibus vero ut scilicet, samenta, infusum, & suffumigium sufficere.

Sextum, In biliosis, aut melancholicis temperamentis, calidiora omnia medicamenta esse deuitanda ac mitiora, tantum vitanda, quæ appetentia temperata & humefiant, atque emollientia esse permittenda.

C A P V T I I I.

De fluxu mensium immodico.

Mensium fluxus moderata quantitate, ac debito tempore procedens, naturalis est; si vero quantitas in modum excedat, vel frequentius redeat, vel diutius perseperet; immodicus ac præternaturalis censendus est.

Causæ mensium fluxus immodici eadem sunt, quas in hemoptis productione concurrere, vno loco, diximus; nempe anisomolis, diapedesis, diarræis, & diabrosis; quæ sunt a sanguinis quantitate nimia, caliditate, tenuitate, vel acrimonia, ætu, casu aut vulnere; quæ in hemoptis fit theoria solius ætus fit, ut eadem hic repetere non opus sit. Ideo lectorem ad dictum caput perlegendum remittimus.

Diagnosis ad ipsum affectum, aliusque causam dirigenda est. Fluxum mensium immodicum ac præternaturalem ostendunt, difficilis tolerantia, vitium lapsum, inappetentia, cruditas, & cachexia, color cadaverosus, pedum intumescencia, & alij affectus grauiiores, qui caloris nimii exolutionem consequuntur.

Causarum vero diagnosis in hunc modum instituenda est.

Per diapedesim sanguinem fluere ostendunt, rarus corporis habitus, & carnum molities, cibi & potus vix solum multiplicare idonei; ac præsertim ipse sanguis dilutus ac serosus, qui facile in linteis dignoscitur.

Per anisomoliam, vel thixim sanguinem fluere ostendunt, vulnere, casu, aut contusione prægressa, saltus, clamores, & gestatio ponderis insoliti in corpore plethorico, & mul-

to sanguine referro, vel ingens ætus, frigus immodicum, coitus immoderatus, iracundia insignis, & similia. Idem contingit post partus laboriosos, vel ab impetia obilitate nullitatos, post abortus, vel duratum mensium suppletionem, quæ collectum nimia copia sanguinem, constrictum deinde cluere facit.

Diabrosim, seu vicerationem in utero factam indicant, sanguis paulatim exsiliens cum sensu doloris & acrimonia, humores salii & acres in corpore redundantes. Sanguis vero effluens primo saniosus, ichoriosus nigricans, aut flauus profundior; postmodum vero si viceratio augeatur, frustula quedam partis deraduntur, a quibus deinde magna sequitur sanguinis effusio, quam sistere difficile est. Præcedunt causæ cacochymiam generantes, ut vici ciborum actum, salorum, putridorum, & similia.

Prognosis quod attinet. Omnis hemorrhagia copiosior, vel diuturnior periculosa est, præcipue ex utero, quæ non solum indiuicibilis, sed etiam species noxia est.

Diapedesis omnium minime periculosa est, quia minorem efficit calorem, & spirituum iacturam, diutius tamen, perdurat, propter crudiores & serosiores sanguinis proventus.

Rhitis & anisomolis manus inferunt periculum, quia magnam subito profundum sanguinis copiam citius tamen curantur, quia in corporibus bene sanis & plethoricis ut plurimum contingunt.

Diabrosis vero omnium difficilissima est, quia in vlcere fit substantiæ perceptio, quæ nouum istarum partium coactum impedit.

Si viri debilitas, & symptomata vehementia nullo modo minuat, sed in dies augeatur, ægre interitum portendit.

In senectute ualere menstruum nimis fluxus plerumque incurabilis, & lethalis est.

Curatio mensium fluxus immodici, eadem ferè esse debet, quæ ad immodicum hemorrhoidum fluxum fuit proposita.

Primo enim plethorica reuulsio in gratia in brachio celebranda est, phlebotomia vicibus, & digito per vires foraminis admoto. Magna copia sanguinis detrahendus est, quantum vires ferre possunt. Testatur enim Høliertus *comment. Aph. 50. scilicet*, s. se multas vidisse mulieres, quæ detractio multo sanguine & vena conualuerunt, cum nullis alijs remedijs posset reprimi fluxus sanguinis.

Frictiones, ligaturæ, & cucurbitule ad reuulsionem etiam conueniunt, ut in dicta curatione, præcipue vero manibus, iuxta Aphor. Hippoc. citatum; *Adulæ*, inquit, si placeat menstrua sistere, cucurbitulam quam magnam ad mammam appone. Si tamen admodum cucurbitula difficultas spirandi oriat, subito auerenda est.

Purgatio pariter eadem, ut in dicta curatione, conueniente potest; eaque semel, aut bis in hebdomada erit repetenda, donec impuritati viscerum & venarum sit pressum. Sublatis enim biliosis & serosis humoribus, qui sanguinem fluxum reddunt, ipse sponte consistit. Si serum magis abundare videatur, radix mechoacan cum rhubarbo conueniet.

Purgatio etiam per vomitum potenter reuellit, & ab Hipp. laudatur *a de morb. mulierum*. Blanda autem debent esse vomitoria, & frequenter iterari; aut etiam digito in os immisso vomitus provocari poterit. Imò vero iussit, critique vtilissimum, ante prandium vomitum clere, & alimen non vomere, sed solum id tentare.

Postmodum nlepi, pulueres, opiat, pilule, alique remedia incrasantia, & astringentia in dicta curatione proposita etiam conueniunt, additis etiam narcoticis si vixeret necessitas. Quibus frequenter vultus addi poterunt, a doctissimis viris experta.

Re. Cortices duorum ouorum recentius vltos thuris, maffiches an. Vnc. iiii. margar. præparat. coralli tubr. præparabes an. 5. u. lapid. hæmatit. smargdi præp. an. 3. sem. laring. hordes sine surchre P. i. albumina ouorum iiii. & si opus fuerit, adde parum aque chaly. beate & fiant due pilule, quæ in iurno coquantur, vt possint in puluerem redigi. Dos. 3. sem. ad 5. cum iulculo potum veruicis somno manent. Hoc puluere multas mulieres loco affectu satis antiquo curatas fuisse testatur Io. Michael Paschalis quoc; pulvis solus corticis oui ad 5. exhibitus in aurota per aliquot dies, & habetur prolethero.

Foreſtus ſequentem puluerem commendat, quem dicit eſſe vnum ex arcanis præceptoris ſui Helidæ. Accipit turturæ moderate pinguem, ab intellinis repurgatam, & lotum vino rubro aſtringente, & aqua roſacea. Deinde maſtiche Vnc. i. in ventre, ponit, & aſſiat ne elabi poſſit: atque in vera ad ignem rotat, & inter aſſiduum, loco butyri, aceto roſaceo alpergit, pinguedinemque ex eo deſluentem colligit, & viſu ſectur. Poſt perſectam aſſationem, turturæ in ollam noſtam vitream conijcit, luto philoſophico obturtat; & in furnum calidum demittit, vt turturæ perſectæ exſiccarit poſſit: quem poſtea in puluerem redigit. Cuius cochlear vnum exhibet omni mane, cum aqua plantaginis, aut decocto aſtringente. Et pinguedine reſeruata regionem renum, pubis & inguinum, inungit.

Noſtræ mulieres vulgare habent remedium ex floribus chamæleontis, quibus lac condenſare ſolent. Exhibent cum iulculo, aut alio liquore. Aliæ vtuntur coauglio hœdi, vel leporis ad 3. ſem. quod & languinem ſancient ſiſit, & concretum in vitro diſſoluit.

Succus plantaginis inter reliqua remedia præſtantiſſimum cenſetur à Gal. ſi recenter extractus ad Voc. ii. vel iv. exhibeatur.

Solenander diſto ſucco colophoniam addit, & infallibilè remedium aſſertit, his verbis. *Ad conſtringendum menſtrum rubrum antiquum; Accipe ſucci plantaginis cyathum vnum. Impeſe Drach. j. colophoniam pulueriſat, & tribus agræ. Ad ſiſt. quæ, & erit curata inſanſſenter, Deo dante.*

Succus millefolij huic viſu etiam conuenientiſſimus eſt, ſi eius 3. ii. vel iii. exhibeantur cum lyrapo corollorum, aut alio conuenienti.

Succus viticæ prædictis non cedit, vel etiam efficacior eſt: exhiberi poteſt ſolus, & cum alijs permixtus: vel ex 3. ſiſi fieri poteſt (lyrapus ad vltum frequentem).

Aqua ex teneriſſis, & rubentibus quercus folijs extra-
dictum proſituium ſiſit.

Sequitur autem aqua valde efficaci à Mercato in hunc modum componitur.

3. Panem ex amylo, farina hordei, & oryza conſectum. A ſunde aquæ chalybeatæ 3. ii. Quibus adde roſar. rubricæ. Pui. ſucci plantag. it. i. rad. conſolidæ maior. virentis & conſuaſatæ 3. ii. camæleontis M. i. carnis pyrorum, agrelitum & cydoniorum ana 3. ii. portulacæ M. j. boli armen. Vnc. j. balauſt. & ſanai omnium, ana Vnc. ſem. Deſtillentur omnia per alembicum: huius aquæ capiat 3. ii. cum ſyrupi de portulac. aut de roſis ſiccis Vnc. ſem. Pro feminis delicatioribus poterunt parari iulcula ex decocto pedum vitali, & ſol. plantaginis, vel languariæ. Vel ad increſcendum languinis, poterit fieri iulculum ex aqua roſarum pura, & vitellis ouorum recentibus. Iſdem quoque conſert conſeruâ fructus cyaorthoidi frequenter exhibita, præſertim ſi calida hepatis intemperies aduerſet.

Ad omne languinis profluuium. Præſci vtuntur oxy-
crato, largo hauſtu per os exhibito. Verum in menſium fluxu pertuſcendum eſt, quia vtero (vtpote parti membranæ) eſt inimicum.

Inter ſpecifica recentetur radix ſilpendiæ, & cortex radicis moti, quorum pulueres exhibentur ad 3. i. cum li-
quore idoneo.

Flores nucum, quando ſunt maturi, & cadere incipiunt collecti, & in puluerem redacti exhibentur ad 3. i. cum vino calido maturo per plures dies. Ex hoc medicamine omnes habentes fluxum menſtruum ſanciunt, vt teſtatur Solenander. Specifica etiam viſuſſocationibus vteri medetur.

Spica nardi tenuiſſime puluerata, & ſumpta ad 3. i. cum liquore idoneo, menſtrua cohibet: tum etiam ſi ex ea naſ-
cale componatur.

Lac chalybeatum per plures dies epotum in aſſectu in-
ueterato multum prodeſt: humorem enim acrimoniam cōtemperat, coſcendit, increſcit, corpus reſcit, & fluxui reſi-
ſtit. Hoc commendat Auicenna. Rhaliſ alij Arabes & An-
geliſ ad caſum extollit. Cauendum tamen ab eo eſt, vbi aliquand vitioſi humoris in corpore ſuſpicio ſuerit.

Aquæ minerales acidulæ, vitærolæ, ferratæ, vel alumi-

noſæ, in fluxu diuturno cohibendo, cauſis eiſdem auferen-
dis, & viceribus roborandis plurimum conferunt.

Chymici tincturam corallorum valde commendant, tum etiam vitærolam Martæ, & multa alia ſuis autoribus præce-
da. Pro potu vtatur aqua decocto maſtiche, vel millefolij, vel lentici ſicci in vino etiam lignum lentificum inſundi poterit, eoque nigro, & auſtero, quo maxime vicerâ ro-
borantur, & fluxiones cohibentur.

Diligenter obſeruandum eſt, in aſſectu inueterato mul-
tùm aſtringentia, & increſcitantia non eſſe diu viſuenda. Periculum enim eſt, ne matuſ offiantur, occidantur, & conſtringantur, atque obſtructiones generent, & viceribus præcipuis (quæ in ſigne damnum in hoc aſſectu recipere ſolent) plurimum offiant. Sed multò præſtabilius, ſi in hepar roborantibus inſilire: quæ quidem aſtringunt, at-
tamen ita moderate, vt aſtrictione obſeſ nequeat.

Lodouicus Septalius lib. 7. *Annotad. medic. art. 144.* de-
coctum corticem aratorum tanquam remedium ceterum
ita commendat, vt propria ſua verba tranſcribere non
inutile ſuerit. *Poſt, inquit, huiusmodi remedia ex ratione ſacta, cum ea quæ uti ſuſcipi ſolent, aut aſtringunt maxime conueniunt, vnum in præſentia emittendum nullo modo eſſe cenſus, quo inſiſtas propemodum mulieres ab hoc morbo liberaui: inter ſecreta aliquando reſeruatam poſt aſ-
ſeruitibus; quæ ſub niſtra tuteſta ad præſentem medicum ad-
diſcendum exerceatur, etiam communicatum; nam omnibus ad communem utilitatem, commune factum: quo ſerui mon-
quam fruſtratum ſum, modo ab exſiccerato aliquo vaſe in vitro
fluxus in menſtruum aliquando non habet occaſionem. Eſt
autem emiſſio expreſſio, & ſaciliſſima parabola. Recipe autem
aquæ 3. ii. In quâ incoque cortices tritum aratorum accide-
rum, aliquando ad hoc ſubſtitutum, & alios in phillyris acide,
& excoque ad duorum partium conſumptionem, & ſalta colu-
tura Voc. viij. vel ix. perandas maſtade. Quod ſi valentius
medicamentum parare hoc ſipum volo, manipulum herbe pilo-
ſellæ in ſine excoquendam adde. Validiſ ad hoc reddatur, ſi in
aqua Villenſi decoctio fiat; aut ſi in eſſe liberi aqua ſit, vbi
dua tertio partes per colentem abſumpta fuerit, & excolat
reliquum chalybe induto igne ſuprà, ad hoc magis roboretur.*

Exterius vter topiciſ medicamentis fluxus menſium
immodicus cohiberi ſolet.

Ac primum ſomenta in hunc modum parari poterunt.
3. Rad. bulthoræ, tormentillæ, & corticum granatorum,
ana Vnc. ſem. fol. plantaginis, centimoidi, burſæ paſtoris,
equileſti, ana M. j. nucum cupreſſi, balauſior. granorum
myrti, ſumach. ana Vnc. j. Bulliant in aqua ſertata & vino
auſtero. Colatura foueatur regio pubis valde tepide.

Item ſpongia marina in aceto forti bulliat, quæ ſupra
pubem mulieris poſita poterit ſiſit.

Semicupium ex priori decocto ſotus paratum, aucta
etiam conuenit. Sed cauendum ne calidum adminiſtretur,
ſed tantum ſubrigidum; alioqui calore ſuo vaſa vteri ma-
gis aperiet. Efficaciſſimum eſt balneum decoctionis alu-
minis; ſed ſterilitatem inducit.

Linimentum, vel vnguentum poſt ſotum, vel ſemicu-
pium, admouendum eſt publi, perinæ, & lumborum regi-
oni, in hunc modum compoſitum.

3. Ol. myrtini, de maſtiche, & cydoniorum, ana 3. i.
boli armen. languis draconis, & karabæ ana 3. i. aceti
cochlear. j. Fiat linimentum.

Vel admooueri poterit vnguentum comitiſſæ, aut vni-
guentum de bolo recentur diſpenſatum, vel ceratum ſe-
quens ſummè efficaci.

3. Piceſ naualis Voc. ſem. thuris maſculi Vnc. i. maſtich.
Vnc. ſem. terebinthinæ Vnc. i. ſang. draconis, roſar. rubræ
ana 3. ii. Fiat ceratum rebus applicandum.

Emplaiſtra etiam vmbilico, & lumbis vtiſſime admoventur,
ex maſſa emplaiſtri contra rupturam, pro matrice, de
maſtiche, ſolis aut ſimul myrtis: vel ex maſſa emplaiſtri de
Vigo pro ſtraſtris, quod præſtantiſſimum eſt, & abſque
calefactione operatur.

Cataplaſmata frequentia multò efficacius operantur, &
in largo languinis profluuii, vnde vitæ periculum imma-
nè eſt, plurimum poſſunt.

Parantur autem 3. i. vel bolus atemena cum ſucco plantagi-

is, & pauco aceto incorporantur, & admoneantur.

Vel pulvis gypsi & cum gummi arabici torrefacti 5. x. & quatuor albuminibus ouorum incorporatur, & cum placentula gossipi emplatretur partes praedictae. Dicit Solenander, hoc cataplasma omnem muliebrum fluxum, sistere vno die.

Benignus operatur, & specifica quidam vi potius quam astrictione, cataplasma ex vitra cocta in sartagine, quibus regionem admovent.

Iniectiones etiam sunt in vterum per metrenchytem ex succo plantaginis solo; qui vaide est efficacis, & a Practicis celebratur. Et succo polygoni solem praeparari poterit. Tum illius succi addiderintur iolent maculaginis gummi tragacanthae 3. i. amyli 3. i. aquae peculii rosarum Vnc. iii. Et in vterum infundantur. Vel

3. fol. polygoni plantag. millefolij, burse past. caede equinae, ana 3. sem. Coquantur ad h. sem. In colat. dissolue acacie Drach. iii. tinguunt dracon. boli armen. & lapid. haemat. ana Vnc. i. Misceantur, hac col. l. ut vterum.

Succus ex aceto supra laminam candentem effuso, & in sella perforato receptus, vtilissimus est. Vel in hunc modum componi poterit.

3. Thuris, malthices, ana 3. ii. myrtillorum, ladani, ana 3. i. succini, rosatum rubr. balsalthorum, ana 3. sem. Cum infusione tragacanthae in aqua rosarum, sicut trochisci pro lunumagio.

Sustituuntur comburalium testatur Ioannes Michael Palchialis, se sciam quoniam curasse, quae septem ferè mensibus hoc fluxu laborauerat. Idè etiam sustinuit vngule mulie hunc fluxum minime sistere & perituri esse scribit.

Palliat adstringentia hic etiam viuantur. Quae tamen parum vtilia sunt, cum vix ad officina venarum aperta possint pettingere. Si tamen vix ad ceruicis vteri aperta sint, locum habere possunt, & in hunc modum componi.

3. Succus plantag. vel centimodae 3. n. pulu. trochisc. de carabe, & acacie, ana 5. Misceantur cum albumine oui, & pauco serico muolantur. Fiat pessarium. Vel

3. Pulv. hypocistidis, acacie, boli armenii, sang. draconis, rad. consolide, aragolite, galliarum, ana 3. sem. succi portulacae, vel plantag. vel syrups. de rosis ficcis, aut mirtilorum q. l. Excipiantur bombace.

Parantur etiam pessaria ex folijs portulacae, plantag. aut polygoni vel alterius herbarum convenientis contritae, & in linteum muolatae; aut ex vnguento comitissae lana excepto, & vtero indito.

Neque omittenda est lotio tibiarum in aqua frigida, aut decocto asringente, a Practicis visitata, quae cohibendo mensium fluxum non parum conseruit.

Circa topicorum administrationem hoc aduertendum, ne scilicet adstringentia medicamenta saltem fortiora admoventur, priusquam reuulsiones sufficienter celebratae fuerint, praeterit illa quae vena sectione perficitur. Periculum enim est, ne vires in vtero, aut grauiore alios affectus contineat. Ideo semper, quantum morbus daretur, inducias poterit cum reuulsibus, tum incantibus atque allringentibus internis curatio tentanda est, priusquam ad topica illa deueniatur.

Supra descripta curatio fluxui mensium aptari poterit, siue ab analomosis, siue a diapedes. siue a thym. seu ratione valorum dependeat. adhibito iudicio. Ad si ab erosione, seu exulceratione oratur, illius curatio erit militanda prout in vicinis vteri curatione docebitur.

In toto morbi decursu, dum praedicta remedia viuantur, vicerit roboratio, & correctio sanguinis incubenda erit, quemadmodum in fluxu haemorrhoidum dictum est.

Ad censque sedato symptomate, prophylaxis ibidem, instituta, hic etiam conseruit poterit.

C A P I T U L U M IV.

De Fluxu muliebri.

Fluxus muliebri, vteri profluuium, seu mensis albus, dictus, sit quando humores excrementi ex vtero profluunt, vel conuulsi, vel saltem nullo ordine nulloque curatu.

Illi autem humores excrementi modo albi sunt, & pituitosi, sero lactis, aut hoc die cremori persimiles: modo pallidi, aut flauo, aut virides, ex bilis permissione, modo aquosi ex serosis humoribus. modo lubrigo, ex humoribus melancholicis admixto; modo acris & erodentes, ut partes vterinae exulcerent; modo tetri & grauiolantes, modo nullo odore molesti.

Feeminas adulescentes, & aetate maturas plerumque matum hoc solet corrigere; virgines tamen ab eo non semper sunt immunes, quod perperam nonnulli asserere ausi sunt, vitarum angustiam accusantes, & temere pronuntiantes, corruptas esse virgines, quibus fluores albi promanant. Item in si virgines satis amplas habeant vteri venas, ut per earum ductus menses ordinatim fluere valeant, quid etiam fluores albi per eadem vias sistere poterunt, cum saepe materia illius fluoris ipso sanguine tenuior, & fluidior sit, utpote serosa vel biliosa? Idipsum confirmat experientia a doctissimis Medicis prolata, & quodammodo via a nobis etiam confirmata, castissimas atque integerrimas virgines, de quibus nulla corruptio suspicio esse potuit, hunc affectum passas esse. Et testatur Femelius se puellam vidisse octavo aetatis anno, hoc malo obiectam, ac diu po- itea grauius afflictam.

Generatur autem humores isti excrementi, vel in toto corpore, vel in aliqua parte principalis, vel in ipso vtero.

Si a toto corpore isti profluunt humores, vel ex prauo alimento, vel ex vitio, & habituali totius corporis temperamento generantur, & ad vterum confluunt, tanquam totius corporis sententiam, ac veluti cloacam ad quam reliquae partes sese exonerant.

Partes vero peculiares, quarum consensu in hoc morbo vterus afficitur, portissimum sunt, cerebrum, ventriculus, hepar, lien, menterium, & vesica, quae sua excrementa ad partes debiliores & receptioni magis dispositas, amittunt.

In vtero generantur humores isti excrementi, quia proprium alimentum commutare nequit, ac debilitatem re- tentricis, concoctricis, ideo illud maiore parte in excrementum humorum facit, cum imperfecte coquantur, vel potius corruptantur. Imperfecte coquantur in frigida vter imperie, corruptantur in calidiori, sit cum vterus ex concoctionis defectu; nutritione sua frustratur, novum alimentum continuo attrahit, quod in excrementum conuertitur, ab eo tanquam inutile e pellitur, ac noua omnino fit attractio. vnde coctus, & copiosus fit prae illius humoris per vterum effluxus. Debilitatur vterus, & horum excrementorum receptioni magis idoneus redditur a grauiditate, parte, abortu, contusione, inflammatione, abiectione, aut exulceratione.

Diagnosis ad ipsum affectum, partem affectam, & causam illam producendam dirigitur.

Affectus ipse ex agrotantis relatu facile cognoscitur, eumque non raro varia symp. omata consequuntur, nempe color faciei pallidus, appetit. via deiection. nausea, spirandi difficultas, vtriusque deiectionis, oculorum tumor, & inflatio, moror & tristitia, vtriusque crasse & turbidae; aliaeque non paucae, quae pro humoris peccantis diuersitate varia esse solent, ut inferius distictè magis explicabuntur.

Partem affectam, & locum in quo humores excrementi fluorem illam efficientes generantur, sequentia indicant.

In toto corpore materiam istam generari indicant, lassitudo spontanea, & grauitas, a qua leuatur agra, copia humoris excreta, & rursus grauius incipit noua collecta materia; vterum plenitudo, torpor pedum, manuum ac crurum, quae signa plenitudinem praecipue offendunt. Caecochymiam vero in toto corpore redundare significant, prauius totius corporis habitus; manuum & pedum inflationes, pruritus & mordacitas in toto corpore, si humor acrimoniae sit particeps, & alia non pauca.

In aliqua vero parte peculiari materiam peccantem offendunt symptomata, & excrementa cuique parti propria & particularia; v.g. icterus, dolor, calor, aut tumor, cum excrementis biliosis, si cor esse affectum significans; eadem vero symptomata in sinistro hypochondrio apparentia, cum excrementis humorum melancholicum referentibus.

tibus, ex liene fluxum procedere ostendunt. Pituitosa excrementa, nausea, improprietates, & aliquando ingens fames frequens ciborum corruptio, & ructus acidi, vel idolorum certa litor affluunt ventriculi indicia.

Dolor capitis, spumosa excrementa, consueti per os & nares euacuatione suppressa, & capite humores affluere testantur. Si nulla predictarum partium lesarum signa appareant, ab ipso vtero fluxum procedere coniectandum est. Præterea forma est boni coloris, materia fluens pauca, eihum solius vteri est excrementum. Præcesserunt causæ vterum labefactantes, vel partus laboriosus, vel abortus, calidus supra ventrem aut deorsum, coitus immoderatus, præsertim si feminis nauens coniugio tradita sit, tumores, vicia, alique affectus vterum obfidentes, quorum signa in propriis capitibus propostia sunt.

Humorem vero, fluxum illum efficientem, testantur in primis colores humoris effluens supra propostus, qui in lineis appareat, quibus ille excipitur; si, vt docet Hippoc. 2. de morbis mulierum, linea illa areolata simplici aqua lauentur, ac in vmbra exsiccentur. Tunc eum manifeste colorem referunt humoris in excrementis dominantis; quibus addi possunt ex leucotica generali, signa humoris in toto redundantis.

Signa denique propendenda sunt, quæ illum affectum, & consensibus distinguere valent. Consensibus iuxta sunt excrementa, paritales ex matris viciis, & gonorrhæ.

A materia purulenta distinguuntur ipsius viciis signis proprio capite & circuibas, cum etiam quæ ipsam, longè est crassius, & albicans, & minor quantitas, si rite concoctum sit; si vero lascosum & ichorolum fuerit, quodam crure periculum est, & interdum filamentosum partium, & cum insigni dolore sensu exire solet: tum etiam mulieres vicia potentes in vtero, aut illius ceruicæ, non adduntur coitum, nisi cum molestia, quæ affectum ipsam expræcat; quæ vero muliere prolium patiuntur, libere, & patienter veneros amplecti solent. In gonorrhæa vero materia effluit in minori copia, crassius maiore, albedine splendidiore, & longioribus intervalis; ac rarisius foret, nisi si gonorrhæa sit venialis, ac in puro concubitus contracta, ac ardore urinx, pudenti viciis, alique signis malignitatem indicantibus innotece.

Prognosis huius affectus ac vix parte bona est, ex altera vero mala. Bona dici potest, quatenus vterum num vitæ periculum non mittit: mala vero quatenus affectus est continua, & diuturnus, & coitus difficilissimus; siquidem humor spermiolum effluens, qui semel hanc via affecta nit, difficillime amittitur, cum vterus, vt antea dictum est, sit lesa totius corporis, per quam etiam in statu naturali humores superius singulis mensibus expurgantur.

Si grauior euadat affectus, multa alia mala inducere potest, nempe iteritatem, vteri precidentiam, & ulcerationem, cachexiam, hydropem, talem.

Fluxus liuidus, cruentus, aut fetidus deterior est albo, pallido, & minime fetido.

Quo diutius durauerit huius affectus, eo curatio difficilior est.

Venas hoc malum plerumq; ad mortem comitatur, ob pituitæ copiam, & facultatis concoctricis imbecillitatem.

Curatio huius affectus incipienda est ab vniuersali humores peccantes euacuatione, quæ illius naturæ conueniat. Et quæ huiusmodi fluxus & pituitosa, & serosa humoribus plerumque fieri consuevit, hos humores purgantia medicamenta erunt præcipue viaripanda, & isque cholagogæ, aut melanagogæ erunt adhibenda, prout biliosi, aut melancholici humores isti admixti fuerint. Præcribi ergo poterit apocema cocheniensis, alterans simul & purgans, pro quo aut quinque dosibus, pro foliis euacuatione; hoc cōtinuo aduertendo medicamentis purgantibus quodam astringentia, & roborantia esse permiscenda, ne humores commoti, versus vterum magis præcipitentur.

De vena sectione dubitatur, an scilicet in hoc affectu conueniat. Cum enim hic fluxor à cacochymia dependat, & illa per phlebotomiam ad venas attracta, massam sanguinis inquinare possit, nullus videtur esse vena sectionis lo-

cus. Adde quod cum id chronico hoc affectu vires valde deiciantur, & corpus non raro ad tabem perducatur, vena sectione amplius labefactandum, & alimentum suo fraudandum non videtur. Ita tamen decidit, quod si fluxus iste non sit purus & solutarius, (sed aliqui aliquo modo premixtus, & subterfugus appareat, tunc celebrari potest vena sectio, tum etiam si insignior sit secoris caliditas, & biliosi succi acrimonia huius fluxui coniuncta. In his vero casibus præsertim quando hic affectus innotuerat, melius est à phlebotomia abstinere.

Ligatura in superiorem partibus, & euctubitali scapula & dorso ad reuersionem erunt vtilissima; tum præcipue influentia ex lineis primis mollioribus, mox alperis, quibus quoties Galen. vtebatur in vixore Boethi, quam intra tredecim dies curauit, ut ipse refert lib. de præcognitione ad Pothumum cap. 18.

Ac præter purgationem vniuersalem supra propostam, viciales etiam purgationes administranda sunt, & frequenter repetendæ, vt magis illa excrementa humoris illiusdem educatur, & natura assuescat humores per alium expurgare, qui ante ad vterum consueverant. In hunc finem /rupi magistralis, spulæ, & opiatæ viciales conueniunt, potenter egrotantis temperamento, & humoribus peccantibus congruæ. In affectu pituitoso laudar Mercatus syrapium ex decocto ligus gnææ, cum fenice, & perperbo, & agarico, tum etiam pilulas sequentes.

1. Pululæ huius 3. agarici trochiscæ. Drachi 6. Cum melle rosato sunt pilulæ, quorum summa non esse capiat liborans, sed aut septem, tertio quoque die; postea vter ex eorum tres tantum, quinto, aut sexto quoque die. Vt ad magis adstringendum sinat & purgandum, in quocunque temperamento, ita confici poterunt.

2. Rhab. electi succo rosato frequentes irrigari 3. li. myrobol. curramor, chelidonium, & iderum in syrapium succo rosato an 3. miltichis 3. l. spica 3. l. Cū syrapi rosato fiat massa pilularum, cuius dosis erit 3. abis in septimana.

In fluxu ictero rade salapæ est præstantissima, eaque in hunc modum viaripari poterit.

3. Salapæ sacculi sine pulueritate 3. cinam. pulueris 3. l. Miltichis & cum rose pulis fiat potio, quam sumat in aurore.

Pulua la vix per mensem quotidiè exhibita, contumax vteri prolium in curat, quod alio remedio ita curatur, vt in obseruationibus nostris videre est.

Vomitus etiam in hoc affectu maxime commendatur, in iis præsertim quæ facili vomunt, quia humores crudi, qui circa ventriculum cumulari solent, euacuantur, tum etiam ab vtero potenter reuelluntur. Inter idem medicina concilianda vomitus laudar dafarum Femeli, cuius Vnc. sem. data cum aqua mullâ, vel cum oxymelitis Vnc. 4. & iure pulli tepidioris aut ter in mense, sine vilo labore vomitus ter, vel quater moiet.

Possit sufficientes purgationes, ad discutiendas humores superius reliquias, ludores excitari poterunt, quibus etiam non sicut conueniens reuolui fluxioni ad vterum desumenda. Hinc rei conuenient decoctum gnæci & fessæ in pituitosis, vel chinæ & fallapariæ in biliosis meicholiosis; additis etiam herbis refrigerantibus, vel temperatis, ne magis isti foci exasperentur, & aciores euadant. Vel prouocabuntur sudores herbarum calidæum decocto, vt nepetæ; calamentis, feniculis, hyssopi, enulæ, chamomæ, anethi & similibus, cuius euaporatio in solio idoneo recipiatur. Ex quo etiam decocto balneum fieri poterit, à quo sudores e-citentur. At in calidioribus naturis sufficit balneum aque dulcis tepide, in quo modici tantum sudores, & blandi prouocentur.

Thermæ etiam sulphureæ sudores potenter excitant, & huius morbi reliquias abstant; harumque vix nonnullas mulieres curatas vidimus, quæ aliis remediis restitui nequiverant.

De diureticis non levis est difficultas, an scilicet huius affectu conueniant. Illa enim non solum vrinas, sed etiam menstrua prouocant, calefaciunt scilicet, & attenuando humores in venter contentos. Attendantur ab omnibus auctoribus approbatur, & à Gal. ipso, qui ipsi vix est in vixore Boethi.

Boethii. Et ratio est; quia diuretica urinas primario promouant, mox vero secundario, & quasi ex accidenti. Deinde renes continuo serofam materiam attrahunt, vitæ vero excipit tantum. Unde credibile est, maximam illarum humilitatem partem ad vias urinae profecturam.

Diureticum autem in dicta muliere à Galeno usurpatum, fuit decoctum alari, & apii in aqua communis; atamen magis temperatum efficeretur in aqua cichorii.

Magis compositum decoctum in hunc modum parari poterit.

Rad. alari, apii, ana Vncj. fol. calamenchii, fol. dancilæ, ana Mj. fol. sambuci M. sem. poly. pod. & sem. carthami, an. Vncj. sem. coquantur ad lb. i. Colaturæ dentur Vnc. v. mane. Et si purgans efficere volueris, adde decocto aliquid agarici, vel turpethi in ligatura nicotii.

Dubitat de causis tribus admoendis. Cum enim, humores alicuius ad inferiores, & florem illum vterinum augere possunt. Atamen in diuturnis affectibus conuenire experientia docuit, quod per hæc emissaria inutilis materis portio educatur.

Si humores biliosi, & acres in vitio fuerint, non solum exhibenda sunt purgantia cholagogæ sed etiam alterantia, refrigerantia, & incassantia; & licet ut astringentia, quales sunt iulepi sequentes.

Rad. cichorii cum rad. endiuie, borrag. lactuca, & portulacæ, ana M. sem. iulubarum, & febeften recentium, ana Num. vii. sem. quatuor frig. maior. & papau. albi, an. 3. li. totar. rubr. P. i. Coquantur ad lb. j. In colat. diffolve syr. ap. cyd. vel de rosâ siccis Voc. iij. Fiat iulep. pro iiii. dosibus.

Si vero humores melancholici redierint, remedijs etiam illos respicientibus alterandi, & expurgandi sunt.

Vtrique autem curæ maxime conferre poterit lactis chalybeati visus, per 40 dies exhibitus mane ad Voc. iij. vel v. Cui addi poterit circa finem tantillum boli armenæ, aut terre sigillatæ.

In toto curationis decursu aduertendum est, an aliqua pars corporis vitio aliquo laboret, vt possit esse pars mandans illius fluxionis; atque ita illi parti curæ mendum.

Si enim a cerebro fluentes humores huic morbo originem dederint, remedia ad eam partem dirigenda sunt præcipue sitationem resistentia & demuantia; vt eucalyptula scapulis & dorso admoræ frequenter, erithina, masticatoria, vesicatoria, & caustica occupati, vel brachio inulta, quorum vicem, & multo efficacius habuent ferææ. Refertque Fabricius Hildanus *cap. 41. sent. 2.* fe mulierem quandam diuturno fluxu muliebri laborantem, & inde ortam itenitatem, adhibito iactæco curasse.

Si à ventriculo, hepate, aut alia quadam parte humores defluant, illi remedia appropriata adhibenda sunt.

Corpore preparato, & materia morbifica magna ex parte vacuata, vel deriuata, ad roboranctia & astringentia, veniendum est. Quæ tamen nunquam sunt adhibenda, donec antecessens materia probe euacuata, & deriuata sit. Alioqui humores illi retenti, ad partes nobiliores ruunt, & grauiora symptomata excitant. Quoadmodum scribit Galen. *lib. de crassi.* vixit Boethii consanguineus ab viâ astringentium præpositæ venter intumuerat, recentis serofis humoribus, qui antea euacuati solebant. Illud etiam aduertendum, vt dum vitium astringentibus, materia antecessens alio diuertatur, illiusque generatio prohibeatur remedijs prædictis. Inter præcipua roboranctia theriaca reuenerit, in corporibus pituitosis usurpanda. Cui conferua rosarum, & abfinthij admisceri poterit. Vel opiatæ sequens erit componenda.

Rad. Coniferæ anthos Vnc. j. coniferæ rad. acori vulgaris 3. ii. specier. diarr. abbat. & aromat. rosat. an. 3. i. cox all. rubri preparati 3. ii. theriacæ 3. ii. Cum syrupo condit. coct. cicti fiat opiatæ. Vel

Rad. Coniferæ rosar. antiquæ, rad. symphyti, buglossi, & cortic. citri, an. 3. i. coralli rubri vii. i. raliuræ choris, boli armenæ, terre sigillatæ, smg. drac. an. 3. i. Cum syrupo de rosâ siccis fiat opiatæ.

Puluis ex sauro, fallap. & balsam. sumptus manè singulis diebus cum iulculo est remedium alicuiusmodi iulcerum.

Decoctus sequentium opiatam contemdat, a se cum fœ-

lici succellu sepe usurpatam.

Rad. Gummi arabici, tragacanthi, ana 3. ii. coralli vtriusque, cinerum putaminum quorund. cornu cerui, seminis anethi succini, ana 3. i. mellis rosat. q. d. Fiat opiatæ, cuius 3. ii. horis duabus ante cibum deuoranda exhibeatur. Deinde illam superbibat aqua aquæ plant. 3. iij. an. vini rubr. 3. ii. iulepi fieri possunt ex aqua rosat. centimodia, planta, cum syrupo myrtino, & de rosâ siccis, & similibus, adiectionibus quibuldam pulueribus ex superadditis.

Mercutialis decoctum soliorum quercus cum eucalypti leporis fe in sequijs viâ habere testatur, quocumq. se multas mulieres hoc affectu laborantes curauit, idque remedium ita parat. Rad. Decocti iul. quercus 3. v. vel v. coaguli leporis 3. ii. Capiat per viii. vel x. dies.

In affectu bilioso sequens syrupo roborans, astringens, & refrigerans parari poterit.

Rad. Aquæ rosar. lb. iij. spiritus vitrioli q. d. vel aqua reddatur acidula, ac vix talis sentiat ad gustum, rosar. rubr. ficar. P. ii. Insuadunt frigide per hidium. Colaturæ adde sacchari rosacei q. s. vt fiat syrupus.

Ac uenique astringentia medicamenta, in mensium fluxu immodico decipit, huc transire poterunt.

Pro potu ordinario conuenit bochetum ex rad. chinæ, vel ligno lentisimo, cum vino astringente.

Dum astringentia & roboranctia vterum per os exhibentur, topica, & externa admoenda sunt; videlicet lotus, semicupia, vnguenta, emplastræ, iniectiones suffusæ, & pessaria; qualia in fluxu mensium immodico præscripta sunt.

Antequam autem astringentia hæc topica in vsum reuocentur, vitium probe detegendum est. Alioqui impariter illæ in eo retinerentur, quæ sursum remaneant grauiorum morborum causa essent. In detergendo autem habenda, est ratio humoris morbifici. Alia enim detergentia debentur humoris pituitoso, alia humoris bilioso.

Si humor sit biliosus, fiant iniectiones ex aqua hordei fero lactis aqua saccharata. Si verò pituitosus sit, parentur ex hydromelite, vel decocto abfinthij, matricar. arg. & similibus.

Pessarium detergens etiam fieri poterit ex theriaca, & terebinthina, vel ex solijs mercurialis contusis, & panis lino rari inuolutis.

Hic vetitur ante astringentia, donec vitium probe detectus fuerit. Quod cognoscitur ex nullo, aut paucis humoribus per eam partem transire.

Ab viâ detergentium suffusis primum administrandæ sunt, quia vterum exsiccant, & roborant. Itaque commodè parabantur ex thure ladano, masticæ, lantalis, nucis moschata, rosâ rubris. Postmodum vero ad alia astringentia progrediendum erit.

C A P V T V.

De Furete vterina.

Furor vtericus est species mania, ab intenso & effrenato cocundi appetitu orta, qui mentem de sede sua deiciat; ita vt laborantes oborta & impudica verba passim effusant, obiectione omni verecundia venereis furiosis expectant, & ad eam vires mutant.

Producitur inmodicus ille cocundi appetitus à feminis copia, acrimonia, & feruore naturæ leges excedentes; quæ in valis feminilibus immodice utgens, genitalia vehementer excitat ad verperis appetitum, eaque veluti inflammant. Ex ea verò materia vapores ad cerebrum demittuntur, qui rationem perturbant, eamque è sede sua deiciunt; quamuis ipse cocundi appetitus immodicus sipe vaporum concupiscentie per rationem superare possit, & obtrunc, quoadmodum omnia pathemata vehementiora de præstare possunt, præsertim amot inmodicus, qui etiam affectus nominatur.

Illas autem qualitates acquirat semet, quando nimis retinetur in corporibus salacibus, & multo calore præditis; atque adeo hic affectus virginibus, aut viduis immoribus proprius est, quamuis etiam nuptis contingere possit, quæ licet ignauas habent coniuges, aut non satis admatos, vt vala ipermatica sufficienter deplete, aut appetitum reuerentem satiare nequeant.

Quidam

Quidam voluit fœmen etiam putrefcere, & malignam qualitatē inducere, quæ grauiſſa ſymptomata producat. Verum non facile iſt eſt differentiam offendere, quæ inter hunc affectum, & hysteriam paſſionem intercedit, quæ a ſemine corrupto, & malignitate adepto produciuntur. Licet enim varij putredinis gradus, varios etiam malignitatis gradus efficiant, vnde magna ſymptomata varietas exurgit: ſufficiunt tamen qualitates malignæ, nempe ſeminis copia excedens, caliditas, acrimonia, & turgentia nimia, cum phlogiſti partium genitalium aditum affectum generantium.

Cauſæ verò calidum iſtud ſemen, acre, & copioſum producentes ſunt ætas æuenuſ, temperies ſanguinea & bilioſa, vel melancholia adultæ particeps: cibi euchyſmi, & copioſa menſa, adque magis ſedulæ aromatiſas condantur: odor ipſe aromatum frequens, vt molchæ, zibetæ, & ſimilium: ſomni longiores, & in lecto pluriſimè mollioribus reſerto, blanditiæ anaſtorum, lectio liberorum impudicorum, choreæ, & aliæ voluptates in adoleſcentium conſortio ſuſceptæ.

Diagnos ſiſ huius affectus ex iſtis quæ diſta ſunt facile elici poteſt. Sed quia ſæpius & per gradus apparet, ſolet, illius progrefſus exponendus. In principio igitur dum adhuc minus compoſes ſunt, meſiores ac taciturniores euadunt, ſed cum oculorum iactatione, ac lacrima, & faciei rubore, qui per interualla intenditur, præcipue verò rei venereæ facta commemoratiōne, ad quam reſpiratione, & pulſus immutatur per ſympthiam cordis, vnde Galeus, ſe ex pulſu cognouiſſe gloriatur ſurſumque mulierum ætates, quod euſmodi amantes varias ſubito mutationes in pulſu patiuntur, dum obiecta expectata illis offeruntur, vel in memoria ſuauſcantur. Poſtmodum verò dum malum exacerbat, incipiunt rixari, & lacrymari, ac lubidine in riſum eſſendi, multa colloqui incoſcinnè, & imprudenter, ex quibus nihil certi colligas. Deinde reſpiſcunt, donec alter paroxiſmus ex materie motu inordinato, & ſine viſa cetera periodo redierit. Hoc furor pericit mulieres morbo ad ſtatum progrefſo, viros ad coitum palam, & coram omnibus inuadit, rem veneream proprio, & vernaculo nomine paſſim inculcantes.

Quod ad prognofim attinet. Morbus iſte corabilis eſt, ſi maturè medela adhibeatur. Si vero diutius perſeuerauit, & firmas radices egerit, in veram maniam degenerat.

Magna ſalutis ſpes eſt, quando longiora incipiunt eſſe interualla, aut quando corpus emaciatur inſtaurari incipit, & commemoratio rei venereæ coram illis facta eas non amplius ita afficit, & perturbat.

Curatio huius affectus eo dirigenda eſt, vt calida intemperies tum viſcerum, tum vteri præſentis, tum ſanguinis, & ſeminis corrigatur, & humores acres ac materia ſeminalis euacuetur. Quod quidè ſequētibz remedijs perfici poteſt.

Ac primum phlebotomia pluries repetita, quantum vires ferre poſſunt, celebranda eſt: vt tota humorum maſſa, & ipſe vterus refrigerantur, & ſanguis feruidus ab vteri ſemis reuclatur.

Si vero menſium ſuppreſſio adſurgenda poſtmodum eruat venæ iuueniores, vt curſus ille naturalis humorum conciteſcat.

At ſi verſus hæmorrhoidales venas ſanguis pergere videatur, quod ex timore & rubore illarum dignoſcitur, ad motus hirudinibus aperienda ſunt.

Poſtmodum purgatio inſtituenda eſt, ex benignioribus compoſita, bilem, aut melencholiam educentibus, prout alteriter humor redundauerit.

Purgatio ſuccedit ialepi præparatos humorem peccantem, refrigerantes ſcilicet, & leuiter aperientes, per triduum viſuandis.

Mox purgans validior exhibendum erit, ad humores illos per ſitus inſixos euellendos. Cui viſi conferre poterit illa medicamenta purgantia, quæ in manie curatione ſuere deſcripta, quæ per interualla erunt repetenda.

Iterata purgatione, ad vterum, & vniuerſum corpus refrigerandum, humoresq: ſeruos temperandum ſequens balneum erit viſuandum: idque pluries in morbi decurſu erit repetendum.

ꝑ. Fol. laſſuca. falicis. nymphaeæ, viticis, portulacæ, vmbilicis veneris, ana ſalcis. flor. violar. nymphaeæ. & roſar. ana. M. ſi. Coquantur omnia pro balneo, quod ingreditur tepide, ſine ludore, bis in die longè à paſſu.

Quia vero balneum integrum tam facile ad multos dies continuari nequit: ſaltem ſemicupium ex prædicti decocti portione, immo vero ex aqua ſimplici paratum frequenter iterandum eſt: & valde tepide admiſtrandum: ſumma, etenim huiusmodi curatione in eo conſiſtit, vt vterus valde refrigeretur. Quod confirmatur inſignis experimento ab Harueo propoſito, in tractatu de partu nobilis ſemine a furore, & melancholia vterina vitra decennium dſtantis: cui poſtquam omnia fruſtra tentata eſſent. contigit vteri prolapsus, qui non ſuit reſpoſitus, donec à frigore externo illius intemperies deſeruiſſet. Succellit res ex ſententia, breuius pluriſ conſualur, atque vterus demum loco ſuo reſtitutus eſt.

Ad vterinorem corporis refrigerationem, ſerum lactis per multos dies exhibitum, conuenire poterit.

Ac denique ea omnia, quæ ad maniam, & affectionem hypocondriacam propoſita ſunt, in hoc affectu etiam conferre poterunt, prout bilis, aut melancholia illi deſerit originem.

Quibus omnibus addi poſſunt illa, quæ proprietate ſpecifica ſemen extingere ac refrigerare valent, in quorum numero ſequentiſ recentem debent.

ꝑ. Fol. nymphaeæ, falicis, viticis, ana M. ſi. fol. laſſuca, portulacæ, vmbilicis veneris, ana M. ſi. fem. quatuor frigidi. maior. lactucæ & papau. albian. ꝑ. ſ. anethi 3 ſ. ſi. ſi. nymphaeæ & violarum. ana M. ſi. Contundantur omnia recentia, & irrorentur ſucco limon. & deſillentur in B. M. ac ſingulis aque libris addæ camphoræ 3 ꝑ. Capiat ꝑ. ſi. frequenter.

Vel ex prædictis ſimplicibus, vel eorum nonnullis poteſt fieri decoctio, & lactarum dulcorari ad plures doſes, addendo camphoræ parum.

Vel fiat emulſio ex ſem. frig. maior. lactucæ & papau. albi. extracta cum aquis nymphaeæ, lactucæ, & falicis, cum ſyrupo violaceo.

Opiata in hunc modum præſcribi poterit.

ꝑ. Conſerue flor. nymphaeæ, violar. & viticis ſeu agni calici, ana ꝑ. ſi. conſerue roſar. Vuclem. caudicum laſſucæ condit. Vnc. i. coralli & ſmatagdi præparat. an. 3 ꝑ. Cam. ſyrupo violac. & nymphaeæ, fiat opiat.

In ſumma delirij vehementia ſonnum conciliantia reſiſſima ſunt, tam interna, quam externa, prout in phrenitidis & manie curatione deſcripta ſunt.

In toto morbi decurſu, Clyſteres refrigerantes, & blandè purgantes viſuandis ſunt, cauendo ab acrioribus, & vehementer purgantibus, quæ materiam in vtero, aut in eius vaſis contentam exagitant, vnde ſymptomata exacerbari ſolent.

Iniectiones etiam fieri poſſunt in vterum ex decoctis herbarum pro balneo aliſque remedijs præſcriptarum, a quibus vultus ſal Saturni addi poterit.

Clyſteres frequenter ex oxyrato ad hoc quoque conferre poterunt.

Externis etiam linimenta refrigerantia, lambis, pubi, & perineo admouenda ſunt, ex ol. nymphaeæ, vnguento roſar. vel albo refrigerante, cum ſucco ſolani, hyoſcyami, nymphaeæ diſſoluſis, addendo parum camphoræ.

Tum lamina plumbea perlorata ſupra renes continuo geſtenda.

Ratione cauſæ coniuñctæ, quandoquidam ſeminiſ illius acrioris, & corrupti euacuatio motum ſoluere poteſt: optimè conſultum foret, in morbi principio, antequam delirium ſint valde conſpicua, aut in eorum interuallo, ſi ſatis dilucidum exiſtens, huiusmodi virgines viro iuueni ac valido iungere. Sic enim ſatiato vtero, & effuſa materia quæ in vaſis illius continetur, eas curati contigit.

Si verò non ita facile nuptiæ celebrari valeant, aut viceconditio inſiſtè patiatur: conſultum nonnulli, vt à petita obſtreſſe diſtint iniectiones & conſtreſſiones partium genitalium, a quibus excretæ poſſunt magnam ſitum ſemini� copiam. Sed quia illud neas eſt, ſufficiunt, dum ægra eſt in balneo, perſiccare leuiter longè à pudendis vteri partes.

X ꝑ.

ꝑ. aquæ

et aqua, tapore ille a rempente, & madore laxior fiat, dicitur atque sua (sive et leniale excrementum, ita ut manus nihil aliud præstet, quam tantum aqua subingressum ad peniores vteri partes; quod tantum aqua operetur, quantum aliud auxilium exij), que aduocet fœmen purgans.

Ad eundem vsum pessaria componi possunt ex folijs pterocaulis confusis, cum pauca myrrha, aut puluere aristolochie. Quæ supponi debent dum ægra est in balneatione, nihil enim calefacit vterus, & post vasus horte (patum auferri). Morque fiat melleo in vasa ex lero lactis, vel decocto hordii cum pauco iucco solani temperatum, aut scicutæ, que in hoc affectu peculiariter commendatur.

Ad lœmen expurgandum sequens bolus erit vtilissimus. Drach. sem. dauci, carmabæ pulu. ligni aloës, an. gr. viii. Cam. lach. fiat bolus.

Si affectus persequetur, applicentur caustera cruribus. Nihil enim præstantius est, quam maxime ad inferiora, per illos fonticulos deriuare.

Quod si lenis tumor, & obstructions superueniant, ut sepe fit, illis diligenter est providendum proprijs remedijs.

Quia denique in hoc affectu cerebrum, & cor grauius afficiuntur, ob vapores ab vtero sursum elatos, utique providendum est; cerebro quidem, frictionibus, ligaturis ad inferiora, cucurbitulis supra coxas & inguina frequenter adinotis; cordi vero epiphrenæ, tan liquidis quam solidis, in vtrum imbecillitate præscriptis.

C A P V T VI

De hysterica passione.

Dum fœmen, & sanguis menstruus præter naturam retinentur in mulieribus, putrescent ac corrumpuntur, nec non malignam, & venenatam qualitatem acquirit; unde vapores maligni eleuantur, & ad varias corporis partes deferuntur, propter miram consuetudinem quam vterus habet cum omnibus propetendum corporis partibus, & inde varia accidunt symptomata, ita diuersa, ut nunc dixerit Democritus in *epistola ad Hippocratem*, sexcentarum ætenuarum immutatamque calamitatem autorem esse vterum; & ipse Hipp. scripserit *lib. de morbis virginum*, multis, & incomprehensibilibus ferè affectionibus premi nasserunt mulieres. Nos illas omnes affectiones hoc capite explicare aggredimur, & vnicuique hysterice passionis omnino comprehendimus. Galenus inuicem, qui *lib. 6. de loc. affect. cap. 5. dicit* hysterica passionem vnam quidem nomen esse, varia tamen & innumera accidentia sub comprehendere. Quamvis potest fieri omnis suffocationem hysterica sub titulo h. hysterice passionis explicare, symptomata peculiare generis, nomenque domesticæ, propter quod omnino frequentissimum, & molestissimum esse, conuenit, in hoc tamen maxime superius esse videntur auctores præcipui, qui de muliere mulierum scripserunt, quod diuersis capitibus varios ex vtero affectus exponunt, nempe hysterica suffocationem, capitis dolorem, conuulsiones epilepticas, cordis palpitaciones, arteriarum in hypochondrijs & dorso pulsaciones, ventriculi, hepatis, & ienis affectus ex vtero oriundos, & varios in varijs partibus ab eodem conuulsos; quod omnes illi affectus ab eodem causâ oriuntur, & ipsi remedijs curari debent; ita ut auctores perhibeant in varijs capitibus eadem sensum esse, non sine leuissima ratione, repetere cogantur.

Nos igitur, ut breuiter & methodice omnes illos affectus exponamus, opera præsumimus diuersas causas eorum, & vias, quas præmittunt, ut deinceps singularem ostendamus quomodo illi affectus ab his causis oriuntur.

Diuisus itaque ab initio, duas causas precipuas horum omnium affectionum esse, scilicet muliebrem, & sanguinem, multumque id præter naturam retinetur, & corrumpitur, malignamque ac venenatam qualitatem acquirit, ex quibus vniuersi vapores eleuantur, variæque partes afficiuntur. Cui diuersa generatim propetis duo alia maxime,

momenti adiungenda sunt; quorum primum est, non solum lœmen & sanguinem menstruum hystericas affectiones producere, sed etiam varios humores excrementitios in vterum confluentes, qui diuturnâ mora putrescunt, & tepidi vapores emittunt. Huius rei fidem faciunt verba non pauca, quæ sanguine menstruo & semine destituitur, hysterica tamen affectibus sunt plurimum obnoxia. Alterum est, quod non solum vapores ex prædicta tabularum eleuantur hystericas affectiones producunt, sed etiam ipsi humores, qui hiberna cauit non inueniuntur per vias vteri (ad quem veluti lentum, natura humores superfluos deponit) ob suffocationem mensium, vel fluoris vterini, ad partes superiores repurgantur, eisque inficiunt præuæ illa qualitate, quam in valis vteri, dum inuori mora aut per contagium sentimus, aut membris corrupti contrahunt.

In ista constitutis, videndum est quomodo hysterici affectus à prædictis causis excutitur, à suffocatione incipiendo, quæ omnino præcipua & magis frequens huiusmodi muliercularum affectio esse solet, multique alijs itque grauissimis plerumque statim symptomatibus. Nam præter lœm respiracionem, quæ interdum, etiam aboletur, totius corporis refrigeratio, vocis, & pulsus interceptio, imò interdum motus & sensus absolutio fontitur, ut ægræ quasi a morte accedant, & quædam per mortuus habent, igiturque destituta fuerint, cum tamen, postea reuertuntur.

Inuadit autem hoc malum per paroxysmos, qui nunc frequentius, nunc rarius, & ceteris, nunc breviores, nunc longiores tempore durant, pro materia copia, quæ non citius, nunc tardius colligitur, nunc atque citius, nunc tardius discutitur. Habent enim easdem causas in corpore humano sua digestiones, & exaltaciones tempora, quæ ubi acciderint, subito & quasi in momentis ad agendum erumpunt. Imò verò collecti aëres in corpore huiusmodi humores in corpore aliquando latere possunt, donec à causa aliqua interna, vel externa commotis veniantur auram in alias partes effundant. Frequentissime autem de nocturne causæ huiusmodi commotione & agnatione effluens sunt tres odorate naribus adnotæ, vel alimeta dulcia assumpta, à quibus promptissime mulieres affectibus hysterics obnoxie paroxysmum incurrunt: quod etiam non raro præstant iuxta vehementem, terror, aliaque animi pathemata grauiora.

Varij autem sunt huius affectionis grades pro varia materie morbificæ copia, & malignitate. Aliquando enim suffocatio, & respiracionis lætio leuis est, & citò soluitur; aliquando grauis, et omnino sulserat, & alias affectiones hystericas, ut vomitus, delirium, conuulsiones, syncopas aduicias habet.

Commouetur tamen et semine corrupto grauiora excitantur symptomata, quam ex sanguine menstruo, aut alijs humoribus corruptis. Quotò enim fœmen propriam leniorem naturam, citiusque huius bonitate menstruum superat, tanto etiam ex superueniente corruptione, in maiorem, & deterorem venenositatem degenerat.

Aliæ etiam huius affectionis hysterice differentie notandæ sunt, quod nimirum aliquando mulieres hysterice magnam respiracionis difficultatem patiuntur; alias sele irregulari dicunt, quasi rursus illæ hinc contrahantur; alias vero respiratio inextinguibile maneat, aut aboleatur sinevicia molestia, aut suffocatio lenis. Cuius diuersitatis ratio inde petenda est, quod simplex suffocatio, & respiratio difficilis pendet à lœtissima copia, quæ in vtero magna copia conueniuntur in mulieribus hysterics; præsertim quando hysterica passio hypochondriacæ naturæ est; qui demum status diaphragma & pulmone committunt, ut in alimeta huiusmodi contingit; sensus vero strangulationis in quo postremo fauces contrahit videtur à potius autem venenatis adeoque dependent; quemadmodum alia venena regerunt in macrocymo, quæ hanc fauces contrahendos, & strangulationem efficiendi vim obtinent, ut de quadam fungorum specie notum est. Varias autem alie venenositatis illas qualitates, quæ in hysterics mulieribus generantur, lætio innot Gal. 5. de loc. affect. cap. 5. dum huiusmodi vapores

vaporis malignitatem torpedinis veneno, phalangium mori-
funt, & idem corporis comparat, quæ venena est mole
finit exigua, viribus tamen maxima, in corpus humanum
recepta, exiguo temporis spatio illud grauissime afficiunt
& vehementissima symptomata inducunt. Immanata vero
aut abolita respiratio sic ab ipso vaporibus narcotica
quadam vi præditis, qui cordi maxime & spiritibus vitali-
bus aduersi, actionem eorum impediunt, vnde sequitur
totius corporis refrigeratio ex dictis spiritibus influentia,
& respiratio cessatio deficiente vi. Cum enim respira-
tio ad cordis refrigerium necessaria sit, dum ab aura illa
venenata cor impetu refrigeratur, non indiget illo refrig-
erio sibi per respirationem communicatio, & ita cessat
respiratio cellulae vite. Dicere etiam possumus, auram
illam venenatam & narcoticam cerebrum impetere & spi-
rituum animalium influxum impedire, vnde motus dia-
phragmatis & muscularum respirationi inferuentium im-
peditur. Adde quod destructo spiritui vitali, animalium
etiam delitui necesse est, qui ex eo generetur.

Dubium soluit Galen. loco citato, ex eo deductum quod
passio circumstetur, hominem vivere non posse sine respi-
ratione, atque adeo mulieres hystericas respirationis
abolitionem pati nullo modo posse. Dicere enim ex summa
cordis refrigeratione tolli respirationis necessitatem, quæ
vi vigente corde impeditur, promptus liqueatur interitus:
sed exiguum calorem qui adhuc superest in cordis
sola transpiratione foueri, quemadmodum animalia in la-
tibulis per hyemem degentia sola transpiratione viuunt,
quæ frigidissima sunt, & exiguum habent calorem, qui
respirationem non indiget.

Præter causam supra commemoratam hystericæ susci-
pationis, nempe vaporem malignum & venenatum: qui-
dam aliam addunt, scilicet vteri ascensum ad partes supe-
riores, quo ventriculus ad diaphragma comprimitur, &
inde non solum suffocatio hystericæ sed etiam alia sympto-
mata emergunt. Hunc vteri ascensum propulsiu Hippoc.
lib. 6. de natura mulierum, his verbis, *Compropter vteri impetum
fertur, & ad præcordia struitur; siurum enim ad humos item
feruntur, ad laborem nuntium reflectit. Hæc autem grauius in-
moriturus est.* Fernelius vero lib. 6. pathologicæ, cap. 16. hunc
vteri ascensum se frequenter tactu deprehendisse affirmat,
cumque instar globi cuiusdam in ventriculum elatum, ac
grauiter opprimetur, vnde sæpe manū depresso elatam
intelleq; in propriam sedem propulsi. Idem testatur Ea-
stachius Rudius lib. 3. Prædictæ cap. 1. le. nuntium propriis
manibus vterum ipsum vique ad vmbilicum, & nonnun-
quam supra ipsum eleuatum, contredixisse, & in propriam
sedem prolatum propellendo deduxisse. Gal. vero 6. de loc.
aff. cap. 5. hanc sententiam oppugnat, docetque etiam vterus
aliquo modo moueri posse, atque ascendere, id tamen per
exiguum esse; necque fieri illo modo posse, vt vterus vique
ad ventriculum ascendat, tantum abest, vt illum præce-
rendo, ad septum transferui pertingere possit. Ratio
firmissima ex Anatome petitur. Siquidem vterus quatuor
validissimis ligamentis in sua sede ita firmatur, vt sursum
tanto spatio attolli minime valeat. Ad hanc tamen respon-
dent huius opinionis detractores, in præcedenti vteri liga-
menta illius ita laxari, vt extra pudenda prodire soleat, atque
adeo quantum descendit ad inferiora, tantum posse ascen-
dere ad superiora ligamentis ita relaxatis. Respondemus
vteri præcedentiam fieri paulatim & longissimo tempore
per emolliationem & humectationem ligamentorum a du-
tissimo humoris priuati delitui excitatum: vteri vero
ascensum quem vocant fieri in momento, & citissime resis-
ti, ac cessare: & omnino nec effusum fore antea relaxata
fuisse illa ligamenta, atque adeo vteri prolapsi laborarent
omnes mulieres quæ huc ascensum obnoxie essent, quando-
quidem cessantibus causis, quæ illum ascensum pro-
mouere possunt, sponte & proprio pondere vterus ad
inferiora præuocetur, & continua præcedenti a labora-
ret.

Difficilis est respondere autopsiæ a Fernelio, Rudio,
aliisque propoſitæ, qui le manū propria vterum percipisse
sunt globi instar ad vmbilicum & vterum ascendente
& compressione ad luctum locum propulsiu. Ad hoc re-

respondet Sennertus, corpus illud, quod tactu deprehen-
ditur, non ipsum vterum esse, sed testes, & vas illud cæcum
quod tuba Fallopiæ dicitur, a Fallopio inuentum, qui
tubæ extremo officio id comparauit. Cum enim testes
vteri sint penduli, & corpus tubæ fistulosum, laxum & va-
gum, dum semine corrupto, & humoribus vitiosis ac fla-
tibus repletur, & turgentur, per hypogastrium hinc
inde moueri, & ad vmbilicum vique ascendere possunt.
Talem autem tumorem rotundum in testibus, & tuba-
vteri polle contingere, qualis interdum in feminis depre-
henditur, docere possit. Riolani obseruatio in Anthro-
pographia propolita, vbi refert le in hystericis virginibus
testes deprehendisse pugno grandiores; serotio semine,
turgentur, quæ etiam tubam vteri amplificatam, & valde
dilatatam. Velutis verò simile quippiam obseruauit in
nobili quadam puella vteri itraugiatu laborante, in qua
aliter testis instar masculicæ pilæ protuberabat, croceo
humore, firmique grauitate olente, ac venenolus,
quid, & retrum ipsante, tertius, quæ humor contem-
ninas sedes tingebat, non fecit ac colon intellum,
quæ sub iocore tertur, a cystide felicia luctum reddi cer-
nuntius.

Verum non valde recede Sennertus a prædictorum
sententia. Posito enim quod ille adert, testes, & tuba-
vteri, dum semine corrupto, & humoribus vi-
tiosis ac flatibus repletur, & turgentur, per hypo-
gastrium hinc inde moueri, & ad vmbilicum vique
ascendere possit, cum partes illæ vtero contigunt,
per hypogastrium, & ap ipsum vterum moueri nequeunt,
quin vterus simul moueatur, atque adeo toti vtero ex par-
tibus suis integritatibus eique connexis, composito, motus
ille facile tribui potest. Deinde si testes, & tuba vteri
dum vitiosis humoribus, ac flatibus repletur, variè
commoueri possunt, quidni etiam vterus ipse dum humori-
bus aut flatibus repletur, ipse motus fieri potest. Con-
uincit quidem ratio Sennerti a Galeno mutata, vterum
quatuor ligamentis contritum ad diaphragma non posse
ascendere imo ne quidem ad ventriculum: sed ad vmbili-
cum vique proferri potest, vbi auctoribus prædicti globum
illum perciperent, negandum non est, tum quia ligamenta
illa aliquantulum extendi possunt a materia turgente tum
quia vterus dum innatur, locum ampliore occupat, &
versus vmbilicum percipi potest. Sive igitur totus vterus,
sive partes illæ annexæ, nimirum testes, & tuba vteri
moueantur, semper ascensum vteri nominare possumus, &
doctrinæ Hipp. inhere.

Dolor capitis ex vtero variis modis contingit, interdum
enim totum caput obducitur, alias fincipit, alias occupat in-
madri, alias circa oculos percipitur, vt è sede sua quasi eru-
ptum videatur.

Fiunt autem illi dolores a prædictis vaporibus acerbis
& malignis ad caput eleuatis, & partes illius membranæ
vellicantibus humores etiam præni ab vtero translati hunc
dolorum excitare possunt. Sanguinem enim vitiosum, ex vasis
vteri regurgitans, & præsertim tenuior ac serosior illius
portio, ad caput vique ascendit, & in membranas par-
tes effusus, dolores illos procreat; qui dolor interdum
pungens & vicioriosus est ex vaporum aut humorum acrimo-
nia. Interdum sensus a copia & multitudine tenio-
rum efficitur, interdum vero pullatorius, quando vapores
aut humores per arterias ierunt, vel quando arterie
partes aliquas capitis peculiari sanguine secundo replen-
tur.

Epilepsia ex vtero ab ipso vaporibus acerbis & mali-
gnis excitatur; qui dum infligunt actionem acque mali-
gnitatem adepti sunt, partes neruofas vehementius & acer-
bius lacerant, vnde hic vt ille contrahantur, & ad excitationem
rei noxiæ motibus consensibus agitantur.

Palpitation cordis ab ipso vaporibus sæpe contingit, ex
vtero ad cor eleuatis, illiusque facultatem expultricem re-
stantibus.

In arteriis etiam dorsi & hypochondriorum pulsatio con-
tingit ex sanguine feruido, ex vtero in illas arterias translati,
eique distendente, vnde pulsatio maior fit, quæ partes vicinas
spresu pulsationis ipsius in se inducit. Fiunt tamen interdum

certitudinem præ se ferunt, cum antea dictum sit, quoddam mulieres hystericas facile transpiratione vivere solitas animalium in labiorum degeneratione hyemis tempore, & omnino abolitam in eis esse respirationem. Quod licet rarissime contingat, cautio tamen illa observatione digna est, ne mulieres affectu hystericis deficiant, ante certum diem lepeliantur, aut saltem donec letare incipiant.

Signa causarum etiam proponenda sunt; quæ ternario numero fore comprehendenda, & illæ sunt: quæ reterentur, & corruptur; sanguis menstruus item reterentur, & corruptus; & cacochymia in vteri valis aut cauitate contenta.

Si a femine reterito, vel corrupto hic affectus oritur; aderunt, vel præcesserunt omnes causæ, quæ illud augere, coacervare, & corrumpere in vasis potuerunt, vt florescentas Veneri matura, aut illi prius affluat, quâ postmodum interitibus, temperantur sanguinem, vita otiosa, & volupciatibus dedita; visus laetitia, & opiparus, tum viciu ciborum facile corruptibilium. In his si contingat hystericæ passio, menstruus commode fluentibus, concludendum erit a reterito semine dependere.

Si a sanguine menstruato reterito, & corrupto affectio hystericæ dependeat, illius suppreffio, aut immutatio adent, atque sufficiens expurgatio, mulierem inter sufficiente, citius vitent. Et suppreffionem illam quoddam symptoma sequentes, vt melancholia, irascuntia, torpor, somnolentia, & capitis dolor, mammarum inflatio, grauitas lumborum, & crurum.

A cacochymia vero exteri affectum vterinum ostendit, menstruus commode fluentibus, cum sufficienti Veneris exercitio, hic affectus contingat, & mulier semio vicina sit, aut valde cacochymia, vel aliquo alio vteri affectu laboret.

Aliorum vero symptomatum ex vtero provenientium, & supra descriptorum diagnosi paucis proponenda est.

Dolor capitis ex vtero proveniens cognoscitur ex eo quod menses non debite procedunt, dolor præcipue insillat, vel augetur, insillat, vel apparente fluxu menstruum, & vterus non recte le habet. Distingueretiam possumus, an vapor vel humor hunc affectum excitet. Si enim dolor grauius non sit, & per interualla recurrat, a vapore fieri certum erit. Si vero continuis sicutum grauitate conuulsus, humorem in parte contentum indicabit, qui si biliosus fuerit, dolor erit mordax, pungens, & acutus; si pituitosus, torporem inducet; si melancholicus, tristitiam.

Cordis palpirationem, & arteriarum in hypochondriis, & dorso pulsationes; ventriculi hepatis, & lienis affectus, tum etiam dolores varios, ex vtero provenire consuevunt, si alia vteri affectu signa, & symptomata supra enumerata simul adfuerint. Tum etiam si graueolentia naribus, & saueolentia pudendis admoventur, quodammodo miscant.

Quoad prognosim attinet. Rarè hic affectus interficit ægrotantes, sed valde chronicus esse consuevit. Aliquando tamen propter syncopen superuenientem, aut insignem conuulsionem, vti periculum ægrotantes incurunt. Tum etiam si affectus lapsus repetat, & difficile solutur periculum est, ne respiratione toties laesa, calor naturalis suffocetur, & vita deficiat.

Ita passio hystericæ est deterior, in qua plures partes in conuulsione trahuntur; tum etiam illa quæ a femine corrupto exoritur, vel daturia suppreffione mensium.

In febris vix curatur hic affectus, propter insignem cacochymiam, quæ facere solet. In senibus plerumque cessat, quando parere incipiunt.

In prægnantibus & puerperis periculosum est malum. In illis quodam propter metum abortus. In his vero ob vniuersum puli partum imbecillitatem.

Sternutatio hystericæ mulieri superueniens, bona. Robur enim significat cerebri: & illo motu maligni vapores cerebrum obidentes discutiuntur; tum humores vitiosi vtero contenti euacuantur.

Curatio hystericæ affectus duplex instituenda est, vna in paroxysmo, altera extra paroxysmum. In paroxysmo vapores illum efficientes, discutiendi, & retellendi; humores in vtero contenti, vnde vapores illi emanant, euacuandi; & vterus ad propriam sedem, quando ab ea dimouetur, vt

sepe fit, iuxta doctrinam Hippocraticam, reducendus. Quæ omnia sequentibus remedijs impleri possunt.

Primo itaque ægra in lecto ita collocanda est, vt ceruicem & scapulas acclives & elatas habeat. Inguina verò, & femora declina, ita enim vterus facilius reducitur.

Postea verò fieri debent ligature dolorifice patribus interioribus, tum etiam frictions celebranda eorumdem partium; nec non cucurbitula coxis admoventur. Tum etiam cucurbitula magna pectini admodum prodest. Cauendum tamen, ne supra umbilicum applicetur, quod multi imperite faciunt, sic enim vterus (ursum retrahitur. Vbi conuulsiones adfunt vel animi deliquia, frictions asperæ conueniunt in plantis pedum, etiam cum sale & aceto, tum etiam auulsiones pilorum capitis, & pendendorum; contorfiones digitorum in clamationes alta voce, & alia huiusmodi.

Vile etiam in plantis pedum admoventur cataplasma epispasticum in hunc modum compositum.

℞ Fol. artemisiæ matricar. rutæ an. M. i. saluæ M. sem. sterco. columb. pulu. 3. ii. saponis nigri Vnc. j. iacanthus, maffiches puluerat. an. 3. i. succi rutæ, & oxycati q. l. Fiat cataplasma.

Eodem tempore foetida, & graueolentia naribus admoventur, vt plume perdicum combusta, vtera coria vitæ, & sulphur accensum: oleum gargarum, pomum ex assa foetida, castoreo, galbano, ruta, malaxatis cum syrupo artemisiæ, vel aceto, sarta ex ruta, tanacetis, abstinio. Ab his tamen quæ ex iam dictis fortiora sunt; abstinendum, si semina epileptica fuerint, qui ab his cerebrum officinam agitant, vnde humores in illius ventriculis precipitantur, ac symptomata ingrauescunt.

Fumus tabaci ori & naribus ægrotantis insufflatus, eam a paroxysmo citissime liberat.

Contra vero saueolentia vtero admoventur, vt moschi, aut zibetæ grana aliquot cotone immolita.

Naribus pulvis sequens infundatur.

℞. Piperis albi sinapi, pyrethri, castorei, an. 3. i. Fiat pulvis tenuissimus.

Si mulier valde sepulta videatur, proritetur sternutamentum (iuxta Aph. Hipp. 35. sect. 5. Mulier, quæ hystericæ molestat, aut disculset paries, superueniens sternutatio bonum.) Quod quidè etiam a prædicto pulvere non raro proritatur. Sin manus citius hellebori albi aut euphorbiæ adiciatur.

Naribus quoque oleum succini, vel etiam gargarum illiniri poterit.

At vero clysteres laxantes, & carminantes præ cæteris remedijs consuevit, ad discutiendos vapores terros paroxysmum producentes; quorum formulæ talis esse poterit.

℞. Fol. merc. pariet. artemisiæ, pulegiæ rutæ, calamitæ, an. M. i. sem. carui, cumini, & baccar. lauri an. 3. ii. Coquantur ad th. 3. ii. Colat. dissoluitur hinc piceæ & bened. laxat. an. 3. iv. olei rutæ Vnc. iii. camphoræ 3. ss. Misce, fiat clyster.

Si primus clyster non sufficit iterandus erit ex eodem, aut simili decocto, dissoluto diaphanico 3. x. xerebinthina vitello oui dissoluta. Vnc. cum oleo prædicto, camphoræ in oleo nenupholute 3. iem.

Ac denique perseverante affectu, tertius merè hystericus & discutiens, non autem purgans ieiunandus est, qui valde efficax ita componi poterit.

℞. Olei rutæ 3. iv. aquæ vitæ 3. i. vini generosi quartaria ii. galbani 3. ii. Misce, fiat clyster, qui inijciatur præmissis clysteris laxante.

Clyster ex oxycato hystericæ paroxysmum statim cohibet, vapores illi efficientes copiosius, & coagulando.

Idem præstat oxycati ciuilem cyathus ore assumptus. Consulant etiam Autores ventrem fluxu umbilicum facia fortiter alligare, vt reducatur vterus, & vaporum ascensus prohibeatur.

De vene sectione est magna dubitatio, vtrum scilicet in ipso paroxysmo coequantur. Cum enim tum ingens adit viri deiectionis, & aliquando de vira dubitatio, & refrigeratio totius corporis a malignis vaporibus cor, & cerebrum infestantibus, qui nullo modo per vene sectionem eludi possunt: non est dubium, quin ex vltimo illius accessione tempore maximum imminet periculum. Huic sententia assensum

Y y 3 Væ

Vandens & Sennentes. Contra, verò Mercatus, & Rodericus à Castro Istrumæ, in talo venam esse aperendam, quando affectus produciat à sanguinis mensuri copia, atque retentione, & nullo alio remedio vires onere pressas vias nimia redundancia oboccatas, & suffocationis periculum, lenati Pesse. Si quidem in hoc caluque feda, neque odorata, neque cucurbitula agram à paroxysmo lenitate solent. Philippus Hoeschlerus *Observationum, pars secunda*, nonnullis hyston offendit, venæ sectionem in pede plurimum profuit. Ita ut virgo quedam in mensis quæ aphoda, & consilia perbidum fuerat, post duas horis à venæ sectione, sati cepit, conedere ac bibere. Exstimamus nos venæ sectionem posse celebrari, si pulsus laetis validus, & manifeste plenitudinis vires appareant. Si verò pulsus languidus appareat, esse abstinendum, & intervallii esse expectandum, in quo tensus sanguis detrahi possit.

Emplictra vitiliter sub vmbilico admoventur solent, ex massa emplastri ceronei composita, quod emolliit & discutit, atque ita melius est emplastro pro matrice vulgari, quod aliquantulum attrahit, & sic vapores & humores malignos retinere potest. Fiant etiam emplastrea ex galbano, & gaila fetida: vel ex gummi caragaa, & tamaracha, vel folijs, vel admixtis quibuscumque acromis. Exempli gratia.

g. Gummi caragaa 3. sem. pulu. nasis molch. & caryophyl. an. 5. s. olei lacini gutt. iv. cerebith. 3. ij. Fiat empl. Huiusmodi emplastrea ad formam scuti fieri debent, & in parte acuta, quæ ad vultum vergere debet, apponenda, grana aliquot molchi, vel zibetæ, ut gratum odorem vtero insperant, ipsiusque retrahant. Molchi gr. ii. excipiantur corone, pauco oleo humectato, & intradantur in foramen vmbilici. Deinde admoventur emplastria parum ex galbano liquo. Hoc quædam mulieres pro secreto vniuntur.

Vel capillæ grævi doliolantur in ol. amygd. dulc. & vmbilico indantur, admodum desuper emplastro diapasma.

Si flaturum copia altitudo sonare videatur, convenient scuti, sempercupæ ex decocto fol. rutæ, artemisii, thymi & calamitæ, leni. feticuli, anisi, cumini, bacotrum lauri, flor. champh. anethi & similibus.

Saculi etiam parari poterunt, quibus includantur cumini, anisii, fœmen dactyl. sal. tura, fursit, & benè calidi applicentur, ac sepe iterentur. Vel

g. Olei rutæ 3. iv. spiritus cerebith. 4. s. Misce immergatur panis nequeat, è furno extractus, & vmbilico applicetur.

Iunctioniones quoque ventris inferioris, & totius vteri regionis, pectinis & lomborum non erunt inutiles; eo quod vias dilatent, vapores attenuent, & discent. Eæque parviuntur ex oleo wardiq, de pica anethiq, de croco, lilior, & amygdulicium.

Maximè commendant Auctores suffumig. ex vernicis, quælibet equorum adalcatum: quæ fit in calente fumo effusæ, & in pulvere redigantur, ac naribus suffumigantur, sit atque precipitante remedio, & magna utilitatis admittit, non solum mulieres sed et infantes à paroxysmo liberat.

Si à foetore recto affectus oriamur, nihil conto condeobilitas est, cum mulieres sunt excitatæ, si viro coniuncta sit. In cotus penuria multo consilium pudendum contra rationem atq; utilitatem ab oblectare facti am, immixtis digitis in vteri cervicem, oleis aromaticis percutitis. Vtrum cum ad sine seclere fieri nequeat, à Medico Christiano nunquam est præscribendum.

Ad vapores istos malignos, paroxysmum hystericum, producentes, discutendos multa per os exhiberi solent, eorum numero à thorace vultus ad 3. i. exhibita cum aqua artemisii pulgii, melissæ croci fedi in myrrha ad 3. ij. m. diluam ad gut. v. vel sex cum ulsom liq. quibus.

Pulvis in frequenti viæ conclusionem quædam præcipue ita componi possunt.

g. Calorei myrrhae de assu fetida an. 3. i. fecula bryoniae 3. ij. sem. rutæ & croci an. gr. vi. Cum typo de artemisia fiant pulvis x. Copiat tres, vel quatuorq; si agra deorare nequeat, diluam in aqua artemisii.

Ad vehementissimum paroxysmum sequentem utilissimum fuit, eumque certo sedare solent.

g. Assu fetide Dr. i. callorei gr. vi. pulvis gr. ii. fiant pulvis tres, vel iv. Copiat statim.

Pulvis fetidis maiores, licet purgantes sunt, tamen in paroxysmo vtiliter exhibentur ad 3. s. Blandè enim cuquantur, nec nisi sedato prius paroxysmo purgare consueverunt ita ut ab operatione nullum sit metuendum periculum. Aquæ etiam multæ elaberi solent in paroxysmo nimium aqua vite, camomilæ, vel theriacalis.

Vel aqua specifica in hunc modum componi poterit. g. Rad. zedoar. leni. dauci, rad. leusitica, ana 3. i. in myrrha rubra, callorei an. 3. i. rad. peronia 3. iv. rusc. querc. decretescent luna collecti 4. s. Preparatis infunde aqua matricaria 3. iv. leni. spiritus vini 3. i. cum. Digerantur per triduum postea distillentur. Dosis coch. perle, vel cum aqua conueuant.

Parata facilius, & egrediatur gratior, neque minus efficax, ita componi poterit.

g. Succor. melula boerag. depurator. an. 3. i. croci opt. 3. i. indantur & decillantur in balneo. Dosis coch. cum sulculo. Hæc potuicula in communi vlti habetur.

g. Aquæ cinam. 3. i. aquæ naples 3. iv. callorei gr. iv. Misco fiat potio.

Oleum succini ad gutt. iij. vel iv. exhibitur cum aqua flor. arantiorum, vel alia specifica, paroxysmum hystericum citissime diluit.

Potio liquas plurimum conciere solet, ut in oblectat. quibus nolitis videt. cii.

g. Aquæ artem. 3. i. & flor. arant. 3. i. aquæ cinam. 3. i. coniect. de hucyotho Drach. puluer. elict. diamarg. 3. i. Dr. i. croci gr. iv. Fiat potio.

Aqua naphæ iola ad Voc. ii. vel iv. vtiliter exhibetur. Sed cum molcho & sang. cleonici permixta, miranda prestat quod molitur solamoderat hystericis. *Moloch quidam seuissimè* (synopsis artem. affigebatur, dolera capitis, vultus, comæ, alio corpore, diuina signant, fœdora dentium, ab quando in te. ram cadit finem, ut aliq. ut aperient, p. flet; atque licet ex matris vultu omnia. Remediis multo frustra facti, si perueniant mulier quidam vultu dedit vultu granatofidit. & totum sanguis, de tota vultu te 3. iv. aqua flor. arantiorum, & sanata est, nec vultu in p. fletum istos dolores passa est. Idem medicamentum in similibus casu si ex cubitum semper profuit exhibitur aut aliquantulum.

Vngula alces ad hunc affectum est etiam vtilissima, ita experientum Apollonii Menabei, in de calce cap. 10. his verbis. Contra materis significatorem, quoniam alces proferturum esse remedium, & ai alius anduiss, & pericula fide me cogitasse faret. Nam accersit ut mediam manū adhibere, cui dom muliere suffocata ne oppressa, dat a hinc vultu ratura cum radice radiorum, aliq. quibus ex arce adhibet optatum finem cum bene sum consequatur. Cum præterea vultu geram eandem, si peruenit ex ipso morbo tentari, ut patet hinc vultu, etiam apponit aquæ purpureæ, & c. Quod cum solido fessit, quod dicitur, antequam vultu vultu vultu ea semper modesta curat, unde noli mulieres gratias agi.

Camphora accensa, & in aquam coniecta, ribique manent donec ex ignis, postea est remedium ad 3. i. exhibita. Ipsi calu nuci jugland, in epistolis à Laurentio Soluto collecta, & epistula à Thoma Mofeto ad Petram Monasium scripta, hoc locog commendant. In vteri fanguis atq; lobus singulari remedium, dicitur, sine carulis juglandis in pulvere effusæ, & zomodo. Dicitur ad Dr. i. b. cum guttulis dactyl. olei succini. In vteri fanguis vultu, non præstantur.

In forma pulueris deo parari possunt remedia efficacissima, & a nobis pluries experta.

Vnum fit ex secundis apem parat in camino & efficata, & in pulvere redacta. Cuius dosis est 3. i. in liquo idoneo, cum libet à paroxysmo.

Alterum fit ex duabus partibus sulphuris, & vna naci molchatz. Rediguntur in pulvere, & 5. pondere exhibetur. Pulvis gargar. ad Dosis. vel Dr. i. exhibitur multum potest.

Pulvis garorum affus seu libebat Quærenti, cum vini cyano in p. Dr. i. podero, epilepsiam hystericum tub. mouet, iturque rotam in p. Dr. i. secunda exhibitione.

melancholia hypochondriaca esse phlogosim in hypochondrijs sanguine in ijs propter obstructions retento, & supercalefacto: id eo quia vterum refrigerare possunt, hic maxime convenient quia sunt femicupia, oxycratum ore assumptum, & per clysteres iniectiones & similia. Quibus addere licet historiam ab Haruro relatum in tractatu de partu mulieris, hysterica symptomatibus nulli remedium generi cedentibus, diu laborantis, que tandem post multos annos ab vteri prolapsu sanitate recuperavit. Quia nimis vterus acri externo expolitus, refrigerari est; sicque phlogosis illius & calida interperis prestat.

Ipsius etiam chalybis visus à quibusdani Practicis maxime commendatur, tanquam omnibus affectibus vterinis opportunissimus. Cuius preparationes desumuntur ex curatione obstructions hepatis.

Cautera cruribus admodum maxime etiam conferunt. Ab vtero enim praeiis humores derivant, ratione venarum, quæ vtero & cruribus communes exsunt.

Neque negligenda amuletæ de collo suspensa supra regionem vmbilicalem, quædammodum antea monuimus, vngulam alicui hoc modo conferre. Alias laudant radicem pucedani gestatam. Et nositate mulieres non infelicit gestare solent frustulum alij fœtidæ lanceæ raro incusum. Alias vidimus quæ vulpis vterum excisatam cum testiculis, de solito suspensum supra vmbilicum gerebant, & se hoc modo ab insultibus hysterici præseuabant.

Aliæ gestant frustulum carnis lupinæ excisatæ, vel hepatis lapide sine fructu.

Quod ad remedia externa attinet, post singulas purgationes aut saltem semel in mense, octo, vel decem diebus ante purgationem mensuram, conveniens sors, aut femicupia, ut colligantur humor morbi causa per referatas vias facilius elisat. Et parari poterunt, ex rad. althææ, illior, bryonia, reos, rubie, valerianæ, angelicæ, fol. artemisæ, nepetæ, matricariæ, melissæ, bacis lauri & similibus.

Ad materiam morbi sic reliquias discutendas, & vterum corroborandum, post forum, vel infusum, emplastrum liquens sub vmbilico admoveat poterit.

q. Gummi tacamahacæ & caragæ, an. 3. ij. aliptæ moschat. 3. 6. sem. agni casti 5. 6. famul. omnium an. 3. 6. tereb. thaliam. ceræ an. q. l. Fiat emplastrum.

Si à femine retento hic affectus oriatur, vintpentur illa remedia, quæ ad semen extingendum supra in foris vterij curatione descripta sunt.

C A P V T VII.

De vteri inflammatione.

Vteri inflammatio est tumor illius partis à sanguine in illius substantiam effuso.

Illa autem inflammatio, vel totum vterum occupat, vel aliquam illius partem. Et vel à puro sanguine producitur, ac phlegmone simpliciter appellatur, vel bilem cum eo permixtam habet, & phlegmone dicitur erysipelatodes: vel iungitur cum pituita, aut melancholia, & phlegmone edematodes, aut scirrhus nominatur.

Causæ ad hunc affectum producendum, aut promouendum idcirco, varie esse possunt: temperamentum scilicet sanguinem, plethoricum aut biliosum, naturalis vterilitas, & viarum amplitudo, aer impense calidus humores inflammando, vel leigidos costringendo, & profluens mensura, vel fluere parata, coercendo, vehemens exercitio, coitus immoderatus, idus vel casus supra regionem vterianam pathematæ grauioræ, præsertim iracundia, alimentis acriora, & calidiora, & quæcumque alia assumpta acrimonia insigni, atque erodendi facultate prædita, vt de cantaridibus autores referunt, quas non solum vesicæ, sed etiam vtero valde infensas afferunt; pessaria acriora diutius vsurpata, medicamenta cathartica aut alterantia, qualia plerumque vsurpantur à sterilibus mulieribus vndeconque exquisita, quædammodo retento plethorum augendo, vel nimia profusio vias relaxando & motum humorum à toto corpore in hanc partem promouendo, cucurbitule etiam pubis regionem sciopota attrahere possunt violentius ad regio-

neri vteri, in eaque cohibere sanguinem, & alios humores. Idem præstare possunt partus laboriosus, abortus, contraflatio violenta partum genitalium ab oblectrice imperita, & gestatio fetus molesta.

Signa diagnostica sunt tumor, calor, & dolor in regione vteri cum febre continua. Sed quia rectum intestinum, & vesica eandem regionem occupant, id eo alia signis vteri inflammatio distinguenda est: qualia sunt mensium suppressio, aut diminutio, eorumque color pallidus, aut citrinus, ac dolorifica excretio: & in mensium absentia, ichiores quidem spiculi, ac putridi refulant, & locos mulieribus irrogant. Quorum etiam intelligitio clarum affert diagnosim. Oculum enim interitis tumens, retractum & dolorificum apparet: ceruix vteri rubicunda, & inflammata erit, tumensque ventris per cam dispetis.

Si totus vterus laboret, omnia symptomata erunt venementiora. Si magis vteri ceruicem inflammatione teneat, calor & dolor maxime ad inguina, & pudendum extenduntur. Si anterior pars laborat, maior erit vesicæ sympathia: si posterior, rectum intestinum magis laborabit, & dolor ad lumbos exporrigetur. Si pars dextra, aut sinistra inflammatur, tumor & dolor circa altitrum inguen apparebit: & crus eisdem lateris granitate quadam afficietur.

Signa caularum ita inuicem ancla sunt. Si à sanguine puro inflammatio flagromia, symptomata sunt mitiora: si vero bilem admixtam habeat, febris est ardensior, & omnia symptomata sunt vehementiora. Si vero sanguis pituitosus sit, aut melancholicus, febris erit mitis acuta, sed morbus diuturnior ac contumacior. Tum etiam ad illam diagnosim referenda erunt signa humoris in toto corpore prædominantis.

Si inflammatio in suppuratum abeat, dolor, & febris augetur, & horrores sæpe sine ordine oriuntur, plerumque tamen circa vesperam recurrunt. Omnia etiam reliqua symptomata intenduntur. Suppuratione facta, omnia mitescit, & tumor magis attollitur, ex quo interdum alius, aut vtriusque suppuratur. Si vero inflammatio sine suppuratione diffunditur, tumor immittitur symptomata mitescunt.

Si denique in scirrhum degeneret, febris, dolor, & reliqua symptomata immittuntur. Tumor perferente, & duritiam maiorem adipiscitur, tum etiam pondus, & grauitas permanet, non solum in vtero, sed in partibus etiam circumiacentibus, vt ægra corpus difficile mouere queat.

Prognosis huius affectus bona insituri non potest, quia periculosissimus est, & vt plurimum lethalis. Maius tamen vel minus periculum potestur per magnitudinem morbi, causæ & symptomatum, in hunc modum.

Si inflammatio totum vterum occupat, morbus est deploretus: si vero aliquam tantum partem, saluti spes adest.

Si mulieri grauidæ in vtero sit erysipelas, lethale, ex Hip. Aph. 3. sect. 5. Igitur enim propter inguinem inflammatione emoritur, vnde sequitur abortus. Et in gaustino morbo accedens, matrem iugulat. Galen. comment. 1. b. v. Aphor. dubitat num hæc sententia de omni inflammatione pronuntianda sit, & num vtero inflammationem patiente, letus possit aliquando viuere.

Inflammatio vteri facile in gangrænam degenerat: quia vterus veluti totius corporis cloaca, excrementorum illuuiem recipit, à quibus calor natiuus facile suffocatur.

Vteri inflammationis delirium, consilium, singulas, extremorum frigiditas, sudor diaphoreticus superueniens, mortem breui aduenturam portendunt.

Si inflammatio vteri suppuretur, solutio illius spectanda est: sed vlus fordidum loquatur, à quo ægra lent à febre contabescit, vel in hydropem incidit.

Si inflammatio in scirrhum mutetur, malum diuturnum euadit, & sæpe hydropem accersit.

Ad curationem huius affectus, sanguinis ad vterum fluxus repellendus, & deriuandus est: qui fluxit & in parte contemetur, resoluiendus. Et si tumor ad suppurationem vergat, ea adiungenda est, ruptoque abscessu pus euacuandum. Quod nec frequentibus remedijs.

Præmissio igitur clyster ex coenole, & refrigerante, mittatur sanguis à basica lateris magis affici: vel ab vtraque, si totum vterum tumor occupet: & phlebotomia reueretur.

tur bilis, quater, pro agra viribus, a phlegmone magnitudine.

Poli sufficientem resolutionem, & transito morbi augmento, ubi nulla amplius suspicio est fluxionis adluc hientis, vnde inferiores aperiendo sunt ad derivationem a parte affecta. Quo sensu audiendum est Gal. lib. de sang. missione, & 33. *werkum* docet, in vteri inflammationibus venas poplitas & malleoli esse aperendas. Artan. quidam aliqua resellit indicatio perit, status est venas brachij aperire.

Ad resolutionem etiam conveniunt frictions, & ligaturæ superiorem partium, & cucurbitulæ capulis, lumbis & dorso admotæ.

Si viscosi humores, præcipue biliosi in corpore abundent, qui reliquorum humorum in fluxu, quasi vehiculum sint; iis lechibus medicamentis evacuandi, vt syrupo rosaceo, & violato soluturo, manna, rhab. catholico, vel electuario lenitivo, fortiora enim humores nimium commouendo fluxionem excitant.

Vomitoria autem licet præferantur ab Auenenna, minime conuenire videntur. Si enim blanda & mitiora sint, nihil penè euacuant. Si fortiora, magnam corporis agitationem efficiunt, vnde humores commoti magis in partem irruere possunt.

Propter insignem febrem refrigerantia medicamenta virganda sunt, vt incipi, & emollientes; quibus, si immen-
sus dolor, & iniquitudo ægrotantis vehementer afflicti, narcotica etiam permiscenda, quæ etiam somnum exhiberi possunt.

Poli primas evacuationes, topica admoventur immo ventri, inter vmbilicum & pectinem, & circa renes, primo repellentia & refrigerantia, in fortia suauitatem, epithemas & cataplasmata.

Lunamentum fit ex oleo rosaceo loto in aceto, vel vnguento rosaceo, cerato laetino, refrigerante Gal. addito paucis aceto.

Epithema fiet ex aquis, vel decocto plantaginis, acetofa, solani, iunimati, papau. albi, & rosarum, addendo boliamen, lang. drac. vel terre sigillatæ tantillum.

Cataplasma parabitur ex melle panis albissimi cum lacte cocto, cui parum olei rosacei, vel olei hyoscyami, vel solani, cum vitellis ouorum addatur. Vel ex farina hordei, semina fenugr. cum oleo rosæ, quibus etiam prædictæ plantæ cantu-
le addi poterunt.

Iniectiones in vterum fieri debent, in hunc modum compositæ.

Re. Sol. plantag. nymphæ, solani, endiu. an. M. j. ros. rubr. P. ij. Coquantur ad tertias, & adde olei myrrini Vnc. j. aceti 3. ii. Fiat iniectio.

Ex istis herbis confusus cum oleo rosaceo, & aceto fieri debent pessaria, & in vterum admitti.

Neque verò diutius vitendum est repellentibus & refrigerantibus, ne tumor indurecat, & in scirrhum degeneret. Ideoque cum repellentibus emollientia & resolutiva permiscenda, caute, vt quo longius phlegmona a præcipio distat, maior sit quantitas digerentium. Sic prædictis remedijs malua, althæa, artemisia, fenugræcum, chamomilla, melilotus, aucta vel immixta eorum dosi, admissi poterunt.

Intrum si alius est dolor, emollienda est blandè purgantibus. Ino verò ad temperandam inflammationem clysteres refrigerantes frequenter inecti plurimum prodesse poterunt, cum vterus recto intestino iungatur. Eorum autem minima fit quantitas, vt diutius retineantur, & ne vterum comprimant, quorum tale fit exemplum.

Re. Rad. althæe Vnc. j. fol. malua, violæ, lae. succe, ana M. j. solani M. ss. flor. violæ ros. an. P. i. perunor. acidor. num. x. Coquantur in aqua hordei in colat 3. vi. adde olei rosacei 3. iiii. Fiat clyster.

Si dolor valde urgeat, prædictis clysteribus addi poterunt vitelli ouorum, a xungia gallinæ, lac melle, mucago sem. fenugræci, vel manna; & imo & tantillum opi cum paucis croco.

Tum etiam fiunt iniectiones in vterum ex lacte capris, vel onis, cum opi & croci an. gr. iij. vel ij. & pauca aqua rosarum.

Vel pessaria addentur opii medicum cum paucis croco, vitellis ouorum & oleo rosaceo. Vel etiam fiat pessic phlionio Romano cum croton. Velfotus anodynus in hunc mundum paratur.

Re. Althæe cum rad. malua, violæ ana M. j. chamomille meliloti, rosar. an. 3. Coquantur pro foci.

Inclinant affectu purgato iteranda est blandioribus catharticis. Ad affectu ad resolutionem vergente, (quod ex remissione sympnomatum, & minori partis grauitate dignoscitur,) discutientia maiori copia prædictis remedijs addantur. Vel fiat tale cataplasma.

Re. Pulueris rad. althæe vnc. j. flor. chamomille, meliloti, an. 3. i. fol. artemisise puluer. farinæ hordei & fabarum, ana Vnc. sem. Coque parum in vino aufero; adde pinguedinis porcinæ recentis, olei chamemel & liliorum abotum, ana Vnc. j. Fiat cataplasma.

Fotus & infusus resoluens hæc etiam conferre poterit. Si tumor resolu non negat, sed ad suppurationem vergere videatur, adiuuanda est sequenti cataplasma.

Re. Pulueris radice althæe, flor. chamomille, farinæ sem. lini, fenugræci an. Vnc. j. ficum pinguedinis vitæ Coquantur ad paulis consistantiam. Deinde adde vitellos ouorum in v. croci Serap. 3. olei lilior. & butyri rosarum ana 3. Fiat cataplasma.

Confectio pure, quod ex caloris & doloris remissione, ac quædam in mandatione rangende dignoscitur, ab effectu disceptio procuranda est motu corporis, tuillu, sternutatio, cucurbitulis admotis, iniectionibus detegentibus & attenuantibus, vel pessarijs rumpendi vim habentibus. Exempli gratia.

Re. Adipis anetini Vnc. sem. terebinth. 3. ii. pulueris sem. rutæ, nict. radice iris, ana 3. ii. Melle, & cum lana fiat pessarium.

Rapto ab effectu, puris expurgationi, & viceris deffectioni ac consolidaioni incumbendum est, prout in viceris vteri curatione iam describenda docebitur.

C A P V T VII.

De viceris vteri.

Inflammationem vteri (suppuratam sequitur viceris) quod etiam ab alijs causis dependet, quocumque scilicet in vtero erosione efficiere consuevit.

Causæ igitur illius sunt, ab effectu disceptis, humores acres in vterum confluentes, acris & erodencia medicamenta in vterum immissa, vel etiam alumpita, vt de cantharidibus supra relatum est.

Causæ antecedentes sunt illæ omnes, quas inflammationem efficere posse supra docuimus, vt parua diffilis, violenta, & effranis concubitus, illos muliebres acror, & diuturnus, vulneta, calidus & confusio, & præcipue gonorrhæa virulenta, ac lues venerea, cuius contagium vtero, aliisque ceruici facile communicatur.

Differente putantur a loco magnitudine, figura, & complicatione cum alijs affectibus.

Ratione loci nempe varium vteri partium modo vicos ceruicem vteri occupat, & internum illius officium modo in fundo residet, quod rariis contingit. Aliquando & frequeus internum vteri superficiem obidet, aliquando, sed rarius vterum inuadit: vnde fit non inquam, vt pus ab inuisione viceris omni, per vterum, vel in vterum vacuet, vel fit in caritate abdominis subsistat, ab alijs circa vagina appareat, de quibus loquitur Hippocr. lib. 2. 47. & 48. s.

Ratione magnitudinis, quædam magna, quædam parua, multum scilicet, vel parum (parci) occupant in vtero, dicunturque si sint parua, & superficialia, parua & scabæ, & pruritu discentia, verò magna, & grauis, ac relati depauperata, nome ab Hipp. nominantur.

Ratione figuræ, viceris dicuntur rotunda, oblonga, fissura, fissata, fistulosa.

Ratione complicationis cum alijs affectibus, dicuntur phlegmonosa, cancerosa, scirrhalosa, dolorifica, saniosa, virulenta & contagiosa.

Signa diagnostica viceris in vtero geniti sunt; dolor & mor-

q. Rad. gentianae, rhabdientiae, zedoariae, & aristolochiae rotundae, ana Vnc. 3. vini albi lb. vj. Bulliant ad tertie partis consumptionem. In colat dissolue sacchari albi lb. sem. Seruetur ad vsum.

Vel sequens decoctio parari poterit.

q. Hordei integri, furfuris macri, & rosae, rubr. ana P. l. fol. agrimon. abinthii, caprifolij, & apii ana M. labarum & lestrum ana 3. lb. iij. liquoris r. rad. iros. Florent. & zedoariae ana Vnc. ij. Fiat omnium decoctio addendo circa finem parum vini albi.

Si vlcera admodum fetida, & putrilagine infecta fuerint, decoctioni addi poterit panum vaguenti Aegyptiaco, collyrii Lanfranci, vel pulueris Mercurij dulcificati.

Vbi vlcus probe deterium, atque mundificatum fuerit, ad exsiccanam & solidantiam veniendum est, quorum formula talis esse poterit.

q. Rad. consolide maior. bistortae, ana vnc. i. fol. plantag. caudae equinae, burf. paltoris, saniculae, pilosellae, mellefolij, ana M. rosae, rubr. M. sem. Coque in mensura aequa, pro iniectione.

Predictae, aut simili iniectioni pulvis sarcoticus sequens admisceri poterit.

q. Rad. iros. aristolochiae, consolide maiore ana vnc. sem. myrrh. Vnc. aloes 3. lb. Fiat pulvis, cuius vnc. leas misceatur in qualibet iniectione.

Terebinthina lora cum aqua plantaginis ad 3. lb. & dissoluta cum melle, & oui vitello, iniectioni mixta valde prodethaque magni pulvis sarcoticus etiam addatur.

Vnguenta pompholygos de cerula, de plumbo, & similiter cum iniectionibus, an. 3. vs. pro vna dosi mixta viuantur. Sed reliquis prestat oleum ex vitellis quorum in mortario plumbeo agitatum.

Suffragina ad vlcera profunda versus vteri fundum inhaerentia penetrant, ea quidem, ea quoque ita parari poterunt. q. Thuris, myrrh. malichis, styracis, alani, ana gummi juniperi, ladanii ana Vnc. terebinth. q. l. Fiat trochisci pro suffragio.

In vlcere contumacissimo cinnabaris addita suffragio omne foret punctum.

Thermis quoque siccantis, sulphureis & aluminosis in vlcibus diuturnis viuantur, quoque mulieres desperatas, tamquam ad ext. tamen remedium, Medici ablegare solent.

Emplastra etiam conuenientia epigastri applicare non inutile fuerit. Si quidem eorum vires ad interiora vique, per aliosque meatus deferuntur.

Si vlcus sit in collo vteri, linimentis inungendum est detergentibus & exsiccantibus. Detergentia in hunc modum componi poterunt.

q. Succo apii vnc. 3. anella rosae, Vnc. 4. sem. terebinthinae Vnc. sem. farinae hordei, vel orobi q. l. Leuiter bulliant, & fiat instill. linimentum. Vel

q. Aristolochiae rotunda 3. lb. marmabii, centaure. min. agrim. an. M. sem. Coquantur in q. l. hydromeli Colaturae adde pulv. rad. iros. Florent. 3. lb. farinae orobi, mellis depurati ana q. l. Fiat linimentum.

Ad mouet etiam vnguentum diapompholygos, ad addendum thuris, malichis, myrrh. ana, oleum pro vt vlcere ratio requirit.

Vlcere sufficienter mundato, exsiccans & cicatricem inducens vnguentum adinungendum est, cuius formula talis esse poterit.

q. Tuthia lora Vnc. 3. lithargyri cerussae, sarcocolly. ana 3. lb. olei de cera q. l. Fiat vnguentum.

Interdum contingit vlcera vteri ad rectum intestinum penetrare, interdum vero ad vesicam; quod ostenditur per vnde per illas partes exiret.

Si per intestinum rectum pus effluat, & vlcus lenientes, detergentes, exsiccantes viuantur, quales in dysenteriae curatione fuisse proposui.

Si vero per vesicam pus effluat, & conuenient diuretica lenientia, & refrigerantia, quae vacent illas fordes in vesicam transmissas, & vlcus curationem promoucant, quales sunt emollientes sem. j. maior, quibus iungat terebinthina, aliaque remedia pro vlcere vesicae praescripta.

Si vlcus in fistulam degeneret, quod praecipue contingit,

dum exterius versus eorum aperitur, quomodo etiam in ipso vtero, cuiusdemque ceruicis idem fieri possit. Ad mouendum erit, verum magis conducit agrotanti, mentum iam affectum relinquere intactum, per quem natura vacationem excrementorum multiplicum molitur, vel eisdem curationem suscipere illud si magis e commodo agrotanti sit cura, saltem palliatia ducta, inlinuenda per peragitationem frequenter repetitas, & sudorifica bis singulis annis exhibenda, tum iniectiones detergentes & roborantes, atque emplastra diapalma, dauium & similia superius addita. Si vero sanatio operari possit, eadem remedia viapanda sunt, quae ad aliarum fistularum curationem adhiberi solent.

Si a lue vlcera in pudendo, vel fini vteri sunt vlcera, extra vniuersum huius curationem lauari minime possunt. In qua perficienda per varios modos, ille qui per suffragia cinnabaris sit, maxime confert: non solum enim ea conducunt ad luen illam & toto corpore anserendum, sed etiam peculiariter si vteri finem excipiantur, vt hae vlcera, citius sanentur, efficiunt. Tum etiam in cura quae per iniectionem b. drargyri fit, vnguenta mercurialis in penultima illa loca erunt detrimenda.

In quibusdam vteri vlcibus, si praevius molebus illius cruciemur & thicatur, vt non raro solet contingere, ubi humores acris & salii in eam partem deflauerunt, ad eam demulcentia conuenient pelliculam imbutam vnguento emulato citi mercurio, aut Aeg. piscio dissoluto in aqua marina, aut aqua aluminis, aut butyro recenti, in quo hydragryum patendum sit, addito sulphure.

CAP. V. IX.

De scirrhus vteri.

Scirrhi in vtero geniti natura, differentia, & causa eadem sunt, quae in hepatis scirrhus fieri proponit, vt eas frustra hic repetere non opus sit, sed inde erunt deponenda.

Intra causas tamen antecedentes hae vteri scirrhus propria est, caque satis frequens, dum scilicet mulieres fluxum menstruum, aut lochiorum patientes, se impudenter aeri frigido exponunt, aut aqua frigidam potant, unde sequitur fluxus cohibitus, sanguineque retentus crassescit, & condensatur, ac tandem in parte tumorem scirrhosum producit.

Signa scirrhi in vtero geniti sunt, durities & resistentia in vteri regione, alius circuli per ipsoem referens, grauitas in eadem parte, & pondera sensus, praecipue quando agitata, quasi vt erus prolapsus sit in pueri dandi, & pendens vtero, aut decumbentibus, grauitate sua restum interstium premittit, febri, carpitia, & doloris, quibus distinguitur ab inflammatione, aut saltem dolor est exiguus in scirrhus non exquiescentem in vtero pulsus sit. Si inflammationis succedat, cessat febris & dolor, manente duritie & resistentia. Si in ipso vteri corpore sit, regionem pubis contrahendo facile dignoscitur, verò in ceruice, digitis contracti explorari poterit. A mole distinguitur ex causis praecedentibus, tum quod in mole menses si fluant, inordinatè fluunt, licet vlcus autem si fluant, ordinem seruatur, in mole etiam manens lacte tingitur, in scirrhus autem extenuatur.

Quod ad prognosim attinet, omnis scirrhus curatu difficilissimus effluat, cum valida semel contracta vix emolliiri possit; adeo quod calor naturalis in parte scirrhus affecta admodum debilis est, vt aegre materiam ex illam & hinc lapides in discutere possit.

Magnus & contumax scirrhus hydropem tandem accendit. Scirrhus vteri, si calidioribus & nimium humectantibus remediis tractetur, in cancerum degenerat.

Curatio huius scirrhi ad duo dirigenda est, scilicet ad causam antecedentem, & consequentem.

Ratione causae antecedentis phlebotomia, inlinuenda est. Primum est vena brachij affectus non fuerit admodum inueteratus. Postea vero ea vena inferiorior, praecipue quando suppreffa sit, mensura.

Hemorrhoidum apertio hae etiam vtilissima est. Nam & sanguinem iculentum euacuat, & ab vtero detrahit, propter venarum communem, quam habent cum vtero.

Purgatio etiam necessaria est, per interualla repetita, ex

mc.

medicamentis melancholicum educendum, vsurpando primis mitiora, mox ad fortiora transfundendo.

Purgantibus autem premittenda erunt preparantia humorum melancholicorum, & aperientia, in forma apozematuum, iuleporum, aut iulculorum, iuxta dispositionem egrotantis.

Ac præter aperientia vulgaria, etiam remedia ex chalybe vsurpanda sunt, quibus validissimi isti infactus rebellium, & crassorum humorum in vtero aliqui paribus dissolviuntur.

Ut vero humores superflui ab vtero deruantur, vtiliter admoventi poterunt cauteria cruribus, candida gestanda, donec purgationes menstruales, quæ vti plurimum in hoc affectu supprimuntur, ad consuetum ordinem ratione temporis, quantitas, & qualitas, redeant.

Ratione causæ coniunctæ emollientia, & resolutiva medicamentis a exterius admoventia sunt, in hunc modum composita.

℞. Rad. althææ, & liliorum, an. Vnc. ij. fol. malvæ, violariæ, althææ, branchiæ vrsinæ, an. M. fol. art. emfisi, nepetæ, an. M. flem. lini, & fœnugr. an. j. flor. chamæ, & meliloti, an. P. j. Fiat decoctio, quæ locatur regio pubis & inguinum, cum spongia in ea imbuta, & expressa.

Ad magis emolliendum, potest fieri decoctio in aqua & oleo dulci vel in decocto intestinum veruecis.

Possunt etiam addi decocto, vt potentius euadat, radices beyoniæ, & cucumeris agrestis. Nam à mitioribus incipiendum est ad validiora progrediendum.

Ex eodem decocto, quædā dosi simplicium potest parari iematicipum, quod huius rei est efficacissimum, & locu poterit.

Clysteres etiam frequentes, tum iniectiones in vterum ex eodem decocto erunt conficiendæ, quibus olea liliorum chamæ, aut amygdalarum dulcium addi poterunt.

℞. Olei lihor. & amygd. dulc. an. j. iij. mucilag. sem. fœnugr. extrahæ cum vino albo j. j. pingued. gallinæ, aniseris, & anatis, an. j. j. butyri recentis, & xungus porcianæ j. j. cere, & cerebith. q. s. Fiat vnguentum.

Sequens verò in omni scirrhus probatur, & à Rhasi descriptum.

℞. Beldij, ammoniaci, galbani, ana partes equales. Temperant in mortario cum oleo de bene, & liliorum. Deinde addde mucilaginum sem. fœnugr. aliud, & ficum parum quantitate. Fiat vnguentum.

Ex eadem materia addita cera, fit etiam emplastrum efficacissimum, admoventium regioni vteri ante, & retrò. Vel amoueatur emplastrum diachyli ireatum.

Cataplasma fiet ex residua decocti fomes prædicti contrita, & per setaceum trita, addendo saring sem. lini, fœnugr. an. vnc. j. ficum m. v. puluis rad. iris j. croci j. j. pingued. gallinæ, olei amygd. dulc. an. q. s. Fiat cataplasma.

Lutum bituminosum in thermariis sulphurearum, & bituminosum, vtiliter instat cataplasma, admoventur.

Suffusus ex lapide pyrite candente in aceto extingido, miris laudibus efficitur a Galeno, ad omnes tumores scirrhosos dissolvendos, idæ vt instat incantamenti operetur. In dicto aceto saturata & patericia incoqui poterunt. Aduertendum tamen est, ne laps pyrites sit plumbarius, quia maximè nocivus esset.

Ac denique omnia remedia tam interna, quam externa, quæ supra in hepatis & lienis scirrhis curantibus fuisse propostia, hæc etiam conferre poterunt.

Hæc tamen medicamenta in toto curacionis decursu, summo iudicio ac prudentia moderanda sunt: de vel indiget scirrhus, vel quod multo peius est, in cancerum genere. Quod omnes Præfici verentur, ex incauta, vel diuturniore auxiliorum administratione: à qua melius est per intervalla desistere, vt eorum successus aduertatur. Frustrâ enim pugnat quod scirrhus omnino indolens, lapsi dè paratam adeptus est.

C A P V T X.

De cancro vteri.

Cancer vteri est tumor durus, ac renitens in vteri corpore vel cervicæ dolore acerbissimum, puncto-

rium, & lancinantem præ se ferens.

Fit ab humore atrabiliario in ea parte co lecto, vel à scirrhus malè curato, qui faciliè in cancerum degenerat, in ea præcipuè parte ob sanguinis copiosum affluxum, qui in venis scirrhi vicinis retentus, nec sufficiens per menstruales purgationes euacuatur, adurit, & osaliam corruptionem acquirit.

Duplex vulgò statuitur, viceratus, & non viceratus. Quando materia morbifica minoris acrimoniæ, & malignitatis participes est, cancerum efficit non viceratum. Acrior verò tacta per putredinem, vel aduersionem, tantum exulcerat, & cancerum viceratum producit.

Diagnos ex definitione propostâ facili efficitur, enim tumor durus ac renitens in vteri corpore, aut cervicæ percipitur, qui dolore punctiformi ac lancinantem efficit cancerum esse pronuntiare possumus. Evidentius tamen distinguuntur, si oculis percipi possit, vt quando est in vt cervicali, speculo matricis adhibito; apparebit enim tumor inæqualis ac tuberosus, lucens aut nigricans, venarum propagibus quasi radicibus circumseptus. Si verò viceratus sit, lancinem quandam emittit fulsum, aut oigram, & graniter oleum interdum etiam sanguinem, ob erosionem venarum quæ in partem decurrunt, tanta copia nonnunquam aperro aliquo vate insigniore, vt ægra vix periculum incurat. His accedit à breuior, anxietas, nausea, pudendum ardor, & similia.

De prognosi hoc tantum pronuntiare licet, cancerum esse incurabilem, vel viceratus, siue non viceratus sit. Quod quidem vt de omni cancro, etiam partes externas obfident verum est, si potiori iure de eo qui vterum occupat sentiendum est, ob continuam superfluitatem illius, quæ ad eam partem decurrit.

Cum igitur curatio integra (separabilis non sit) ad alteram quæ palliativa dicitur, conueniendum est. Eaque cò dirigenda, vt canceri non vicerati viceratio prohibeatur, & ne viceratus manus incrementum fulcipiat, in vtroque doloris atrocitas temperetur. Quod fiet primum vniuersalibus corporis euacuacionibus & alijs remedijs, quæ humorem melancholicum & atrabiliarium alterent, euacuant, eiusque generationem impediunt. E quorum numero sunt nullio sanguinis ex brachio, malloeo, hemorrhoidibus, portiones, apozemata, ulepi, fistula, lac, serum lactis, & aquæ minerales frigida, & alia humiliora, quæ ad euacuandum canceri, in quacunque parte fixi, curacionem à Præficis vulgò præscribi solent. Et purgationes præsertim frequenter iteranda sunt, vt antedecens canceri materia lubratatur.

Tum etiam admoventia erunt topica, quæ moderate refrigerent & allicantur, sine vlla mordicatione, linimentum forma amplicis vsurpantur, quorum præcipua ita componi poterunt.

℞. Ol. myrtini, & rosæ an. j. j. succi solani, & temperui, an. j. j. Agitentur omnia in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, donec nigrificent. Deinde addde litharg. r. i. & cere, nullæ in aqua scabiosæ lotor, an. 3. in turtib. præp. 5. in camphoræ 3. j. Fiat linimentum, quo illinantur ter, aut quater in die. Vel

℞. Olei ex vitellis ouorum, & rosæ, an. 3. j. sem. sacchari Saturni 3. j. Agitentur in mortario plumbeo, donec colore mutant.

Sequens cæteris præcellet, eo quod tumores mammarum, qui cancerosi potantur, prorsus curati sunt.

℞. Ol. ex vitellis ouorum 3. j. succi solani, & veronice vel semperui, an. 3. sem. mercurij crudi 3. ii. Agitentur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, donec crassum linimentum acquirant.

Linimenta prædicta in vterum immitte in qua cum turbandis oblongis vel candelis cereis lincolo obvolutis. Iniectiones tamen multo facilius immitti poterunt in hanc modum compositæ.

℞. Aquæ horæ h. sem. aquæ solani, & plantag. an. 3. ii. aquæ veronice 3. i. trochilorum alb. Rhaf. C. an. sacchari Saturni 3. i. Fiat iniectio.

Si dolor atrociter vrgeat, addde Vnc. iv. iniectionis, syrpidi de papauere Vocâ.

Foveatur etiam pars affecta aquis plantaginibus, & solani, vel

vel eorum decoctis: quibus addi poterunt folia nymphæ, papaveris albi, olei rubræ, & camphora. Quod etiam decoctum inini frequenter poterit in vterum, fictæ multo efficacius, si in mortario plumbeo agitur, vel saccharum Saturni eidem permiscetur.

Inter specifica commendantur rana lota & cocta, & cataplasmati loco imponitur, vel caruni decoctio per iniectionem adhibita. Tum etiam decoctum aut fucus cancerum fluviatilium in vterum iniectionis. Sicut & herba Roberti sumpta, vel admodum.

Si cancer viceratus sit, linimentis prædictis mineralium doctis augeatur, sique cinis cancerum fluviatilium vtiliter addi poterit. Iniectionibus verò trochisci albi Rhafis, & aqua hordei cum superni iniectionis materia permisceri.

Si dolor valde virgat, fomenta ex malua, althæa, nymphæ, papavere, hyocyamo, coriandro virida, anetho, lemmi, piliplacte, croco & finalibus per interalla viarpana, vel cataplasmati ex iis purata imponenda. Ex quibus etiam decoctis iniectiones & semisupia parari poterunt.

Hæc tamen omnia aliquando non sufficient ad immanissimum dolorem placandum, qui interdum nullum quieti & somno locum relinquit. Unde cognitur non raro ad narcotica recurrere, que in hoc affectu, propter intensum humorum leuorem, minus nocet. Et videmus nos mulierem cancro in mamma laborantem, que fingulis noctibus per quatuor menses, laudari gr ij, vel iii, innoxie & cum maximo solatio fuisse.

Si ex cancro vterus multus sanguis prodeat, ut sæpe fit, iniiciatur in vterum succus plantaginis cum tantillo thuris.

CAPVT XI.

De vteri grangræna, & sphacelo.

Grangræna est corruptio, seu mortificatio partis incipiens, ubi autem omnis corrupta, & cinotusa fuerit, sphacelus, seu lyderatus nominatur.

In mulierum genitalibus facili hæc affectus generatur, propterea quod illæ partes humidiores sunt & molliores, totiusque corporis excrementa facili reperiunt.

Inflammationis abfcessus, viceri vel cancro male curatis sepius succedit, quando calor vitalis partis suffocatur aut destruitur. Suffocatur in magnis inflammationibus, quando plus sanguinis affluit, quam infusus calor partis digerere aut in pus commutare valeat. Destruitur vel a frigida intemperie illum extinguente, vel a calida dissipante ac resoluente.

Cognoscitur grangræna incipiens, ex eo quod calor insolens in parte percipitur, horrore ac tremor inuadit cū pulli languido ac frequenti, & animi deliquio. Ex cum vitulini murtu ceruicem vteri magis hic affectus inuadat, atq. adeo pars affecta oculis explorari possit, ea mollis, liuida, nigra, tum cadauerosa appareat, & siue sensu pungi ac locati valeat, tum seorsum ac cadauerosum halitum exhalat.

Quod ad prognosin attinet. Maligno hoc grauissimum est, quæ periculosissimum, atq. vltimum lethale. Obseruatum tamen est, quæ quamplurimum auctoribus, vterum putredine & grangræna corruptum, vel sponte occidisse, vel iectione ablucum fuisse, cum incoluntia mulierum, quas auctorum obseruationes magno numero collegit Schenkius lib. 4. obseruat. inuom.

Curatio perficitur iisdem remedijs, quæ ad aliatum partium grangrænas adhiberi solent, si grangræna sit in ceruice vteri, vel ad externas partes vergat, ut i scarificationibus, & abluionibus, decocto abstinij, myrtis, & similibus; vnguento Aegyptiaco, cataplasmati de tribus tannis dicto, quod fit habet.

Farinæ hardæ, fabæ orobian, vnc. ij. oxy mel. lb. j. Coquantur ad formam catapi. Cui si addatur farina lupinorū, myrtis, aloë, & abstinij, efficacius erit.

Quod omnino corruptum, & emortuum est, amputandum sectione in vteri procedenda, ligatura in dæc magis ac magis coarctata & constricta. Quarum operationū exempla quamplurima habentur a Schenkio collecta lib. 4. obseruat. inuom.

Refert etiam Vtriusque obseruationibus, & e curatum

mulierem annorum 15. cui effluante canicula tuberculum quoddam in sinu muliebri, ex violento forsan maris concubitu, productum fuerat. Illi autem cum imperitus chirurgus cataplasmata minus idonea admoisset, intra dies non multos, pars vniuersa putrefecit, nigrescit, & emori cepit, & incredibili celeritate animæ verius malum progressum est. Ipse autem sequenti methodo eius curatio inueniuitur. Primo folia & plantaginis succum vberitimum, syringæ in vtrumque meatum ter vel quater in die iniecit; deinde horis illis intermedijs lini baptem si succis, admixto aceto, ambucum applicuit: qui succus eodem cursu permixtus liquore. Ac in eiusmodi repetita aliquoties applicatione perseveratum est, donec resisteret vterus, & desinere putrefactio. Alumenque interim quoque portione, singulis diebus, ex decocto acetosi, scabiosa, pimpinella, prunæ, damasci, summit borrag. bugliæ, flor. calendule, cum aqua, hyssopi, & aceto, ad lytupi acidi longi formam apparatus. Vicius erat paucus, sed refrigerans & acidus, putredinis occasione præfens. Tercio die incendij flamma lauita; putredinis remisit. Quare canem nigra mortuæque iugula corpe atrati & circumquæ; à vno, sine doloris sensu, separari fecerari; iussit. Inde reliquum ad vnum vique Aegyptiaco vnguento abluimus. Eodemque modo ad cicatricis inductionem, vt in alijs viceribus, profectus est.

Toto curatiois decursu, cordis roborationi incumbendum est, tam affumptis, quam admotis. Tum etiam enemata emollientia, abstergentia, & refrigerantia, frequenter infundenda, que propter viciniam parti affectæ plurimum opitulantur.

CAPVT XII.

De vteri inflatione, & hydrops.

Vteri inflatio, & hydrops ab omnibus propemodum auctoribus conuenduntur, ita vt inflationem vocent illum h. dropem, qui fit a flatibus; cum hydrops simpliciter dictus ab humore aquoso genere, distinguitur tamen, & datur quædam vteri inflatio, que hydrops dicitur non debet, quando nimirum a flatu lubro irruente vterus inflatur ac distenditur, unde dolor intensus excruciat, quemadmodum in colico dolore contingit; atque adeo si illa inflatio non diu pereneret, sed breui diluatur, hydrops nomen non necesse est, talis læpe accidere solet in hysterici affectibus.

Duplex igitur hydrops vteri statendus est, vnus a flatibus, qui tympanici afflatus, alter vero a seroso humore, qui aliter analogus est. Quidam tertium addunt a pituita, vt etiam leucophlegmatia similem speciem constituant, quæ in vtu practico rari contingit. Nos tamen nobiliem mulierem vidimus, quæ vna die tantam pituitæ crassæ copiam ex vtero excreuerat, vt sex vel septem librarum pondus equare poterit; quæ procul dubio pituita diutius retenta, hydropem vteri.

Flatūs & serosus humor vteri hydropem efficiens, vel in cauitate vteri, vel intra membranas illius, aut vesiculas continetur. De cauitate vteri est aliqua dubitatio, quomodo flatūs & humores in ea contineri valeant; cum facilis patet exitus per vteri osculum & ceruicem. Respondemus, officium vteri internum pluribus modis occidui posse, vel a pituita crassa illi parti impacta & indurata, vel a tumore scirrholo, vel aliqua alia causa. Merctatus cenet pituita mucosam excreta per ostia venarum, & que purgationi mensilium destinata sunt, & ex illa pituita heri quandam pelliculam totam vteri iuxtaficem totamque obducantem, in qua pellicula ferum & flatūs continetur. Aetius verò putat ex illa pituita per venas vteri transmissa quoddam producti folliculos; in quibus serosus humor continetur. Ferelius vero putat, sine osculi vtero, & ex simplicibus illius contritione aquam in vtero contineri posse. Omnes isti modi recipiendi sunt, & varijs exemplis confirmari possunt.

Ac primum flatuum in cauitate vteri contentorū exempla referuntur a Sennerio præf. lib. 4. part. 1. sect. 3. cap. 10. quorum primum delinuntur a Valerio de Taranto, cuiusdā

Iudæa Vlyssiponenfis, quæ cum prægnantem se esse putaret, eo tempore quo partus aduenturus putabatur, n̄ agna flatuum copia e vultu verus æquatur. Secundum est ex Matthæo de Gradis, qui dum propter vixit contigit retere. Aliæ etiam exempla. & Dodonæo Thædo Duno, & alijs delumptis similes casus occurrunt. & in vfu præctico talia videre non tam rari contingunt. Quibus addere licet huiusmodi a nobis intra in curatone ex Solenando reatam, mulieris quæ ex fultu nūc muliebate, flatumemulit ex vterio, cum tu putu milar iaco petuæto.

Aque vero licet materiat leioræ in vteri cauitate contentæ, ex-empla proponantur ab eodem Scennero, ex Khafis, qui vidit leumantem ex cuius vtro vixit vixit cœtie aque cœtie rantiatū etiam ex Jacobo de partibus & Dodonæo, in quæ quæ piam reitentiōis. Velas vero leumantem dillecut, in cuius vteri cauitate leioræ materiat plūquam le ragnia mœuare. Augustinus quæ singule tres caput libras, reperit ius, os vero vteri murtum in modum occallat.

Interdum vero aquam intra vesiculas contineri in vtero plurius tellantur auctores, qui huius rei exempla videntur in quibusdam mulieribus, quæ tales vesiculas aqua plenas per vtrum excoluerat. Ex coram numero sunt, Actius, Valerius, Chyllophorus a Vega Mercatus, Matera, & Fabricius Hildanus.

Aliquando etiam h̄drops vteri cum grauiditate complicatur, vt de propria voce narrat Fabricius Hildanus, cuius venter in montrolia magna tuihine intumuerat, & tempore partus penum aqua libras octodecim excreuit, post temhoram vero iterum libras novem & conlequenter puellum sanum, & robustum peperit. Similis casus habetur apud Scherkiu, cuius curatio contrariis malis, quæ ad partu leoris vtri venter tumorem retina, qui in cœtu cœ, poris n̄, gis ac, m̄, is mœre, agram de mœdo fultit, & vtero apertio, quæ quæ copie in eo repera est.

Denique h̄drops vteri continetur in illa peculiari illius vtri aquæ in vtero retenta eximiam habet apud Fernellum h̄drops paritæ, 15. cuiusdam mulieris h̄drops vteri corruptæ, quæ quos appetebat mœstia purgata, om̄nem aquam illam in eo vtero profundè, peluæ, sex vel octo complens aqua citrina reitentiā, dum vterus totus subfideret, colica proximo mense par colluvis, flatu tempore prolucit.

Causa mœstia mlationis, & h̄drops vteri est calor patii imbecillitas, quæ vel in hepate & liene sedet, & ex ipsa patibus flatu, puria, aut ferri humores in vterum transiunt, vel in ipso vtero, vnde prædixit materie in eadem parte per congectionem conuulsant.

Causæ autem quæ calorem natum debilitare valent, vel per h̄, vel per accedens, quamplurime sunt, ex vbi præsertim non naturalibus peccatis, ac frigido præsertim post partum impudentem in vtero exasperat, grauiditas est huius affectus causæ quæ etiam producere potest si fuerit mœstia inopportune occurrat, denotio itequm in aqua frigida, præcipue si fuerit mœstia, idem præstatum etiam ciborum frigido, aut si fuerit vterus, vt fructum, oloctum, leguminum & aceti vltus diuturnus, aut frigide potus copiosus, & mœstia h̄drops: formos longior, & profundior, partus vel abortus laboriosus, itque frequenter recurrent, mœstia illius miodicos calorem natum exasperans, vel suppressio eundem calorem sufficiens. His addo peculiare vteri in orbos, aut tumores, vicia, & similia quæ a calore in partu reioiunt, vel etiam oculum vteri occidit, & sanguinis mœstia, atque excrementa trorum hamoni exitum impediunt.

In diagnosi huius affectus multa inquirenda sunt. Primò quo modo sit h̄drops vteri particularis ab vniuersali totius corporis distinguitur.

Secundo quomodo species illius diuerse dignoscantur, vtrum a flatu, aëro, vel puria producat. Tercio vtrum a primario ipsius vteri affectu, vel ex vno altarum partium oriatur. Quarto vtrum materia peccans in cauitate vteri, vel intra membranas illius, aut vesiculas continetur. Quinto quomodo ab alijs vteri tumoribus. Sexto quomodo a ḡtauitate. Septimo quomodo a mola distinguatur.

Quod ad primam questionem attinet. Ad h̄drops, phidomus vniuersalis distinguitur ex eo quod in h̄drops vteri tumor fundum venteris magis occupat h̄drops vero vniuersalis abdomen vniuersum & qualiter distendit. Præterea in h̄drops vteri non tam citò apparet palior, & extenuatio totius corporis, quemadmodum in h̄drops vniuersali quo etiam plexum quæ fias & lingue lictas contigit. Etiam autem in h̄drops vteri, tumorem etiam in eo reliqua omnia symptomata sunt longe miora. Durities etiam & reitentiā, quando fit a flatibus, aut si fuerit quando ab aqua generatur tantum ipsam non occupat, quemadmodum in h̄drops vniuersali. Ac denique in eo aliquid flatus per mœstia ex vtero erumpit, aut tantum aquæ effluit, quæ manante videntur flatum vel aquam in vtero contineri.

Secundæ quæstioni satisfaciendum est in hunc modum; Species h̄drops vteri ita nuicem distinguuntur. Si a flatibus exasperatus venter percussus sonum edit, venter volutus percutitur pungit, qui interdum per septum transiunt, venter scilicet, lumbos, vmbilicum, aliaque partes excurrunt; nonnumquam flatus per vteri ceruicem videntur erumpunt, sentiunt quoque leuenum mulieres vterum ad ventriculum milar globi complendo efferri. Respiratio interdum difficilis est, & agra a lomo excitata sæpe cum anxietate ipsarum ducere cogitur. A cibis, & potu quoque malum exacerbat. Frequenter eructant, & a roctu meus habent. Si notatiōem vteri sæpe incurrunt. Dolorem interdum in regione vbi pogastrica percipitur, vbi adnotat manum ferre nequeant. Hæc signa inflationi vteri etiam conueniunt, illa siat quoque a flatibus: & in eo tantum differunt inter se h̄drops vteri, vt antea diximus quod inflatio breuior sit curatioris, h̄drops vero a flatibus multo longior.

Si vero vteri h̄drops ab humore leioro fiat, regio illa, mollis & illacida apparet; cum flatus tensionem efficiant grauitas maior adit in parte, & sonus veluti fluctuantis: aliquid aquæ nonnumquam e pudentis est illic. Ac denique si a puria oriatur maior est mollities, & illacidas partes quo in illis incrementum sumit, & partes ex cumilantes nonne pogastrica, pubis, perinae, ac lumborum tumore cedemto affectu conuulsantur.

Ad tertium quæstionem ita respondemus. Si appæntia sint totius corporis maiore affectu indicia, vt per lebris acutas vel diuturnas, hæmorrhagias immoderatas, fluxiones a capite grauioribus, venterque imbecillitates: lenis vel hepati tumores, alioque earum partium affectus contumaces, cū quibus vteri h̄drops accipit, & cum ipsi incrementum susceperit maxima est coniectura, vterum ab illis partibus per viam rheumatismi materiam h̄drops vteri ulciperit. Si vero toto corpore satis bene valente, tumor ille accedit, & partu aliorum ipsius vteri affectibus succedat, quales sunt partu laboriosi suppurationes mensium, vel nimia eorum profusiones, vicia, tumores phlegmonosi, vel icterici, conueniendum erit h̄drops vteri a peculiaribus istis dispositionibus dependere, & materiam illam producentem, per congectionem ex depurata illius humoris conuulsant.

Quæto quæstio ita fit, dicendo materiam quæ in vteri cauitate & continetur, multo ampliore tumorem efficere, quam dum intra membranas continetur. Deinde quando fit ex leiora materia, maior luctuio percipitur, quæ vbi intra membranas coheret est. Si vero quædam vesiculæ aqua repleta ex vtero decedant, signum est certissimum leiorum humorem in vesiculis contineri.

Ad quantum quantum respondendum est, h̄drops vteri a tumoribus eundem partu phlegmonosis, vel erythematosis distinguitur ex eo quod in h̄drops vteri aëro & doic ad leuissimum contractum sese exasperans; tum inflatio vique ad partes gentiales ex porrigitur. A tumoribus vero ictericis & cancerosis distinguitur, quod in eo non fit tanta durities, quæ dignus cum pementibus redit, sed potius cedat ac vixit in locum deprensus.

Sexto quæstio satisfaciendum est in hunc modum. In grauiditate tumor non est ita æqualis ac depressus, sed acumatus, & salignus, atque emittentem quandā circa vmbilicum prole icrent. Secundo, in grauiditate post aliquot mœ,

in infans. mulieres melius se habent vt plurimum, quia gra-
uior fetus maiorem humorum partem absumit: qui prius
membris laborum faciebant: ac hydrops quo vitatus pro-
greditur, eo maiores procreat molities. Tertio in grauita-
te fetus commotio manifeste percipitur post tertium men-
sem, vel quartum, quod in hydropse non contingit. Fit tamē
aliquando, vt quando hydrops a liatibus exoritur, palpita-
tio quaedam in vtero sentitur, sed illa a motu infans facili-
ter distinguitur, qui magis aequalis est: plures ventris par-
tes occupare solet. Quarto in grauiditate mammae intum-
escunt, in hydropse verò extenuantur, ac graciliores eua-
dunt.

Ad septimum quartum respondemus: in mola grauitatem quandam ad mulieribus in ventre sentire, quoniam in hydrope utri non apparet, et quando extra decumbunt in alium latus, pondus percipere in illud lapsum in illud deorsum. Deinde in mola fluxus mensium efficitur per interualla, tertio scilicet aut quarto quousque mensis contingunt, quod in hydrope utri non fit. Ac denique in mola mammae intumescunt, et aliquando lac in his apparet, cuius res contrarium accidit in hydrope.

Quod ad prognosticon attinet. Simplex veri inflatio, quia diuturna non est, periculo vacat. Si tamen cito non curetur in verum hydropem degenerare potest.

Hydrops vterali ab humore benigno, & minimè corrupto producatu, lolet quidem malum esse diuturnum: successu tamen temporis curationem recipere potest, imò interdum ex vtero aqua sponte effluit, & mulier conualecit.

Si vero humor prauius sit, aut putridus, quod ex
symptomatis praebuit innotet, morbus periculosus est,
et periculum lethalis. Si enim a proprio utriusque affectus
dependet, integram denotat virtutem naturalem illius
paris utriusque, unde virescibilis bydrops tandem accen-
ditur. Si vero vterus pro concilio aliarum partium patiatur
hepatis necem, aut ventriculi, quod maior erit labor,
et hic totius corporis ruina impendit. Hinc recte Aetius,
qualis est vterus in muliere, tale est vterplurimum reliquum
corpus.

Silicatus aut aqua in vteri cauitate contineatur, facilius curatur, quam si intra mēbranas, aut vesiculas cōcludatur.

Humus afflicto cursu idem ferè remedijs perficitur, quæ ad hydrops et chlorosis curationem fuisse propo-
sitæ. Quibus etiam peculiaria quedam, huic afflicto magis appropriata subnectenda sunt. Ac primum, quod ad phlebotonium spectat afflictu recenti, a suppreffione mens-
trui productæ, se plenitudine aliqua adhuc apparente, illa
conuenire poterit. Alioquin noxia iuxta eilum, calor natu-
ræ admodum debilitatur, quæ immixtura sitis et contumæ-
cie obstruções, ab humore ingido productæ, hydrops
venerialis motum incitant.

Purgatio verò omnino necessaria est, eaque frequenter repetita, quemadmodum in praedictis affectibus praecipimus.

Post sufficientem purgationem, aperientia, diuretica & menses moventia erunt viarum pandenda. In praedictis etiam locis descripra, quibus addi poterunt sequentia.

ȳ. Rad. apu & rubie tinctor. an. ȳ. fol. labine, matricarie, pulegi, an. P. ȳ lem. dauci 3 i Coquantur in sulculo pulli co-
lumbini, colaturam capiat manẽ per plures dies .

Ante iuscula assumptionem una ex sequentibus pilulis
deglutatur.

Ț. Caltoarei opt. myrrhæ, rubiæ tind. an. 3ß. croci 3j. Cum
fucco limon. formentur pulv. & ix.

A quibus medicamentis valido exercitio utendum est. Quo quidem non solum excrementa in visceribus & in corporis ambitu concepta, calore mediante dissipari possunt; verum & totum id quod in vtero continetur, ruptis exercitii vehementia pelliculis, foras euocari potest.

Si n'ulter facit vomit, bis in septimana vtiliter vomitus provocabitur. Qui non solum humores ad vterum confluētes recuabuntur, & educuntur, sed etiam dictæ pelliculæ vtero inhærentes, & interdum aquorum humorem continentem, motu & agitatione vehementi dirumpi forsitan poterunt, vnde humoris noxi fluxus consequetur.

Ad dictum humorē in vtero contentum discutiendum

bolus sequens erit efficacissimus.

q. Boracis mineralis 3. β. croci 3. β. Cumi succo fabine fiat
bolus. bis in septimana fumendus.

Sudorifica etiam in hoc affectu non parum proficua sunt: his enim humores feroci & pituitosiusque in vtero siue in toto corpore contenti, discutuntur & euacuantur.

Interius innatus ventriculi calor roborabitur, tam affugetur, quam admotis; in affectum illius partis curationibus descriptis.

Exterius verò topica remedia adhibenda sunt, ad vitæ roborandum, & humores in eo contentos discutien-
dos idonea.

Ac primum parari poterunt fomenta & femicupia, ex decocto radicum bryoniae, cucumeris agrestis; foliorum, ebuli, mercurialis, sambuci, organi, calamenti, abanthi, rutae, faluae, maioranae, thymi, lisi, pulegii, & artemidis: feminum genitilae, dauci, cumini, isidii, feniculi, baccar. lisi & iuniperisiflorum chamomillae, melissae, jorissiflori mar. Ex quibus etiam fieri poterunt faculi decocti in vino albo. Ad decoqui poterunt praedicta, aut eorum nonnulla in litinio cinereo armentorum.

Vt autem melius operentur prædicta fomenta, applicanda sunt ante & retroræ aque ludare debet, si possit, in lecto, vel supha commodè parata. Quod quidem semicupij beneficio præstari etiam poterit.

In hydropneumatosis uterina sicca magis erunt proficui; ex facculis paratis ex milio, sale, cumino, surfure in sartagine torrefactis, & vino irroratis.

• Polli solum uniantur infimus venter oleo nardino, anethino, rutaceo, ablinthico, abrotoni. Quae si arte chimica fuerint elicita, multo efficaciora futura sunt.

Alitu admovebitur emplastrum de baccis lauri; vel cataplasma ex stercore vaccino, ouillo, feminibus api, petro-
selini, cumini, & melle cocto.

In eadem vsum commendatur pellis recens mactata
quis vino meraciori calida ictorata, & vtri calide admora.

Cylindres frequentes injicendi sunt, ex decocto abinthii, origani, pulegii, rutae, centaurei, et similibus. Vel ex oleo rutae, nucum, anethi, et vino alio, aut Hippocratico, aut maluiaco. In quibus diluatur benedictam laxativam, diaphoreticam, hietiam discolorantem hidos, terebinthinam, confectionem et bacis lauri, mel anchosatum et similia.

injectiones in vterum, humoribus in eo contentis euacuandis, plurimum conferre poterunt, in hunc modum compositæ.

4. Rad. alari 3.ii fol. polegi, calaminthæ, an. M. fem. fabi-
næ P. i mechoacan. 3. i. fem. anisi, cumini, ana 3. fem. Coquæ-
tur, & in colat. Vnc. vj. diffulue olei irini & sambacini, an.
Vnc. i. Fiat injectio.

Ad eundem finem pessaria conficiuntur ita parata.
 ꝥ. Colocynth. & mechoac. ana ʒ. i. falis nitri ʒ. ʒ. mellis
 cocti q. f. Fiat pessarium Vel

q. Rad. cyclam. efule, ana 3. j. sem. nigellæ romanæ 3. 6.
mellis q f Fiat pelsarium. Vel

† Elaterij 3, g. caricarum contul. q. f. Fiat pelsarium.

Ex quando illatio fit a flabbus, maxime condecit sufficere
et nunc molestia, ad Solemnam commendatus, his verbis.
Adulter quidam puerpera se impotissimus ante tempus
debiliu virum committit & arripiens in insolubiles a lo-
res neque potius resistit. Tandem supernis obstrictus vetula
beni exorat. Iussit huius affertur mores tres in tristitia gressu
cum uxor. Tu non suppones scilicet totum cum carbonibus ignis
astra a muliere. Et statim infero nuncius mystificatus pul-
verem, se cum sa sapientia, ut infero pulvis sufficem excipere
pendens, per infundibulum internum. Per superna eodem
tempore eundem sufficem excipit. Qui ubi penetrat, mulier
sicum exclamans: Necesse est reddenda mihi alius. Qua voc
pui eide audatus est flubus & strepens, quales elidit scum
pulvis tormentatus alius quidam angustia aclusus accendit: et
Qui spiritus ubi resistit perperat, in ipso protinus momento
mulier famatis reclusa est. Iffia a experientia monstrat, in simi-
li casu aliquoties posse a idem remedia gravis admodum, potius &
profundius intrare, experientia.

In eodem calu vtiliter admouetur cucurbitula umbilico, cum multa flamma, flatus cum excreto discutit.

In affectu verò humoralis cauteria curibus admoenda, per eos fonticulis vteri sentia sensim exhauiatur.

Sic etiam thermæ sulphureæ & nitrosæ à plerisque laudantur, cum potius quam balneo, dummodo insignis feruor peroratus totus corporis non sit illi conueniant.

Ad vteri doctorem hunc affectu sapè ineluctantem, commendat Amatus Lusitanus aquam vel decoctum florum chamæmelidæ & v. v. exhibendum.

Ac denique si à partu iustitio contingat, non opus est alia purgatione, quam ea quæ per vterum fit. Quæ si non satis procedat, nuqua est pellaris aut hæmorrhoidalis & cucurbitulis feruoribus affusis, ceterisque remedijs in mensiam suppressione descriptis Et si status aduerius, iussus ex nupè inposita super propolis, erit opportunissimus.

C A P V T XIII.

De vteri proci dentia.

Q Vando vterus situm suum naturalem amittit, & versòs pendens prolabitur, vteri proci dentia, seu prolapsus nominatur.

Varie sunt illius differentie, secundum magis & minus tantum differentes, interdum enim sola ceruis anterior proiicitur in vuluam, alias totum vteri corpus proci dit, seu non prominet extra vuluam, & in illius margine apparet osculum vteri interius, instar glandis virilis, aut oui anseris perforatæ. Alias fundo etiam inuerso prominet extra vuluam, instar feroci virgins, aut oui struthiocamelæ, cum tamen pugilos sit, ac lapetifrice marquali præditus; denique aliquando ita relaxatur, vt ad femora vique deuoluatur.

Causa propterea vteri proci dentia est ligamentorū illius corporis, & ceruicæ in suo loco naturali continentiam, ruptio vel relaxatio.

Ruptio ligamentorum fieri potest ab omnibus causis violentis, vt ætus, alui saltu, onera grauioris tuberculatione, vel gestatione, compressione abdominis violenta, tuti vehementer & diuturnior, iternitudo violenta, præcipue in partu, aut in compressione fortis, partu difficili, nullifione violenta, seu aut secundum, conatu vehementi vteri ad præpulsionem aliquid sibi molestem, vt fetum mortuum, molam, aut secundum matrem enim coningit vtero, docet Galeo lib. 3. de facili, aut quod duobus Athletis, cum se fe mutuo deiecit conantur, vterque in terram prolabitur, huc adeo frequenter eucurbitularum admodum feruoribus, & quæque corporis & animæ agitationem vehementem.

Relaxatio ligamentorum exciditur etiam ex varijs causis, vt catarrhus diuturnior, eruditibus varijs, quæ in vtero velut sentiantur totius corporis agitantur. Hinc mulieres quæ sunt alio diutius laborant, vix hoc malum euitare possunt, præcipue seniores, quæ illi maxime sunt obnoxie. His accedunt causæ externæ, vt balnei vix frequentior, & præsertim in aqua frigida, aer autumnalis & humidior præcipue post partum in vtero lussus, alimenta humidiora, potus ebullientiorum, semper peluicæ, & omnes alie causæ, quæ humores præstiti prouocant, eisque in vterum conflantur, prouocare possunt.

Signa diagnosticæ sensibus ipsis patent. Vterus enim in pudendo vbiuis huiusmodi gressibus, vel infirmis, aut glomeris sili, cum lenis ponitur pudendo incumbens, cum erecto corpore stat. Dum vero sedent, aut alium eggerant, dolor vehemens præcipit circa regionem pudendi & pælis sacri. Si multum prominet, dolor & ardor maior sentitur, vix paulatim egreditur & vuluam in transitu mordet.

Causæ proci dentian excitanter ita distingui possunt. Si à laxitate ligamentorum fiat, sensim generatur, minorem habet dolorem, & præcellitur porgmentis alba, vel alia causæ vterum humectant, etiamque ligamenta relaxantes. Si vero fiat à rupture ligamentorum, dolor est vehemens, & sanguis interdum erumpit, & ac præcellitur causæ, quæ violentè ligamenta rumpere possunt.

Quod ad prognosin attinet. Affectus per se periculosus non est, valde tamen corpus & molestem, progressionem ac

deambulationem liberam conceptionem & conceptionem amenstruorum expurgationem impedit.

Interdum tamen mortem interire potest, si dolor, febris, consilij, aut alia quædam graui symptomata accedant.

Interdum etiam ab acris incomperis, aut violenta impulsionē corruptur, & gangræna afficitur, quæ partem amputare cogit.

Recessu affectus in quo vterus non valde prominet, facilius curatur, quam si inuolutus sit, & iniquis egredatur. In sanioribus facilius, quàm in adultioribus vterus in propriam locum reuertitur.

Quæ à rupture ligamentorum orta est proci dentia, incurabilis est.

Ad curationem, vterus in suum locum naturalem retrahendus est, vndeque contentendus; & ligamentorum vitium corrigendum si nempe distorta fuerint, & agglutinantibus illi relaxata, & viciantibus, instringentibus & roborantibus. Quæ omnia sequentijs præstidij perferri poterunt.

Primo itaque, quo vterus in suum locum facilius respondatur, alius & velica exoneranda sunt, ne ceruicem vteri comprimendo, illius reductionem impediatur; si quidem certum vteri recto intestino incumbit, sibi que incumbenti non habet vicem.

Potiusmodum verò mulier in dorsum supina recumbens, dissarcatis cruribus, genibusque sudum attractis, manibus vterum anteriorum premat, ut iungat in ceruicem tradendo, sicque inuolutio solgat, donec in suum vique omnia remaneat. Vbi si ægre succedat, obliuiscens opera id peragat, vt bacillo crassiori obulo lances inuolutio hoc faciat, quo & in sinum proiiciatur, quam solis inuolutio potest repelli. Aut vt minus ledatur, pellamur ex panno lineo laxis conuoluta, si quæ stricte ligato pareat, & huc vix accommodetur.

At si prolapsus vterus intumuerit, ita vterum denud subire non possit, tuatur ante quousque tollendus. Et si inflammatio sit, quæ huc latere contingit, erunt adhibenda, si alia militatio, quæ cum vterum, alia panga; si totum nimium infleuit, & inuolutio viciantibus & reuoluentis Rodericus à Castro turcico; vterum per decoctum ablut deinde aceto & sale lauidi in pectus, ac sic immutato tumore redact.

Idem Rodericus scribit, ad vteri repositionem plurimum conicere, si medicus vel Chirurgus cauterium aduale, aut aliud ferrum candens manu ostendat, & in vterum inserere velle fingat. Ita enim natura contrahitur, & cum ea vterus ipse, tum etiam quæcumque alia pars extra promens, reuertitur enim quædam exercitulationum, Chirurgum intelligit per vultus abdominis excentia, hac indutia repositio, se cum reliqua tuncquid non prohibent, Causam enim fermentum magni coram pateat manu gelans, vterum applicatumque de hinc. Cuius rei subro terrore intus e velliguo in suum locum reposita fuerit.

Amezoar, 2. Theor. str. & c. quæpiam oia ab simile proponit. In primis, inquit, quædam oportet hoc agere. Ad hoc cum leniter potest curare. Et reducat omnes ipsi modis, videlicet manu, si vix, si non, fac tam supinam facere, & fac quædam sedat super pelvis suam, & alius super crura, & fac cum terrore, ponendo circa pedes suos aliquæ reptilia, sicut sunt mures & lacerte, aut ranæ, vel las similes, ex quibus multum terroret, & veli fagere, trahendo pedes & crura ad se; & inde omnia membra & corpus totum simul contrahantur. Et hac de causa matrix intra redit ad suum locum.

Zacutus Lusitanus Amezoarem secutus, sequentem historiam referat. Sc. lib. 3. proponit. Cum, inquit, accedat rem ad feminam, quæ ab anno & dimidio statum prolapsum habebat, cum durissimum, difficile reducere ad locum suum posset ad suum locum reduci, maxime cum dicit aduenire, in principio hoc opus celebrandum esse, cum adhuc vixit, vix, contraxit calum. Adhuc alium præstidij pro hoc morbo vnde do machinam. Insuper adstringentia, persura, complicita, & cohesiones. Tandem laboribus iustis nihil proficere. Ad hoc præstidij accedo. Suppono mulierem cruribus muris, si aligares. Quibus postea & per femora vagantur.

bus, flamina metui ingens incurritur, & repens, (mirabilia vis)
veteris in propriam sedem reducitur. Hoc salis, emplastre con-
tra rupturam veteris regionis, & inq. inibus apposita, a malo sa-
pienter tuti a remediis.

Antequam vterus reponatur, prius inungendus est ma-
gagine rad. confolid. vcl infusione gummi tragacanthi. Pos-
tea aspergendi pulueres, qui asperitate nullam habeant, ne
vterum, aut illius ceruicem laedant, sed glutinandi magis,
quam astringendi vi possint. Qualis esse poterit in hunc
modum præcipuus.

℞. Thuris, malthæ, & sarcocollæ lacte moliebri nutritæ,
ana ʒ. j. mamiæ, gummi arabici, scaciæ, hypocistidis, ana
Drach. iij. Fiat pulvis tenuissimus, inpergendus vt dictum
est.

Idem pulvis ad formam vnguenti admoventi poterit, si
cum dictis mucilaginibus, aut oleo hypericonis, alioue con-
folidante permisceatur.

Postquam vterus conuenienter fuerit repositus, omni
atque in suo loco continendus est, muliere in lecto remanen-
te aliquantulum inclinata, & cruribus extendis mollior, &
ita coarctat, vt vtrum alteri incumbat. Ac per aliquot dies
in hoc statu maneat, immisso etiam lanæ, aut bombycis, vel
etiam spongæ frustulo in sinum vulvæ, quod irrigatum
fuerit vni aulero, aut aqua rosacea, in quibus acacia, aut
hypocistis dissoluta fuerit.

Ad huiusmodi retentionem iuuandam, cucurbitule sub
mammas, & umbilico cum multa flamma frequenter etunt
admoventur.

Tum etiam bene olentia naribus erunt admoventia, &
fœtida genitalibus subiicienda, nisi mulier hysterice susto-
cationis sit obnoxia.

• Foveantur dicitur partes decocto astringentium, ex vino
rubro, & aqua ferrata parato.

• Semicupium etiam ex eodem decocto, à Prædictis vsur-
patur. Quod tamen cautione indiget. Periculum enim est,
ne ex illo situ vterus denuo prooluatur extra suam sedem,
potissimum in principio, dum adhuc recens est affectus.
Vbi autem diutius ægrotant emittuntur, & eaque conue-
nienter subligaculo premantur fuerit, non parum conferre
potest.

Post semicupium suffragas etiam erit vtilissimus, ex thure,
malthæ, san darar, & rosæ rubris paratus. Alij verò cum
mediant, tanquam specificum, sũstinent ex pelle anguillæ
fale conditæ.

Iniectiones in vterum maleo efficacius operabuntur, in
remedijs quæ exterius admoventur: eaque componentur
ex decocto fœtus, semicupij.

Linenta & emplastra hic etiam conuenient, qualia in
fluvi mensium immo, & fluore albo fuisse descripta, &
infra etiam ad abortum præcauendum proponuntur.

Porò assumptis medicamentis astringentibus, & robo-
rantibus, vteri retentio etiam adiuuari potest. Et inter illa
pulvis sequens sæpe sumptus huic affectui peculiariter ac-
commodatur.

℞ Rad. zapi barbat. ʒ. iij. li. myrris sem. pãstiac. dome-
sticæ, an. ʒ. i. rasura cornu cerui ʒ. fem. cineris cochar. ʒ. i.
coralli rubri Drach. iij. Fiat pulvis. Dosis ʒ. i. cum vino aulero.

De astringentibus huius medicamentis tam internis,
quam externis, hoc obseruandum; caute esse vsurpanda, si
mensitrua flatus periodicis adhuc profusius ne supprimantur,
& grauiora usula inde oriantur. Tempus autem huiusmodi
remedij magis idonei est, vbi fluxus mensitruus præterit.

Illà remedia per duodecim, aut quodvis dies erunt
continuanda. Simulque cura est habenda, ne alius pignus
sit aut laxior. Si enim ferres duræ sint, vterus in eis egerendis
facile præcipitatur, & fluida nimium alius ligamenta vteri
relaxat.

Dum prædicta remedia vsurpantur, causæ antecedenti
occurrentium cibus quæ humores pituitosos, vteri liga-
menta relaxantes euacuari & discutere valent.

Ac primum purgationes conuenientes insinueri opor-
tet. Quæ tamen non lux perturbantes, & violenter operan-
tes, ne vterum de nouo præcipitent, adducti in eas assatim
partes humores.

Nonnulli vomitum probant, quod humorum fiat reuul-
sio ad superiora. Et eo nomine quidem esse proficuum, ni
alia ratioque esset metuenda. Quod nimirum usque non con-
tu periculis, & non minus quam iterum vterum pro-
pellat. Imò verò docuit experientia, nihil esse efficacius ad
paruum difficultem, & fortam citò excludendum, quam vo-
mitum exhibitum.

Post sufficientem purgationem, decoctum guaiaci per
tres hebdomadas exhibendum est, vt singulis diebus manè
sador eliciatur. Vt perit autem fons ino venter adhuc
ex salis, origano maiorana, thymo, masticaria, tanacetæ
abinsio, ruta, rosæ rubris, radicibus ʒperi, calamenti, nu-
eibus cupressi, & similibus, decoctis in aqua laborum, &
vino rubro. Post fons suffragas & linimenta suprà descripta
adhiberi poterant.

Loco ludorici, vel etiam post vsum illius thermae sul-
phureæ, quales sunt nostre Balericae, erunt præstantissi-
ma, rarumque vni multas consualisse compertum est.

Vt autem à procedenti, quæ facili iterum recurrit, ste-
mina secuta sit aut si nulla perfectæ curationis spes sit, sub-
ligaculum adhibendum, quod vulgo Zema Hæperrati no-
minatur. Hoc enim munite mulieres, sine prociplis pericu-
lo ambulare, & munis quotidiana exercere possunt, vterus
ab externo frigore defenditur. Parantur autem ad
eum ierè modum, quod falcia ad herniam parari solent.

Peculiar quoque in deploratis veteri prædictis vtilissi-
ma sunt, quæ à noualis componuntur ex subere fabis ob-
longo, & cera superinducta. Alii ex sola cera conficiunt, &
ex his nonnulli forma rotunda, alij ovali, quadrata, trian-
gulari, aiaue forma, quæ in ipsam vteri cavitatem inducuntur,
& nunquam eximuntur, atque vterum in suo loco reti-
nerit tamen vt mulieres omnia vtrum consueu exercit,
cum viti sine incommodo coeant, concipiant, vtero gerat,
& pariat. Quod pluribus exemplis confirmatur à Francisco
Rosseto de partu Casaro, & cap. 5. & Bauhino in appen-
dice ad Roesum. Quæ omnia ad verbum transcrita sunt
à Schenkeo & Sennero, capitibus propriis, vbi videri pos-
sunt.

CAPVT XIV.

De vteri clausura.

Virgines vteri clausura laborantes atrete, seu imperio-
razæ nominantur. Illa autem clausura in tribus locis
fieri solet, scilicet in osculo vteri interno, in eiusdem cerui-
cæ, & in osculo anteriori, quod vulua nominatur. Genera-
tur verò aut à prima conformatione, quando membrana
quandam vteri orificio, aut ceruicæ obtenditur; vel vul-
nere, aut vlcere præcedente, quibus coalescentibus, sit
partium ceruicis vteri, aut laborum coactis; vel à tumo-
ribus meatum interiore obturantibus. Vel denique à
compressione, strictione, aut distorsione, quæ pudendi vitilis
& seminis ingressum, tum etiam mensitruam purgationem
præpedire solent.

Diagnosis ex parte facilis est, ex parte verò difficilis. Si
clausura sit in externo orificio pudendi, sensibus ipsis di-
gnoscitur. Si verò sit in ceruicæ, aut orificio vteri, non ani-
maduertitur, nisi dum mensitrua erumpere incipiunt, aut
femine generationis operi incumbunt. A ducente nimirum
mensitruæ purgationis tempore, dolores & tormina in
regione vteri certis periodis sentiuntur, cum pondus sen-
sibus tamen sequitur mensium effluxus. Coniecturam
augebit, si virgo bene habita sit, nullaque cachexia, aut ob-
structionibus affecta. Perfluente affectu intumescit vterus,
vt virgines grauidæ videantur, & interdum totum cor-
pus, quod etiam luore quodam, ex redundantia sanguinis,
inflectum apparet. Si verò clausura ceruicem vteri occupet,
in primis coribus dignoscitur, quando scilicet pudendum,
virile non admittit.

Si denique orificium vteri clausum sit, difficile cognoscitur;
ad tamen peritæ obsteritici manu aliquo modo, et plo-
rari potest, illiusque coniecturam faciet si semen virile post
cicatulationem statim egrediatur.

Quod ad prognosim attinet. Si clausura sit in orificio

pudendi, curatio facilis est, & leui sectione resoluitur. Si verò peniores partes occupet, longè difficilior curatio nem admihi.

Quando à membrana meatus clauduntur, facilius curatur, quando verò à materia carnea sit coactus, ut post vicia contingit, curatio est difficilior.

Claustra interius vteri orificium occupans incurabilis est, chirurgica enim infl: uterica illic aptari nequeunt.

Curatio vteri claustra cum à Ch. rurgis maxima ex parte peccatur, adeo tam paucis expeditur.

Si à primo ortu claustra vteri contracta fuerit, simplici sectione aperienda est. Cuius modus ampla narratione describitur à Sennerio cap. proprio.

Si verò ex vixere claustra ortum duxerit, ut in lue venerea contingit, acutius tendum est, an sit tantum carnis excrescentia, meatum non omnino claudens, si integer parietum ceruicis, aut laiorum coactus. Si enim caro tantum excreuerit, tenuisculo est, præ multis excruciationibus contentibus, præ multis carnis augmentum prohibet, sicantibus, & medicamentis medicamentis, ut polium, modum carni eandem, immensum medicamentis ex thure, anilothia, cortice thuris, rosas balsamum palmaticum, myrrha, aloë, & similibus, quæ si non sufficiunt, ad carnem abluenda iunius doliorum transfundendum est, ut alumen, vitium, vnguentum Aegyptiacum, & similia. Ac tandem si hoc quidem hoc modo consumptio obtinere possit, ut in gyrum præcedenda instrumenta, quoque polypii tollantur. Si verò ceruix vteri omnino coacta sit, uterumque est viciu, quare, & medicamentis prædictis carnem superuacua solvere. Sin minus, etiam inflantia elixir proliis modoque naturalis ceruicis vteri coactus curatur.

Si à tumore aliquo meatus vteri occultatur, propria remedia illi decernenda sunt, quæ in vteri inflammatione, scirrhus, & cancro luere propitia.

Si fiat a compressione ceruicis vteri, vel oculi illius interioris, causa a compressione autem, quæ variæ esse potest, namque calidus viciu, minor recti intestini, omentum pinguis, crassa, aut lemora distorta, ac diuicata, quorum curationes à luis locis repetende.

In fluitura, quæ potissimum fit à duritie, vel siccitate, agendum est, huiusmodi, ut in omentibus, & lauantibus, semicupis, lotibus, linimentis, & petariis: sicque relaxata parte, immittatur cannula plumbea, vel ex cere alba optimè concinna, & butyro, aut oleo enollente irrigata, quam perpetuo gedit, vel latere noctu dum decumbat, & interdum immittat pulvis ex cotone conuenienter constructus, & munctus vnguento de alba, vel simili.

In distorsione eadem rem curandi methodus obseruanda est, cannula ita fit conformata, ut in contrarium partem distorsionis moueri delectat: sique vteri ceruix ad locum debitum paulatim reducitur.

CAPVT XV.

De Sterilitate.

Sterilitatis nomen non adeo itèrta significatione in hoc loco usurpatur, ut tantum omnimodum concipiendi defectum, & integram ab omni homine signis, sed in ampla & lata, ut omnem concipiendi impotentiam, omneque impedimentum comprehendat. Quando nimirum mulier ea ætate, quæ ad concipiendum habilis esse debet, & viri consuetudine vterum non concipit: & talis d. lectus a sterili seu a sterili a nominatur.

Hæc autem sterilitas, seu concipiendi impotentia à pluribus causis excitatur, quas omnes à prioribus doctrinæ gratia, ad quatuor capita reuocare possumus, iuxta quatuor operationes naturales, quæ ad conceptionem pertinebant requiruntur. Quarum prima est, ut mulier in congressu venereo virile semen conuenienter in vtero recipiat, secunda, ut semen receptum debito tempore retineat, tertia, ut illud in vtero leuaret, & conferuet; quarta, ut debitam materiam suppediet ad embryonis conformationem, & incrementum necessarium. Hinc quatuor conceptionis impedimenta oriuntur, nempe mulier semen non recipiat, non retinet, non conferuet, & non nutriet.

Receptio seminis impeditur à pluribus causis, ex rebus naturalibus, non naturalibus, & præternaturalibus repetitis. Inter res naturales primam recentior ætas iuuentula, in qua ob exiguitatem, & strictum partium genitalium, mulier virile pudendum admittere non potest, aut certe nisi cum summo dolore, qui tam concubitu auriæ cogat. Eandem aliectionem prælat ætas procreantia, quæ in virginitate senioribus partem gentales defectu exercitii venere, marcidæ, ac vix facile iustas sit idones reddere, ut potest virilem facile pollinodum admittere non possint. Quæque etiam nauia clauduntur, distoritur, vix de prelia coagge et illunt, vix possunt commodè in concubitu figuram præstare, quæ adueniens debitam receptionem necessaria est. His addit pinguedinem nimiam, quæ vias vteri angulatis, & aquilaculo prominentiore, iustis & commodum viri cum semine congressum impedit. Ac denique temperis vteri frigido, torpidas mulieres reddit, ut nulla propemodum voluptate in coitu fruantur, aut tardius saltem excitentur, ut internum vteri orificium tempestiue non aperiat ad semen virile recipiendum.

Inter res non naturales animi pathemata principem locum obtinent, ac primus admodum inter coniuges, quo mulier ab humilimo voluptate avertit, non suppetat spiritus sufficientes, quibus turgere debent genitalia tempore congressus, ut matris quasi effluens semini virili occurrat, quod beneigne excipiat, atque tractet in cautem suam, simulque proprio semine in ea voluptate effuso perfundat, & irriget, atque ex ambobus coniunctione conceptioni oriat.

Res verò præternaturales, quæ seminis receptionem impedire possunt, in morbois disputantibus versantur, quæ partibus genitalibus, aut illis viciis aduenire solent, ut tumores, vicia, obstructions, alii quædam, claustra, distorções, calculus vesicæ, & alia huiusmodi.

Secundum mulierum vterum conceptionem impediens, quædo scilicet semini non retinetur, vel à nimia vteri humiditate dependet, quando scilicet vterus multis excrementis humoribus repletus est, à quibus laxior factus non debet, & stringitur ad semen rectum, cum excipere tendendum, vel orificium illius laxius redditum, non potest se se sufficienter consistere ad semen retinendum, quod precipue contingit ex abortu, vel partu laborioso, in quo hæc vteri diuidentur, & nimirum latet, aut cum orificio interno. Illa autem humiditas immo diuina a proprio temperamento, & a causis externis humidioribus, ut balneo, otio, viciu humidioris, vel præcipue a fluore alio excitati, potest, quæ quidem fluore albus, siue fluore muliebri frequentissime accidit, cum vterus sit veluti cloaca, ad quam omnes corporis partes suas superfluitates deponunt, ita ut hæc omnium frequentissima, & magis ordinaria sterilitatis causa est soleat.

Tertia verò causa conceptionem impediens, quando nimirum semen non nutritur sufficienter in vtero, ab his dependet, quæ semen corrumpere apta sunt, ut interperies vteri quælibet, frigida nimirum quæ semen extinguit, calida quæ spiritus dilapidat, humida quæ debitam feminis crassitatem diuit, & sicca quæ semen absumit, atque ita semen ab humilimo interperiebus corruptum, à naturali sua constitutione deiecit, conceptioni ineptum efficitur. His addit autem maleficia, & incantationes, à quibus conceptionem impediri posse apud omnes in consensu est. Res etiam externæ, & alimenta, & vena idem præstare possunt, quæ ab autoribus recentiorum tempore inter alimenta, acutissima, menter, sibi mium aquaticum, fabæ, & similia, inter vena verò, aut saltem delectaria, quandam qualitatem, à sterilitate inducendam obtinentia, lapis gagates, volua capiæ, aut mola, mola, sapphirus, imargus, & similia. Ac denique morbi maligni, & iabe quadam venefici inquam materiam maxime corrumpere, ac generatoni ineptum reddere valent, ut phthisis, elephantiasis, lues venerea, vicia letida, & cancro.

Quarta denique sterilitatis causa, quando scilicet femina debitam materiam non suppetat, ad embryonis conformationem, & incrementum, ex semine aut sanguinis mactru defectu dependet, si nimis iuuentula, & vetule non concipiunt, propter vterus materiam defectum. Aetas autem conceptioni idonea vulgo designatur à 1. anno ad 30. imò verò licet

licet mater illa non deficiat, si dispositiones praeas adepta sint, generationis incapaces sunt. Praea autem illae dispositiones a variis interperiebus, aliisque morbis induci possunt. cum etiam ex prava vietus ratione illudabilem sanguinem producant. Si femina multis fructibus crudis & aqvis frigide potu se infingant, ferolum sanguinem cumulant, generationis ineptum. Fateri autem oportet nonnullas mulieres conceptu quibus nunquam menses esse viderant, vt ex plurimorum aurorum oblationibus colligit. Verum dicendum est, quod si in illis mulieribus materia defuerit, ad menstruas purgationes efficiendas, non desuit tamen ad conceptionem tanta illius copia colligebatur, quanta superesse solet mulieribus, quae purgantur, licet non sufficeret ad emensuras purgationes.

Causa haecenis proposita adiungi debet certa seminum, virilis, & feminei improprio, qua fit vt recte inuicem commisceri, & in vnam embryonis generationem conipar nequeant: licet in neutro coniugum aliquis defectus sensibilibus non appareat. Et contingit interduas, vt idem vit cum alia muliere, & eadem mulier cum alio viro proles suscipiat, cum tamen simul iuncti tales permanserint. Fit etiam vt mulier per decem aut plures annos viro cohabit, & non concipiat postea vero concipere, & parere incipiat: cuius eventus causa est mutatio tempera urz, aut progressu aetatis fit, ob quam lenem aliam temperiem recipit, quae cum antea feminis virilis temperatura improprio nata esset, per aetatis mutationem proportionata euasit. Illa autem improprio in eo praecipue versatur, quando viri valde imtemperati, cum mulieribus eodem imtemperatae excessu laborantibus coniunguntur, puta calidiores viri cum feminis calidioribus, frigidiores cum frigidioribus; illa enim imtemperamenta nullam in discordantiam conciliant, possunt duobus feminibus, & alijs causis ad generationem necessarias. Quidam etiam ad qualitates occultas confingunt, ob quas lemina conuenire, ut discrepare aliterunt, etiam nisi nullus primarium qualitatum excessus appareat.

His etiam addunt aurores occultam quandam dispositionem, qua nonnullae mulieres steriles redduntur, licet nulla causa manifeste appareat.

Signa diagnostica sterilitatis, iuxta quatuor propositas causarum classes percurrere sunt.

Ac primum causa feminis receptionem impediens difficilis non habet diagnosis, & ipsa sensibus conspicua sunt. Facile enim dignoscitur aetas tenior, aut procreandi mala partum vteri vicinam conformatio, vt quando mulieres claudae sunt, vel crura distorta, aut depressam coccygem habent, & pinguendo nimia. Frigiditas vero vteri in terra causarum classe indagabitur. Odium inter coniuges, ex eorum, & aditantiu relatu innotescit. Morbi etiam particulares feminis receptionem impediens, vt tumores vlcera, obstructions, altitudines, clausurae, distensiones, partium genitalium exploratio ab obstruente, vel chinetur, gignit innotescit.

Ex causis feminis retentionem impediens, quae secundum classem constituent, humiditas nimia in tertia classe est ponetur; abortus vero & partus laboriosus & mulieris relatu dependet.

Tertiae classis causa, quae scilicet semen corrumpere valent, accuratioris requiritur diagnosis, quam nos in hunc modum persequimur.

Frigida vteri imtemperies inde dignoscitur, quod femina coitum non appetit: minorque in eo voluntate afficitur; facies illi mollis albens, & obliqua est, stupido sensu praedita est circa pectus humilior, & crurum: crudum ac tenue semen excremit, & cum exigua voluptate, menses supprimuntur, vel parce atque modeste procedunt, siveque pallidi ac decolorati. His accedit praegrassa vietus ratio reijetans, in fructum & oleum visu diuturno, & largo frigore poru constitans.

Humido autem vteri imtemperiam argunt, luxu femina habens, & mollis; vita ledentaria; illiores albi frequentes, ac ferme assidui, menses copiosi, tenues, & aquosissimi inappetentia. lumborum grauitas, & ab ortu procliuas, vrinis copiosis, & vietus ratio humidior.

Calida imtemperies cognoscitur ex habitu virili ac robu-

sto, qualis in viraginitibus existit; facie rubicunda pilis ac fupercilijs nigris; voce forti, ac virili; his addatur iracundia frequens, ad omnes adiones promptitudo nimia, sitis inextincta; vrina laua; menstruum paucitas, color ruber, obcurus, calor & acrimonia, vt saepe pendenda existerent; pruritus genitalium, magna ad venerem productus; prompta & celer feminis excretio in coitu; pollutionis frequentes, ac libidinis infomina.

Siccam vero vteri imtemperiam significant; mensem paucitatem, oris vteri siccitatem, pruritus & illure quae rhagades nominantur; pauca in coitu feminis excretio; ex animo coitu molestia; corporis gracilitas.

Si ex maleficio feminis corruptela, & sterilitas contingat, aberrant omnia illa signa, quae causas manifestas indicare possunt; aderit autem aliquid dyortium inter coniuges, cuius neuter rationem satis apposite reddere potest; imò & interdum seminis vtriusque esculatio, raro, difficulter & cum labore fit.

Alimenta aut venena semen extinguere si assumpta fuerint, ex diligenti mulierum interrogatio, & altissima relatu perdiscendum est.

Ac denique morbi maligni semen extinguere valentes vt elephantiasis, lues venerea, aliique proprijs signis innotescunt.

Quarta sterilitatis causa, quae in menstrui sanguinis defectu, aut prava qualitate praecipue consistit, dignoscitur primo ex nimia totius corporis pinguedine, ad cuius nutritionem sanguis abundat, & foetus alendo non sufficit. Idem ostendit corporis gracilitas, & summa macies. Cum enim sanguis non sufficit ad corporis nutritionem, vix superesse potest ad foetus incrementum.

Ac denique ea omnia quae sanguinem abundare, & multum immutare possunt, si praecederint, vel asseuerent eundem penitus in corpore significant; vt labores immensi; vigiliae immodicae, ieiunia austeria, larga haemorrhagia; febres acutae, vel diuturnae, vlcera fistulosa, & caetera multum fluentia.

Nimiam etiam sanguinis quantitatem interdum feminis, atque embryonis nutritionem impedit; obstruit enim semen nimia illa copia & vim suam placitam exercere non potest. Hoc contingere solet in mulieribus pletoricis, ac rubundioribus, genio & crapulae indulgentibus, quibus vterus perpetuo quasi madore proluitur.

Praua vero sanguinis qualitas, seu cacochymia ex prauo mulieris habitu, mentitruorum colore, alijsque conditionibus alienis, & praua vietus ratione praegrassa, innotescit.

Semen vtriusque coniugis improprio difficulte cognoscitur. Si tamen ambo calidiori admodum, aut frigidiori temperamento praediti sint, ex illa imtemperie improprio proportionem prouenire conijcimus, si aliae sterilitatis causae manifestae non appareant.

Difficilis adhuc cognoscitur sterilitas, quae ab occultis quadam dispositione dependet, nullis illius causis manifestis apparentibus. Apud aurores tamen multa reperiuntur experimenta, quibus interuolui posuit, an mulier a natua constitutio sterilis sit. Quae licet omni modum certitudinem non habeant, coguntur tamen interdum Medici ea in viam truoare, in gratiam principum, & magnatum, quibus licet sterilitatis causa dyortium facere.

Hippocrates Aphorism. 59. sect. 5. Si mulier, inquit, non conceperit, scire autem velis an conceperit a se, panis circumiectum inferre sufficit. Et si odor videretur per corpus ut ad nates & os, scire quod ipsa ex seipsa si vili non est.

Idem Hippocrates foetum secundum dignoscitur putat, si caput ali deralum & purgatum in vterum lubdatur. Si postmodum odor ad os perueniat, eam ad conceptionem aptam: sin minus, ineptam esse.

Vel galbanum ad ignem emollitum, sericoque inclusum, mulieribus vteri orificio nocte indito, caput; totum limbo odorato obligato: mane si vertex mulieris galbanum, redolet, mulier probe purgata, & secunda erit.

Idem experientia, si parum ballami aquae admixtum, & bombace exceptum in vterum immittas, & femori alligaueris: quod si tunc vterus traxerit, fecunditatis est probatissimum signum.

Amarus Luficanus, fequens, vt probaciffimum laudat. Capiat coagulū leporis 3-ij. quam aqua calida diffolutam. mulieri in aqua calida exiftenti acuto ventriculo propinat. Si muliere tuus dolores ventris fentit, fecundam; fin minus, fterilem illam pronuntiat.

Multa quoque ex vrina fertilitatem colligere volentes eam hordæo abundat. Hoc intra decimum diem ſi germinet, pro fecunditatis nota; ſi non germinet, pro ſterilitatis certo argumento agnoscunt.

Alii denique ſiſiqui, vel ſurturi vrinam affundentes, ſterilitatis notam ex eo obſervant, ſi vermes in eo generati videant.

Pro huius diagnoſis coronide aduertendum eſt, ac diligenter inquirendam, nam viri culpa aut defectu generatio impeditur. Fruſtra enim mulier multorum remediorum viſu torquetur. Sterilitas a viro procedens dignoſcitur ex morbis partes genitales illius obſidentibus, vt erectione laſa, ſeminis defectu, teſticulorum tumoribus, gonorrhæa aliſque. Huius etiā rei coniecturam faciēti vir timidus exterritus, & efſeminatus, frigidus natura ſit, & barba careat, tardè ſemen excremat, idque ſiigidum habeat; quod tale ab vxore excretionis tempore in vtero ſentiat, nullam, aut exiguam habere coitus appetentiam, & quam minimam in eo percipiat voluptatem. Ac denique ſi cauſe præceſſerint, quæ ſemen infecundum reddere valeant.

Prognofis iuxta cauſarum ſuprà enumeratarum ſeriem inſtituendum eſt.

Ac primum ætas tenerior conceptionem non impedit, niſi ad tempus, & illa ætate aduoluit expectanda eſt. Ætas vetò præcedit omnimodam conceptionis deſperationem inducit. Si tamē adhuc menſtrua procedant ordinatè periodicè, quodam ſuperſeſſe poteſt conceptionis ſpes, ſed ætatem exigua, in his mulieribus in primis quæ quadrageſimum ætatis annum exſeſſerunt; qua licet mulieres quæ iuniores pepererunt, in ea etiam ætate concipere ſoleant; illæ tamē quæ nunquam grauidæ fuerunt, & æguam ſpem habere debent, in ea ætate concipiendū, quia, veteris tamdiu otioſas, ni arcidus ac vietus factus eſt, & ad concipiendum inhabilis.

Quæ a praua membrorum conformatione ſterilitas inducitur, vt in iſis quæ clauda fluore crura diſtorta habent vel cœcym depreſſam, incurabilis eſt.

Si vero à nimia pinguedine, aut aliqua vteri intemperie non admodum inueterata, ſterilitas procedat, curatio ſpecificabilis eſt, maciem inducēdo, & intemperiem corrigēdo.

Illæ verò quæ ab aliis morbis inducitur, vt tumore, vicerè, obſtructione, fluore albo, menſtrui defectu, vteri prolapſu, phthiſi, elephantiaſi, vix venerea, aliſque, curatio facilior, aut diſciliior eſt, prout dicti morbi faciliē, aut diſciliē curationem admittunt.

Ad curationem huius affictus quatuorquæ ex cauſis prædictis cum producere valent; earum remotioni incumbendum eſt.

Ac primum anguſtia partium genitalium ob ætatem, iuuenſculam curatione non indiget; ſiquidem ætatis progreſſu ad conuenientem ampliandū reducitur. Interim tamen coitus abſtinentia eſt neceſſaria, ab illo enim præparatio partes illæ a naturali conſtitutione deſcunt.

Quæ verò à parua ſtatura, aut ætate proiectione procedit, incurabilis eſt; tentari tamen poteſt emollientibus, & relaxantibus medicamentis adhibitis, ſi adhuc menſtrui purgationes profluant.

Nimiam obeliſtas extenuante viſitatione, & conuenientibus euacuationibus corrigenda.

Si ex praua viſu ratione ſterilitas dependere videatur, vt in guloſis, chloroſis, aut hydroſis, ad exactam viuendi normam huiusmodi mulieres reducendæ ſunt; omniſque neceſſas tum cibi, tum potus, penitus circumſciendæ.

Viragines, & robuſtiſſimæ mulieres ad naturam virorum quodammodo accedentes, vt reddantur apæz generationis efficiendæ ſunt omni artificio, & ad mores ſexui congruos eſtormandæ, interdiciſ omnes aduſus craſſioris ſucci, laborioſi, & exercitioribus, ac procuratio conuenienti menſtrui fluxu, vt illius immoſcitate copia,

emeruerit ac molleſcant. Tum ſi menſtrui fluxus ad id non ſufficiat, frequenti purgatione, ac venæ ſectiōe, immiſcantur humores, & balneis ſæpius iteratis, aliſque alterantibus rotas habitus humidior & frigidiior reddatur.

Si ab vteri clauſura, diſtortione, obſtructionibus, tumoribus, aut viceribus ſterilitas producta fuerit; illis prouidendum eſt remedijs in eorum curationibus propoſitis.

Quæ ab occulta quadam diſpoſitione, & eaque nativè dependet, incurabilis eſt; eaque ſedulo exploranda, ne ſuſcepta remedia viſperant.

Si à maleſicia, aut incantatione, aut occulta pharmaco-rum vi, ſterilitas inducitur, perexiguus eſt medicinæ locus; ſed ad preces, atque orationes conſugiendum eſt, quæ à viſu pietatis præitantibus ardenti animo ſuæ, diuinum auxilium eliciunt.

Aduerſus tamen pharmacā, occulta vi ſterilitatem inducentia, nonnulla proponuntur ab Autoribus amulera, quæ proprietate quadam malignæ huic qualiſque aduerſantur. Vade voluit Cardanus, priapum lupi geſtatum omnes illas ſalcinationes diſſoluere. Alij valde commendat adamantem, & hyacinthum. Antiqui hypericum vocabant iugam demonum. Eadem viſitiam tribuitur ſcille, eryngio, curæ, ſagapeno, ab vtroque coniuge geſtatis. Deinde huic negotio plurimum conducere certum eſt, vt huiusmodi ſalcinationi conſentiens animo illa conetur maleſicia & incantationes alpernari. Tum (ſi auctor maleſicia ignoretur) vt locorum mutatione, domos, cubilia, velles, & ſupplectilem relinquunt, in quibus viſa veneficia, & ſalcinatoria ſæpe abſconditur.

Si calidior intemperies ſterilitatis cauſa fuerit; eadem, curatio adhabenda eſt, quæ in calida iccoris intemperie ſuit propoſita. Quod ſi maior fuerit caliditatis exceſſus, ad ea erit recurrendum, quæ pro ſurore vterino fuerit deſcripta. In quibus tamen remedijs caprura non admittenda eſt, quæ ſecunditatis plurimum nocere creditur.

Siccitas immoſca conceptionem impediens curabitur victu analeptico; & ſi maior ſit conſumpſio, ad curam heſticorum erit recurrenda, videſcet lactis vium, balneum, frequens, & ſimilia.

Ar verò omniur frequentiſſima ſterilitatis cauſa eſt, frigida, & humida intemperies totius corporis, & vteri, quam fluores albi ſæpiſſimè comitantur, eorumque curatio ſpecialis ex proprio capite delumenda. Peculiariter verò dictis intemperibus ſequētia adhibebuntur remedia, quæ à prudenti Medico variari poterunt, ita vt magis vel caleſcant, vt exiſcant, prout vel ſtigiditas, vel humiditas magis in vtro fuerit.

Ac primum humores puriores in corpore reſtagnantes, euacuandi ſunt purgantibus medicamentis, diureticis, & ſudorificis. Nec non reuulſioſes quadam intrinſecus ſunt cauterijs brachijs, ceruici, aut cruribus adhibiti. Tum partes principes roborande theriacæ miſchridatio, tabellis aromaticis roſati, confectione alkerkes, & ſimilibus. Nec non purgationes per interualla repetendæ, ſi cœcophyma redundare videatur.

Postmodum ad ea veniendum eſt, quæ proprietate ſpecifica vterum roborare conceptionem adiuuare, & veneri ſimulacra addere nata ſunt; quorum innumera apud Auctores deſcribuntur formula. Nos præcipua hæc ſelegerunt.

Ac primum opiata in hunc modum componi poterit. \mathfrak{R} . Rad. eryngij, & ſatyrii, nucem macchæ, ſaccharo condit. ana 3-ij. zinziberis vinydis conditi 3-ij. auellana. nucleor. puni, piſſiacor. an. 3-iv. nucem molchat. ſaccharo condit. num. 4. ſem. crucæ, & nallituri, an. 3-4. cineris priapi tauri renum ſcancor. & ſaturæ ebotis, an. 3-4. conſect. alkerkes 3-ij. diambæ, & diamoſchi condit. ana 3-ij. ambræ geſt. 3-6. Cum ſyrupo conditur cort. citri, ſiat opiata, de qua capiat ad ſequitatem vini caljanæ in introitu lecti, bis aut ter in ſeptimana, ſuperbibendo vini generoſi, vel Hippopotati puri.

In forma pulueris ſequētia exhiberi poterunt. \mathfrak{R} . Sem. crucæ, ſilicis montani, an. 3-6. ſaturæ ebotis, cin. nucis molchat. an. 3-4. mochi (mijis quæ ferre cum poſſunt) gr. iij. ſantal. albi 3-ij. Miſce, ſiat pulvis, detur 3-4. ex vino generoſo. Vel

maſtiche ſ.ii. gummi tacaſaacha. & caragæg. an.ſ. i. pul. rad. tormentil. & biſſorez. 4n. ſ.iii. pulueris myrtill. 3.ii. pulu. aromat. roſat. 3.ii. Malaxentur cum ol. cydonior ad mixta 3.ſolueris moſch. Extenduntur ſuper alutach. & lormentur duo empliaſtri: quorum vnum fit torandum poſtmodum alimouendum: alterum quadratum, lumbis applicandū.

CAPVT XVI.

De morbis acutis & chronicis prægnantium.

Morbi acuti, & chronici prægnantium non aliam habent eſſentiam, aliamque diſpoſitionem, ac dum non prægnantes, aut etiam viros obſiderit, ſicque hic peculiariter eorum Theoriam proponere non opus eſt: ſed illa ex propriis capitulis repetenda.

Prognosis verò illorum morborum eadem non eſt, quæ doquendum in grauidis longe periculoſiores ſunt, & ſæpiſſime lethales. Sic apud Hipp. *Aph. 3. t. ſ. 5. Grauidam mulierem morbo acuto terrore, permiſſum.* Sine enim cum febre morbus ſit, duplex impendit a morbo periculum, vt docuit Gal. in *comm. huius Aph.* vnum à febre ipſa ſecum perimente, alterum à victu tenui, qui ad morbi acuti curationem neceſſarius eſt, ſæui autem alendo non ſufficit. Siue autem ſine febre acutus morbus fuerit, vt epileſia, apoplexia, tetanus, morbi magnitudinem, ac vehementiam mulier & ſæctus teſſere nequeunt, neque vehementia re. media, quæ ad illorum morborum curationem requiruntur, ſerre poſſunt. Sciendum tamen eſt, illam prognosim non eſſe perpetuè variatam. Multas enim mulieres morbis acutis laborantes euadere. tum auctorem reſtituimus, & exemplis tum quotidiana experientia nocum eſt.

Chronicis verò morbis, vt febres intermitientes, catarrhi, tenſiones, alique, abortus periculum minantur: & ſi eum non inferant, vix ante partum curari poſſunt, ſed viſque ad tempus illius periculaſent.

Morbi acuti, & chronici in primis, & vltimis geſtationis menſibus periculoſiores ſunt, quam in medijs. In primis enim menſibus vincula quibus ſæctus vtero alligatur, ſunt imbecilliora, vt facilius diuellantur, & ſæctus renouet à cauſis illis præter æturalibus iaculis opprimitur. In poſtremis vero menſibus, ſæctus nimirum ſextimo, & octauo, ſæctus grauior mal. di indiget alimento: quia in morbis prædictis deſtituit. Adde quod prædicta ligamenta non ita firmiter hærent, quædammodum in tertio, quarto, & quinto menſe, in quibus minus eſt periculum abortus. Ideo Gal ſæctum in vtero egrege comparat fructibus ab arbore pendicibus, qui in ortus ſui principio tenerrime habent pediculos, vt facile à vento aut quauis alia commotione violenta excuti poſſint: dum verò ad maturitatem accedunt, minus ſimmiter habent, quam in medijs tem. poribus.

Curatio etiam prædictorum affectionum in prægnantibus ſatis inſignem habet diſcrepantiam circa dietam, & magna remedia, vnde ſectionem ſcilicet & purgationem, quibus addi poſſunt medicamenta per alius vias euacuanti, tumidum menſes monentia, diuretica, & luſtorica quia metus eſt, ne ab huiſmodi euacuacionibus abortus concitetur. De his ego tantum hic agere continemus, reliqua ad peculiarium cuiuſque morbi capita reuertentes.

Quod ad dietam ſpectat. Illa in morbis acutis non adeo tenuis imperanda eſt prægnantibus mulieribus, ne ſæctus geno ſuo fraudetur: neque tamen adeo liberalis concedenda, vt ea febris promoueatur, ſed media quadam via incedendum eſt, eſe ſatis cautione adhibita, vt in primis geſtationis menſibus tenior viſcus miſcatur, in poſtremis vero paulo craſſior, & copioſior, quia ſæctus eo tempore maior indiget alimento. Si tamen in ea dicta aliquid peccandi ſit, ſæctus eſt ad paulo pleniorum victum accedere, quam prius exquiſitum, ex matris enim, & ſæctus viribus præcipue ſolus ſperanda eſt.

Circa venæ ſectionem, ſtatim opponitur Aphoriſmus Hipp. 3. t. ſ. 5. *Adulæ vtero gerens ſanguine ex vena miſſo abortit, & præcipue ſi ſæctus ſit grauidus.* Et ratio redditur à Galeno in comment. quia ſanguine detracto ſæctus ſuo fraudatur alimento, vnde abortus conſequitur. Ex altera verò

parte in pluribus prægnantium morbis, præcipue vero acutis, vt plicaride, peripneumonia, febre continua, & ſimilibus, phlebotomia eſſe neceſſariam & poſſe admiſtrari, non ſolum prius, ſed etiam medijs, anno & interduca poſtremis grauiditatis menſibus, vix quocundam oſtenditur, eaque omnia, tum mater, tum ſæctus in ſumum vix diſcrimen concutit. Ex huius poſteriori ſententia ſenioris Medici ſuffragant, neque ab Hippocratis, & Galeni mente diſſentiant. Ea enim tantum de cauſa mulierem grauidam ſæcta venâ abortire voluerunt, quia extractio ſanguine ſubtrahatur alimentum ſæcti. Si igitur talis venæ ſectio dari poteſt, qua ſæctus alimentum non ſubtrahatur, nullum ex ea inuinebit abortus periculum. Tals autem datur primum in prædictis geſtationis menſibus, dum ſæctus eſt minor, & minori alimenti copia indiget: tunc enim ipſi alimentum non ſubtrahitur, præſertim ſi quidam plethoræ indicia apparuerint. Sicque à primo meſe vique ad quintum venæ ſectio tuto admiſtrari poterit. In medijs verò, & poſtremis menſibus, maior circumpreſione opus eſt, quia ſæctus maior, maiorique egens alimentum, non ita tuto phlebotomia ſerre poteſt. Atamen ſi mulier ſanguine abundet, & copioſa admodum non fiat, venæ ſectio, tuto poteſt miſtri ſanguis, quia hinc ſubtrahitur morbus, nec tantum alimentum ſæcti ſubtrahetur, vt hinc mulier abortum incurrat. Si autem aliter videat ſæctus Hippocratis, animaduertatur quod modo longe dictio, non venam ſecamus, ac antiqui faciebant, qui ad libras non vltra ad vncias mittimus. Inno vero ad prædictas mulieres ab abortu, nullum eſt præſtantius remedium, quando ſi contingit ex nimia ſanguinis copia ſæctum obreueſcere & fulſocare, in ſormentis, quæ extra grauiditatem menſibus temporibus copioſe cum per plures dies expurgant. Sic Petrus Salus Diuerſus lib. de morbis particularibus cap. 23. Teſtor ego, inquit, me plurimas ab abortu in quem frequenter incidunt, ex ſola ſanguinis miſſione primo menſis ſaſſa, præſeruiſſe. Non ita tamen conſeſſenda eſt de hac ſanguinis miſſione, vel moderata, vel parua in vtero ger. ſæctis adulæ, ſeruant, vi tamquam non veniat ſæctus in vtero, ſi e. p. poſſe ſi. Interdum etiam in vltimo menſe ex ſola ſanguinis miſſione ſaſſa, non ſeruentum ad ſæctum inuacuum. Et ego aliquando hanc venæ ſectionem copie ſaſſam in vltimo menſe, poſt ſæctum partus tempore, dum vtero gerentes aculeis conſiſtenter febre, plurimæque abundantæ ſanguine, tentant, & hinc remiſſionem febris, ac parua acceleracionem ſperant, utramque ex ſanguinis miſſione conſequi poſſimus. a. c. u. u. ſi ſaſſa admiſtrari, ſeruent, & matrem vna pe. ſcientiam, ex hoc ſolo remedio ſaluam. Quod remedium in aliquibus præmiſſum, & à Medico verba ſolum Hippocratis, & non ipſam rem ponderantibus, neglectum ſuit in cauſa, vt e. acceptis ſæpti vna cum matre, & aliter vnde & ſeruant ſanguinis ſufficiens, miſer abſoluit perierit. Hæc Salus Amatus Luſitanus curat. 57. ſ. 1. mulieri annos octodecim natæ, lunetrem vterum gerebat, & cauſe laboranti, quæret vnam aperuit cum ſæcti ſuccellu. Et Rod. à Castro lib. 3. de morbis mulierum, cap. 1. ſcribit, te mulieri Viſſipouenſi in octauo menſe plicaride corpore, & ab alio Medici pro depiorata reſcitæ, quæret etiam ſanguinem miſſiſſe, eaque conſiſtente, ac hinc laum pepellit. Ac denique nobis aliquid ex proprijs experientijs depreme te liceat, ſequentes hiſtorias, quæ inſignis eſt, & notata digniſſima, hic annotabimus. Vxor ſæctus ſæctus cunctis Adonſiſſentia, vix abortus conſequenter paſſa fuerat, vix temporibus geſtationis dum quarto gradum eſſet, circa primis menſis ſæctus corpore eſt iſdem venis, & lumborum doloribus, qui aliorum abortuum prædiximus eſſe conſueuerant. Plicaride ad eam, & aduerſum mulierem ſanguine temporante præduam & plethoricam, ſtatim ſanguinem miſſi tubo ab Vnc. iv. & intra dimidiam horam præditi dolores omnino quæſuerant, & mulier ſæctus habuit, reliqua remedia, ad præſentationem abortus à me præſcripta, admiſtere noluit. ſæctus autem ſymptomata apparuerant eo prius tempore, quæ ipſa extra grauiditatem menſibus purgationes prius conſueuerat. Tercio demum grauiditatis menſe, eodem periodo, ſimilia redidit ſymptomata ſæctus me ſtatim vocatum, rogat vi ſæctum venæ ſæctum præſcriberem, cum præterito menſe adeo præſentia.

Cap. XVI. De morbis prægnantium. 379

*ignem leuante ab ea percipiet. Aliquis uero ipſius an-
nuncie, ſanguis deum multatur, pari præſens euenit. Quare
ardens interſe, quare ſexis, ſeptimo, & octauo, uſdem ſym-
ptomata perſeuerant recurrentibus uerata ſunt phlebotomia, &
mulier ſtans liber abſque. Pſtuma phlebotomia celebrata fuit
oſſo diſſeque ante præſentiam noui menſis, cum eodem fructu; &
circa hunc noui menſis diſſa mulier peperit filium uſtalem,
& bene habuit.*

Non eſt tamen quod hiſce exemplis peſuſas iunior
Medicus, audacior fiat in ſanguine petendo poſtremis
geſtationis menſibus. Sed morborum & mulierum habi-
tus diligenter oportet circumſpicere, ut illis remedia con-
uenienter aptari valeant. Hoc perpetuo in memoriam re-
uocās peccata omiſſionis leuora eſſe peccatis conſuſionis,
& ſatis eſſe in re dubia ſibi ſubſtitere, quam ultra de-
bitos limites progredi. Attamen ubi nunciatis ſan-
guinis mittendi indicationes intuetur, præmonitis alantibus,
nullo minus ex morbi leuitate, quam ex uenæ lectio-
ne, tum abortus, tum vitæ matris ac ſetus imminente pe-
riculum; audacter ſanguinem detrahet; hoc nihilominus
aduerterendo, ut ſanguinis miſſio ſi parcori, non copioſa,
que ſcitu alimentum ſubtrahere poſſit. Eſt multitudine
ſanguinis largiorem eius detractationem deſiderat, paruius
viciuſus, non ſemel id exequendum eſt.

Predixit igitur Hippocrates Aphorismus non abſolute
venæ ſectionem interdixit, led tantum admonuit, ut Medi-
ci cautiones ſint in ea celebranda. Quod a Cornelio Celſo
elegantè proditum eſt lib. 2. cap. 10. ſi uerius. *Antiquo
primam, uſitumque ætatem ſequere non poſſi hoc anxius
ſeius indicabit. Perſuadeat ſibi mulierem grauidam,
quæ ſa crata eſſet, abortum eſſe ſecuturam. Poſtea uero uſus
eſſendit, nihil ex his eſſe perpetuum aliſque poſſores eſſe
tationes adhibendas eſſe, ad quas duriſſe carant; cuſiſum de-
beat. Inter ſi enim, non qua ætas ſit, nec qua in corpore in-
ter generat, ſed qua uires ſint. Ergo ſi in uenæ ſectio eſt,
aut ſi uires, quæ grauida non eſt, parum ualeat, male ſig-
nificat. Emittitur enim ſus ſi que perit a, & hoc modo
eripit eſt. At primis pueri, & robuſtus ſexu, & grauida mu-
lier, uolente ſuo curantur. Hæc Celſus. Recentæ uires quædam
auſi ſunt uenas inferiores aperire in grauidis mulieribus,
ex curatione epilepiæ ex uero bubono uenerit & po-
ſſentis, imo & abortus præcautionem ut uidere eſt apud
Zacutum Luſitanum in Præſa Med. mirab. obſer 23. lib. 1.
obſer. 30. & 151. lib. 2. Qui propriis, & aliorum experi-
mentis offendere nititur, eam phlebotomiam poſſe totò
celebrari. Quæ prudentibus Medicis penſanda relinquo.*

Dixerunt ab initio huius capitis, nullam eſſe diuerſita-
tem in affectibus prægnantium curandis, niſi circa magni-
tudinē remedia, que in ſus a determinanda eſt, ut nimirum affe-
ctus, qui non grauidas occupat, ut vomitus inappeten-
tiæ, & ſinules, in non grauida magis indigeant purgatio-
ne, quam venæ ſectio, quia ſunt & cacochymia in ven-
triculo, & toto corpore redundante: in prægnantibus uero
magis egeant phlebotomia, quia ſunt & ſanguine re-
tento ab ipſo grauiditatis initio. Eſt docuit experientia vo-
mitu, qui prægnantes frequenter infeſtare ſolet primis ge-
ſtationis menſibus, & purgationibus exacerbari; & venæ ſec-
tione uero pluriſimum ſubiciantur, imò uerò in totū aulernſi
vix ad ſolutionem ſymptomatis ſingulis menſibus iteretur.

Purgationes uero uſitæ in grauidis mulieribus deſinunt
Hipp. Aph. ſec. 4. Vero gerentes, inquit, ſuis medicandæ,
ſi materia turget, quarto menſe, & uſque ad ſeptimum. Sed
ha minus, & inueterata, aut ſenſu, & ſenſu cauere oportet. Gal-
lenus enim. dicit eandem eſſe proportionem ſæpius, & fru-
ctuum arborum. Hiſiquidem in prima generatione debi-
loribus pediculis impoſitorum & ideo facile decidunt, quò-
d uſu meator uentris ipſos conſuſerit. Poſtea uero au-
cti difficilem habent a plantis diſſolutionem. Sicuti riuſus
cum periculis ſunt, ſponte, ſua ſine vi extrinſeca decidunt.
Eodem modo mulieres primæ & vitæ menſibus abortu-
um patiuntur, quia in illis letius minus ſtemit uero ali-
gatus eſt. Attamen noſtro hoc ſæculo purgationes quo-
libet ſere grauiditatis menſe admiſtrati ſolent, in morbis
qui ab excrementorum dominatu, & cacochymia produ-
cuntur, turgentis, vel concoctæ materiæ; quocumque

maius impendit. Periculum ex parte illius cacochymie
morbum committentis, quam ex commotione à purganti
medicamento excitata. Audaciores hac in parte Medici
ſecutus blandia, & innoxia medicamenta, quibus hodie
utimur, ut ſunt rhubarb, myrobalani, caſſia, inanna, ſenna,
agaricus, & ſimilia. Attamen habenda perpetuo ratio ſeu-
tentie Hippocraſiſque menſibus, cautius uero primis,
& vitæ purgantia medicamenta eſſe exhibenda. Præterea
plurimum uſus in grauidis perpetuo debet eſſe ſuſpectuſtu
quia corpus magis conturbant, uti etiam ratione alios, que
propter inſignem anætozem ſunt inſuſta eſt, & ora uenarū
aperire credatur. Quod ſi aliquando illius viſus necellarius
uideatur in grauioribus ventriculi affectibus, qui prægnan-
tes non raro primis geſtationis menſibus infeſtare ſolent,
laetetur diligenter cum aqua roſacea, ut eius acrimonia tol-
laſtur; vel admiſceatur aftringentibus, & roborantibus, ut
rhubarbo, mallicæ & ſimilibus.

Euacuatio autē que fit per clyſteres, non omnino tota eſt
quia comprimeſcit uerſu potius abortu excitare. Vbi igitur
illius opus ſuſcit, & in mulieribus affluſus huius remediſſi
geueri in minori quantitate componi debent, & ex his que
molliendi & leniendi potius, quam validè purgandi ſacul-
tate prædita ſunt.

Denique de ſudorificis, diureticis, & menſes mouen-
tibus ita pronuntiandum eſſe mentis mouentia propè dicta
in grauidis nunquam eſſe uſurpanda. Diuretica uero, quia
mentes quoque mouere apta ſunt, debent eſſe ſuſpecta; &
ſi morbi necellitas aliquando eorum uſum poſſit, leuiora
erunt eligenda. Ac denique ſudorifica tutius admiſtri-
ari poterunt, quæ per habitum corporis humores edu-
cunt, inde nullum ſuſcit abortus periculum. Ita ut non
nullæ mulieres in media grauiditate à ſu uenere, illæ ſo-
ſectu, liberatæ fuerint.

CAP. XVII.

De Abortu.

Aborus eſt immaturus focus excluſio, atque adeo ſe-
cus mortuus in utero, non dicitur abortus, donec
excludatur. Sive ergo ſectus uirus, ſive mortuus exclu-
datur, qui nondum maturus eſt, nec debuit accretionis
quæ in utero recidere debet, terminum attingit, abortus
dicendus eſt.

Cauſæ abortus aliæ internæ ſunt, aliæ externæ.
Internæ ad quatuor capita referri poſſunt, neopè ad hu-
mores, ad ſectum, ad uetrem, & ad morbos matris.

Humores abortum efficere poſſunt, dum quantitate,
vel qualitate peccant.

Quantitas peccant excedente uel deficienti.

Quantitas excedens reperitur in plethora ſanguinis enim
copioſiori, quam ad ſectum nutritiorem requiritur, ad uteri
venas ſuit, & inſtar purgationis menſtræ excludit, ſi-
mulque ſectum claudit.

Quantitas deficientis humoris alibiſ ab iſſis cauſis proce-
dit, quæ ſectum alimentum ſubtrahere ualent, ut media ſiue
uoluntaria ſit, ſiue coacta, ut cum grauidæ omnem cibum
aperſantur, aut vomitu reſiciant; tenuis dieta in morbis
acutis, immodica ſanguinis euacuatio per nares hæmor-
rhoides, uetrem, vel phlebotomiam immodicam, unde
Hipp. Aph. 34. ſec. 5. Mulieri uero gerenti, ſi alius multum
ſit, periculum eſt, ne abortiat. Huc referenda eſt ſumma
totius corporis gracilitas, in qua tantum ſanguinis non
ſuppedit, ut ſec. 11. alendo ſufficiat. De quo Hippocraſis
Aphor. 44. ſec. 5. Quæ præter naturam uires uetrum gerunt,
abortiunt, donec habuerint euacuati.

Ratione ſectus abortus accidere poſſet, ſi ſit nimis gra-
dis, ut propter molem in utero contineri non poſſit; hinc
ſæpe contingit paruas mulieres abortum pari, præſertim
ſi uires grauidioribus ungantur, quorum loboles magnam
incrementum capeſſit, & non habet ſatis amplum locum
ad illud perſeuerandum, unde Hipp. lib. de ſuperſer. Mulier,
inquit, ſi quæſtione, quæ quædam, & frequenter ſec. ſec. 11. bime-
ſtris, trimēſtris, aut quadrimēſtris, & ueteriores ſtato tem-
pore ſemper & certe excedit illud eſt referendum ad uteri an-
guſtiam, quæ anguſtiam ſatam amplius continere non poſſit.

Nomen.

Numerus etiam excedens abortum efficere potest, vt si duo, tres, vel plures in vtero continentur, periculum est, ne vterus nimia sarcina grauetur, illos prematurè excludat, vnde frequens fieri solet gemellorum abortus. Mortuus etiam fœtus ad hanc classem referri potest, ad cuius exclusionem natura continuo inuigilat.

Ratione vteri abortum contingit, si non sit satis amplus, & capax, vt sufficiat dilatari possit pro incrementum locum, quemadmodum supra relatum est ex Hippo de superfluo. Tum etiam aliquid præter naturam in vtero succurrit, vt inflammatio, tumor icterichus, abscellus, & quamplurimi a iij morbi. Ac denique si vterus sit humidus & laxior, vt fortum satis commodè continere nequeat.

Ratione morborum matris duplici ratione abortus contingere potest. Primo, cum morbi vteri communicantur, a quibus extinguitur, vel ita debilitatur, vt conueniens nutrimentum, aut incrementum recipere nequeat, quales sunt febres continuæ, & intermittentes, iuxta venerea, & alij complures. Secundo cum a diuersis morbis magnæ euacuationes, aut graues corporis commotiones excitantur, vt hæmorrhagiæ copiosæ, & quacunque corporis parte fiant: alui profluentia, grauis, lyncopenia, epilepsia, vomitus, & tenebrimus qui supra omnes alios morbos abortum efficere consuevit, quandoquidem a frequenti ac ferè continuo egerendi conatu, qui tenebrimus perpetuò comitatur, musculi abdominis assidue contrahuntur, & vterum magis comprimunt, quam in intestinum rediunt, cui superaret, & ex continua illa compressione fœtus exclusio tandem subsequitur.

Causæ externæ abortum promouentes, alia fœtum encant, alia cibum illius subtrahunt, alia fœtus acetabula, quibus vtero alligatur, dissolunt.

Fœtum encant animi commotiones graues, vt ira, tristitia, terror, &c. cibi adterer appetit & denegati, medicamenta cathartica fortiora, menses mouenta, partum adiuantia: quæ fœtum expellere nata sunt, & quæ proprietate specifica fœtum encantere cendantur; odores tetri, & præcipue fumus, & tinctiue lucernæ.

Cibum fœtus subtrahunt, iuicia, & immoderata sanguinis euacuatio, præcipue dum fœtus est grandior, docente Hippoc. Aph. 66. sect. 5.

Vteri acetabula dissolunt, exercitatio vehemens, saltatio, cursum, equitatio, aut vectio durior, qualis est curraurum; & grauioris oneris gestatio. aut è terra eleuatio, calus videnter coacti, ictus ventris fœtum contundens, abdominis motus vehemens, & tussis, vomitus, alui fluxus, sterilitas, conuulsio, clamore, & immoderate venere, aut petulantia. Ac denique imotus brachiorum vehemens, aliquid violenter attrahendo, totam agitando, aut aliquid simile agendo abortum maximè promouere potest.

Signa abortus præcipient per se manifesta sunt. Abortum verò præcedentia, & illum futurum demonstrantia hæc sunt: lumborum, coarumque grauitas insolita, & ad motum segnitia, appetitus decedens, rigor aut horror per vires recurrent, capitis dolor, præsertim circa oculorum radices laterum, ventrisque superioris confusio, mammae tumescunt, & extenuantur, vnde ex Hippo. Aph. 37. sect. 5. Si mulieri vtero gerenti mammae subito extenuentur abortus sequitur. Significat enim mammae illa extenuatio sanguinis defectum in vtero vtero, & mammae communi. ob quem fœtus periclitatur. Si verò a causa aliqua externa abortus concutitur, vnde sequitur violenta fœtus agitatio, & valorum disruptio, cum dolore illarum partium, spiritibus, & sanguis ad partes genitales ruit, quibus namque destituta extenuantur. Præterea hæc copiosum est mammae effluens partum imbecillum, & hinc metum abortus indicat, ex Hippo. Aph. 52. sect. 5. Si verò dolores frequentes, & ferè continui renes & lumbos excrucient, qui versus pubem, & os sacrum exporgantur; cum quodam ex vtero egerendi conspectum imminet abortus indicium est. Dolores enim illi membranas, & ligamenta, quibus fœtus vtero alligatur, tendi ac distendi significant. Quod si dolores illos, & conatus languis parius, vel ferocius, vel aqua ex vtero profluentis subleuantur, abortum instare, & disrupta vala ac membra aqua, atque os vteri apertum esse significat. Eodè

tempore situs fœtus mutatur, & qui antea sublimis, & fixus, ventris medium occupabat, iam conglobatus versus pudenda pronouatur, tum etiam non raro grauius symptomata consequuntur, vt rigores, tremores, cordis palitationes animi deliquia, hæmorrhagiæ copiosæ.

Hic addere licet quod docuit Hippo, epid. 71. quod si a causis externis violentioribus, puta ictu, vel calu, & similibus, vehemens dolor, & perturbatio in grauida excutitur, ita tamen, vel saltem eadem die sequitur abortus: si verò minor fuerit vis causæ externæ, ad tertium diem abortum differri potest, quo elapso cessat abortus periculum, quia vulnera humiliora tertio, ad summum quarto die secrescere soleant, vel admodum mitigare, vnde fœtus denique in vtero confirmatur, & retinetur. Quod præceptum maxime est in praxi momenti, vt prægnantes mulieres post violentam causæ alieus externæ insultum, in lecto per triduum, aut amplius quiescat, & remedia abortum prohibentia viciantur.

Prognosis abortus varia institui potest in hunc modum. Ex abortu multoties magis periclitatur, quam ex vero partu, quia violentior est, ac tempore alieno hri. Vt enim in fructibus maturis pediculi ab arbore laxantur, & fructus sponte decidunt: ita in partu naturali vala, & ligamenta quibus fœtus vtero alligatur, sponte laxantur, & soluantur, quæ in abortu sponte abrupta necesse est.

Quamolurimæ mulieres propter abortum steriles euadunt, ob insignes lacerationes, quæ vteri dispositiones omnes euerunt.

Insigne hæmorrhagiæ, ad duas lyncopeniæ, deliria, & conuulsiones sequuntur, mortem inferre solent: & testatur Aretæus se nullas vidisse seratas ex ijs, quibus in abortu aut abortum, conuulsiones insperuerunt.

Inflammatio vteri ex abortu contra dicta vt plurimum lethalis. Sanguis enim in vterum magna copia afflatus, non expurgatur, sed in eo putrefcit, & ad superiora reurgitur, vnde febres æstuosæ, palitationes cordis, cardialgia, aliaque symptomata supra enumerata.

Abortus in primipara periculolior, quia in adueta doloribus, & angustioribus habet istas vias, diutius ac vehementius torquetur.

Mulieres admodum graciles aut crasse in abortu magis periclitantur: illæ quidem propter infirmitatem, hæc vero propter contridictionem viarum per quas excluditur fœtus.

Abortus periculolior est sexto, septimo, & octauo mense, quia tunc grandior fœtus maiori cum molestia, & difficultate excluditur.

Femine quæ laxiorem, & humidiorē vterum habent sine noxa vt plurimum abortiunt, primis potissimum mensibus; quia partes illæ facili cedunt, vnde mox sequitur molestia.

Hippocrates 2. epid. afficit abortum sexaginta diebus, masculinum conferre in mensem suppressionibus. Per mensem suppressiones, intelligit tantum diminutionem, quando scilicet mulieres sufficienter aut commodè non purgantur mensibus periodicis, per huiusmodi enim abortum aperturam via illæ obstruitur, & sanguis afficitur versus vterum, qui parcius antea lucebat. Huius Hippocrates fœtus ite veritate obseruasse videntur nostras mulieres, quæ in abortu paucorum mensium, vernaculo sermone, & velut adagijs pronuntiant. *La femme auantée es moue empregnede*, id est, seminam abortum passam iam imprægnatam esse.

Curatio abortus in præseruatione posita est; qui enim iam factus est, restitui non potest. At quæcumque cum consequuntur symptomata, cum symptomata enuabuntur comunia sunt, illa autem abortus duo præcipua habet capita. Vnum extra grauiditatem alterum in grauiditate.

Extra grauiditatem omnes prae corporis dispositiones, quæ abortum concitare solent, remouendæ sunt: vt plethora, cacochymia, & peculiaries vteri morbi, v.g. anempestes, tumores, vicia, & similia.

Pectoris, & nimia sanguinis copia vteri venas replet, aut fœtum intus suffocat. Hinc illi puta & simplex iuxta plethora, sanguis mistio medetur, quæ illius redundantiæ lauscat,

Cacoehymia verò, aut biliofa est, & acrimoniae participes, vt venarum orificia aperiat: aut naturam stimulam expultricem exciet, qua etiam fetus una cum nonis humoribus excludatur: aut propter excrementorum copiam in prima regione cumulatam, ventrem distendens, itum fuffocet, aut in toto corpore sanguinem variat, & fetus alieno inuitem reddit: aut nimia humiditate fetus retentione impedit, vel vteri acerbata mucore plena reddat.

Huc cacoehymia medebitur etiam phlebotomia, sed parciom manu celebrata, cum praecipuum curationis caput fit, frequentis purgatione superuacua corporis excrementa detrahere. Quibus interuenient ea, quae videri intemperies humorum acrimoniam, si aduerit, demulcent, vel tenuitates incoarant. Aut si humores pituitosi luxuriant, sudorificis, diureticis, aliisque remedijs erunt discutendi. Hic tamen sedulo obseruandum, in quacumque cacoehymia cauteria mirum in modum prodesse ad praecautendum abortum: quod speciatim annotat Zacutus Lusitanus his verbis *Falsissime experimento obseruam, frequentem abortum ex vitijs humorum ad vterum à toto de mandatis fuisse praeuacuitate, pro capta fatum ementibus, hoc solo praesentem exitum auertere impeditur. Femina plures hac ipsa de causa frequenter abortiebat. Ex his quaedam fatum septuagies, quodam interfectum, laterum tamen, & omnis partium infestationem, sepius emixit, non nisi hoc praesidio, tam in brachijs, quam cruribus, semper tamen ad euersionem fluxionis celebrato, à vtero multis leuare putauerat, & debito ac constituto tempore fatus sanus, multa laeae fundere in hoc edidit.*

Peculiariter vteri vitia, vt nimia humiditas, tumores, vlcera & similia, erunt auferenda remedijs in proprijs cuiusque affectus capitibus descriptis.

In grauiditate, si eadem caula aduerit, maior est difficultas, quia praegnautes non ita facile quaecumque ferre possunt remedia. Ne tamen auxilij deficiat, in summo abortus & viti periculo venturum, quaedam remedia vinepanda sunt.

Praeterea igitur plethora, etiam in grauida in muliere, sanguis detrahendus est, primis potissimum mensibus: idque aut ter, si opus fuerit. Hoc perpetuo obseruandum, ne magnitudo vicia vice detraharit. De qua sanguinis missione fufius egimus praecedenti curatione.

Vbi vero insignis cacoehymia redundauerit, purgatio blanda frequenter iteranda est, medijs praefertim menibus gestationis. Et si intemperies humida, catarrhosa, mucosa, vel flatuosa infestatione, ad diuam ludoniam in robuitoribus, saltem leniorem, transcendere aliquando licet.

Interim toto gestationis decursu astringentia, & roborantia, quae abortum prohibere nata sunt, in vium reuocanda sunt. Quorum non pauca in fluxu mensium immodico descripta sunt, huiusque frequentia vtiliter addi poterunt.

¶ Granor. tritor. rad. tormentillae. an. ʒiij. malthiches, ʒi. ʒi. fiat puluis de quo per intervalia detur ʒ. ʒi. vel quantum in culpe cultri contineri poterit. Vel

¶ Coralli rubri Drach. ii. granor. kermes. ossium dactyl. an. Dr. i. rad. uterboris Dr. ʒi. margaritar. non perior. ʒ. i. fiat puluis.

Vel grana aliquot malthiches singulis diebus mane deuorantur.

Nosirates muliercule in frequenti vfu habent semen plantagini, quod mane ad Drach. ʒi. circiter assuntum cum vino diluto, ouo, aut iusculo, vel per singulis fere diebus toto gestationis tempore, non sine fructu.

In eundem vium opiate componuntur valde efficaces, quarum exemplum sequens esse poterit.

¶ Conferat ʒ. ʒi. cortic. citri condit. ʒ. vi. myrtobal. conditor. pulpe dactyl. an. ʒi. coralli praep. marg. praep. & rasura eboris, an. ʒi. Cum lyppo cydon. hac opiate, de qua caput magnus calixne frequenter.

Si forma liquida magis ardeat, decoctum tormentillae cum conserua rosarum vtiliter exhibeatur.

Tabellae sequentes sunt vtilissimae. Si quidem roborant, & corpus ab excrementis sensim liberant, licet aliquando sensibilibus non ena cunctis.

¶ Macis, trium lantal. rhab. fenae, cotall. margaritar. an. ʒ. i. iacchari in aqua rosar. dissoluti ʒ. iv. Fiant tabellae,

pond. Dr. iij. Capiat vnam bis in septim per se, vel in iusculo dissolutam.

Exterius verò admoventur erunt vnguentis, & emplastra in hunc modum composita.

¶ Pici nautalis ʒ. ʒi. thuris ʒi. malthiches ʒ. ʒi. sanguinis drac. & ros. rubr. ana Drach. ʒi. Fiat ceratum. Vel.

¶ Olei myrtobal. & malthich. an. ʒ. ʒi. lantal rubri, citrioi, hypocistidis acaciae, an. ʒ. ʒi. lipo dactyl. rosar. rubrar. an. Drach. ii. boli armen. terre sigillat. raturae corall. an. ʒ. ʒi. tercenti, cum aqua plantag. lotae ʒ. i. cere q. ʒi. fiat ceratum, quod superpetendatur linteis, & rebus applicetur.

Emplastra componuntur ex massa emplastris promatrice, & contra euphoram, regionis puus & lumborum applicanda vel in sequentem modum.

¶ Massae empl. pro matrice ʒ. iij. rad. histortae. acaciae, hepocist. cortic. melior. granat. an. ʒ. ʒi. ladam Drach. vi. Malaxetur cum lacte cydon. & fiat massa emplastrum ad vium dictum.

Circa emplastra hoc animala dendum, ea non diu esse gestanda, sed per intervalla remouenda. Aliquo diutius lumbis adhaerere adeo renes calefaciunt, vt mulier mulieres aliquando vix ardore afficiantur, vel calculos, arcuulus, & interdum sanguinem nungant.

Neque onantur sunt ea, quae ex proprietate fetum retinere dicuntur; vt lapis aetres de collo suspensus, magnis vmbilico admotus corallia, iaspides, smaragdi, oilla de corde cerui legitima, & similia axillis gestata, vel de collo suspensa.

Zacutus Lusitanus obijcit, *Si a, Praeceptum adm. inter cetera commendat zonam, ex corio equi marini confectam: & illius defectu corium lupi vtiliter viupum posse adferri.*

Vt autem horum remedium fuisse pollic esse euentus, summa quies imperanda est, tum corporis, tum animi tum etiam coitus abstinenda, quia vterum vehementer excitat. Dum enim fere vterus aperit ad comprehensionem feminis, quo maxime oblectatur, fetum totentem, & non quum, & firmiter adherentem propellit.

Si verò non obstantibus remedijs praedictis, propter caulae vehementiam, siue interna fuerit, siue externa, abortus imminet, sequentibus auxilijs illis erit succurrendum. Ac primum dolores & tormina quamprius apparuerint in vetro fundo, versus pubem, in lumbis & ossis lacro, eorum sedatione incumbendum est, tum sumptus quam admodum pro varietate caularum admotus. Si enim ob cruditates & flatus excutitur, (quod est frequentissimum, quando incipit à causa interna,) exhibendus erit puluis ex aromatico rosato, & sem coriandi compositus. Immo aqua Imperialis exhiberi poterit, si maior sit pruitus, & flatuum congeries.

Eodem tempore applicentur abdomini carminantia, vt fasciuli ex sem. anisi, lenculi, fenugr. flor. chamom. sambuci, anthos, & storchados compositi. Vel placenta rosacea fixa in larrag. cum vino generoso, & puluere nucis molch. & coriandi conspersa. Vel omentum veruena recentem maciat, aut palmo euident calide admotus.

Si hiice dolores non cessent, iniciatur clyster ex vino, & oleo conicius in quo phloeny Rom. Drach. ii. dissolui poterat. Aut etiam narcotica per os, in minori doli exhiberi, ad frangendum flatum, & humorum impetum, vt in colico dolore fieri consuevit.

Si vero propter dolores contumaces, aut caulae externa violentiam sanguis apparere incipiat, resucientia remedia admanitanda sunt. Vt frictions superiorum partium, & ligaturae dolorificae, cum cucurbitulae capsulis lab. mammae & vtriusque pochondri admotae. Imò verò si mulier fuerit plethorica, non erit abs re sanguinem detrahere, cum apparente sanguine, tum praecipue antequam appareat, & partibus vicibus non altum educere.

Quas si non sufficiens fluxus sanguinis perueniat, ad astringentia veniendum est, & intransientia, tum alimentorum medicamentis: aequa ita pulueres, & opiate supra descriptae exhiberi poterunt. Tum etiam luccus plantagini recenter extractus, nec non lyropus de papao ad Vinctum puluere boli armenii, aut sanguinis draconis.

Exterius vero admoventur poterunt viti astringentis, &

roborantes, ex corticibus granatorum nucibus cupressi, calycibus glandium, balauftis, acinis vuarum, & similibus in aqua laborum & vino rubro decoctis.

Vel sacculus rosis balaulis impletus, coquatur in vino rubro, & ventri calide applicetur.

Hæc etiam accedere possunt cerata, & emplastra prædicta. Vel ad magis astringendum, fiat cataplasma ex poluere astringentibus, cum terribentina, & ab omnibus oorum, quod extendatur super flupis, & vinum applicetur vmbilico, alterum tumbis calice. Stupæ applicentur vmbilico, mediant in vino: applicandæ renibus, in aceto.

Sequentes duo remedia pro secretis habentur, & scetum certo retinere creduntur, si antequam lotus à coryleodonibus ciliuiss fuerit, visentur.

1. Iota auti. numi. xii. Ispodij Drach. i. germina trium. oorum non substantia eorum. Misceantur probè, donec autum fit in minutissima diuisum. Postea dissolvantur in dandis co: atio vini albis & uter mane per triduum.

Eodem tempore sequens cataplasma admoveatur.

Thuris masculis pulverati Vnc. ij. albumina oorum numi. Agitentur simul super prunas leniter movendo ne coarctent. Adidendo terribentina, ne nimis adhærent. Polica flupis recipiantur, & quantum ferre poterit, calidissima vmbilico applicentur bis in die mane, & scet per triduum prædictum.

CAPVT XVIII.

De partu difficili.

Partus difficile appellatur, qui debitis atque ordinariis naturæ leges non servat in eorundem tempore inflatur, & dolores subito vehementiores, aliæque symptomata grauiora eum comitantur.

Plures illius causæ assignari possunt, tum internæ, tum externæ. Internæ dependet vel à matre, vel ab utero, vel à foetu.

Ex parte matris partum difficilem reddere potest debilitas totius corporis, vel natura: vel propter ætatem, vt in iuueniculis, & vetulæ vel pro morbo quibus in grauiditate mulier afflicta fuit, aut adhuc assurgit. Ad hoc etiam conferre potest macies, & fœcitas nimia totius corporis, vel pinguedo, & crassities vas veteri comprimens, & angustiores efficiens: ossium vterumque anfractuosa mala conformatione, vt in claudicantibus, status intestini distendens, caliculus, aut tumor præter naturam vesicam occupans, vterumque comprimens: & pulmonis, aliarumque partium respirationis infertulentum præuia constitutio, quia spiritus cohibito ad foetus & exclusionem valde necessaria est.

Ex parte veteri, varij illius morbi partum difficilem reddere possunt, vt tumores, vicera obstruções, alitudo nec, obstruções à causis præternaturalibus oriundæ.

Ex parte scetus contingit partus difficilis, quando vitium aliquod in eo reperitur ratione substantiæ, quantitatæ, figuræ, & illæ adiunguntur.

Ratione substantiæ vitium in foetu est, quando mortuus est, aut putrefactus, aut labe aliqua infectus, aut ab aliquo morbo debilitatus, vt nihil vitium conferre possit ad suam exclusionem.

Ratione quantitatæ scetus partum non adiuvat, quæ vel continua est, vel discreta. Ratione quantitatæ continua vitiosus est, si grandiori corpore aut capite præditus sit, vnde laboriosa exclusio sequitur. Ratione quantitatæ discrete, vt quando plures sunt in utero: sic in partu gemellorum laboriosior vterque videri potest.

Ratione figuræ seu situs in utero, partus difficilis varijs modis contingit, vt quando seans in pedes, aut manibus præcipue exte conatur: vel vnam tantum pedem: aut narium alterutram evertit, vel duplicem egredi conatur, nates aut ventrem ad vterum orificii offert.

Ratione adiunctionis situs: contingit difficultas in partu, quando membrana scetus obvolutes tenuiores sunt, vt citius quam par sit, dirumpantur: vnde sequitur prætorum citius effusio, sique ressecatum manet vteri orificij, tum tempore exclusionis situs: vel quando crassiores sunt

& densiores, vt faciliè à situ dirumpi nequeant.

Externæ causæ dependent ex rebus necessariis, & contingitibus. Res necessarie sunt illæ quæ nonnaturales vulgò nominantur. Si aer frigidus & siccus, & status Aquilonaris, parturientibus valde infensus est, quia totum corpus contrahit, languinem & spiritum ad interiora repellit & intant à repetentibus illis locis euentis valde noxius est. Aer etiam feruidior spiritum dissipat, & foetus ac sepe vires exhaurit, inflammationem febrem faciliè inducit in corpore iam cacochymo, & exagitato.

Alimenta cruda, aut concocta difficilia, aut astringentia magna copia ante partum assumpta, difficilem eum reddere possunt, debilitato ventriculo, & confusatis vijs communibus, quæ hæc maxime patere debent.

Sonolentia, & stupor, matris, & scetus impetum retardant, & naturam inuicem offendunt.

Motus parturientis intempertissimus partum maxime retardat, cum illa, vbi opus est stare, ambulare, decumbere, vel in sella oblectrici sedere renuit: vel importune agitata: vnde contingit scetum, vel non posse exire secundum debitam viam, vel iam amittit ob matris motus præfatos.

Excretorum retentiones tempore partus, vt vrine vesicam distendunt, scetum induratum in recto intestino, & hæmorrhoides valde tumentes vteri conuicem coarctant & naturam à conatu parturiendi auerunt.

Ac denique animi parhenia vehemens, vt timor, tristitia, traxitudo, partum facilitatem plurimum impedit possunt.

Ad res contingentes referuntur istius, casus, vulnera, quæ partum plurimum nocere possunt: tum etiam affantes, quæ partum tentem adiuvare debent, valde nimirum menses, & lamule, quæ illam subiecent, & succiant, dum est in ipsa enatu, & præsertim oblectrici perita, quæ vniuersæ huic actioni præsidere debet. Si enim illa in officio suo errauerit, partus difficultatem inferre solet. Interdum enim oblectricæ citius parturientes incitant ad conatus expulsiuæ, & spiritus cohibentur, dum adhuc ligamenta scetus vtero firmiter adherent: vnde vitium exolucio subsequitur, quæ postmodum in ipsa partus hora non sufficit. Iam verò dum oblectricæ parturientibus premature persuadent, tempus partum infare: sic vt ille omnes vires ad excernendum scetum intendat, & sæpenuero vasis violenter diuisus, in non leue discrimen præcipitentur.

Cognoscitur partus difficilis, tum ab ipsa parturiente, tum ab assistantibus, & præcipue ab oblectrice. Ac primò si longiori tempore nanciatur signa in laboribus partus, V. G. per duos, tres, quatuor, aut plures dies, cum verè naturalis partus intra 24 horas perfici debent. Deinde signum difficilis partus est, si dolores partus sint languidi, & per longa intervalia recurrant, & dolores ad dorsum potius, quam vterum pudenda vergant. Causæ verò difficilis partus ex ipsarum parturientium relatu, & ipsa autopsia maiori ex parte dignoscuntur. Sic debilitas agra, macilentia, aut pinguedo nimia, ex habitu corporis deprehenduntur. Morbi vteri proprijs indicijs dignoscuntur. Scetus debilitas ex debili, & tarda motione dignoscitur. Scetus verò mortui signa capite sequenti innotescunt. Magnitudo scetus ex parentum stature colligi potest, præsertim cum vir magno corpore præditus, cum pusilla muliere coniunctus est. Quando verò hæc deficiunt, & matris conatus satis validus est, istique sese commouendo, sufficienter extrahi affert, partus tamen difficilis ac laboriosus est: indicio est secundum esse fortorem, quæ non facile dirumpi valeat. Cuius rei coniecturam augere, si aqua & humiditas in labore non profluit. Præputia scetus figuræ ab oblectrice deprehenduntur, & reliqua, vt dictum est, ipsa autopsia innotescunt.

Prognosis quod attinet. Partus difficilis ex se periculosus est, & in eo interdum mater, interdum scetus, & interdum uterque extinguitur.

Si mulier quatuor dies in partu laboret, vix fieri potest quin scetus moriatur.

Alitudo soporosi, & convulsiones in partu difficilis super.

superuenientes, sunt vltimum lethales.

Sternutatio in partu difficili superueniens, bona ex Hippocrate. *Apb. vltimu.*

Ad curationem partus difficili, primo omnes causas que illum retardare valent, quantum fieri poterit, auferende. Deinde partum adiuuantia remedia methodice administranda.

Ac primum vulgare est apud mulieres aque cinnamomi cochii, aut alterum exhibere. Vel ipse cinnamomi puluis cum pauco croco, vel coisect. aliterm. cum uisculo propinari poterit. Tum etiam crocus solus ad 3. ss. in singulis iufculis, aut singulis horis, cum modico vino sumptus vtilissimus est. Vel

℞. Olei amygd. dulc. & vini a. bi. ana 3. ij. croci & cinnamomi, ana gr. xii. coisect. aliterm. Drach. sem. syrupi capellor ven. 3. ss. fiat potio.

Si hac non sufficiat, & validioribus agendum sit, sequens potio erit efficacia, illiusque frequenter vti a nobis comprobata.

℞. Dictamini cretici, aristoloch. vtriusque & trochilcor. de m. ritha, ana 3. ss. croci & cinam. ana gr. x. coisect. aliter. Drach. sem. aque cinani 3. ss. aque naphz & artemisiz, ana vnc. 3. sem. Fiat potio.

Inter efficaciora recentiorum oleum succini, cinamomi, extractum croci, que in exigua quantitate multum operantur, scilicet extractum croci ad gr. v. vel vi. oleum cinamomi ad gutt. x. vel v. oleum succini ad gutt. xii. vel xv. cum vino, uisculo aut alio liquore.

Sternutatio partum accelerat, ex Hipp. *Apb. 15. sectum. 5. Difficili partus superueniens spernenda, bonum. Illa, prouocabitur puluere sequenti.*

℞. Hellebori albi Dr. sem. piperis longi 3. j. castorei gr. v. Fiat puluis qui insufficitur in nares ad pili magnitudinem.

Idem Hippocrates aliud prescribit remedium lib. 1. de morbis mulierum, quod ab omnibus ferè Auroribus est prætermissum. Illud autem est secta venæ inferioris, his verbis proposita. *Si vera, inquit, prægnans multo tempore cohibetur & parere non possit, sed dubia pluribus ex partu dolore laboret: sit autem summa, & in vigore, & multo sanguine referta, scire oportet venas in malleolis, & sanguinem detrabere, vtrum respiciat habito. Quamuis id Prædictis nostris nunquam in vsum reuocetur huiusmodi remedium, & videatur maxime reformidandum, cum in partu vires vnicè necessariae sint, quæ a venæ lésione infringi possunt. Tamen si a phlebotomia difficultas parienti oratur, quod inuenire voluit Hippocr. cum dixit, si mulier sit summa, & in vigore, & multo sanguine referta, non est dubium, quin maxime conferre possit, cum venæ plurimum sanguine refertæ omnes vias interiores angustiores efficerent solant. Vnde fir. in dolore nephritico similis phlebotomia sæpè miranda præstet, & ca culorum tum in remittentibus in veteribus contentorum, exclusionem faciliat.*

Non solum autem internis remedijs propositis, sed etiam externis, partus difficili adiuuari poterit.

Obstetrix itaq; vterum parturientis frequenter inungat oleo lilior. amygd. dulc. sem. lini & similibus.

Tum etiam foueat venter inferior decocto emolliente, ex rad. ali. lilior. sol. malis, violat. artem. sem. lini, sennigr. flor. chamom. meliloti.

Clysteres ac nequius, quorum irritatio expulsiuæ etiam vteri stimulat, & depleta intestina ampliore locum vtero relinquunt.

Vmbilicus inungatur oleo succini. Quæ idam fel gallinæ nigre laudant, eidem parti admodum.

In vterum etiam venire possunt ea, quæ proprietate specifica partum iuuare creduntur: vel lapæ acetæ, vel magnes styraz calamita, & reliqua coxis aliata.

Hæcnam oculis temporis mente Martio capto, laudat Quiludose uenerandi, ne comprimat natus, & cum pipere in orde efficiendi. Horum vnus vteri cum pipere sta aligetur, vt venter a pupilla tangatur, & solum, siue, mortuum, siue: vnum educat Quo iactu, mos amouetur, de vterum plane propeat. In mola etiam valere asserit.

Cauendum etiam est, ne puerpera gemmas in annulis aut alio loco geuet, sed omnes deponat: nam multa ex ista proprietate speculica solum reseruit creduntur.

Si fortis debiliior videatur, rescindendus est tum roborantibus matri exhibitis, vt vino calente, coisectioe aliterm. aqua cinamomi; tum externis, vt crusta panis, aut placenta rosacea puluere nucis moschat. cin. am. caryophyll. granor. kermes sinapilata, & aqua imperiæ, aut vino tepente irrigata. Vel frustulo carnis venecine partum affo supra craticulum, & aqua rosacea, vel flor. arantior. irrigato omento veruecis nuper madati adhuc calenti, & similibus.

Si periplostero modo fortis egredi incipiat, vt brachio vno aut pede primum emisso, vel altero quo prius modo; obstetrix nullo modo talem partum excipiat, sed in vterum retrudat, & ad legitimam intram conuertat. Quod fiet puerperam in lecto supinam collocando, capite demisso & clunibus elatis. Postea ventrem ipsius versus præcordia blande comprimendo, & in vterum ipsum ipsam compellendo. Postea verò obstetrix alia forma excundi occalione infanti ministrat, artificiosa natus prouocans, vt lacem tergo matris obseruet, dein matris & crura versus matris vmbilicum euacuet, & ad legitimam partum accelleret.

Sublata omni partus fe, aut etiam matre iam mortuæ proxima, nonnulli Aures ad lesionem Cesaream accedunt, de qua Franciscus Rossetus elegantiussum edidit tractatum: vbi multis rationibus, & exemplis conatur ostendere, illam posse aliquando succedere. Attamen quia operatio est periculosa & terrens plena, raro aut nunquam tentanda est Medico prudenti, si nomini suo consulere voluerit.

C A P V T XIX.

De partu mortuo.

IN partu difficili ob magnos, & diuturnos labores sæpè fortis extinguitur, inquit, etiam ante labores partus ex causis præternaturalibus, quales sunt ea quæ abortum prouocare consequuntur, eum mori contingit, & si nondum determinatum parienti tempus augerit, abortum iacti si verò ad illud tempus peruenierit, facit partum difficilem, quia ad legitimam & naturalem partum fortis cum matre cooperari debet, vt è carcere fuo egrediatur.

Omnes igitur causas partum difficlem efficere volentes, si maiores & grauiores sint, fortis extinguere possunt. In primis verò laqus extinguitur fortis, si adeo præpostera figuræ, prodeat, vt nullo modo excludi possit, neque ab obstetrice, vel chirurgo: & trahi, aut in meliorem formam conuertere. Cum enim hoc modo in officio hæreat, & venter matris conatum eludat sic vt in istis conatibus, varique moribus & compressionibus interdum mater & fetus interdum mater sola, & interdum fortis solus moriatur. Admiratione dignum est, quod rehet Fabricius Hildanus de duabus mulieribus ex partu laborioso extinctis, in quibus vterus disruptus inuentus est, & caput infantis in ventris capacitate demissum. Vnde colligere est quantum sit validi fortis impetus ad sui exclusionem molendam.

Cognoscitur fortis mortuus, quando motus illius cessat, quæ prius in vtero aut mater ipsa sentiebat, aut obstetrix percipiebat ad motum manum, aut alius robur tepentibus, & roborantibus, quibus illius vis sopita fortis exsuscitatur; maior ponderis sensus cum dolor abdomen intellat, quando incemine de latere in latus sese conuertit, fortis ex vna parte in alteram in latus lapidis dilabi percipit, ventris inferioris frigiditas tactu deprehenditur, extinctio calore natuæ, & dissipatio spiritibus, qui in fortis continebantur oculi redduntur coacti, & perturbati; facies & labra pallent, partes extremæ frigide, ac luidæ apparent; mammae laccidæ euadunt, ac tandem putrescent; fortis, ichores foetidi & saniosi ex vtero emanant; abdomen ob vapores eleuatos inflatur, teter odor, & grauiolens spiritus, non solum ex ore matris, sed etiam a toto corpore exhalat. Si ante septum secundum excludatur, certissimum est fetus in vtero mortui indicium.

Quod ad prognosin spectat, periculissimus est fetus in vtero mortuus, & nisi maturè excludatur, febres, ipsochy-

mias, fopores, convulsiones, & mortem inferre solet.

Aliquando tamen fetus in utero mortuus per longum tempus servari potest, ut plurimum hæc casus a variis autem rebus relatis constat, quas tanquam raros casus magno numero collegit Schenkius, & transeunt Sennertus; multarum mulierum, quæ fuerunt in utero ipsi & corrupti obitu, per vterum, alium, vesicam, & tumore in abdomine aperto excreverunt.

Nos vnam vidimus, quæ omnia fœtus ossa per vmbilicum excrevit, & postea coalescente vmbilico perfecte restituta est.

Curatio tota versatur in fœtus exclusione, vel extractione. Cum enim maximum vitæ periculum immincat ex longiori fœtus mori in utero mora: quamprimum ex signis propolitis certo concluditur fœtum esse demortuum, ad illius exclusionem properandum est. Illa autem ipsæ remedia promouentur, quæ ad iuvandum partum fuerunt propolita. Ex iis tamen fortiora & efficaciora eligenda sunt, quibus nonnulla maiores adhuc etiam addi poterunt in hunc modum.

℞. Fol. labine siccor. rad. aristol. rot. trochisc. de myrrha, castoreo, an. ʒ. iij. cinam. ʒ. ʒ. croci ʒ. iij. Misce, fiat pulvis, de quo capiat ʒ. ii. cum aqua labine. Vel

℞. Dixamni cretic. labine, boracis, an. ʒ. iij. myrrhæ, rad. arist. cinam. croci, an. ʒ. iij. Misce, fiat pulvis, dosis ʒ. i. cum dicto aut simili liquore.

Interim vomuentibus pudendo, pubi & perineo fœtus emolientes prædidi, addendo rad. bryoniæ, cucumeris agrestis, ieros. Floren. aristol. rot. & flores genitæ. Post fœtum inungantur eadem partes unguento de arthanizæ, vel sequenti.

℞. Aristol. rot. colocynth. & agarici, an. ʒ. i. gumma ammoniaci in vino soluti, & fellis tauri, ana ʒ. i. olei cherni q. s. fiat unguentum.

Pessarium etiam in vulvum immittatur.

℞. Rad. aristoloch. rot. ieros, hellebori nigri, colocynth. myrrhæ, an. ʒ. iij. galbani, opoponacis, an. ʒ. ʒ. Cum felle bovis, fiat pessarium. Vel

℞. Ammon. opoponacis, castorei, serap. hellebori nigri staphis aristoloch. rot. pulv. colocynth. scam. ana ʒ. i. euphorb. Drachi. Cum succo rutz, cyklam. cucum. agr. & felle taurino fiat pessarium.

Zacutus Lusitanus obfer. 154. lib. 2. Præc. ad mortem non imminuentem in utero mortuum, & gravissima symptomata præsentem, & exclusum fuisse testatur vulvum pessari vi, & balnei oleaginis, cum decocto medicamentorum aperientium & vias dilatantium commixti.

Stethus ex galbano, vel vulgula asine per infundibulum recipiatur.

Si res cunctetur diutius, vitæ erit constantibus viribus, catharticum medicamentum exhibere: quo simul educuntur viscosi humores, qui in hoc statu facile & citò colliguntur, & coalescunt quodam fœtu propelluntur.

Angelus Sala in triumpho emeticorum, testatur se septiduo cum pluribus in hoc casu exhibuisse mercurij, vitæ græj. vel v. idque remedium potentissime fortum mortuum excludere & reliquis remediis prævalere. Quod tamen propter vehementem suam operationem, humana cautione & Medici prudentia indiget.

Si medicamentis diu tentata fetus mortui eductio obtemperari nequeat, ad Chirurgicam operationem veniendum est. Eaque sit, vel instrumentis, quemadmodum à Paulo Aegineta describitur; vel manus illius ministerio, prout docent à Carolo Stephano. Bauhino & alijs quæ omnia à Schenki & Sennerto diligenter transcripta sunt.

C A P V T XX.

De secundina retenta.

IN partu naturali secundina vix plurimum statim post fœtum excidit solet, aliquando tamen in utero retinetur, unde gravissimum imminet vitæ periculum.

Causæ istius retentionis internæ sunt, nimia tunicarum ætrem densitas & crassities, propter quam vterus patiens

bus firmius adherent, eamdem intumescens ab humorum affluuio qui in partu laborioso concitatur, virum exortio ex partu laborioso facta ut non sufficiat ad secundinarum exclusionem, & ori vteri occlusio post fœtum exitum. Causæ verò externæ sunt aeris frigiditas, cuius vi secundina repellitur, & vteri orificium occluditur; odora menta quædam quibus vterus sursum allici, vel exagitari potest; animi pathema gæus, ut timor, vel terror lubimone non vult, vel eos conatus præstare, qui ad hoc opus perficiendum requiruntur; instantis pondus nimium, quo ex improbus vmbilicus distrahitur, remanens intus secundina; & impetita obstrictio error, quæ vala vmbilicalia cuius refecit, aut non tenet finistra manu, vel debebat; si cum dimittantur, retrahuntur ad vterum, & in eo cum secundina latent, quæ eorum extractioni inferre debent.

Diagnosis secundinae in utero retentæ per se facilis est, aliquando tamen frustulum illius separatur, & in vtero retinetur, cuius notitia non est adeo facilis; cognosci tamen potest ex eo quod vterus post partum adhuc in exercendo laborat, quamvis leuiores sint illius conatus; doloris & caloris sensus in vtero percipitur, & post aliquod dies, teter ac cadaueros subulatus a vtero exhalat.

Periculossima est secundina retenta, & si per aliquot dies in vtero moretur, scdam putredinem acquirit; unde febres acuta, nausea, hypochymia, dyspnæa, ludot diaphragmaticus, extremorum frigiditas, hysterica fluctuatio, epileptica insultus, morstandum sublequuntur.

Hippocrates 2. epidem. exemplum vterus cuiusdam coartari, inuit bonum esse, si sanies copiosa breui per puerendum effluat; ipse enim est membranas illas putrefactas vel maxore consumptas, luto vel septimo die effluuntur.

Secundina retenta ipsam remediis expellitur, quæ ad fœtum mortuum suere propolita, quibus addere licet nonnulla specifica ab Autoribus tradita.

Generus, & Augustinus p. unum laudant eam castri testiculos, trassulam incisos & in furno siccatos. Illo rumque pulvis datur, quantum tribus digitis capere potest, cui iure pulvis idque si opus sit, bis aut ter repetatur.

Rulandus olei iuniperi guttas xxx. sequebat exhibuit.

Alij iubent puerperam dentibus eam comprimere, succumque deglutire, idque ter, quaterque dentibus in cepam ad actis, leucocis semper elicto ac deglutito, repetere, postea vini calidi & valis luperibere, unde citò liberatur.

Forelius relet de obstrictio quadam, quæ à Iudæo Medico secretum sequens acceptat. Sumebat solia leuistici viridis, contundebar, & succum & primebat cum vino Rhenano optimo, cuiusque cyathum propinabat.

Angelus Sala mercurium vitæ commendat, ut in fetus mortui eductione.

His addenda erant sternutamenta, suffusio, fomenta, sinimenta, aliaque tum externa, tum interna supra descripta, in partu difficili.

Sequens edoctio à muliere quadam nostræ vici præparata, miranda preestitit.

℞. Aceti rosæ, viij. vel x. folior. lauri & baccarum eiusdem, ana M. iij. placentam rosaceam ex aqua distillata recedam, in testa distillatam, nunc. Bulliant in igne, & eo decocto lauentur duo coræ & tunc calide, apertus est, ac secundina decidit. Huic decocto commodè addi poterit myrrhæ & aritho, styracis, ana Vnci.

Inter alia verò remedia multum potest manus perici Chirurgi in vterum immitti, antequam inflammatio, vel inflatio augeatur. Sic enim apprehensis secundinis & mollior circumductis, poterit illas extrahere, mulieremque à tot symptomatibus, & remediis mori molestis liberare.

Si nullo modo secundina educi poterit, sed firmiter vtero hæreat, & in eo putrefcat, suppurantia in vterum immittenda sunt, ad ipsas detergentibus, ut si quod putrefactum est sensim educatur. Ad id laudat Rondeletus unguentum basilicum, perierit si distillatur in decocto, sequens.

℞. Fol. malvæ cum rad. M. iij. rad. aristol. vtriusque ana Drach. vi. semini & ligni ana, Vnc. sem. violariæ M. i. Rosam

rum chamom. & centa. min. an. M. 6. Fiat decoctio in aqua admiscendo, si magna suppur. atione opus est, aliquid o. et si verò maiori dectioe. vnguenti Aegyptiaci parum.

CAPVT XXII

De fluxu lochiorum immodico.

Fluxus lochiorum immodicus non ex quantitate, aut tempore durationis estimandus est: quia in diversis naturis, etatibus. vite generibus, variis admodum effluat: et difficili tolerantia, & vitium deiectione, quae ex eo contingit.

Causae illius sunt, valorum apertio nimia, vel laceratio in partu difficili, vel secundinarum violenta extractio: vel sanguinis copia maior, quae per totum gestationis tempus in utero venis collecta fuit, vel eiusdem tenuitas, & acrimonia, quae valorum oscula nimium aperit, & naturam ad excrctionem stimulat.

Cognoscitur fluxus lochiorum immodicus ex viribus, ut dictum est, quae ex haultis spiritibus deiciuntur: tum sanguis grumulosus effluit: itaque accedit cibi fastidium, dolor in hypochondrijs, cum ventris tensione: pulsus debilis & frequentis: vires obestebatio, aurum tinnitus animi deliquis, & cognoscat.

Cum omne sanguinis profusum periculofum sit, ex eo quod sanguis est vite noxae telus: sit fluxus lochiorum immodicus magis periculosus est propter labores partus praegressos, a quibus factum est virium relaxatio. Maius autem, vel minus adest periculum pro maiori, vel minori sanguinis effluu, & symptomatibus leuioribus, aut grauioribus, quae illi superueniunt: vnde apud Hippocr. Aph. sect. 35. si mulieris profusus sanguis, aut animi deliquis superueniat, malum.

Curatio sanguinis fluxus immodici in illius cohibitione tota versatur. Summa tamen cautio adhibenda est, ne quod per huiusmodi purgamenta externi conuenit, intus recedat, & grauiorimum affectum causa euadat. Atque adeo si affectus non vehemens irgeat, si leuionibus incipendum erit, ad potentiora, si opus fuerit sensim progrediendo.

Ac primum sanguinis imperus cohibendus est alimentis incalescentibus, vt panatellis, gelatinis, oryza, amylo, cum lulis pedum vituli, pyris, & doings coctis, carnibus assis succo granatorum apertis.

Cibus paulo copiosior exhibearur non tamen vna vice, sed potius frequenter, cum hoc modo calor & spiritus qui expulsiorem in vtero adiuuant, ab vtero ad ventriculum, auocant, & vires iouaerunt. Vitelli oorum huic viti conueniunt: nam & iacile coquantur, & calorem ad ventriculum auocant.

Potus sit aqua ferrata, vel extinctionis auri, vel in qua parum mastiches bullierit. Deinde sanguinem ad partes superiores reuellentia remedia viupanda sunt, vt frictions & ligaturae partium superiorum, tucurbitulae sub mammis, & vtrique h. pochoindio admota.

Vite etiam est nimis louere in vino calente, in quo confectio alkerines vel theriaca dissoluta fuerit.

Tum etiam venter facilia mediocriter fringatur: quia hoc modo comprimatur vasa, & fluxus immodicus impeditur.

Lumbi admoventur linca oxycrato madafacta, quibus sanguis in vena causa contentus temperatur, illaque motus inhibetur.

Si fluxus valde immodicus sit, viresque deiciat, vt vite periculum imminuat: ad iortiora remedia confugendum est. Et inter alia frequens potio velpurum succedit.

¶ A quatuor plantag. naphae & rosae an. Vnc. j. syrup corall. vel illius decoctus de rosis sicca Vnc. i. i. alas prunellae Drach. j. saug. dracon 3. 6. fiat potio.

Si quatuor dures fluxus, puluis vel opiata ad plures doses praescribi potest in hunc modum.

¶ Lapidis hematitis 3. v. pul. boli armeni. coralli rubri, margarit. prepar. an. Drach. i. i. plant. coriandri prepar. & granor. sumach. ana 3. i. Muce. fiat puluis tenuissi-

mus, de quo capiat Dr. j. cum decocto centinodiae & syrupo cydoniorum.

¶ Conterat rosae & rad. symphyti an. Vnc. i. boli arm. trochisch. de carabe & corall. an. Drach. j. Cum syrupo corall. vel de rosis sicca fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem castaneae superbibendo parā aquae potusodinary.

Exterius vero lotus, & vnguentum vultus admouebuntur, quorum formula talis esse poterit.

¶ Summit. lentici rubri, plantag. cupressi, oliuae, & polygoni, ana M. s. rosae. rubr. p. ii. granor. nymr j i s. nucum cupressi sum. vi. corticum granat. p. ii. Coquantur in aqua chalybeata & vino rubro atringente, & colatura foueantur partes muliebres valde tepide & fere subfrigide.

¶ Vnguenti comestis Vnc. j. incci plantag. Vnc. j. Agitur simul, & fiat inuimentum, applicandum post foras.

Iniectio in vterum etiam potest fieri ex succo plantag. d Galeno laudato 5. meribis, vel decocto lotus praedicti.

Reliquis remediis non conserientibus, venaesectio in cubito praesentaneum est remedium, si paulatim & per quaedam intervalla sanguis educatur: sic enim multas deploretas conuulsive experientia docuit.

Ac denique perleuer ante affectu omnia remedia, quae pro fluxu mensium immodico sunt descripta, hic etiam conuincere poterant.

Iniecta remedia autem pro fluxu mensium immodico propolita habentur cacaplastmata regioni pubis, & lumborum applicanda quibus sequens adit poterit, fluxui praeteritum lochiorum immodico maxime conueniens.

¶ Pulguinis canini purissimae Vnc. viij. Subiugatur cū acceto fortissimo, & fiat cataplastma renibus applicandum.

De somno peculiariter hic annotandum, cum sanguis copiose effluit, cum esse penitus arcendum. Multae enim ex eo de medio tolluntur, quia calor ad interiora retrahitur maiorem fluxum efficit. Et si aliquando in concedendis sit aliquis ex munitis semper adebit debet, qui agrotantis pulsum & respirationem obseruet.

Denique si grumi sanguinis in vtero subsistant, ibique dolor & tensione exacerbanda operatur, vt maturae educantur, ne per rediem contrahentes, retros vapores transmittant ad cerebrum & cor, febremque conent. Ideo praeparati si vires lerant, seu deambulatione vti debet, vel erecta aliquando stare aut in leui periorata sedere, quasi vellet deicere. Quod si non sufficit decoctio hordei tepido cum pauco oxymentis, vel unelle rosaceo in vterum iniectio dissolendi sunt. Cautè tamen hic agendum est, ne dum grumi educantur, sanguis de nouo concutatur.

CAPVT XXIII

De suppressione lochiorum.

Bonus ac felix puerperij successus ex conuenienti lochiorum effluu praeipue dependet: quandoquidem impuritates, quae per nouem gestationis menses in venis vteri ac toto corpore colliguntur, per illas euacuationes expargi solent. Si vtero ille suppurantur, aut emittuntur, infinita mala & pericula inde oriuntur, nempe febres acutae, placentitis, manias, melancholia, angine, pleuritidis, peripneumonias, vteri inflammationes, & alia tumores vtpotimum maligni.

Causae istius suppressionis, aut immissionis sunt, sanguinis crassities, valorum angustia, vel obstructio, quae liberum effluxum impediunt: aer frigidus incaute in vtero susceptus, qui valorum officia confringit, refrigeratio pedum, & aquae frigidae potus, metus, terror, trauis, & alia animi pathemata, quae sanguinem ab vtero auerant.

Diagnos is fluxus suppressionis per se manifestae est. Imminuto vero ex quantitate sanguinis effluus desumendum non est, quandoquidem mulieres aliae plus, aliae minus sanguinis superflui habent. Sed integra illius cognitio ex symptomatibus superuenientibus elicitur, quia sunt, ventris intumescencia, dolor in um vterum, lumbos, & inguina occupans: faciei rubor, spirandi difficultas, oculorum perturbatio, rigores, febre, animi deliquia, & symptomata supra enumerata.

¶ Nucis molchat. anifi. cinam. an. 3. j. Mille, fiat pulvis, detur cum vino albo Vel olei nucis molchat. 3. j. cum iulculo exhibetur. Vel

¶ Nuculorum pulvis florum & perficorum, an 3. sem. nucis molchat. 3. j. pulvis diamarg. calidi 3. j. anifi. 3. cinam. 3. j. croci. 3. j. facchari ad pondus omnium. Fiat pulvis tenuissimus, cuius dentur 3. j. cum vino albo, bis aut ter in die, si virgeant dolores.

Forellis decoctum flor chamomil in cerevisia, vel decoctum artemisiz & chamomil in iure puli propinquat, scilicet succellu.

Præstat mox a partu ius galli veteris tribus diebus summo manē ieiunio stomacho, portigere cum modico cinamomi & croci.

Sequens pulvisulatio post partum impetus a terminibus marē præstat. Ita vt si primipara exhibetur, in fequentibus partibus nullo modo a dictis doloribus torqueri credatur.

¶ Rad. opifolia maior. excitate 3. j. nucleor. perficor. & nucis molch. an 3. j. succi 3. j. ambræ griseæ 3. sem. Fiat pulvis de quo capiat 3. cum vino albo: si febris adfuerit cum iulculo.

Pro potu ordinatio vtatur agra decocto artemisiz & cinamomi & croci.

Si a biliosis & acerbis humoribus termina generentur, eodem serē modo curantur, quo dolor colicus a bile. E.g.

¶ Symp. violat. borrag. an. 3. j. macil. de lem & ydionorum aqua viol. extracta 3. sem. aquæ borrag. corzonere. an. 3. iii. Mille, fiat iulep pro u. duobus Vel

¶ An. amygdalar. dulc. 3. j. symp. violat. 3. j. aquæ borrag. 3. sem. Mille, pro vino & iulep.

Extrema quoque medicamenta vias laxant & emollientia adhibeantur, que eadem opera dolorem sedant.

Intus post partum (sepe dolor exerceat in inguine, ex vtero in illo conglobato). Curatur admoventio vinibilibus emplastris ex galbano & alia fetida, in cuius medio granula quor. molchi ponantur.

CAPVT XXIV.

De morbis acutis puerperarum.

Quod supra de morbis acutis prægnantium diximus, id nunc de morbis acutis puerperarum possumus repetere, non aliam scilicet habere essentiam, aliamque diagnosis, dum non puerperas, ac etiam viros obident. Vt hic peculiariter eorum theoriam proponere non opus sit, quæ ex propriis capitibus facili desumitur generat.

Illi autem morbi acuti vixissimum sunt, febres continuæ, tum essentielles, vt fynochus putrida, tertiana continua, & reliquæ tum symptomatice, quæ inflammationes æternas, vt pleuritidis, peripneumoniam, hepatitis, phrenitidem, & alias comitantur.

Ei tamen peculiaris febris species, quæ omnibus propemodum puerperis contingit, *febris lactis* vulgo a mulieribus nominata, eaque critica terminatur, aut quartum puerperii diem accidere solet, cum lac in mammis copiosius generat incipit: oriturque ex sanguinis ab vtero ad mammæ relaxandis, quodque motu & agitatione. Quæ quidem febris inter ephemeras pluri, in diem recessit, neque vilis indiget remedijs, quia intra triduum, vel quadriduum, nempe circa nonum diem fuore soluitur. Distinguitur a putridis, quod tunc circa quartum diem inuadit, mamma lacte repleti incipiunt, & duntaxat dolore, ac calore afficitur cor dorsi, & scapularum grauitate & calore, tum puerperia recte fluunt, quod in putridis rarissime contingit.

Febres autem putridæ puerperis superuenientes a tribus causis oriuntur: nempe lochiorum suppuracione. ad immutationem, prauorum humorum congerie gestationis tempore cumulatæ, ac in partu agitata, aut diæte erronea. Nonnulli addunt lachum lochiorum inmodicum, qui potius signum est latentis cacochymie febrem excitantis, alius vero causa propria esse non potest.

In suppuracione lochiorum sanguis, & viscosi humores qui per gestationis decursum cumulatæ sunt, ad vires ma-

jores reurgunt, ibique putrescunt, & interdum ad hepaticam, aliaque partes feruntur, in quibus inflammationes concitant. Aut si in venis vteri moeuerit, putredinem concipiunt, atque ita febrem pariunt, etiam in ipso foetu, quæ antea incipiente valetudine fuit videbatur.

Si verò ritè fluentibus lochijs febris oritur, illa vel ex bilioso humorum apparatu, vel ex diæte erronea propanit. Præui humores ex partu laboribus, ac doloribus agitari, calorem, & putredinem facile concipiunt, febremque excitant. Duntaxat erroribus varijs modis coniungere possunt. Ac primum in videri, in quo puerpere plurimum peccare solent, pluribus & copiosis ferulis leue ingurgitantes, quæ sufficienter concoqui non possunt, & in corpore putredinem contrahunt. Alter error committitur, dum post partum frigido aceti sepe imprudenter exponunt, præcipue vigente febre ex lacte, quæ per sudores, & diaphoreticis solui consuevit. A frigore autem ambientis incantè admodum diaphoretis impeditur, modè fit vt febris illa, quæ per se salutatis erat, & paucis diebus cessatura, in perniciam periculosam mutetur.

Ei & alia causa satis frequens febris puerperarum, cum videlicet secundine integre non excluduntur, sed quedam illius portio iussu remanet. Id potissimum contingit in hepate vterico, cuius portio interdum vtero annexa relinquitur, quæ putrescit, unde lochia vtericæ, male olentia, & caduerosa promanant: & nullo intra paucos dies ab vtero separatur, & excluditur, in maximam vitæ discrimini agrosantem præcipiat, cum ipsi vtero sphacelum inducere valeat.

Si sanguinis grumi, vel aliud quid præternaturæ, post partum in vteri cavitatem remanent, illud inde dignosci potest, quod oritur vteri mollior & aperta remanet, nec internum illius orificium claudicet, neque fursum vterus retrahitur: cum omnibus ritè se habentibus post partum, vterus fortim trahatur, illiusque ceruix, atque orificium breui tempore claudantur. Huius rei experimentum proponitur ab Haruano tractatu de partu, de muliere, quæ febre maligna, cum summa vterum lactu laborans abortiuit: & post excisionem situs integri, atque incorrupti, post triduum tamen viribus cum pulu vermiculante, & lido tribus frigidis, moribunda videbatur. Ipse vero vteru explorans, eius orificium laxum, molle, & patientissimum deprehendit vna cum male olentibus lochijs: & digitis immittis malana, cuius asperit magnitudine, tormentibusque aliquot (astrum, videri, & turgentem posttrahentem in se habentibus), prædictam extraxit, statimque inde a prædictis symptomatibus liberata est, & breui coalescit.

Contingit etiam in nonnullis, orificium vteri statim a partu adeo colligari, vt detentus intra vterum sanguis subito grauemur, & putrescat, lætissimum iocundat symptomata, cumque nulla arte exus ei parari possit, præsentaneam mortem inierat. Refert tamen Haruanus loco citato historiam mulieris a se curatæ, cum tali affectu laboraret. Pudendi habita tumida erant, & feruida: orificium vteri durum, & clausum, ipse vero instrumentum lictico immisso per viam aliquantulum aperuit, vt iniectionem per sphincterem admitteret: indeque grumulosi, ater, & viscidus sanguis ad libras aliquot effluxit, cum præsentia agra leuauit.

Prognosis harum febrium in eo tantum differt a prognosi similium febrium, quæ non puerperis contingunt, quod ex laboribus partus vires sunt magis deiecit: & ex suppuracione lochiorum, maior est in venis humorum retardantia: & vtrique maius impendit periculo.

Ad prognosin etiam facit, & crides imprimis prænotandas, celeberrima illa quælibet, ac computatio dierum morbi debeat fieri a principio morbi, an a diæte partus. Cuius de cetero paucis stabilenda est in hunc modum. Si partus fuerit naturalis, nullis symptomatibus grauibz comitatus, et lochia optimè procedant, febris vero post aliquot dies accedat: computatio o debet fieri a diæte partus, sed a diæte febris, quæ ab aliqua alia causa, quæ præternaturali fuit concitata, nepe humoribus prauis intus latentibus, vel ab aliqua causa externa. Se vero partus fuerit difficilis, & præternaturalis, febris vero post tres aut quatuor dies oritur: computatur.

putandum est a dies partus: quia tunc caput totius corporis
aeconomia euerit, humorumque perturbatio fieri, quam
deinceps febris consequatur. Si in gradibus vulneribus, ca-
pius praesertim, licet febris non inadiat, nisi post quartum,
vel quintum diem: computato tamen fieri solet: & de acce-
pti vulneris, quia tunc temporis humores commoqui coe-
perunt: & ad febrem disponi.

Curatio aliarum febrium ab aliarum curationibus non
differat, nisi circa magna remedia, venae sectionem scilicet &
purgationem, in quarum administratione non exigua est
difficultas, quam tamen nos breuiter diluere conabimur.

Quod ad venae sectionem spectat, in acutus puerperarum
afflictibus celebranda, tanta est Autorum dissensio, pro-
pter pugnantem in vicem indicationem, vt vix duo reperian-
tur, qui in eadem omnino sententiam coeant. Nos eam quae
ad lapientiorum mentem magis accedit, & in usu practico
saepe succedit, omitti ambagibus, sequentibus theore-
maticis hic proponemus.

Morbus acutus puerperarum aggreditur, vel in principio
partus, vel in medio, vel in fine.

Si contingat in principio, & mulier copiose purgetur,
nulla alia tentanda est sanguinis euacuatio, quam quae
a natura recte & conuenienter optante dirigitur. Si vero lo-
chiorum expurgatio supprimatur, aut minuat, secuntur
venae inferiores & copiose sanguis mittatur, quoniam tunc
temporis copia esse debet ex praescripto naturae, lochio-
rum euacuatio.

Si medio tempore morbus acutus superueniat, duo
consideranda sunt. Vnum, an materia morbifica in vno loco
particulari contineatur, & conculcetur: aut sit per venas di-
spersa. Alterum, an mulier conuenienter expurgetur men-
strua vel non. Si morbus fiat a materia parua, vt in febris, &
mulier non perfecte purgetur, venae inferiores aperiri de-
bent: quia & materia morbifica minuetur, & naturalis flu-
xus prouocabitur. Si vero mulier sufficienter expurgetur,
morbusque inualescat, nec euacuatio naturalis morbo sa-
tisfaciat: venae inferiores etiam aperiendae sunt, tantumque
destruendae, vt ex duabus euacuationibus perficiatur,
quod morbus exigit, vt docuit Gal. *meth. cap. 5.*

Si febris admodum incerta, magnumque incendium ad-
fuerit, id fiat quod in morbo a materia in loco particulari
conculcata, & putrescente agendum esse iam dicturi su-
mus.

In morbo acuto particulari, vt pleuritide, peripneumo-
nia, angina & similibus, aduertendum est, an fluxio tantum
fieri incipiat, ita vt morbus sit tantum imminens, vel inci-
piens, & pericula sanguinis quantitas in parte collecta sit.
Tunc enim venae inferiores aperiendae sunt, vt resouitioe ta-
cta ad opposita distantissima praeposterus ille humorum
motus inhibeatur. Si vero iam bona ex parte fluxio facta
sit, & inflammatio genita, eaque valde virget, siue mulier
expurgetur sufficienter, siue non: statim venae superiores
aperiendae sunt & directio partis affectae, quia talis euacu-
rio a parte affecta sanguinem educit. At si venae inferiores
aperiantur, quae nec proxima sunt parti affectae, nec ab ea
euacuare possunt: & virtus ad euacuationem labefactabitur, &
mulier in loco particulari conculcata non minuetur. Atque
ita vel totum fere sanguinem educes, ad reuellendam ma-
teriam morbiticam a parte affecta: vel prius mulier a
morbo perimetur, quam facta fuerit resouitio sufficiens.

Neque metuendum est, misso sanguine a venis superioribus,
ne retrahatur sanguis ab vero, quia in illis calibus partes
superiores sanguine abundat. Et quamuis multus extraha-
tur, non ita maluitur venae, vt aliunde nouum sanguinem
attrahere cogatur. Ad maiorem tamen cautelam, non
erit inutile, antequam sanguis mittatur, frictions celebra-
re in cruribus, & consequenter ligaturas dolens facere
in medio ipsorum, quae detraherentur donec massae fuerit
sanguis, & paulo post venae sectionem soluantur: ac subin-
de cucurbitulas iidem modis applicare, vel saltem fri-
ctions repetere. Hinc habere poterimus materiam peccantis
educcionem, & nauis illius conseruationem.

Istem sciendum est in febribus ardentibus & vehemen-
tibus. Quia licet in materia sit ipsa, attamen incendium
tantum est circa cor & viscera, vt minor & longinquae ve-
nae apertione non ita exiguus possit, sicut proximae & mai-
oris, qualis est basilica.

Hae curandi methodus, non solum in puerperis sed etiam
in reliquis mulieribus morbo acuto correptis, & mensuratis
purgationis parantibus obferuari potest.

Si in fine puerperii morbus acutus incidit, idem agen-
dum est vt in medio: quod conditionibus obferuatis: hoc
animaduertit, vt quo magis distat mulier a principio, eo tu-
tius venae superiores aperiri valeant: quo autem illa vicini-
or est, etiam medio tempore, id ipsum maiori cum pra-
meditatione exequamur. Et si morbus non inflet, neque
virget illius acuties, ac naturalis expurgatio copiosa fuerit,
propterea abstinemus. Si vero purgatio fuerit imminuta, ve-
nas inferiores ad supplementum debere quantitatis, scabimus.
Si tamen oppositum contigerit, seruetur id, quod vir-
gente acuto morbo agendum esse diximus.

Purgationis vero vius in puerperis morbo acuto corre-
ptis, sequentibus concluditur theorematibus.

Dum lochia naturaliter profuunt, vnaquam purgatio
administranda est: periculum enim est, ne ab opere suo na-
tura diuertatur.

Si vero puerperia praeter naturam se habeant, conside-
randum est, an quantitate peccent, vel qualitate.

Si quantitate peccauerint, eaque imminuta: & mulier vel
omnino nihil, vel insufficienter purgetur: postquam omnia
remedia promouenda huiusmodi purgamentis idonea,
frustra virgata sunt, & materia morbifica concocta appa-
ret, transactio octo, decem vel duodecim diebus a partu, se-
cundum maiorem vel minorem morbi virgentiam, leuiori
pharmaco purgatio institui poterit, & vehementibus
propterea abstinendo.

Si lochia qualitate peccent, ita vt fluxio alba vel alte-
rius coloris non naturalis prodierit, cocta existente ma-
teria, vitium puerperii tempore tuto purgatio admini-
strabitur.

In genere autem hoc perpetuo obferuandum, quo lon-
gius puerpera distat a die partus, eo tutius medicamentum
purgans posse administrari, & contra. Nam experientia do-
cet, mulieres purgamentorum suppressiones laborantes,
si post septimum aut nouum diem alius fluxus contripiantur,
vtriplurimum liberari. Si vero primis diebus, videlicet secun-
do, tertio vel quarto diarrhoea acciderit, vtriplurimum inte-
rere.

A quo ita (Deo sit laus & honor) affectum mulierum
curationes absolutae sunt.

P R A X E O S M E D I C Æ

LIBER DECIMVS SEXTVS

De affectibus Articulorum, & Rheumatismo.

P R Æ F A T I O.



Let omnes articulos affectus ab ijsdem causis dependere, & variis tantum, et affectus inter se differant, ijsdemque remedijs curari soleant; non nullas tamen reperitur differentia inter ijsdem & aliorum articulos dolores, ab parte in ijs articulis componentium structuram & amplitudinem: cuius ratione quondam in novellis remedijs diversitatem obtinet: deo scilicet de dolore ijschiodico agere constatimus. Et quia rheumatismus cum art. ijschiodico magis habet affinitatem, illius ideo ex positionem hoc in loco adducere volui est. Atque adeo labor istis tribus absolutis capitibus, quorum primum erat de arthritide secundum de dolore ijschiodico: tertium de rheumatismo.

C A P V T P R I M V M.

De Arthritide.

Arthritidis est dolor articulos ex intervalis ferè invadens ab humorum influxu excitatus.

Partes dolore affectæ sunt membranae tendines, nervi, omnesque partes nervosæ articulis vicinæ, quæ ab humore in eas influente distenduntur, vel ab eadem acrimonia punguntur & vellicantur. Ligamenta verò ab ossibus occurrentibus expertia sunt. Rarò autem humor ex arthritidem efficiens in ipsos articulos causatus influunt, nec nisi in affectu distensum perferente, & ubi anspores sunt capacitates, ut in dolore ijschiodico diuturno, in quo nonnunquam os femoris excidit, laevi ligaments, alijsque partibus articulum connectentibus: & tunc articuli causis rursus pituita repletur, ut est apud Hippocr. Aphorismo 1. §. 6.

Quæritur hoc in loco, cur ab humoribus in partes nervosas & membranulas influentibus, easque distendentibus aut vellicantibus, non fiat consilium. Respondemus, partes, quæ in arthritide magis afficiuntur, esse membranulas, quæ cum motui nullo modo intersunt, consilium non efficere non possunt, quantumvis distendantur, aut vellicantur. Licet autem tendines & nervi motui dicantur etiam dolore afficiantur, consilium tamen non parant: quia ut fiat consilium debent musculi retrahi versus suum principium, & illa retractio debet fieri per contractionem nervorum, qui in eos inseruntur: quando verò musculi egressi sunt, aut ad extremitatem eorum perueniunt, licet distendantur, musculi contrahere non possunt.

Quatuor arthritidis differentia ab authoribus vulgò constituantur, ex diversis articulis affectis repetitæ: chitagra, cum manuum dolor occupaverit, cum coxendicem iunxit: gonagra, cum genua & podagra, cum pedes humiliori dolore afficiuntur. Reliquorum verò articulos dolores generico arthritidis nomine donantur: licet Parvus propriè in nomina impolletit, si partibus affectis d: lumbrici: dolorem in maxilla articuli resistentem, si gonagram appellans: in cervice, trachelagram, in spina dorsa, chylagram, in humero, homogram: in cubito, pochagram. Sed illæ nomina clarescere in viam medicum relata non solum. Ideo sufficit aliarum partium dolores ad commune, & genericum arthritidis nomen referre.

Aliæ præter dantur arthritidis differentia, quod alia sit generalis, omnes aut saltem plerumque corporis articulos occupans: alia particularis, ubi tantum articulus inhu-

rensalia infusa, & congenita, a parentibus hereditario iure contracta: alia adveniens, a causis externis & erroribus in victu commissis inducitur.

Humores autem arthritidem efficiences, non solum in articulis, sed etiam interdum in alijs partibus, ut caput, dentes, lacrimas & partes internas, ut locur & lienem, influere possunt, in ijsque varios dolores excitare, qui tamen arthritici dicendi non sunt, quævis à materia arthritidem efficiente generentur.

Omnes autem dolores articulos occupantes arthritidis nomen non merentur: sunt enim interdum tumores in articulis, præcipue in genibus, a quibus etiam dolores excitantur, ab humoribus crassis, pituitosis & melancholicis profecti, & diutissime perseverantes, qui ad dolores arthriticos non referuntur, sed diversam omnino naturam sortiuntur. Quæ diversitas ex peculiaribus arthritidis characteribus in diagnosi discernendis, clarius innoteſcet.

Causa proxima & immediata arthritidis est humor scroſus, sua vel quantitate partes feniles articulos ambiens distendens, vel acrimonia velicans. Scroſum esse illam materiam modo colligitur, quod humores crassiores in articulos tam facile colluere non possunt, & tumorem in articulo magis conspicuum efficiunt, qui perexiguus esse solet, imò verò in principio nullus apparet, licet dolor acerbissimus exciteatur: adde quod ille tumor nunquam suppuratur, quod alijs humoribus crassioribus sepe contingit, si tantillum sanguinis fecum admixtum habeat. In arthritide autem sanguis ad articulos attrahitur, qui ex inflammatione partis innoteſcit: nunquam tamen suppuratio contingit, propter feri predominium, quod suppuratio resistit.

Illud autem serum rarò purum atque syncretum est, sed alios humores, aut ichores eorum fecum admixtos habet: vnde diversitas insignis oritur, pro maiori vel minori humorum permixtione acrimonia, a quibus maior vel minor dolor exciteatur. Tumor aliquando est notabilis magnitudinis, aliquando vix apparet: color alius est rubicundus, alius flauus, alius albus: in quibusdam malum cito soluitur, in alijs longius protrahitur: interdum caliditas ingens & fervor partem affectam occupat, alias nulla aut perexigua apparet: quandoque calida admota profunt, alias vero non, & frigida conferunt. Negandum tamen non esse, serum per se maiorem vel minorem acrimoniam habere, propterea magis vel minus salis fecum admixtum habet: cum enim serum salis heterogenea, quæ ex alimentis in corpore cumulantur, dissolvitur, & in seſe recipere solet, (hinc omne serum salum est,) propterea maior, vel minor salis copia in eo recipitur, & propterea illa maiorem vel minorem acrimoniam obtinent, maior vel minor dolor exciteatur consequitur.

Quia vero in arthritide quemadmodum in omni fluxione, quatuor considerantur, materia fluens, pars mandans, pars recipiens, & via per quas fit fluxio: postquam materiam fluentem expolimus, de reliquis est agendum.

De parte mandante est aliqua dissensio. Feremus omnem arthritidis materiam, quam pituitosam, & tenuem esse vult, a capite eluere existimat. Non quidem a cerebro igitur, cuius excrementa vel per nares excreantur, vel per palatum effluentia, ad osses, lacrimas, asperam arteriam, aut ventriculum propellantur: sed ab externis capitis partibus, & extra calvariam positis. Cum enim vena quamplurime ab externis iugularibus deducta excurrant, excrementa sua tenuia ac scroſa ibi deponere solent, & cum capitis cutis crassa denaque sit, & humores per eam facile non exirent, tempore progressu ibi cumulari: &

per

per summa corporis sub cute ad articulos defluere existit. Alii verò caput quidem fluxionis arthriticae originem agnoscunt, sed à partibus illius interioribus, cerebro nimirum effluere censent. Alii denique à visceribus in imo ventre contentis, parit hepate, & liene, vtero, aliisque, tum etiam à toto corpore, humores illos novos per venas & arterias in articulos defluere pronuntiant. Quæ omnes sententiæ, meo quidem iudicio, ex parte veræ sunt, ex parte verò falsæ. Veras esse censemus in eo, quod humores arthritici defluunt committentes, à capite per internas & externas partes, & à visceribus, torquæ corpore per venas & arterias defluere pronuntiant. Falsas verò aliterum in eo, quod vel folas capitis partes externas, vel internas tantum, vel sola viscera interiora materiam arthritidis suppeditare voluerunt. Cum enim totum corpus confusum sit, possunt omnes partes humores superfluos ad articulos transmittere, si illi eorum receptioni dispositi sint. Dispositio autem articulorum, humoribus illis recipiendis idonea, vt partes recipientes conditionem hic data occasione explicemus: est eorumdem imbecillitas, vel nativæ à parentibus iure, hereditario contractæ, vel ætatis à causis præternaturalibus infirmas exponendis, oriunda. Cum igitur certissimum theorematum ab omnibus Medicis receptissimum sancitum sit, partes robustiores excrementa sua deponere in debiores, asserendum est omnes partes prædictas superfluitatibus suis in articulos posse deponere, si illi imbecilliores facti sufficienter resistere nequeant. Et vt vigilanti opinio prædictæ confirmetur: Fœtus quidem facti perspicue ostendere videtur humorem extra calvariam collectum per summa corporis, & sub cute in articulos defluere, cum interdum dolor in capite incipiat, inde ad cervicem, humeros, at tandem in articulos excurrit. Sed nusquam ab aliis locis, aliisque partibus humores in articulos deferri, nullo modo probat, neque vilius potest ipsum probare poterit. Sci etiam qui à solo cerebro fluxiones humifmodi fieri dicunt, contra sensum pugnare videntur. Cum enim partes articulos ambientes, venas & arterias recipient, per quas sanguis nutritionis causa ad eas transferatur: quidni etiam ferofus humor in maioribus vasculis collectus ad easdem partes per easdem vias deferri poterit? Hoc docuit præsertim Gal. *en. Aphor. sect. 3.* Vbi docet in tuberculis & doloribus articuloꝝ profundum corporis expurgari, vitiosos humoribus à partibus principalibus ad ambitum corporis protrusis. Hoc etiam offendit febri quæ in arthritidis principio sæpe excitari solet: fit enim illa à ferola illius in venis contenta & commota, acq. ebulliente quodam natura, ad illius exfluxionem fere accingit: & cum foras omnino eam transmittere nequeat, ad partes ignobiliores & debiores deponit. Tertia verò sententia, quam Serapentes defendit, à ratione etiam aliena est: & in eo peccat, quod nunquam à cerebro fluxiones podagricas fieri contendit. Cum enim ad omnes alias partes, tum internas, tum externas, fluxiones à cerebro decumbant, quomodo articuli ab his poterunt esse immunes? Et si humores catarrhum efficiētes per venas & arterias defluunt non raro, unde febres catarrhales passim oriuntur, humores verò in venis, & arteriis contenti (vt ipse Sermentus asserit) ad articulos facili conflunt: demonstrativè concluditur, fluxionem fieri à cerebro per venas, offendit copiola vrinarum profusa, quæ fit non raro, cerebro ab insano, aut nimio frigore commoto: tunc enim humores ferofi in cerebro collecti agitantur à causis illis procatarrhics, & ad venas arteriaque propelluntur: per quas ad renes & vesicam conflunt, unde copiosa illa vrina promanat.

Caula interna proxima & immediata arthritidis sufficienter hædum expofita: iam ad caulas externas & protractatias tranfeundum eft: quas in tres claffes, clarioris doctrinæ gratia diftribuire poterimus. Prima eft eorum, quæ materiam generande arthritidis idoneam fuppeditant. Secunda eorum, quæ articulos debilitant & relaxant. Tertia denique eorum, quæ humores morbiſici affluxum ad articulos promouent.

Ad primam classem referantur, quæcunque crudorum ac feroforum humorum, omnique cochyne præuentum adiuuare possunt, vt alimenta crassa, & concocti difficilia.

ne valde excrementitia: crapula, & ebrietas frequens: ve-
nus immoderata, unde arthritis Bacchi & Veneris filia di-
citur: orum & viri sedentaria, ac consoletarum & exerci-
tationum intermissio: somnus longior, vigilie intempestivae:
evacuacionum consoletarum siue naturalium, siue artifi-
cialium intermissio: metus, tristitia, & sollicitudo diutur-
na.

Ad secundam classem referuntur, labor & motus vehemens; veneris usus frequens, illius praesertim, quae corpore erecto exercetur; articulorum refrigeratio & humectatio; balneatio frequens; articulorum contusio, luxatio, fractura.

Ad tertiam classem referuntur, ac frigidus humores exprimens, et calor eisdem fundens ac liquans et exagrans, meatulque aperiens: cibi acres et salii humores attenuantes, vinum tenue ac generosum, exercitium immodicum, venus effrenata, ira vehemens, aliaque animi pathemata immoderata.

Signa diagnostica alia imminentem, alia praesentem arthritidem significant.

Innominatus signa sunt: sensus in articulis solito exquisitior, ut & leuissima causa ledantur, patet, notum calcei compressione, ambulatio longa, vel leui alioque ictu, aut ad lapidem aliudve corpus durissimum illisio. Febris peritumque arthritidis quiescentem antecedit, quæ fita leuissimis humoribus, siquæ in eos & artibus contentis, commotis & exagitatis, dum natura eos ad partes illas ignobiliores expellet nititur. Viciniorem verò arthritidis insulsum, & quasi incipientem significant, torpor & formicationis sensus in articulis, & quædam in iis feruor præter consuetudinem inuadens.

Præteritum arthritidem significat dolor cum actu articulum excrucians, quem plerumque tumor, et rubor comitatur: et si statim a principio non appareat, paulo post saltem excitatur. Pedis pollicem, et præcipue sinistrum dolor frequenter inuadit, et ad alios articulos non raro postmodum et porrigitur. Febris ante dolorem apparet interdum perseverat: interdum non antecedit, sed cum dolore inuadit.

• Signa caularum etiam aduertenda sunt. Licet enim humor arthritidem efficiens a praedominio ferofus fit, aliorum tamen humorum cum ferro permixtorum notitia necessaria est, vt iis remedia aptari valeant.

Ac primum bilem cum ferro redundantem significant, dolor vellemens & lancinans, tumor exiguus, color subrubescens aut subpalidus, calor magnus, & febris in statu peruerans, febris intensæ, urina tenuis, illa, & subrubra, auxilium à frigida, lætio à calidis.

• Pictiuz cum lero redundantis signa sunt, tumor paritum affectarum subluxus, qui impreffis digitis foueam relinquit: dolor minus acerbos, vrinae craffe ac perturbatae, leffo a frigidis, auxilium a calidis, calor fere nullus, color albus a naturali parum recedens.

Melancholizae redundantis signa sunt color partis obcurus ad liuorem tendens, dolor profundus, vrina tenuis & aquosa, lassitudo totius corporis, eiusdemque temperamentum ad melancholicum accedens.

Quod ad prognosim attinet. Arthritis periculosa effusio dolorum vehementia mollicissima, et duratio contumacissima, ut tota vita plerumque perferatur, atroxque ad sequestrum comitari solet, iam verò longevitatem nonnullis conciliet, ex eo quod natura humores vitiosos, ex quibus alij morbi periculosiores generari poterant, ad articulos per certa intervalla propellit: sique partes nobiliores à pravis humoribus liberat.

Contingit tamen non raro in corporibus debilitioribus, vel iam fenio confectis, vt quando natura humores noxios itius coacturos expellere non valet, morbi inde lethales oriuntur: vt febres acutiffime, vifcerum inflammationes, apoplexie, conuulfiones, phrenitides, orthopnoeae, cordis palpitaciones, aliq; grauiffim affeetus.

Licet diathefis arthritica visceribus penitissimè infixæ, de
natura articulari imbecillitas radicis extirpari nequeat :
possunt tamen arthritidis insulsi maxime retardari : ita
ut nonnulli sola vini abstinence, alij purgationibus visceribus

bus frequentius iteratis per multos annos lese ab arthriticis doloribus seruauerunt. Hippocr. *Proorrh.* multos arthriticis conuari posse affirmat, coliq; ab illis qui iam non possunt, distinguunt his verbis. *De podagra hoc dicitur: quoniam non omnes sunt aut circa articulos callos tephaces habent aut arummati vniu, sicam aliam habent; ut omnes fari heri non p. sunt humana arte, quantum ego noui, sanas quidem hos, quippe dynteria, si superuenit: Sed & alia requiruntur valde pro utique ad in ferens leues reput. Quia vero inueni effi, & circa articulos non dum callos habet concretos, & acutus vniu, & laboris amans effi, & alium bonam habet ad obediendum pro sudorem ratione: hoc fano Medicum intelligentem natius, sanare poterit.*

Infallibili etiam arthritidis merito ea annumerari debet, quæ hereditaria est.

Si podagricis varices superueniant, soluitur podagra, ex Auicenna. Quia humores ad articulos fluere conantur ad exteriores crassas partes deriuantur.

Si arthritidis suas periodos seruare consuevit non reuertatur, grauioribus & sepe ictualis morbos potendit, nisi materia morbifica diligenter prophylaxi sublata fuerit. Si enim ob debilitatem naturæ materia intus cumulatæ non expellatur, maximos morbos & periculosissimos producit.

Quibusque morbi podagrici sunt, si neda in 40. diebus infammatione, immutat. Hipp. *Aphor.* 49. 1. 6. In paribus enim exiguo calore prædixi inactia, in uibica non nisi longo tempore diutius potest. Cetera tamen & perpetua non est illa periodos ab Hippo proposita: nemini enim citius, alij tardius sanantur: quod dependet ex materiae morbificæ quantitate, crassitie, vel consuetudine: partium affectuum robore aut imbecillitate, & agrotum obsequio in v. citius remedium administratio.

Omnis arthritidis curatio in eo consistit, vt humores ad articulos influxus inhebarer: qui iam intus ita æquiliis inhearet, submoueat: & dolor interminis æquiliis succedat, leniatur. Quæ omnia sequentibus remedijs præstari poterunt.

Ac primum sanguinis detractio est conuenientissima, si illius penuria non addi: & humor pituitosus non abundet: quia ab humoris in articulis fluxibus motu sanguis exagitat, & quasi ebullit, & a dolore in partem affectam attrahitur, idcirco resoluendo, vel citius est, quæ hic ex opposito partis affectuque ad, o. si barbare de trum afficiatur, in finitro vena leuanti de qua per labore vena dextri brachij aperienda. Idem quoque de brachio & pede finitro dicendum. Est autem sanguis derahendus latius ab ipso morbi initio, & quantum opus est diu reserari: vnicæ vice derahendum sin minus, ut citius vbi, ubi donec plenitudini sit restitutum.

Hoc præ oculis semper habendum est, quæ copiosam sanguinis detractio in ipis qui illam facili terere possunt, morbum maxime abbreuiat, si itam ab initio celebretur, aut partem saltem viciat.

Purgatio etiam quam primum, & in ipso paroxysmi initio instituida est: hic enim fluxus & fluxus humor ad articulos vix auocatur, & ad iustitiam attrahitur. In ista autem purgatione duo notari digna obserua sunt, a Solennitudo, practico insignis prænotata.

Primum est vt purgatio illa fiat non blandiori aliquo, & leniente medicamento, quia humores magis commouentur quam euacuantur, & in articulos precipitantur, unde dolor & tumor acerbior ipsi spe fore succedere: sed aliquo ex fortioribus, quod humorem commoueat euacuet, & ab articulis auertat. Alterum est, vt exhibitio medicamento arqua supra genus, & cubitos obvoluantur aliquo defensivo, quo humor fluens, si quas assumptum medicamento commouet, est interceptus, vt manus minoreque impetu in articulos decumbat.

In cum vsum ex bolo, malicorio, balsamitis, radicibus bifloræ, vel tormentillæ, rosæ, cum albamine oui & aceto conficit vnguentum, idque inductum tempus seu falsip palmum, latis & medicis longis supra dictis locis obvoluit, Si nec illa ad manus sunt, simplicis polæ confectis circumdat, atque, quod minimè est, diem totum relinquit. Vbi au-

tem fluxio est vehemens, falsie inducit linimentum ex boloylangue, draconis, albuine oui, & oleo rolat, omphacino, vel prius fine oleo compositum, cui ne fit calidum & iadatum doloribus exciet, partium olei prædicti, aut vnguenti comicis addendum erit.

Ad haec autem purgationem exequendam, præscribitur a petito Medico medicamentum a grotantis nature, & humoribus in toto corpore redundantibus accommodatum, vel aliquod ex prædictis purgantibus, quæ in prælationibus proponuntur.

Euaquatio quæ fit per vomitum hic etiam utilis est in iis qui facili vomunt: quia breuiore via humores euacuat, aquæ adeo non ita metu est vt ad partem affectam ruant. Blanda autem vomitoria exhibenda sunt, quæ tantum partes ventriculo vicinas euacuant, si enim vehementia sint, & a venis attrahant humores, eisdem ad articulos precipitare poterunt. Tunc potius vomitiones purgatio per inferiora etiam molenda est: imò si vicia non sufficiant, erit iteranda.

Potius sufficientem purgationem, sudorem prouocatio: in hoc conferre poterit: sic enim leuata materia per habitum corporis discutitur. Verum cum in arthritidis inuasionem, fiat quasi quedam ebullitio, & plenitudo: febris adfit, & alia iudicia non conuenient, led tantum temperata ex quibus commendat. Semper ut conueniat, vel crudum, vel sine vitione præparatum, aut iolum, aut cum aqua cardui benedictum, etiam antimonij diaphoreticum. In affectu diuturno etiam fibre decoctum chire, falsie parilla, aut falsip potest exhiberi, & herba refrigerantibus, vt cythorionidum, acetula, borragine alterari. Vel solummodo post deterium sudorem, sulculum puli prædictus alterari afformatur.

Martius Ruandus sequenti sudorifico vix est sollicitus, & Summus, entaurum, m. m. rad. alban Vncij. Bullant in aqua f. s. ad medietatem, coletur. Capiat vnc. viij. cada mane per aliquot dies & fudet.

Forellus vno laudar decoctum radicis bardanæ, seu lappe, maioris, quod in idat, discutiat, sudores & vnius moueat. Refert, quædam arthriticum in lecto decubentem, vt nullum membrum mouere possit, bibile cereuiciam calidam, quæ radix lappe maioris cocta erant: quæ, epota, cum nullis remedijs a Medicis curari poterat, plurimam vix alba infusa lactis, & adolentibus liberata fuit.

Hercules Saxonia panis recentis & iumo extracti decem aut duodecim ordines, secundum omnem corporis circumferentiam admovent, quibus sudor copiose prouocatur, & dolores aueruntur.

Conuenit etiam non parum stupida humida ex decocto ebuli lauris, salus, oris marini, & similibus cum vino albo parata: vt illius decocto iunum recipiat æger in dolio a vnde copiosus sudor exeat ut.

Aque etiam theriacales balnei sudores prouocant, & materiam in articulis contentam promptè discutunt. Idcirco cum ægri cas adire nequeant, aqua carum transferri solet, & in lebetæ calefieri probaleone. Erasius con, 15. hoc reliquis præfert ad mitigandos dolores in aqua tantam falsie incoquit, vt gultus clare falsedinem percipiat.

In principio illius, temporibus vacuationum intermedijs, quæ tam fittant, & habenda sunt, quæ sunt, in calidi catarrhi curatione propostia sunt: præcipue verò in, lepre æquis, vel decoctis & lyupis refrigerantibus & incassantibus.

Imo vero interdum necessitate vrgente narcotica exhibenda sunt, nam & fluxionem fittant, & dolorem atrocem mitigant. Ex his theriaca recens erit opportunissima, & leperiterati poterit sine periculo ad 3. s. vel 5. i. Cui vult, ad fluxionem cohædendam, tantillum boli admisceri poterit. Huus tamen loco laudandum opiatum, aliaque narcotica substituere non erit inconueniens.

Post debitas euacuationes celebratas, aliaque interna exhibita, quæ causam antecedentem relapsum: ad topica deueniendum est, quæ dolorem demulcent & causam conuanciam discutunt. Quæ itam vix peranda non sunt, antequam vnauersa falsie prædicta præmia fuerint, aliquo plus damni, quam commodi afferre soleant. Vel enim malet, a

quam

Catellus viuis parti laboranti admodum dolore valde plemet.

Dolore admodum feruiente ad narcotica licet confugere quamuis ea diu in parte retinenda non sunt, cum calido natu & neruis fit amica.

¶ Folij hyocyami M.ij. folij imperiui, ana M.ij. capitum papaueris horrenfis P.ij. rad. madragore ʒ.ij. floram chamem. violar. ana P.ij. Fiat decoctio in aqua vel lacte, aqua foueatur locus.

Residentia pilulæ addendo farinæ sem. lini ʒ.ij. ʒ. farinæ tritici ʒ. iij. ol. chamem. n. ʒ. iij. Fiat cataplasma.

¶ Spiritus vini per croci infusionem flouescens vnc. ij. camphoræ ʒ. i. bulliant parum. Deinde dissolue opij ʒ. i. Eoque liquore pars dolens illinatur. Tutum & efficacissimum est remedium.

Folia nicotianæ recentia, contrita & admodum dolore arthrico sedant, & vni quondam narcoticum obducere dicuntur.

Causam verò dolore effcientem quod attinet, sistenti in partem debent repellenda: si uice uero deriuantia, & resoluenda.

Attamen repellentia hic improbantur, saltem sola, & sine aliorum persuasione adiubita. Nam si humorum in partem influxum omnino impediunt, metus est ne illi ad partes internas retrocedentes periculosos affectus inducant, nisi ad aliquem alium articulum transierant. Adde quod humor in influxu ad partem intus impingitur, unde dolores acerbiores excitantur. Attamen si maximus influxus fiat humorum, precipue calidorum, affluxus, ex quo doloris acerbitas metuenda fit, eum quadam tenus reprimere conueniet, admodum repellentibus non solis, sed cum anodynis permixtis, post vniuersales & sufficientes euacuationes. Tunc enim nimis laxata humorum affluxum promouent. Itaque prædictis cataplasmaris, aliisque remedijs, plantagin. iactucam, portulac. cam. superuicium, & similia addere licet, vt & aceti tantillum. Exempli gratia.

¶ Farina hordei ʒ. iij. Coque in oxycrato, adde vitellos ouor. n. ij. croci Drach. ʒ. Fiat cataplasma. Vel

¶ Ros. rubr. M. ʒ. fabar hor. & fougur. ana ʒ. i. fantali rub. ʒ. ij. ol. chamem. P. i. Coctis & contritis addantur vitelli ouor. n. ij. aceti ʒ. iij. ol. rosacei ʒ. i. Fiat cataplasma.

Inter deriuantia remedia locum habent hirudines, parti dolenti admotæ, post sufficienter euacuatum corpus: tunc enim valde prosunt, præsertim cum vena in parte affecta distente, & sanguine turgida apparent.

Resoluenda vero medicamenta sub varijs formis vniuersali solent, aquæ nimirum, olei, vnguenti, balsami, fomenti, suffusis, cataplasmaris, emplastris, & similibus, in sequentem modum composita.

¶ Vitrioli albi & viridis, ana ʒ. j. camphoræ ʒ. ii. aque vitæ & vini albi an. ʒ. j. Misceantur, atque cum iocundis pannis applicentur. Vel
In vrina calx viua extinguitur, & cum ea per residentiam aut colaturam deputata, locus dolens foueatur. Idem ex calce & aceto factum probatur.

Martini Rulandi in centurijs suarum curationum, æquum suam antipodagricam mirè prædicat, cuius descriptionem nunquam proposuit. Eam autem ita se habere existimant Libanij, Petrus alijque.

¶ Aquæ fontis th. i. aquæ fontis ʒ. ʒ. sublimati ʒ. i. Bulliant per hore quadratam. Hoc liquore panni linei madefacti partibus dolentibus tepide applicentur.

Quercetanus in Pharmacopœa sequentes proponit.

¶ Muris. salis, & vrinæ putræ, ana partes equales. Diffilientur, & aqua foueantur partes cũ linteis, sæpe renouandis.

¶ Folior. & flor. sambuci viridum, an ʒ. j. Contundantur & maceantur in aqua vite, idque per duos dies vellent. Diffilientur per vas vitreum vel cupreum ad siccitatem.

¶ Spiritus vini rectificati ʒ. ʒ. mellis purissimi th. Diffilientur in balneo vaporoso Sic duos distillabiles liquores. Primus est aquæ Secundus multo fortior, & sulphureus, quæ scoriis reliqua. Magnati vix remanent adde croci orisipalis integri ʒ. j. sem. cerebithinæ Venetæ ʒ. ii. calthori ʒ. ʒ. ʒ.

tartari ad albedinem calcinati ʒ. ʒ. sem. falsi fusi ʒ. i. phlegm. a. vitrioli a. suo spiritui non separati ʒ. iij. luxui larnetur corum th. i. Maceantur per xiv horas. Deinde diffilientur ad siccitatem. Liquor qui inde emanat, leruetur etiam ferorim. Fecibus remanentibus affunde perietur etiam remanentia Maceantur & diffilientur. Tandem omnes liquores distillatos melle, & denuo per balneum vaporum distillata. Hanc dicit Quercetanus esse miræ facultatis, & sibi communicatam à quodam Germano celeberrimo, tanquam singulare doctum, asseruisse hanc esse ipsam aquam Martini Rulandi. Scire eximus illius effectus vidisse restatur in sedandis arthriticis doloribus, si intercola in eandem mediocriter calefacta & demerita membro dolenti applicentur.

Idem Quercetanus in consilio de arthritide, gloriatu se sibi referre aquam suam antipodagricam, tanquam veterano militi aliquod æthetici artificij. Quam dicit fieri ex aqua fontana simplici, in qua iteratè & aliquoties extinguit quædam metalla, cui addit duos substantias metallicas, quæ vel per os intè præparatæ dari solent: quarum spiritus impressi in aqua prædicta, vim et tribuunt penetrandi ad radices vique morbi, atque vix resoluendi, & attenuandi materias tartareas, gypseas atque sales in iuncturis concretos, quibus tam intolerandi dolores excitantur.

Huic tórre non ambimus, nec inferior est quæ sequitur.

¶ Calx viar. th. i. Extinguantur in aqua fluuiali ʒ. ʒ. & resiquantur in cella viniaria trium dierum spatio, vt melius sal extrahatur ex calce. Postea parum bulliant, & colentur per manicam Hippocratis. In colat. th. xx. extingue sepius, aut nouies, primò laminas chalybis ignitis, secundò laminas cupri ardentes: terciò vitriolum ad albedinem calcinarum ad ʒ. x. quærto antimonium liquefactum in crucibulo ad lib. ʒ. quærto lithargyri vel ceruse in crucibulo calciactæ th. ʒ. mercurij precipitati albi vincta litione loti ʒ. i. ʒ. aris vbi subtiliter triti ʒ. ʒ. Post extinctionem horum mineralium, aqua superledeat in cella viniaria decem dierum spatio. Postea parum bulliat, & coletur per manicam Hippoc. Hac aqua calente linteæ duplicatæ imbuantur, & applicentur frequenter.

Inter foci parati faciles commendatæ illæ, quæ fit ex sale ammoniaco sepius sublimato, & in vino aut aqua vite dissoluto. Vel ex vrina iuuenis bene lani vique ad mediocrem coctæ, & cum linteis admotæ.

Scribit Solenander consil. 24. felt. 4. quendam senem podagricum sibi hoc modo facere medicinam solitum. Cum tumor & dolor magnus, localiter rubens erat, accipiebat salern, cinerem, vrinam pueri, & acetum. In his commixtis madefactum, & expressum pannum linteum album applicabat aliquoties, sicque dolor magna ex parte sedabatur.

Quemadmodum antea diximus, sola anodyna in arthritide parum conuenire: idem de oleis resoluentibus hic dicendum est, quia poros cutis occludunt, sicque liberam transpirationem impediunt, & calorem augent, neque propter viscidam suam substantiam ad internas articulo-rum partes penetrare possunt, vt humores salios, acres, & tartareos in his laceratis temperet ac resoluant. Attamen si prædicta olea per retortam distillentur, huic vlti maxime idonea, vt potè valde penetrantia, ac minime viscidissima efficiuntur. Ex illis præstantissima sunt oleum chernium, hyperici, & de vitellis ouorum, quæ simul mixta, & per retortam distillata, dolori sedando, cuiusque causæ dicuntur vtilissima sunt.

Oleum etiam scorpionum Matthioli, modo prædicto destillatum, præstantissimum est.

Oleum cere ad idem etiam est efficax.

At cæteri omnibus præferunt, & non solum à Chymistis, sed etiam à Doctoribus dogmaticis, vt Cratone, Piactro, aliisque laudatur oleum ex ossibus humanis, eodem modo paratum, quo oleum de lateribus conficitur: nimirum ossa humana non humata, coacta, & ignita in olei vetus in iunguntur. Postea vero oleo imbibita contunduntur, & in retortam coniunguntur, sicque vi ignis extrahitur oleum.

In ossium humanorum defecis, aliorum animalium ossa subrogari poterunt.

Sequens etiam erit valde utile.

℞. Malliches, thuris, myrrhas, ammoniaci, opoponacis, bolianum, an. Vnc.ij. vitrioli lib.ii. mellis lib.ij. tartari Vnc.ij. sem. spiritus vini lib.ij. Dissilatur oleum, ex quo penna illiatur pars dolens.

Ad dolorem fecondum & materiam arthritidis resoluendam laudatur etiam liquor limacum, in hunc modum compositus.

In manica Hippocratis conice limacum integrorum M.ij. Tum super illos muce salis communis M.ij. super salem ferum chuli lubri trine tri. M. & sic viscum limacis salem, item: donec omnium figillatim quatuor vel quinque filtrata contectis. Manica dependeat in cella vinaria, hincuda. Et post paucos dies distillabit ex ea liquor lubricus & prout, quem soli exponito per quatuordecim, & loquum afflicto eo flagito.

Vnguentum resoluens in hunc modum componi poterit. ℞. Chamæpit. abinth. i. vulgaris & sumat. torum an. M.ij. fol. chamom. nictitior. lar. an. Paol. & vini analib.lem. Bulliant ad vim consumpt. Expressioni adde cere q. f. ad vnguentum consistant. Inungatur calide pars affecta. Intra 2.4. horas pars intumescit, & dolor cessat.

Cataplasma etiam resolens & dolorem sedantis vapi conici possunt. Præcipua verò sunt hæc.

℞. Furoris urtica lib.ij. Fiat Vnc.ij. sape q. f. Decoquantur ad formam cataplasmati. Vel

℞. Farine fabar. lib. sem. Decoquantur in vini f. q. addendo aque vitæ & butyri parum. Fiat cataplasma. Vel

Ebuli folia tenera aut sambuci contula applicantur, vel cum butyro fixa in fartagine, in formam plantæ.

Radix bryoniæ contula cum aqua vitæ est etiam valde efficax.

A nonnullis etiam commendatur radix arum, cum stercore vacæ permixta.

Sequens vero à Solenandro laudatur, quod sine insigni calefactione resolut. dolorem sedat, & articulos roborat. Potestque tuto post parosyini principium, circa quintam morbi diem, applicari.

℞. Pul. rol. rubr. Vnc.ij. malliches Vnc.ij. camphoræ 3. ss. farinæ hordei lib. 3. Coquantur in vino albo, continue agitando, donec inspissetur. & calidum applicetur.

Emplastrum denum magno vires esse solent. Præcipua verò sunt hæc.

℞. Thuris, mumie, colophonie, an. Vnc.ij. malliches, myrrhas, oralli albi an. 3. ss. axungie humanæ 3. vi. gummi ammon. & bolij in aceto solut. ana 3. vii. terrebith. 3. C. olei yulpi & rotæ an. q. f. Fiat emplastrum.

℞. Rad. areos Florent. & hermodactyl. puluer. an. 3. vi. emplastr. oxy croci. & de musca an. 3. i. resine pini 3. i. Mactentur simul, addendo ol. olivæ q. f. Fiat massa emplastr.

Emplastrum diapalma seu diachalcitico s. maximo in viq. est, vel solum, vel addita camphora in hunc modum.

℞. Masse emplastr. diapalma lib. sem. camphoræ 3. ii. Misceantur simul, & applicentur partibus affectis. Vel in formam paradræp.

℞. Masse emplastr. diachalcit. lib. 3. de sulphore 3. i. sty. rac. calanit. & benioini, an. 3. sem. gummi. acam. 3. i. olei hyperici & lumbic. an. 3. i. sty. racis liq. 3. i. sem. cere. naut. q. f. Liq. factus omnibus simul mixt. gatur tela bis aut ter, quæ polita & seccata servetur ad vsum.

At verò idem emplastrum cum sequentibus permixt. inter excellentissima remedia arthritica censeri debet.

℞. Emplastr. diachalcit. vino rubro aufero soluti, & ad vini conspersionem cocti lib. i. myrrill. rol. rubr. malliches, tartari vini rubri puluerat. an. Drach. ii. chamap. & chamom. odorati veni puluerat. Drach. f. Fiat emplastrum, applicandum si tumor valde immittus fuerit.

Tandem in dolore durissimo & valde continuato, si materia præsertim frigida oriendo, confluxit nonnulli ad vesicatoria, partibus affectis admoda. Eorum mentionem facit Sennertus, sed quæ anodynis permixta ceant. Et consilium vesicatorio, quod in notitis officinis habetur, solo impetui xtoplastissimum Vapand. præcepto meos scilicet vix est: eoque curavit magnam & continuam tumorem genu occupantem, cum aliq. Medici multas pue-

gationes, & diuina sudorificam, necnon topici permulta frustra viis perferant.

In omnium autem prædictorum remedium vñu hoc vñicè annotandum est, vt a quantibus & leuentibus sumatur indicatio quandoquidem varæ sunt hominum nature, varia temperamenta, & vari generis excrementa in eis colliguntur, unde summa in morbis varietas solet exoriri. Ideo quod vni prodest, alteri sape est inutile. Quod maximè vñu venit in arthritidis curatione. Ea q. ratione vñicuiq. prædicto medicamento (vñu) habenda est, vt si vñum frustra teneatur, ad aliud atque aliud confugere possit: ea semper deligendo, quæ rationali methodo magis consentanea videbuntur.

Quando arthritis topices, & nodosa est, difficillimè curatur, præsertim si in veterata sit. At nodi recentes emollientibus & resoluentibus fomentis, vnguentis & emplastris diluuiis possunt. Specifica verò sunt quæ sequuntur.

Gali valde commendat emplastrum compositum ex casio veteri & acrycum decocto perne fuisse salte subactio.

Alii pedes lutillos salios decoquant, quousque in mucilaginem conuertantur. Polica adficient calci amiqui partes duas, puluer. nallit. partem vnam, vt fiat emplastrum. Vel 3. vnc. i. nicotianæ vnc. i. cere citrinæ vnc. i. resine pini vnc. i. sem. terrebith vnc. i. olei chamom. q. f. Fiat cerum molle. Vel

℞. Baccharum orientalium (quæ Gali vocant, & quæ de Zoster) an. 3. i. thuris, ana lib. 3. Puluerentur & simul mactentur cum aceto lotu in formam cataplasmati.

Genuum animumacum in aceto diloluunt potentes emoluit.

Rulandus tumores istos duos inungit mane, meridie, & vespere oleo olei balsamo sulphuris calente, & desuper emplastrum diaphliphuris calcis applicat.

Ac vñicè confert en-plastrum lequens, quod præter doctis sedatores, etiam ex articulis materiam topiaccam extrahit.

℞. Vitrioli rom. lib. i. aluminis rupei lib. sem. salis Voc. i. v. Hæc omnia coniunctim calcina in catino terreo, euaporando saltem donec spiritus etiam exhalarit ceperint. Quibus odore percepto, statim destille à calcinatione, & refrigerant omnia, ac pulu. rentur.

℞. Huius puluer. & farinæ hord. ana partes æquales. Milce cum sacibus vini ad formam pulvis, quam supra lectionem extendit, ad spissitudinem culti, & applica loco affecto. Exsiccatam massam cum sacibus vini veterum dissolue & applicate perge, donec primum diffusum soluti: postea vero ex articulis ipsis contortis omnes topici consumpsi fuerint. Interim tamen sape fit, vt cuius aperitur, quod formidandum non est. Vel enim sponte sua postea viciat, cocunt, vel cere saltem emplastr. loco impolice consolidatur, ipsis articulis demò mobilibus & agilibus redoluit.

Si denique nimis innotata arthritis, & prorsus nodosa fuerit, præcedenti cura mitigatio quidem dolorum speranda est, sed topi vix cedunt: itaq. caustico leuiori cutis aprenia, deinde emplastrum attritum ex gummatibus topici eximendi.

Articularis doloris iam presentis curatio prædictis perficitur. Sed quæ hic affectus per intervalia, præcipue verè & autumnum, redire solet, aliis prophylaxis insinuanda est. Quæ quidem eo respiciere debet, vt materiam ad articulos ruituræ collectio impediatur: aut si quæ collecta sit, aueratur. Ac denique ne articuli cum facile humorem insistentem recipiant, impedire materiam collectio, optima vñicuiq. ratione, & remedijs viscerum in temperiem corrigentibus. Materiam collecta auertere remedijs euacuantibus. Et articuli non tam facile recipient, si roborantibus viscerum tuer.

Dietam quod attinet, licet ea in hoc casu maximi, imò præcipui sit momenti, institui nostri ratio cum describere non patitur.

De potu tantum dicemus, vinum arthriticis esse maximè noxium, multoq.que eius abstinencia penitus fuisse liberatorem. Si tamen æger propter alia valetudinis incommoda non possit ab eo omnino abstinere, bibat pauciferum, seu æquolum & valde dulcem Hollerius loco vñu commendat.

mch.

mellicratum valde diluunt, scilicet ex aquae partibus 40. vel 48. & mellis parte vna, quod tamen non conuenit picricolis & fibrilibus.

Bochetum sequens omnibus naturis conuenit, & plurimis valde profuit.

Rad. saliz paril. 3. i. liquirit. Vnc. j. cinam. & sem. anisi 3. j. Fiat puluis tenuissimus. Cuius cochli. masticatur cum ea aquae quantitate, quae pro vno posita fuisse. Agitentur in duobus vasis ter aut quater. Postea colentur per potu ordinario, singulis patibus idem iterando.

Vacuatio vero quod attinet, rheumatismia primū insinuenda est, praeteritum vere & autumno: in ijs qui sanguine abundant, cuiusque effluuio obnoxii sunt.

Purgatio vero non solum vere & autumno, sed etiam, quater in anno, imo & singulis mensibus in valde cacochymis celebranda est, in quem vsum maliz purgantium formula circumferenda huic affectui specifice. Praecipue vero quae sequuntur, a prudēt Medico ita vti paranda, vt plenamque immutari debeant, tum ratione materiae, tum ratione dosi, iuxta varia agrorum temperamēta.

Re. Sennae mandat. turbith. hermodactyl. & rasurae cranij non hamati. ana Drach. 3. diagydyd Drach. 3. Fiat puluis, de quo capit 3. cum aqua iux arthritice, vel iulculo. Vel

Rad. saliz paril. Vnc. 3. sennae mundat 3. v. turbith. hermodactyl. lalape, mechouch. ana Vnc. 8. agaric trochisc 3. ii. diagydyd cinamom. 3. 3. Fiat puluis. Cuius 3. i. infundatur in vino albo per noctem. Capiat aeger mane vinum & puluerem.

Eliequarium caryocostinum a Petro Bayro miris laudibus fletur, & ab omnibus Practicis approbatur, cuiusque descriptio habetur in Pharmacopoea Bauderoni. Datur ad Voc. 3. Sed in calidioribus naturis illius vili poterit esse noxiū.

Rhasis pilas suas laudat eo encomio, quod *incidere non valentes faciem ore pedes ille autem ita se habent.*

Rad. Aloes optime vnc. sem. rosae. rubi 3. ii. hermodactyl. alb. a cort. exterioribus mandatorum 3. ii. diagydyd Drach. 3. Cum aqua iux arthritice & mellis rosae. fiat massa pilul. Cuius dosis erit Drach.

Vales etiam sunt quae sequuntur.

Rad. Aloes. hermodactyl. an. Vnc. 6. chamapit. 3. ii. chamēdr. litchad. arabic. an. 5. sem. hyperici 3. 8. Cum terebinth. Veneta fiat massa pilul. quae quā manus purgant frequentius exhiberi poterunt.

Per vomitum etiam facta euacuatio in praeseruatione, magno successu adhibetur, si aeger cum facile tetat. Quod indicatur Allaharibus insignis Medicus, his verbis. *Vomitus, inquit, vtilior est locutus, ad eradicationem proferum humorem, quae sunt ab infirmitate, & vix ad pedem: sicut in dolore febrili, & dolore genium, & similibus.*

Provocari autem poterit vomitus singulis mensibus per biduum sequens: quia secundus dies prioris reliquias excludit. Hunc autem melius succedere quidam obferunt, cum Luna in signo aliquo ruminat, vt in Tauro vel Capricorno. reperia fuerit. A cēna autem provocare vtile est, in ingulis prius cibis viximurpurgant, scribus aliisque in magna copia. Postea ventriculum fricando, & digicos in fauces immitrendo. Quod si non sufficiat, vomitorium exhibendum est, praeteritum ex radic. alari & genitile decocto consistant, quae aliqui in arthritide curanda idonea esse solent.

Illa etiam quae per sudores fit euacuatio, sanguinem a ferolis excrementis repurgat, & causam arthritidis antecedentem educit. In hunc vsum insituri poterit dicta sudorifica vere & autumno decocto labe parchina, salistras, aut etiam guaiaco, provt aegri temperies fuerit videbitur.

At sine sudorum provocatio, per simplicem diaphoresim, materiam moribacim educens decoctum, a recentioribus quibuldam Practicis in vsum reuocatum est, cum eximio fructu. Illius compositio, & vtendi modus talis est.

Rad. saliz paril. antimon. crud. & putamina nucum, an. vili. rad. chine vnc. 3. i. ligo Brasilian. parumque th. x. Bulliant ad medias antimonium & putamina puluerentur, & in dosulo includantur, qui in olla suspendatur, ne fumi ignis attingat. Colaturae capiat bonum haustum, manētri-

bis horis ante passum: post meridiam quatuor horis it prandio, & tribus horis post cenam, per xv. dies, praemissa, vnde sectione & purgatione vniuersali.

Ex residuo cum pari aquae quantitate, fiat bochetum, ad quartae partis consumpt. per potu ordinario, addendo corandri & liquirit. q. ad saporis gratiam.

Ad arthritidem praecauendam, cuiusque radices in viscibus latentes extirpandas, quidam Practici commendant vsum antipodagricorum, per annum integrum exhibitorum, quibus multos in integrum fuisse liberatos pronuntiant. Ex multis eorum formulis sequens praecipua est.

Rad. saliz paril. 3. i. v. hyperici, sol. chamap. & chamēdr. an. Vnc. ii. artillo. rotud. 3. vi. angelica 3. iii. cinam. 3. ii. caryophyll. 3. i. v. croci 3. ii. Omnia in tenuissimum puluerem redacta incorporentur cum mellis Hispani cocti q. l. Fiat opiatia, quae vtrius aeger per annum integrum, sumendo singulis diebus veris, autumnis & hyemis 3. i. fi. illate tantum 3. i. & abstinere omnino diebus canicularibus. Vinum bibat valde dilutum & abstinere a venere.

Horum antipodagricorum insituri forsitan esse poterit decoctum chamēdryos, quod propterea Carolo Quinto Imperatori a Genuesibus Medicis valde commendatum erat: & tellatur Solenander, plurimos qui hoc medicamentum per sexaginta dies bibissent, penitus fuisse liberatos. Huius decocti compositio talis est.

Re. Chamēdryos dum flor. levis, & bene assecurate M. ii. vini medicoris maturi lb. iii. Coque in duplici vase per hor. quinque. Colati vini capiat aeger haustum, corpore ad sudorem composito, praemissa purgatione.

De calidis autem istis medicamentis hic notandum: ea non solum calidis naturis non prodesse, sed etiam immediabiles resolutiones, aut alia incommoda inducere, ideoque summa cum praemeditatione ea esse exhibenda.

Turius & forsitan vtilius vti parat poterit opiatia sequens, quae minus calfaciendo, totum corpus sensim, & per epistram ab omni superfluitatū illius repurgat.

Re. Sennae mund. 3. ii. turbith. hermodactyl. an. 3. v. ligni guaiaci, salistras, & rad. salistras. an. Vnc. 8. rad. chine 3. i. l. l. gni nephritic Vnc. ii. trium fantal. an. vnc. i. sem. anisi 3. ii. mellis optime depurati vnc. iv. Fiat opiatia. Dosis 3. i. per integrum annum, exceptis diebus canicularibus.

Inter vulgares homines quidam pro magno remedio prophylactico habent, vt tres aliorum bulbi integri mane deglutiantur, continuando per mensem integrum. Eteum ventriculum calefaciunt, & tobotant, citra hepatis, aliorumque viscerum calefactionem: nam integri cum scibus excrementis, sed cocti & pituita viscosa obvolunt, quam a ventriculo, & intestinis deturbant.

In arthritide biliosa aequa acida, vitriolata, & refrigerantes plerumque conferunt. Ita vt earum vlu plures ab ea immunes per longum tempus euaserint.

Ad eandem finem laudatur ab Hipp. *id. de morbis*, vlu lactis asini, quod etiam pluribus arthriticis multum constatae experientia docuit.

Ac denique omnia temedia, quae calidioris hepatis intemperie corrigende, &que visceri roborando idonea sunt hic etiam conuenire poterunt, provt supra in eisdem intemperie curatione descripta sunt.

Si vero ferolus humor a cetebro defluerit, vt plerumque fit, huic affectui dederit originem, cerebri tato habenda maxime est vt nimium intemperies illius corrigatur, & humores in eo genti deriuentur & disculantur. Quibus visibus conueniunt cauteria, vesicatoria, errhina, masticatoria pulueres cucuphe, suffitus, aliaque temedia, in affectum cerebri curationibus propoliata.

Vitium praecautio caput est articuli roborantum, ne tam facile humorem influentem recipiant. Aduertendum tamen, roborantia medicamenta, non solum iustitia, sed etiam noxie vti parantur materia aut cedens, & fluxus humor remedii praedictis solliciti auferant. Alioquin haec roborantia vel humorum ad articulos influxum impediunt nequeunt, vel si impendant, ad partes refluunt humores illi, & multo grauiora mala concitant.

Inter praecipua roborantia vinacea numeranda sunt quae matrice moribacae reliquias discunt calore actuali, &

affligendi vi partes maxime roborant. Durescit in Holleum cauta conueniunt. Sed murefcit potest cinacorum effusio: per vinctum: rum, si cinacea experientur. ex tortura in herrem, & ita angustia operis incipit. In his ager centesimæ pedistubas, ceruicæ, brachia, vel etiam totum corpus. Postea vero addit Gallico idiomate; *Je l'ay peignu cœ fous, j'ai, & rien meilleur sous la chappe du Ciel.*

Solenander vero conficit. *Jeit. 4.* hoc remedium sequenti-
elogy prædicat. Sed inter optima remedia. & cunctissima, qua
partes illas afflicta roborant, ac calorem vitæ non sunt. hoc
potendum, & agendum singulis annis, cum amplius fieri ne-
queat, vsus pandum. Adhuc ea tempore vinctum immoritur
pedes atque manus afflicta vitæ, si expressum co-
lentibus ad hoc vel msp. calidi calefactis, mane per dies quod-
decies. Ad pisse in misticæ verum pr. Pantem, cui hoc medi-
camentum communis est, atque ab eo præclaro munere fun-
daturus. *plur e ceteris non potera, & ista remedia, beneficio
Des, substituta est. Quæ autem vasa materies sunt, & plus
adueniunt, videretur vix offerre.*

Thermæ sul. huc, & micro, quales sunt nostræ Baler-
canæ, non solum sudores euocando, vt antea dictum est,
materiam arthriticam discutunt: sed etiam roborando arti-
culos, ad præcautionem non parum conferre possunt: que-
madmodum si per modum embrocæ, vel ducæ capiti ad-
moueantur. Etenim thermæ lotum patibus usque
pius applicatur, eas etiam corroborat.

In thermarum delectu lotiones pedum, aut focus aliu-
rum partium parari poterunt: decocto herbarum nerua-
lium, additis quibuldam astringentibus, vt balauis, myr-
tilus, nucibus cupressalium, sale, cum aqua lerrata & vi-
no rubro.

Commen dantur etiam munctiones frequenter vsu patæ
in hunc modum composite.

Oleum vel rosaci vnc. i. salis 3 i. Melle, fiat inimen-
tum Vel

Ol. omphacini Vnc. ij. masticini Vnc. j. suis correfacti
3 i. boli armen. ussang. dracon. hypocil. thure, mastic. an.
Et. j. sem. Tursina singula per se prius subtilissimè, tum
cum oleis miscantur in formam vnguenti.

Non parum etiam vtile est ad articulos roborandos em-
plastrum diachalcæreos, vbi diapsalmia impostum: et ille-
quæ vtile in omni arthritide, a quocumque humores ducat ori-
gine. Scribitque Solenander *conf. 3. Jeit. 4.* de omni quod-
dam, qui alias frequenter podagra peroxylus tentari con-
sueuerat, vbi huius emplastrum continuo, & purgationibus
per intervalla alternis, quinquennium, integrum ab illis
doloribus liberatos fuisse. Atque emplastrum hoc non
inquinat, non pruritum aut pulsulas excitat, neque odore,
aut alia qualitate molestum est. Apatat autem ad formam
membræ in pedibus et alia minor sunt calces, qui hoc em-
plastro obducti pedibus apantur. Eadem alia emplastro
hoc obita carpi, & alijs partibus applicari potest. At vto
idem emplastrum diachalcæreos, in vino decoctum, &
cum pulvere myrtill. rosar. masticæ. tartari, chamæpi-
ci, chamæp. persuarum, quales supra in curatione de-
scriptum est, ad eodem vni, quæ præstantur cit. Et non
vidimus arthriticus, qui huiusmodi emplastrum in pedibus
& carpi continuo gethære oleo succellat, successu.

CAPVT II.

De dolore ischiadico.

Dolor ischiadicos ab alijs arthriticis speciebus in eo
præcipue differt, quod in his dolor solos articulos
occupat: in illo vero non in sola citæ citæ, sed etiam
summam tarem, & umbos & os sacrum occupat, ac in leu-
mus, tibianque & extremitatem pedem exporgerit. Quod
fit propter nequias à lumbis & os sacro emergentes, qui ad
coxendicem feruntur, & inde ad ten urtibiam, & pedes dis-
seminantur.

Causa huius doloris eadem est, quæ in alijs arthriticis
speciebus fuit præcipua.

Diagnosis ex loco affecto desumitur, vnde etiam nomen
habet: dolor enim præcipue illic regionem occupat. Hoc

etiam habet peculiare, quod nullus humor, nullaque infla-
matio, aut coloris mutatio apparet, quemadmodum in
alijs arthriticis specibus fieri solet, qua humores afflicto-
tes in partes profundiores, & ampliores, multaque carne,
coactas se se infundunt, & vique ad corporis superficiem,
ipsi atque eadem non diffunduntur.

Prognosis doloris ischiadici hoc habet peculiare, quod
dies perleuantur coxæ rationem inferi: humor enim leu-
los, & periculosa in articulo cauatem, quæ amplissima est,
sele minuat, & si diu in ea immoretur, pars ipsa tenuior
dilatatur, crassior renouente, quæ mucola residuit, & li-
gamenta articuli oia, quæ coacta emollit ac relaxat, vt co-
coxæ ex alio loco excitat, vnde lunatio contigit. Et qua
etiam claudicatio sequitur, & crues totius tabes, atque atro-
phia: qua os se sedula elapsum multum, venas, & arterias
comprimunt, vnde motus impeditur, & sanguinis ac spiritis
in partes inferiores commodè fluere non possunt. Prædi-
ctam doctrinam confirmant duo Hipp. Aphorismi, nempe
Aph. 3. Jeit. 4. Quibus duriora cæpitum dolore infestata
sua excidit, rursusque incidit, in mures superueniunt.
Et Aphor. 60. caetum scilicet: Quibus duriora cæpitum
dolore infestata sua excidit, in mures superueniunt, & claudicatio
non vixit.

Curatio doloris ischiadici cum reliquarum arthriticarum
specierum curatione inuita habet communia: in multis ta-
men differt, propter loci affectu, tracturam, & empu-
ndem: idco à prædictis distinguenda fuit, & seorsim in hoc
capite describenda.

Ac primùm præmissio citi, aut leui pharmaco, vna
brachy cuiusdam lateris aperienda est: ad rucellendum: po-
tissima vero ad deriuandum locari debet in poplite, aut intra
mallicolum, exteriori illa vena, que ab insignem vtilita-
tem, quam affert in hoc affectu, ischiadica nominatur: quæ
de sepe sola secta hunc afflictum sanat.

In crete dolente secari solet, licet & in sano spectam ad-
modum proficere, tubæque omnes in dolore lultissimè vi-
sum fuerit.

Gal. lib. de vena sect. cap. 18. Aterius, inquit, non ischiadica
vna de se sola ex crebris euacuationibus, torale, nempe vbi non
frigit, sed impletis sanguine, quo in cæca sunt, vena, prou-
nissent: quare secta in poplite vena illis commodior est, quæ
in mallicolo.

Ex hæmorrhoidibus etiam sanguis per huiusmodi edu-
ctum, in modum ischiadici opitulatur, quod sanguis
in coxendicem vena contentus educatur, arum enim par-
tium maximus est per venas contentus.

Purgationes fortiores hic locum habent: nam leuioribus
humores magis ad partem affectam præcipitant, ideo con-
ueniunt maxime potentes arthritici, caryocostusum, phle-
de hermodactylis & similia. Chymici purgationes mer-
curiales & antimoniales in roboris corporis solent ali-
quando vsurpare.

Mercurius dulcis cum scammonio, vel alijs purgantibus
exhibitus fuisse frequenter, humorem ischiadicum efficien-
tem potenter eradicat.

Vomitoria à multis perferuntur purgantibus per alium
cum per locum à parte affecta remouerent, humores vi-
riolos euacuant, Alarum reliquis præfertur Rndeleto.

Post lulticentem purgationem, ad topica veniendum
est. Et quidem repentina, quod amittit, illa minime con-
ueniunt, quod metuendum sit, ne humores ad partem affe-
ctam magis promoueantur, sed statim in toto resoluenda
ad mouenda sunt, quæ minor, & minus calida, ne magis
humores ad partem attrahant: postea vehementius, in
hunc modum.

Re Rad. beyoniae m. rad. ebuli 3 i. bacorum iuniperi m.
fol. iuniperi arthritici m. huiusmodi, salmæ, osimurum, flor.
chamom. melissa, ans. M. v. Huius decoctio per semicupio,
quod ingreditur bis in die per biduum, aut triduum. In
principio parari poterit decoctum ex aqua sola, postea ex
aqua & vino albo.

Ex eodem aqua simili decocto potest foveri pars dolens
calide frequenter.

Sacculi etiam parari poterunt ex sale, milio & fursure
siccis in sartagine cum vino generoso, & calde applicari.

putandum est: a dies partus: quia tunc cepit totius corporis æconomia eueri, humorumque perturbatio fieri, quam deinceps febris consequtur. Si in grauib. vulneribus, capius præsertim, licet febris non in grauib. post partum, vel quiniū diem: computato tamen fieri solet: a de acceptis vulneris, quia tunc temporis humores commoveri ceperunt: & ad febrem dispoſit.

Curatio istarum febrium ab aliarum curationibus non differt, nisi circa magna remedia, venæ sectionem scilicet & purgationem, in quarum administratione non exigua est difficultas, quam tamen nos breuiter dilucere conabimur.

Quod ad venæ sectionem spectat, in acutis puerperarum affectibus celebranda, tanta est Autorum dissensio, propter pugnantem in vicem indicationem, vt vix duò reperiantur, qui in eadem omnino sententiam coeant. Nos eam quæ ad sapientiorum mentem magis accedit, & in vñ practico spicius succedit, omitti ambagibus, sequentibus theorematibus hic proponemus.

Morbus acutus puerperarum aggreditur, vel in principio puerperii, vel in medio, vel in fine.

Si contingat in principio, & mulier copiose purgetur, nulla alia tentanda est sanguinis euacuatio, quam quæ à natura rectè & conuenienter operante dirigitur. Si vero lochiorum & expurgatio supprimatur, aut minuat, læsentur venæ inferiores: & copiosè sanguis mittatur, quoniam tunc temporis copia esse debet, ex præscripto nature, lochiorum euacuatio.

Si medio tempore morbus acutus superueniat, duo consideranda sunt. Vnum, an materia morbifica in vno loco particulari continetur, & conculectur: aut sit per venas dispersa. Alterum, an mulier conuenienter expurgetur mensura vel non. Si morbus fiat à materia ipsa, vt in febribus: & mulier non periculè purgetur, venæ inferiores aperrendæ sunt: quia & materia morbifica minuetur, & naturalis fluxus promouebitur. Si vero mulier sufficienter expurgetur, morbusque inualeſcat, nec euacuatio naturalis morbo satisfaciat: venæ inferiores etiam aperiendæ sunt, tantumque detrahendum, vt ex duabus euacuationibus perficiatur, quod morbus exigit, vt docuit Gal. *meth. cap. 5.*

Si febris admodum intercala, magnumque incendium adfuerit, id fuit quod in morbo à materia in loco particulari conculectur, & putrescente agendum esse iam dicturi sumus.

In morbo acuto particulari, vt pleuritide, peripneumonia, angina & similibus, aduertendum est, an fluxus tantum fieri incipiat: ita vt morbus sit tantum imminens, vel incipiens: & per exigua sanguinis quantitas in parte collecta sit. Tunc enim venæ inferiores aperiendæ sunt, vt reuulsione facta ad opposita distantissima præposterus ille humorum motus turbetur. Si vero iam bona ex parte fluxio facta sit, & inflammatio genita, eaque valde vrgeat, siue mulier expurgetur sufficienter, siue non: statim venæ superiores aperiendæ sunt: è directione partis affectæ, quia talis euacuatio à parte affecta sanguinem eaducit. At si venæ inferiores aperiantur, quæ nec proximæ sunt parti affectæ, nec ab ea euacuare possunt: & virtus ad euacuationem labefcabitur, & materia in loco particulari conculectur non minuetur. Atque ita vel totum fere sanguinem educes, ad reuellendam materiam morbosam à parte affecta: vel prius mulier à morbo perimetur, quam facta fuerit reuulsio sufficiens.

Nec metuendum est, missio sanguine à venis superio ribus, ne retrahatur sanguis ab vtero, quia in illis calidiss. partes superiores sanguine abundant. Et quamuis multus extrahatur, non ita inuolunt venæ, vt aliunde nouum sanguinem attrahere cogantur. Ad maiorem tamen cautellam, non erit inutile, antequam sanguis mittatur, frictiones celebrare in ceterisbus. S. consequenter ligaturas doctiss. facere in medio ipsorum, quæ deinceps, donec multus fuerit sanguis, & paulò post venæ sectionem soluantur: ac subinde cucurbitulas idem partibus applicare, vel saltem frictiones repetere. Hinc habere poterimus materiam peccantem educationem, & nalis illarum conseruationem.

Idem faciendum est in febribus ardentibus & vehementibus. Quia licet in materia sit ipsa, atamen incendium tantum est circa cor, & vlcera, vt minors & longinquæ venæ apertione non ita exingui possit, sicut proxima & maioris, qualis est basica.

Hæc curandi methodus, non solum in puerperis, sed etiam in reliquis mulieribus morbo acuto correptis, & mensuras purgationis parentibus obſeruari potest.

Si in fine puerperii morbus acutus incidit, idem agendum est vt in medio, iisdem conditionibus obſeruatis: hoc animaduertit, vt quò magis dilat mulier à principio, eo tutius venæ superiores aperiiri valeant: quò autem illa vicinior est, etiam medio tempore, id ipsum maiori cum præmeditatione exequamur. Et si morbus non inſit, nec vrgeat illius acuties, ac naturalis expurgatio copiosa fuerit, prorsus abſtineamus. Si vero purgatio fuerit imminuta, venas inferiores ad supplemendum debite quantitatis, secabimus. Si tamen oppositum contigerit, seruetur id, quod vrgente acuto morbo agendum esse diximus.

Purgationis verò vltis in puerperis morbo acuto correptis, sequentibus concluditur theorematibus.

Dum lochia naturaliter profluent, nunquam purgatio admittenda est: periculum enim est, ne ab opere suo natura diuertatur.

Si verò puerperia præter naturam se habeant, considerandum est, an quantitate peccent, vel qualitate.

Si quantitate peccauerint, eaque imminuta: & mulier vel omnino nihil, vel insufficienter purgetur: postquam omnia remedia promouendi huiusmodi purgamentis idonea, & frustra viurpata sunt, & materia morbifica concocta appareat, transactio octo, decem vel duodecim diebus à partu, secundum maiorem vel minorem morbi virginitatem, leuiori pharmaco purgatio infutui poterit, à vehementioribus prorsus abſtineamus.

Si lochia qualitate peccent, ita vt fluxio albidæ vel alterius coloris non naturalis prodierit, codæ exſistente materia, vitio puerperii tempore totò purgatio admittatur.

In genere autem hoc perpetuò obſeruandum, quo longius puerpera dilat à die partus, eò tutius medicamentum purgans posse administrari, & contrâ. Nam experientia docuit, mulieres purgamentorum suppressiones laborantes, si post septimum, aut nouum diem alui fluxu corrigantur, vti plurimum liberari. Si verò primis diebus, videlicet secundum tertium vel quarto diem hæc acciderit, vti plurimum interire.

Atque ita (Deo fit laus & honor) affectum muliebrium cutationes abſolutes sunt.

P R A X E O S M E D I C A E

LIBER DECIMVS SEXTVS

De affectibus Articulorum, & Rheumatismo.

P R A E F A T I O.



Lest omnes articulum affectus ab eisdem causis dependens, & ratione tantum, et affectu inter se differant, eisdemque remedijs curari soleant, nonnulla tamen reperiuntur differentia inter isthalem, & alium articulum dolentem, ab ipso in istis articulationem componentium structuram, & amplitudinem: cuius

ratione quondam in multis remedijs differentiam obtinet: idcirco fecimus de dolore isthalem agere constitimus, Et quia rheumatismus cum arthritis magnam habet affinitatem, illius adeo posuimus hoc in loco, non illere visum est. Atque adeo liber istis tribus absolute capitibus, quorum primum erit de arthritide secundum de dolore isthale: tertium de rheumatismo.

C A P V T P R I M V M.

De Arthritide.

Arthritidis est dolor articulum ex intervalis ferè iuvandus ab humorum influxu excitatus.

Partes dolore affectae sunt membranae, tendines, nervi, omnesque partes nervosae articuli visum, quae ab humore in eas influente distenduntur, vel ab eisdem acrimonia punguntur, & vellicantur. Ligamenta vero ab offusis orium de sensus experta sunt. Raro autem humores arthritidem efficiunt in ipsis articulum cavitatibus insistent, nec nisi in affectu distillatione perseverante, & ubi ampliores sunt cavitates, ut in dolore isthale diuturno, in quo nonnumquam os femoris excidit, laxatis ligamentis, aliisque partibus articulum connectentibus: & tunc articuli cavitas mucosa pituita repletur, ut est apud Hippocrit. *Aphorismo 68.*

Quaeritur hoc in loco, cur ab humoribus in partes nervosae & membranaceas influentibus, eaque distendentibus aut vellicantibus, non fiat convulsio. Respondemus, partes, qui in arthritide magis afficiuntur, esse membranaceas, quae cum motui nullo modo insistant, convulsionem efficere non possunt, quantumvis distendantur, aut vellicantur. Licet autem tendines & nervi motui dicantur dolore afficiantur, convulsionem tamen non parant: quia ut fiat convulsio, debent musculi retrahi versus suum principium, & illa retrahit debet fieri per contractionem nervorum, qui in eos insistant: quod vero a musculis egressi sunt, aut ad extremitatem eorum pervenerunt, licet distendantur, musculi contrahere non possunt.

Quatuor arthritidis differentiae ab authoribus vulgo constituantur, ex diversis articulis affectis repetitae: chirurgica cum manuum dolor occupatichae, cum coxendicem invadit: gonagica cum genae: podagica, cum pedes huiusmodi dolore afficiuntur. Reliquorum vero articulum dolores generico arthritidis nomine donantur: licet Pars propria istius nominis insuperat, si paribus affectis de sumptis dolore in maxilla articuli tendentis, ygonagiam appellans: in ceruice, trachelagiam, in spina dorsali, achylagiam in humero, homagiam: in cubito, pachyagiam. Sed illae nomen dantur in viam medicum relatae non fuerunt. Ideo sufficit aliarum partium dolores ad commune, & genericum arthritidis nomen referre.

Alia praeterea dantur arthritidis differentiae, quod alia sit generalis, omnes aut saltem plurimos corporis articulos occupans: alia particularis, una tantum articulo inhaerens.

renalia insita, & congenita, a parentibus hereditario iure contracta: alia adventitia, a causis externis & erroribus in viis communibus inducta.

Humores autem arthritidem efficientes, non solum in articulos, sed etiam interdum in alias partes, ut caput, dentes, latera, & partes internas, ut iecur & lienem influere possunt, in istisque varios dolores excitare, qui tamen arthritici dicendi non sunt, quoniam a materia arthritidem efficiente generantur.

Omnes autem dolores articulos occupantes arthritidis nomen non merentur: sunt enim interdum tumores in articulis, praecipue in genibus, a quibus etiam dolores excitantur, ab humoribus crassius, pituitosis & melancholicis profecti, & distinnitè perseverantes, qui ad dolores arthriticos non referuntur, sed diuersam omnino naturam continent. Quae distinnitas ex peculiaribus arthritidis characteribus in diagnosi describendis, clarius innotescit.

Causa proxima & immediata arthritidis est humor scrofulus, sua vel quantitate partes sensibiles articulos ambientes distendens, vel acrimonia vellicans. Scrofulam esse illam materiam inde colligitur, quod humores, crassiores in articulos tam facile cohaerere non possunt, & tumorem in articulis magis conspicuum efficiunt, qui perexiguus esse solet, imo vero in principio nullus apparet, licet dolor acerbissimus exciteatur: adde quod ille tumor nunquam suppuratur, quod ab humoribus crassioribus saepe contingit, si tantillum sanguinis secum admixtum habeant. In arthritide autem sanguis ad articulum attrahitur, qui ex inflammatione partis innotescit: nunquam tamen suppuratio contingit, propter ferè predominium, quod suppuratio resistit.

Illud autem serum tarò purum atque insensibile est, sed alios humores, aut ichores eorum secum admixtos habet: unde diversitas insignis exoritur, pro maiori vel minori humorum permixtorum acrimonia, a quibus maior vel minor dolor excitatur. Tumor aliquando est nocibilis magnitudinis, aliquando vix apparet: color alius est rubicundus, alius laevis, alius albus: in quibusdam malum cito soluitur, in alijs longius protrahitur: interdum caliditas ingens, & feruor partem affectam occupat, alias nulla aut perexigua apparet: quandoque calida admota profunt, alias vero nocent, & frigida conferunt. Negandum tamen non est, serum per se maiorem vel minorem acrimonia habere, propterea magis vel minus salis secum admixtum habet: cum enim serum salia heterogenea, quae ex alimentis in corpore cumulantur, dissolvere, & in se recipere solet, (hinc omne serum salium est,) prout maior, vel minor salis copia in eo recipitur, & propterea salia illa maiorem vel minorem acrimonia obtinent, maior vel minor dolor excitari consequitur.

Quia vero in arthritide quemadmodum in omni fluxione, quatuor considerantur, materiae fluxus, pars mandata, pars recipiens, & via per quas fit fluxus: postquam materiam fluentem exspoliemus, de reliquis est agendum.

De parte mandante est aliqua diffusio. Ferminus omnem arthritidis materiam, quam pituitosam, & tenacem esse vult, a capite delibere existimat. Non quidem a cerebro ipso, cuius excrementa vel per nares excrementum, vel per palatum effluentia, ad os, fauces, & peritram arteriam, aut ventriculum propelluntur: sed ab externis capitis partibus, & extra calvariam positis. Cum enim vena quamplurimae ab externis iugularibus deductae excurrant, excrementa sua tenuia ac serosa ibi deponere solent, & cum capitis cutis crassa denaque sit, & humores per eam facile non exsint, tempore progressu ibi cumulari, &

per

per summa corporis sub cute ad articulos defluere existit. Alij vero caput quibus fluxiones arthriticae originem agnoscunt, sed a partibus illius interioribus, cerebro nimirum effluere censent. Alij denique à viceribus in imo ventre contentis, puta hepate, & liene, vtero, aliisque, tum etiam à toto corpore, humores illos novos per venas & arterias in articulos defluere pronuntiant. Quæ omnes sententia, meo quidem iudicio, ex parte vera sunt, ex parte vero falsa. Veras esse censemus in eo, quod humores arthritidem committentes, à capite per internas & externas partes, & à viceribus, totòque corpore per venas & arterias defluere pronuntiant. Falsas vero alicuius in eo, quod vel solas capitis partes externas, vel internas tantum, vel sola vâlera inferiora materiam arthritidis suppeditare voluerunt. Cum enim totum corpus confusile fit, possunt omnes partes humores superfluos ad articulos transmittere, si illi eorum receptioni dispositi sint. Dispositio autem articulorum, humoribus illis recipiendis idonea, ut partes recipientes conditionem hic data occasione explicemus: est eorumdem imbecillitas, vel nativa à parentibus iure, & hereditario contracta, vel alicuius à causis præternaturalibus inferius exponendis, oriunda. Cum igitur certissimo theoremate ab omnibus Medicis receptissimum sancitum sit, partes robuliores excrementa sua deponere in debiliores, asserendum est omnes partes prædictas superfluitates suas in articulos posse deponere, si illi imbeciliores facti fuerint, resistere nequeant. Et ut sigillatim opinio nes prædictæ confirmetur: Femelus quidem satis perspicue ostendere videtur humorem extra calvariam collectum per summa corporis, & sub cute in articulos defluere, cum interdum dolor in capite incipiat, inde ad cervicem, humeros, ac tandem in articulos excurrat. Sed nunquam ab aliis locis, aliique partibus humores in articulos deflunt, nullo modo probat, neque vilius post ipsum probare poterit. Sic etiam qui à solo cerebro fluxiones huiusmodi fieri dicunt, contra sensum pugnant videntur. Cum enim partes articulos ambientes, venas & arterias recipiant, per quas sanguis nutritionis causa ad eas transferatur: quidni etiam serofus humor in maiorem vâle collectus ad easdem partes per easdem vias deflert potent? Hoc docuit præcisè Gal. cum *Aphor. sect. 3.* Vbi docet in tuberculis & doloribus articulorum profundum corporis expurgari, viscosi humoribus à partibus principalibus ad ambitum corporis protrusis. Hoc etiam ostendit febris, quæ in arthritidis principio fæpe excitari solet: fit enim illa à serofa illius in venis contentæ & commotæ, atque ebullientis, quodam natura ad illius effusionem sese accingit: & cum foras omnino eam transmittere nequeat, ad partes ignobiliores & debiliores deponit. Tertia verò sententia, quam Sennerius defendit, à ratione etiam aliena est, & in eo peccat, quod nunquam a cerebro fluxiones podagricas fieri contendit. Cum enim ad omnes alias partes, tum internas, tum externas fluxiones a cerebro decumbant, quomodo articuli ab his poterunt esse immunes? Et si humores catarrhum efficientes per venas & arterias defluunt non raro, unde febres catarrhales passim oriuntur, humores vero in venis, & arteriis contenti (in ipse Sennerius asserit) ad articulos facile confluant: demonstratè concluditur, fluxionem fieri à cerebro per venas, ostendit copiosa urinarum profusio, quæ fit non raro, cerebro ab insolatio, aut nimio frigore commoto: tunc enim humores serofi in cerebro collecti agitantur à causis illis procaractis, & ad venas arteriasque propelluntur: per quas ad renes & vesicam confluunt, unde copiosa illa urina promanat.

Causa interna proxima & immediata arthritidis sufficienter hæcenus exposta: iam ad causas externas & procaracticas transeundum est: quas in tres classes, clarioris doctrinæ gratia, distribuere possumus. Præmissæ earum, quæ materiam generandæ arthritidis idoneam suppeditant. Secunda earumque articulos debilitant & relaxant. Tertia denique earum, quæ humoris morbifici affluxum ad articulos promouunt.

Ad primam classem referuntur, quæcumque crudorum ac lecorum humorum, omnique cochyneis proventum adjuvare possunt, ut alimenta crassa, & concoctu difficilia,

ac valde excrementitia: crapula, & ebrietas frequens: venus immoderata, unde arthritidis Bacchi & Venetis filia dicitur: orium & vita sedentaria, ac consuetudine exercitiorum intermissio, somnus longior, vigilie intempæstæ, quæ rationem consuetudinis suæ naturalium, siue artificialium intermissio: metus, tristitia, & sollicitudo diuturna.

Ad secundam classem referuntur, labor & motus vehementes: venæ rivas frequens, illius præsertim, quæ corpore erecto exercetur: articulorum refrigeratio & humidior: balneatio frequens: articulorum contusio, luxatio, fractura.

Ad tertiam classem referuntur, aer frigidus humores exprimens, & calor eisdem fundens ac liquans & exagitant, meatulque aperiens: cibi acres & salsi humores attenuantes, vinum tenue ac generosum, exercitium immodicum, venus effrenata, ira vehemens, aliaque animi pathemata immoderata.

Signa diagnostica alia imminenti, alia præsentem arthritidem significant.

Imminenti signa sunt: sensus in articulo solito exquisitior. ut à levisima causa lædatur, puti noni calci compressio, ambulatione longa, vel levis aliquo ictu, aut ad lapidem aliudve corpus durissimum illisio. Febris plerumque arthritidis invasionem antecedit, quæ fit à serosis humoribus, aliisque in venis & arteriis contentis, commotis & exagitatis, dum natura eos ad partes illas ignobiliores expellere nititur. Viciniorum verò arthritidis initium, & quasi incipientem significant, torpor & formica: tionis sensus in articulis: & quidam in his seruat præter consuetudinem inuadens.

Præsertim arthritidem significat dolor cum actu articulum & crucians, quem plerumque tumor, & rubor comitatur: & si statim à principio non appareat, paulo post saltem excitatur. Pedis pollicem, & præcipue fluxionem dolor frequentius inuadit, & ad alios articulos non raro postmodum ex:porrigitur. Febris ante dolorem apparet: interdum præsecurat: interdum non antecedit, sed cum dolore inuadit.

Signa sanarum etiam aduertenda sunt. Licet enim humor arthritidem efficiens à prædominio serofus sit, aliorum tamen humorum cum sero permixtorum notitia necessaria est, ut his remedia aptari valeant.

Ac primum bilem cum sero redundantem significant, dolor vehementes & lancinans, tumor exiguus, color subrubrus aut subpallidus, calor magnus, & febris in statu perfectæ, febris intensio, urina tenuis, lauis, & subrubra, aut, licet à frigida læsio à calidis.

Pituitæ cum sero redundantis signa sunt, tumor partium affectarum sublaxus, qui impressis digitis leuam relinquunt: dolor minus acerbus, vrina crassa ac perturbata, læsis à frigidis, auxilium à calidis, calor ferè nullus, color albus à naturali parum recessus.

Melancholiz redundantis signa sunt color partis obcurus ad liuorem tendens, dolor profundus, vrina tenuis & æquosa, lassitudo totius corporis, eiusdemque temperamentum ad melancholicum accedens.

Quod ad prognosim attinet. Arthritidis periculosa est, sed dolorum vehementia molestissima, & duratio ne consumatissima, ut tota vita plerumque perfeeretur, ægroque ad seculum conuicti locati, non vero longauitatem nonnullis conciliat, ex eo quod natura humores vitiosos, ex quibus alij morbi periculosiores generari poterant, ad articulos per certa intervalia propellit: sicque partes nobiliores à prauis humoribus liberat.

Contingit tamen non raro in corporibus debitoribus, vel iam senio comectis, ut quando natura humores noxios intris coarctatos expellere non valet, morbi inde lethales oriuntur: ut febres acutissimæ, viscerum inflammationes, apoplexie, convulsiones, phrenitides, orthopnoe, cordis palpitaciones, alijque grauissimi affectus.

Licet diarrhæis arthritica visceribus penitissimè infusa, & natia articulorum imbecillitas radicibus extirpari nequeat: possunt tamen arthritidis insultus maxime retardari: ita ut nonnulli sola vini abstinentia, alij purgationibus visua-

bus frequenter infans, per multos annos fefe ab arthriticis doloribus seruauerunt. Hippocrit. *Propter* multos arthriticos sanari potest affirmat, eo quod illis qui sanari non possunt, distinguat his verbis. *De podagra hoc dicitur quod non, eius sile aut erecta articulos callos rephases habent aut erumunt et vniu, sicam alium habentis, si vnuq. sanari non p. sunt humana arte, quantum ego noui. Sanat quidem hoc optimo dynteria si superuenit. Sed & alia eliquationis valde proueniunt, ad in ferens loca reponit. Qui vero incens est, & circa articulos non dum callos habet concretos, & accutus vniu, & laboris amans est, & alium bonum habet ad obediendum pro sudor ratione; hoc facit Medicum intelligentem natus, sanari poterit.*

Infanabili etiam arthritidis merito ea annumerari debet, quae hereditaria est.

Si podagricis varices superuenierint, soluiunt podagra, ex Aesculapio. Quia humores ad articulos iuxta conuulsi ad exteriores erui partes deriuantur.

Si arthritidis suas periodos seruare consueuit non reuertatur, grauius & sepe ictualis morbos portendit, nisi materia morbifica diligenter prophylacti lubata fuerit. Si enim ob debilitatem naturae materia intus cumulat non expellatur, maximos morbos & periculosisimos producit.

Quibusque morbi podagrici sunt, si sedas in 40. diebus infirmam esse, simulat. Hipp. *Aphor. 46.* In paribus enim exiguu calore praedixi materia morbifica non nisi longo tempore deli potest. Cetera tamen & perpetua non est illa periodos ab Hippo proposita: nonnulli enim citius, alij tardius sanantur: quod dependet ex naturae morbificae quantitate, crassitie, vel consuetudine: parum autem robor aut imbecillitate, & aegrotum obsequio in v. clusae remediorum administratio. e.

Omnes arthritidis curatio in eo consistit, vt humores ad articulos inflatus inheuerit: cum illi in articulis inhaeret, submouetur: & dolor articularis ita tollitur, leniatur. Quae omnia sequentibus remedijs praest. r. poterunt.

Ac primum sanguinis detractio erit conuenientissima, si illius penuria non addi, & humor pituitosus non abundet: quae ab humoris in articulis fluctu motu sanguis exurgit, & quasi coquitur, & a dolore in partem afflictaam atra humor illius ideo resilio non cedit, ita est, quae fit ex opposito partis affectu: atque adeo, o li brachium de crum afflictiur, sinistro vena venosissima de r. per laborem, vena dextri brachij percipienda. Idem quoque de brachio & pede sinistro dicendum. Est autem sanguis de r. ad hunc latem ab ipso morbo initio, & quantum opus erit vires lerant. vna vice detrahendum. Si minus, iteratis v.ibus, donec plenitudinem sic fastidiam.

Hoc pra oculis semper habendum est, copiosum sanguinis detractio nem in ipso quae illam facit terre possunt, morbum maxime abbreviare, si illam ab initio celebretur, aut partem saltem v.ibus.

Purgatio etiam quam primum, & in ipso paro y sine initio instituenda est: sic enim fluxus & fluxus humor ab articularum vna auocatur, & ad intestina attrahitur. In ista, autem purgatione duo notari digna obferunt, a Solemario, practico infirmis plurica annotata.

Primum est vt purgatio ista fiat non blandiori aliquo, & leniente medicamento, quod humores magis commouentur quam euacuantur, & in articulos precipitantur, unde dolor & tumor acerbior ipsi sepe loze succedere: sed aliquo ex fortioribus, quod humorem commotum euacuet, & ab articulis auertat. Alterum est, vt exhibitio medicamento artus, supra genus, & cubitos obvoluantur aliquo defensiuo, quod humor fluens, si quis assumpto medicamento commouus est, stercepitur, vt minus minoreque impetu in articulos decumbat.

In cura vium ex bolo, malicorio, balauftijs, radicibus biflorae, vel tormentillis, rosas, cum albamine oui & aceto conficit vnguentum, idque inducitur tenui seu falcijs palmum, latis, & medicocrit longis (supradictis locis obvoluit, si nec illa ad manus sunt, simplicis polae tinctas circumdat, atque quod minimum est, dictum totum relinquit. Vbi an-

tem fluxio est vehemens, facis inducit linimentum ex bo lo, sanguine draconis, albamine oui, & oleo rolar, omphacino: vel prius sine oleo compositum, cui ne sic caui, & induratum dolores exciet, parum olei praedicti, aut vnguenti comitis addendum erit.

Ad hanc autem purgationem eoquequand, praefcribitur a perito Medico medicamentum a procatitis natura, & humoribus in toto corpore redandisque ab accommodatis vel aliquod ex speciosis purgantibus, quae in praefationis propouuntur.

Euacuatio quoque fit per vomitum hic etiam utilis est in ipso qui facit vomant: quia breuiore via humores euacuant, aquae adeo non ita metu est vt ad partem afflictaam ruant. Blanda autem vomitoria exhibenda sunt, quae tantum partes ventriculo vicinas euacuant. Si enim vehementia sint, & a venis attrahant humores, eisdem ad articulos precipitare poterunt. Tum pot vomitiones purgatio per inferiora etiam molenda est: imo si vasa non sufficiant, erit iteranda.

Pot sufficientem purgationem, sudorem prouocatio ma iue conferre poterit: sic enim serosa materia per habitum corporis dilucitur. Verum cum in arthritidis inflammatione fiat quasi quaedam ebullitio, & plenitudo febris adfectu, aliud iudicium non conuenient sed tantum temperata ex quibus commendat. Sennertus cornu cui vel crudum, vel sine vitioe paraturatur, aut iolum, cum aqua catu di benedictum, etiam antimonium diaphoreticum. In affectu diuturno absente libere decoctum chire, salis parillae, aut salis a potell exhibetur, herbis refr. granatibus, vt echinorhodi, acetosae, portagiae, retrarii. Vel solummodo poti deterrum sudorem, iulculum pulu praedicti alteratur aut affluuntur.

Martius Ruandus sequenti sudorifico vsum esse foeliciter, & Summum, centaur. min. M. rad. alari Vncij. Bulliant in aquae h. & ad medietatem coeantur. Capiat vnc. v. capillat mane per aliquot dies & sudet.

Forelius vero laudat decoctum radices bardanae seu lapae maioris, quod in dard, discutiat, sudores & vinas moueat. Refert, quae quendam arthriticum in lecto decubentem, vt nullum numerum mouere posset, bibisse ceruissiam calidam, quae radix lapae maioris cocta erat: quae, & potat, cum nullis remedijs a Medicis curari posset, plurimum inuitit alba in lita lacin, & adoloribus liberatus fuit.

Hercules Saxonia panis recenter & fumo extracti decem aut duodecim ordines, secundum omnem corporis circumferentiam ad mouet, quibus sudor copiose prouocatur, & dolores auferuntur.

Conuenit etiam non parum stupha humida ex decocto ebulli lauri, saluum, rori marini, & similibus cum vino albo parata: vt illius decocto, humum recipiat eger in doloio, vnde copiosus sudor exeat.

Aque etiam thermales balneo sudores prouocant, & materiam in articulis contentam prompte discutunt. Ideo cum aegri eas adire nequeant, aqua carum transferri solet, & in lebere calefieri probalene. Erastus consilij, hoc reliquis praferat ad mitigandas dolores in aqua tantum salis incoquit, vt gullus clare salidinem percipiat.

In principio illius, temporis vacuacionis intermedij, quae eam siliant, est hibenda funtialia sunt, quae in calidi catarrhi curacione propofita sunt: praecipue vero in lepi ex aqua, vel decocto & lypsis refrigerantibus & incraffantibus.

Imo vero interdum necessitate urgente narcotica exhibenda sunt: nam & fluxionem siliunt, & dolorem atrocem mitigant. Ex his theriaca recens erit opportunissima, & sepe iterati poterit sine periculo ad 3. ss. vel 5. i. Cui vniter, ad fluxionem cohobandam, tantillum boli admodum poterit. Huius tamen loco laudanum opiatum, aliaque narcotica substituere non erit inconueniens.

Pot debitas euacuaciones celebratas, aliaque iorema exhibita, quae causam anteedentem relinquit: ad topica deuocendum est, quae dolorem demulcent & causam conuocant dilectum. Quae istam viurpanda non sunt, antequam vniuclia praedicta praemia fuerint, aliqui plus damni, quam commodi afferre solent. Vel enim macta, quam

nam natura ad articulos expellere conatur, ad intendere repellitur, unde grauius impropria excitatur vel articulus impingitur, doloreque exasperatur vel pars effluuiatur laxaturque atque ita fluxus augetur.

Quæ cum vulgo non obferuntur, & topica non satis tempeſtate & caute adhibentur, plus periculum damni, quam utilitatis inde zgri percipiunt. Topica autem illa vel dolorem ſolum ſcitant, vel cauſam ſimul dolores, humorem ſcilicet qui affluit, doloremque & tumorem excitat.

Dolorem lenientia hic maxime neceſſaria ſunt, quia ſymptoma grauiſſimum vires deſicit, & humores ad partes affectas ita caſat. Præterea viu a nodum partes relaxantur & humor qui antea ad profundiores circa articulum partes fluctat, ad exteriores & ambientes diffunditur. Vnde arthritici dolores, antequam pars intumefcat, ſunt vehementiſſimi, mitigantur vero vbi pars intumefcit. Anodyna autem medicamenta partibus arthritide laborantibus ad mouenda plurima proponuntur ab Authoribus. Præcipua vero ſunt quæ ſequuntur.

Lactis reſus parti dolenti admotum, cum pannis lineis in eo intectis, dolorem demouet: tum etiam ſi pars eo irroretur, præcipue vbi primum ex mamma detrahitur: quod maxime commendat Aſclæpius Luſitanus curat. q. t. cent. & huiusverbi. *Qui poſt dæm ingentes dolores parietibus, capram intra cubiculum ſuum adducere, & ex ea lac ſupra membrum dolenti, & male affectum emulſere curabat, quo dolores euidenter immo ſenſibiles Nec quodam interuſa. Nam lac ſic recens emulſum dolores demouet, & miratæ ac remittit. & ſi antea, remedium Turcarum Principibus communis, & familiare ſaſſum, te quo lactum & honore peti, in pretio habendum.*

Ex eodem lacte paratur cataplaſma de mica panis, quæ in eo mcoquitur, addendo vitellos oorum, & tantillum croci.

Folia etiam hyſcocyami, aut violariæ in lacte vel poſca decoquantur, & parti viſciter admoventur.

Paratur etiam cataplaſma ex pulpa rad. althææ, cum lacte permixta.

Ex pulpa caſſiæ fit etiam cataplaſma, vel ſola, vel cum oleo roſaceo aut leuocitius permixta.

Medullæ panis albi in lacte decoctæ ſb. ſauedullæ caſſiæ ſb. iij. fiat cataplaſma Vel

Medullæ caſſiæ ſb. iij. theriacæ reſentis ſb. ſi. farinæ hordei & auenæ, ana ſb. iij. macæ panis albi ſb. iij. lactis vaccini ſb. iij. vel iij. Coquantur in nia in forma cataplaſmatica, quod applicetur calide partibus dolentibus. Si addideris vitrioli calcinati, & ſubtiliſſime puluerati ſb. ſi. vel ſb. iij. multo præſtantiſſe efficies.

In principio arthritidis, quæ pedis pollicem tantum adigitur, ſequens admoendum erit.

Album ouæ, n. iſalis triti panis, aceti rol. gutt. aliquot. Excipiantur ſtupis, & applicentur.

Aliæ etiam ſunt cataplaſma lumenæ effiaciæ, in hunc modum compoſita.

Aquarum verbaſci albi & filicis totius, ana ſb. iij. vitrioli calcinati ſubtiliſſime puluerati ſb. ſi. farinæ ſb. iij. croci ſb. iij. fiat cataplaſma.

Melle cum radicibus iquantum viſ. Coque in ſiſili nouo cum æquis viſ. & aceti partibus ad tertie partis conſumptionem, deinde adde ſurturis ſcalis craſſioris q. l. ad conſociendum cataplaſma. Quod bene ſubadum, & panno lineo inductum applicetur partibus dolentibus calidum quantum ſibi poteſt. Hoc maxime commendat. Solenander.

Reſert Foreſtus, miraculoſum eſſe cataplaſma, compoſitum ex leuocula agnatica, & floribus chamæm. in lacte coctis, addendo farinæ hordei parum.

Non magna in acerbiffimis doloribus ſequens præſtantiſſimum eſſe affirmat.

Re. Vitell. ouæ n. x. Conquaſſentur in friſorio, cum ſb. ſi. oleo roſaceo. Coquantur leuiter ad inſuſſationem, addendo croci. ij. & calidum applicetur.

Admotur & plerique in principio fluxionis, cataplaſma ex ſale & ſulphure cum albuminibus oorum ſubactis.

Vel ex ſor. chamæm. ſb. iij. roſat. rubr. ſb. i. ſor. verbaſci.

ſ. Puluerentur & coquantur in ſiſte dulci cataplaſmaticiſſi conflentiam addendo vitell. ouæ n. iij. vel iij.

Vel ex farinæ hordei & ſaburum, ana M. j. ſor. chamæm. & ſolani M. ſi. quæ verbaſci, ſol. ſalici, ana q. l. vel æque plaurag. & vini, ana q. l. Incorporentur omnia ſimul in forma caſp. & ſiſte.

Fomenta etiam partibus dolentibus admoenda, varia compoſiti poſſunt in hunc modum.

Re. ſor. verbaſci ſb. iij. vini rubri ſb. iij. Tritæ macerentur per aliquot dies. Deſtillentur aqua, qua ſoecantur partes dolentes tepide, cum linteis ca imbutis. Vel

Re. ſor. verbaſci q. l. ſi. ampullæ vitree impleatur, & oriſicio obturato ſoli exponatur: ſi enim in liquorem diſſoluam, qui linteo parti affectæ inpoſitus dolorem lenit.

Sal ſaturum in ſpiritu vini tenuiſſimo diſſolutum mire dolores ſedat.

Aqua ſpermatis tanarum menſe Maio deſillata, partibus dolentibus inpoſita, mire dolores lenit, & partis inflammationem ac rubore in temperat. Cum illa etiam ſequentia viſciter admiſceri poterant.

Re. Aqua ſpermatis tanarum, taphi barbari, & filicis, ana ſb. iij. in quibus ſulphure tibiæ albi, hargyri, ana ſb. iij. vitrioli, calcinati, aluminis, ana ſb. iij. Focæantur partes dolentes tepide.

Acetum ex inſuſione lithargyri paratum, & nonnihil euaporatum, vt omnino dulcificat, admodum prodeſt arthritidi calide.

Oleum ex pedibus vituli extractum ad dolores arthriticos ſedandos præſtantiſſimum eſt, & hoc modo elicitur.

Pedes vituli coquantur, & olea conſingantur. Deinde coquantur ad putrilaginem. Oleum aqua ſuper natans miſce cum aqua vitæ & ſale, iſque partes dolentes affectæ illinantur.

Olea & pinguedines à plurimis etiam viſurpantur. Sed cum inſuſumato, quæ in membris arthritide laborantibus contingit, ad eryſipelatis naturam vtiplurimum accedit, pinguis illa plus nocere, quam prodeſſe non raro poſſunt, cum poros obſtruendo humorem nouum intus retinens, & ita dolorem augent.

Quemadmodum reſert Senoertus, vitrum quandam arthriticum, ſummo cum truſu vti ſolent ad dolores ſedandos caſco ouillo plane recenti inpoſito, vtrum ſæpe renouat. Quamprimum enim à calore partis calefactus pingueſcit, & quali byrum ſumere calcis incipit, dolor intenditur. In quolibet tamen corporis oleum roſaceum, & ſimilia conuenire poterunt, ſi cum aliis medicamentis permixta: quandoquidem pro variis hominum naturis varia conſeſe ſolent. Ideo ingens remediorum numerus habendus eſt, vt paſſim inueneri valeant, quia vix vllum inueniri poteſt adeo effiac, vt omnibus æque proſit. Exempli loco ſequentia habentur.

Re. Medullæ panis albi ſb. ſi. Coque in lacte recenti ad pulvis conſiſtentiam. Deinde adde muſcalaginis ſem. althææ ſb. iij. farinæ ſeminiſ luteæ mugi. ana Drach. ij. pulu. ſor. chamæm. mchorianæ ſb. iij. croci ſb. iij. ol. rol. ſb. iij. Miſce, fiat cataplaſma.

Vel cataplaſmati de mica panis ſupra deſcripto oleum roſac. admiſceri poterit.

Limentia & vnguenta etiam parati ſolent ad dolorem demouendum.

Re. Vitell. ouæ n. iij. vel iij. Diſſoluantur cum oleo roſac. vel violæ vel vino, & tepide applicentur.

Ballamum Sarræni cum ol. violat. vel roſ. paratum dolorem ſedat effiaciſſime.

Re. Ceruſæ ſb. iij. Diſſolue in aqua endiuiz, & modico aceti. Fiat liquidum vnguentum.

Ex eadem ceruſa fit emplaſtrum magne effiaciæ quod q. b. iatio morbi admoventi poteſt, etiam tumore atque inflammatione præſente, cuius compoſitio talis eſt.

Re. Ol. cummum. ſb. i. vini ſb. iij. Balliant ad medietatem vini conſumptionem. Deinde adde ceruſæ ſubtiliſſime puluerati ſb. iij. canphoræ ſb. iij. Coquantur ad emplaſtri conſiſtentiam. Vbi magna eſt inflammation, loco vini acetum eſt vt conponendum. Extendatur emplaſtrum ſuper linteæ, vt commodius partes obſoluantur.

Catcl.

Catellus viuis parti laboranti admodum dolorem valde dimittit.

Dolore admodum leniente ad narcoecia licet confugere quamvis ea diu in parte retinenda non sunt, cum calido nativo & nervis sit amica.

℞ Fol. hyocyami M.ij. folani. temperui. ana M.℥. capitum papaveris horrentis P.℥. rad. mandragoræ ʒ.ij. florum. chamæ. violæ. ana P.℥. Fiat decoctio in aqua vel lacte, qua foveatur locus.

Residentia pistetur, addendo farinæ sem. lini ʒ.℥. farinæ tritici ʒ.℥. ol. chamæ. m. ʒ.℥. Fiat cataplasma.

℞ Spiritus vini, per croci infusionem flavescens vnc. iv. camphoræ ʒ.℥. bulliant parum. Deinde dissolve opū ʒ.℥. Eoque liquore pars dolens illinatur. Tutum & efficacissimum est remedium.

Folia nicotianæ recentia, contusa & admota dolorem arthriticum sedant, & vim quandam narcoticam obtinere dicuntur.

Caulum verò dolorem efficientem quod attinet, fluenti in partem debent repellenti: si uero deserviant, & resoluenda.

Attamen repellentia hic improbantur, saltem sola, & sine aliorum permixtione adhibita. Nam si humorum in partem influxum omnino impediatur, metus est ne illi ad partes internas retrocedentes periculosos affectus inducant, nisi ad aliquem alium articulum transferantur. Adde quod humorum influxus ad partem intus impingitur, unde dolores acerbiores excitantur. Attamen si maximus in principio fiat humorum, precipue calidorum, affluxus, ex quo dolores acerbis metuenda fit, eum quandam tenus reprimere conveniet, admodum repellentibus non solis, sed cum anodynis permixtis, post viuales & sufficientes evacuationes. Tunc enim nimis laxata humorum affluxum promouent. Itaque prædictis cataplasmatibus, aliisque remediis plantaginem, lactucam, portulacam, sperulium, & similia addere licet, ut & aceti tantillum. Exempli gratia.

℞ Farinæ hordei ʒ.℥. Coque in oxycrato, adde vitellos ovor. n. craci Drach.℥. Fiat cataplasma. Vel

℞ Ros. rubr. M.℥. far. fabar. hord. & fougur. ana ʒ.℥. fantali rub. ʒ.℥. flor. chamæ. P.℥. Coctis & confusis addantur vitelli ovor. n.℥. aceti ʒ.℥. ol. rosæ ʒ.℥. Fiat cataplasma.

Inter deserviant remedia locum habent hirudines, parti dolenti admove. post sufficienter evacuatam corpus: tunc enim valde prouent, præsertim cum vene in parte affecta distente, & sanguine turbide apparent.

Resoluenda verò medicamenta sub variis formis vsurpantur, aque nimirum olea, vnguenti, balsami, fomenti, suffusio, cataplasmatibus, emplastris, & similibus in sequentem modum composita.

℞ Vitæoli albi & viridis ana ʒ.℥. camphoræ ʒ.℥. aque vitæ & vini albi ana ℥.℥. Misceantur, atque cum intinctis pannis applicentur. Vel

In vina calix vina extinguantur, & cum ea per residentiam aut colatam deputata, locus dolens foveatur. Idem ex calice, & aceto factum probatur.

Martini Rulandus in cennuris suarum curationum, æquum suum antipodagricum mure prædicat, cuius desorptionem nunquam propulsi. Eam autem ita se habere exultant Libanius, Petrusque alique.

℞ Aque fontis th. aqua fortis ʒ.℥. sublimati ʒ.℥. Bulliant per horæ quadrantem. Hoc liquore panni linei madefacti paribus dolentibus tepide applicentur.

Cyerceranus in Pharmacopœa sequentes proponit.

℞ Muræ. salis & vine pater. ana partes æquales, Distillentur, & aqua foveatur parti cui lintes, sæpe renouandæ.

℞ Folior. & flor. sambuci viridum, ana ℥. Contundantur & macerentur in aqua vitæ, idque per duos dies volentes. Lintē lentur per vas vitæ, vel cupreum ad siccitatem.

℞ Spiritus vini rectificatus ℥.℥. mellis purissimi ℥.℥. Distillentur in balneo vaporoso Sic duos distillabiles liquores. Primus est aqueus Secundus multo fortior, & sulphureus, quæ seorsim reterus. Magnati fusi remanent adde croci orbiculatis integris ʒ.℥. sem. cerebinthine Vnciæ ʒ.℥. calidior ʒ.℥.

tartari ad albedinem calcinati ℥.℥. salis fusi ʒ.℥. phlegmæ vitrioli a suo spiritum non separato ʒ.℥. lusu samentorum ℥.℥. Macerentur per xiv horas. Deinde distillantur ad siccitatem. Liquor qui inde emanabit, seruetur etiam seorsim. Fecibus remanentibus affunde priorem aquam reservatam. Macerentur & distillantur. Tandem omnes liquores distillabiles misce, & de novo per balneum vaporosum distillata. Hanc dicit Cyerceranus esse mire facultatis, & sibi communicare a quodam Germano celeberrimo, tantquam singulare donum, affirmante hanc esse ipsam aquam Martini Rulandi. Sequæ eximios illius effectus vidisse testatur in sedandis arthriticis doloribus, & in interlea in eandem mediocriter calcifacit & demerit membro dolenti applicentur.

Idem Cyerceranus in consilio de arthritide, gloriatur se sibi reservare aquam suam antipodagricam, tantquam veterano multo aliquid athletici artificii. Quam dicit fieri ex aqua fontana simplici, in qua iteratè & aliquoties extinguit quendam metallum, cui addit duas substantias metallicas, quæ vel per os ritè præparatè dari solent: quarum spiritus impressi in aqua prædicta, vim eis tribuit penetrandi ad radices vique morbi, atque verè resoluendi, & attenuandi materiam tartaream, gypseam, atque sales in interduris concretos, quibus tam intolerandis doloribus excruciat.

Huc tunc non absimilis, nec inferior est quæ sequitur.

℞ Calcis viuz ℥.℥. Extinguantur in aqua fluuiali ʒ.℥. & relinquantur in cella vinaria trium dierum spatio, ut melius sal extrahatur ex calce. Postea parum bulliant, & coeant per manicam Hippocratis. In colat. ℥.℥. extingue sepius, aut novies primò laminas chalybis ignitas: secundò laminas cupri ardentis: tertio vitrum ad albedinem calcinarum ad ʒ.℥. quò antimonium liquefactum in crucibulo ad lib. ʒ.℥. quantò lithargyri vel ceruse in crucibulo calcinatis ℥.℥. mercurii præcipitati albi vnciæ locione loti ʒ.℥. i. aris vbi subleuit triti ʒ.℥. Post extinctionem horum mineralium, aqua superfusa in cella vinaria decem dierum spatio. Postea parum bulliat, & coeatur per manicam Hippoc. Hac aqua calente lintea duplicatè ambutantur, & applicantur frequenter.

Inter totus parati faciles commendatur ille, qui fit ex sale ammoniac sepius sublimato, & in vino aut aqua ritè dissoluto. Vel ex vrina iuuenis bene fani vique ad medietatem cocta, & cum linteis admota.

Scribit Solenandus consil. ʒ.℥. fell. ʒ.℥. quendam senem podagricum sibi hoc modo facere medicinam solitum. Cura tumor & dolor magnus, localique rubens erat, accipiebat salem, cinerem, vrmam pueri, & acetum. In his commixtis madefactum, & expressum pannum lencum album applicabat aliquoties, sicque dolor magna ex parte sedabatur.

Quemadmodum antea diximus, olea anodyna in arthritide parum conveniunt: idem de oleis resolutivis hic dicendum est, quia poros cutis occidunt, sicque liberam transpirationem impediunt, & calorem augent, neque propter vitædam suam substantiam ad intima articulo rum partes penetrare possunt, ut humores salios, acres, & tartareos in suis latitantibus temperet ac resoluant. Attamen si prædicta olea per retortam distillantur, huic vsui maxime idonea, vi potè valde penetrantia, ac minime viscida efficiuntur. Ex illis præstantissima sunt oleum cheirimum, hyperici, & de vitellis ovorum, quæ simul mixta, & per retortam distillata, doctores sedando, cuiusque causæ discutiente vtilissima sunt.

Oleum etiam icorponum Marthioli, modo prædicto distillatum, præstantissimum est.

Oleum cetræ ad idem etiam est efficax.

At cæteris omnibus præfertur, & non solum à Chymiastris, sed etià à Doctoribus dogmaticis, ut Cratone, Piatero, aliisque laudatur oleum ex ossibus humanas, eodem modo paratum, quod oleum de lateribus conficitur: nimirum ossa humana non humata, confracta, & ignita in oleo vetus in ignuntur. Postea verò oleo imbibita contendantur, & in retortam concutiantur, sicque vi ignis extrahitur oleum.

In ossium humanorum defectu, aliorum animalium ossa subrogari possunt.

Sequens etiam erit valde utile.

g. Mastiches, thuris, myrrha, ammoniac, opopanax, bellaryuminae, an. Vnc.ij. vitrioli lib.ij. mellis lib.ij. tartari Vnc.ij. Item. Spiritus vini lib.ij. Diffusetur oleum, ex quo penna illustratur pars dolens.

Ad doctorem secundum & materiam arthritidis relati-
pendam laudatur etiam liquor limacum, in hunc modum
concoctus.

In manuce Hippocratis conice linaceum integerrimum M. Tum super illos infunde communis M. super falem ferments olei lubi infusa triu M. & sic viciffim linaces, falem, lomenti donec omnium figillatim quatuor vel quinque librari contineant. Manica pendeat in cella vinaria, humida. Et poli paucos dies diluabit ex ea liquor lubicus & purpureus, quem foli exponito per quadriduum, & liquorem aquae chamæ filitio.

Vnguentū f. foliis in hunc modum componi poterit.
γ Chamæpabularū vulgaris et unanct. torridi an. M.
℞. flor chamom. nictitior. lar. an. P. 40. & vini an. lib. tem.
Pulliant ad vim confusuræ. Expressioni adde ceræ q. l. ad
vnguentū confectum. Iungatur calide pars afflata. Intra
24. horas pars intumescet, & dolor cessat.

Cataplasmata etiam resoluuntia & dolorem sedantis varia confici possunt. Præcipua verò sunt hæc.

¶ Puturis tritici lib. i. lase Vnc. i. lase q. i. Decoquantur
ad formam cataplasmatica. Vcl

q. Farinae fabar. lib. sem. Decoquatur in vini f. q. addendo
aque vite & butyri parum. Fiat cataplasma. Vel
Ebuli folia tenera a sambuci contula applicentur, vel
cum butyro friza in farta rube. in formam placentae.

Radix bryoniae contusa cum aqua vitæ est etiam valde
efficax.

* A nonnullis etiam commendatur radix aronis, cum stercore vaccæ permixta.

Sequens vero à Solenandro laudatur, quod sine infigni calefactione resolvit, dolorem sedat, & articulos roborat.

¶ Pula.ro(rubr.Vnc.) mastiches Vnc.i.camphoræ 3.6
 feruntur hoc de lib. 8. Constat in vino albo. coarctum

Emplastra demum magno viui esse solent. Præcipua vero sunt hæc.

γ. Thuris, mumie, colophoniz, an. Voc. i. mastiches
mastiche coralli alba an. i. 6. stuppiebuscom f. si. mupio

Rad. iroeo Florent. & hermodactyl puluer.an.3.vi.em
plasti emerozi & de musco.an.3.viii.sicini3.Mo

Emplastrum diaspalma seu diachalciticos maximo in vi
est, vel solum, vel addita camphora in hunc modum.

3. Melle emplastrum diapalma lib. sem. camphoræ 3.ij
Misceantur simul, & applicentur partibus affectis. Vel i

7. Matiz emplăstri diachalcir lib. β. de sulphure 3-4. fly

rac. calant. & benzoim., an. 3 dem. gum. tacam. 3 ii ole.
hy. peric. & jumbic. an. 3 ii. f. i. r. v. n. h. q. d. 3 i. f. i. m. cer. n. a. u.
q. d. Liq. fact. omnib. simul i. m. v. n. h. g. t. u. r. t. e. l. a. b. i. s. a. n. t. t. e. r.
gum. polia & siccata. s. e. r. v. e. t. u. r. a. d. v. i. n. u. m.
At vero idem emplastrum cum sequentibus permixtum
inter acutissimos, pessimos, & horribilissimos, & in

gr. Emplastrum diachaleit. vino rubro austerio foliis, & a
vini confusio prout in costis lib. i. myrtill. ros. rubr. mastic. ba.

Tandem in dolore diuturno & valde contumaci, d. m. a. teria confectum frigida orando. confectum pessum.

tertia praeteritis iniquis oratione, coniungunt nonnulli a-
 vesicatorio, paribus affectis admodum. Eorum mentionem
 facit Sennertus, sed quae anodynis permiscuantur. At en-
 plastro vesicatorio, quod in nostris officinis habetur, sol-
 & impetum xto, sapientissimus Varandaeus preceptor me-
 lochiter vult esse: eoque curavit magnam & contumaci-
 tumorem genu occupantem, cum alij Medici multas pu-

gationes, & diartem fudorificam, nechoi topici permittit
frustra viurpant

In omnium autem praedictorum remediatorum visio huncynicè annotandum est, quod a iuuventibus & iuuentibus hominibus indicatio quandoquidem variae sunt hominum naturae, varia temperaments, & varii generis excrementa in eis colliguntur, unde summa in morbis varietas loti exoritur. Ideo quod vni prodest, alteri saepe est inutile. Quod maxime vult veni in arthritidis curatione. Ea quae ratione vnicuique praefixo medicamentorum lyta habenda est, ut si vnum fructu tenetur, ad aliud quae aliud confugere possit: ea semper deligendo, quae rationali methodo magis confidentia videbitur.

Quando arthritis tophacea, & nodula est difficillime curatur, praesertim si in veterata sit. At nodi recentes emollientibus & resolventibus fomentis, vnguentis & emplastris solui possunt. Specifica vero sunt quae sequuntur.

Gal. valde commendat emplastrum compositum ex ca-
leo veteti & acrycum decocto perne suille salite subactio

Alii pedes lillos albos decoquant, quousque in macila-
ginem conuertantur. Poltea admilcent calci anti qui partes
duas, puluer nalturt. partem vnam, vt fiat emplastrum. Ve

g. Nucii nicotianae vnc.ii. ceræ cicutæ vnc.ii. refinæ pini
vnc.ii. feni. terebinth. vnc.ii. olei chamom. q. l. Fiat ceratum
mole. Vel

St. Baccharum orientale (quas Galli vocant *coquelicot* & *coquelu*)
Linn. (1753) in *Fl. Linn.* 1: 108. Plurimum in Italia & in
Gallia communissimum in agro diffunditur, notum

Ruſandes tumores iſtos duros inungit manè, meridiè &

vesperi olio leu ballamo fufphuris calente, & delaper em
plastrum diafufphuris calens applicat.

Ac vnicē confert en-platium loquens, quod præter doloris sedationem, etiam ex articulis materiam tophiaceam extrahit.

gr. Vitrioli rom. lib. i. aluminis rupei lib. sem. falis Vnc. iv.
Hæc omnia coniunctim calcina in catino terreo, euapo-
rando saltem donec spiritus etiam exhalare ceperint. Quo-

¶ Huius puluer & farine hord. ana partes aequales
Misce cum lacibus vini ad formam pulvis, quam supra h

ciniam extendere, ad ipsitudinem cultri, & applica loco a-
fecto. Exsiccatam massam cum fecibus vini veterum dissolu-
& applicate perge, donec primum discussus dolor: postea
vero ex articulis ipsis contortis omnes thphi consump-

fuerint. Interim tamen sepe fit, ut cuius aperietur, quo
formidandum non est. Vel enim sponte sua postea vicia
coeunt, vel cetera saltem emplastris loco impolita confolid-
antur. ipsis articulis denuo mobilibus & agilibus redditis.

melicratum valde diluunt, scilicet ex aquae partibus 40. vel 48. & mellis parte una, quod tamen non conuenit picricolis & fistibundis.

Bochetum sequens omnibus naturis conuenit, & plurimis valde profuit.

Rad. saliz paril. 3. inquirir. Vnc. cinam. & sem. anisi 3. g. Fiat puluis tenuissimus. Cuius cochli. misceatur cum ea aquae quantitate, quae pro vii. o. passu sufficit. Agitentur in duobus vasis ter aut quater. Postea colentur per potu ordinario, singula passibus idem iterando.

Vacuatione verò quod attinet, phlebotomia primum influenda est, praesertim vere & autumno: in iis qui sanguine abundant, eisque effluente obnoxii sunt.

Purgatio verò non solum vere & autumno, sed etiam quater in anno, in & singulis mensibus in valde cacochymis celebranda est. In quem visum multae purgantium formulae circumferuntur huic affectui specifice. Praecipue verò quae sequuntur, a prudenti Medico ita usurpandae, vt plenissime immutari debeant, tum ratione materiae, tum ratione dosi, iuxta varia aegrorum temperamenta.

Re. Sennae mundat. turbith. hermodactyl. & rasuræ cranij non homati. aas Drach. 1. diagrydi Drach. 8. Fiat puluis de quo capiat 3. cum aqua iux arthriticæ, vel alicui. Vel 3. Saliz paril. Vnc. 3. sennae mundat. 3. v. turbith. hermodactyl. 1. alape. mechosh. ana Vnc. 8. agaric. trochisc. 3. diagrydi cinamom. 3. 8. Fiat puluis. Cuius 3. infundatur in vino albo per noctem. Capiat æger mane vinum & pulverem.

Eleguarium caryocostinum a Petro Bayro miris laudibus fletur, & ab omnibus Prædicis approbatum, cuiusque descriptio habetur in Pharmacopœia Bauderoni. Datur ad Voc. 8. Sed in calidioribus naturis illius vius poterit esse noxia.

Rhasis pilas suas laudat eo encomio, quod *incedere non volentes faciunt ut pedes ille autem ita se habent.*

Aloes optime vnc. sem. rosæ rub. 3. ij. hermodactyl. alb. a cort. exterioribus mundatorum 3. diagrydi Drach. 3. Cum aqua iux arthriticæ & melle rosæ. fiat massa pilul. Cuius dosis erit Drach.

Vites etiam sunt quae sequuntur.
Aloes hermodactyl. an. Vnc. 8. chamæp. 3. ij. chamæd. 1. lychad. arabic. an. 3. sem. hyperici 3. 8. Cum terebinth. Veneta fiat massa pilul. quae quia manis purgant, frequentius exhiberi poterant.

Per vomitum etiam facit evacuatio in praeservatione, magno succedat adhibetur, si æger cum facile terat. Quod indicant Allaharismus insignis Medicus. his verbis. *Vomitum, inquit, visus est laxatio, ad eradicationem profusorum humorum, qui sunt ab infra generis, & quae ad pedem, sicut in dolore sciatore, & dolore genium, & similia.*

Provocari autem poterit vomitus singulis mensibus per biduum sequens: quia secundus dies prioris reliquias extrahit. Hunc autem melius succedere quidam obiterunt, cum Luna in signo aliquo ruminante, vt Tauro vel Capricorno, reperia iuerit. A cæpi autem provocare vile est, in gellis prius cibis versis pinguis, scribis alicuique in magna copia. Postea ventriculum fricando, & digitos in fauces intromittendo. Quod si non sufficiat, vomitorium est habendum est, praesertim ex radic. alari & genizil decocto consiliatur, quae aliqui in arthritide curanda idonea esse solent.

Illa etiam quae per indores fit evacuatio, sanguinem a ferros excrementis repurgat, & causam arthritidis antecedentem edere. In hunc visum insitui poterit diæta sudorifica vere & autumno, ex decocto liliæ parchine, salisfras, aut etiam guaiaco, provt ægri temperes suadere videbitur.

At sine sudorum provocazione, per simplicem diaphoresin, materiam moribicam educens decoctum, a recentioribus quibuldam Prædicis in vium reuocatum est, cum extremo fructu. Illius compositio, & vtendi modus talis est.

Rad. saliz parill. an. crud. & putaminum nocum, an. v. vicat. chine vnc. 1. lili. Brasiliani parumque bit. Bulliant ad medietatem usque, & putamina pulverentur, & in dodulo includantur, qui in olla suspendantur, ne sunt strungat. Colaturæ capiat bonum haustum, manet tri-

bis horis ante passum: post meridiem quatuor horis post prandio & tribus horis post cenam, per xv. dies, præmitta, vene sectione & purgatione vniuersali.

Ex residua cum pari aquae quantitate, fiat bochetum, ad quartæ partis consumpt per potu ordinario, addendo coriandri & liquirit. q. ad laporis gratiam.

Ad arthritidem præcauendam, cuiusque radices in visceribus latentes extirpandas, quidam Prædicæ commendant visum antipodagricosum, per annum integrum & exhibiturum, quibus multos in integrum fuisse liberatos pronuntiant. Ex multis eorum formulis sequens præcipua est.

Rad. saliz parill. 3. iv. sem. hyperici, sol. chamæp. & chamædr. an. Vnc. in. arill. rotud. 3. vi. angelicæ 3. iu. cinam. 3. ii. caryophylli 3. iv. croci 3. ii. Omnia in tenuissimum pulverem redacta incorporentur cum mellis Hispani cochli q. 6. Fiat opiata, quæ vtatur æger per annum integrum, sumendo singulis diebus veris, autumnii & hyemis 3. i. 8. zellæ tantum 3. i. & ablineat omnino diebus canicularibus. Vinum bibat valde diluunt & ablineat a venere.

Horum antipodagricosum insit forsan esse poterit decoctum chamædrysos, quod propterea Carolo Quinto Imperatori a Genuensibus Medicis valde commendatum erat, & testatur Solenander, plurimos qui hoc medicamentum per sexaginta dies bibissent, penitus fuisse liberatos. Huius decocti compositio talis est.

Re. Chamædrysos dum floret, 1. 8. & benè asservatæ M. i. vini medicoris maturi 8. iij. Coque in duplici vase per hor. quinque. Colari vini capiat æger haustum, corpore ad sudorem composito, præmissa purgatione.

De calidis aenem ita medicamentis hic notandum: ea non solum calidis naturis non prodesse, sed etiam incommodas resolutiones aut alia incommoda inducere, ideoque summa cum præmeditatione ea esse exhibenda.

Turtius & forsan vitius usurpat poterit opiata sequens, quæ nimis calidissimo totum corpus sensim, & per epist. cralim ab omni superfluitate illius repargat.

Re. Sennae mund. 3. turbith. hermodactyl. an. 3. v. ligni guaiaci, salisfras & rad. salisfras. Vnc. sem. rad. ching. 3. i. sem. lili. gni nephritici Vnc. 3. i. trum (santal. an. vnc. i. sem. anisi 3. ii. melis optime depurati vnc. iv. Fiat opiata. Dosis 3. per integrum annum, exceptis diebus canicularibus.

Inter vulgares homines quidam pro magno remedio prophylactico habent, vt tres aliorum bulbi integri mane deglutiantur, continuando per mensem integrum. Et eum ventriculum calefaciunt, & roborant. Citra hepatis, aliorumque viscerum calefactionem: nam integri cum scilicet excerpuntur, sed cocti de pincta viscida obvolunt, quam a ventriculo, & intestinis deturbant.

In arthritide biliosa aquae acidule, vitriolatae, & refrigerantes plerumque conferunt. Ita vt eorum visio plures ab ea immunes per longum tempus evascent.

Ad eundem finem laudatur ab Hipp. 1. de morbis, visio lactis asini, quod etiam pluribus arthriticis multum constulisse experientia docuit.

Ac denique omnia remedia, quæ calidioris hepatis intemperie corrigende, quæ visceri roborando idonea sunt hic etiam conuenire poterunt, provt supra in eiusdem intemperie curatione descripta sunt.

Si verò ferulos humor a cerebro deflues, vt plerumque fit, huic affectui dederit originem, cerebri ratio habenda maxime est: vt nimium intemperies illius corrigatur, & humores in eo geniti deriuentur & disculantur. Quibus visibus conueniunt cauteria, vesicatoria, erethina, masticatoria pulueres eucuphe, suffusio, aliaque remedia in affectuum cerebri curacionibus propolita.

Vltimum præcautionis caput est, articuli roborentur, ne tam facile humorem influentem recipiant. Aduertendum tamen, roborantia medicamenta, non solum frustra, sed etiam noxie usurpari nisi materia antecedens, & fluxus humor remedii prædicti sollicitè auferatur. Alioqui hæc roborantia vel humorum ad articulos influxum impediunt nequeunt: vel si impediunt, ad partes refluunt humores illi, & multo grauiora mala coniciunt.

Inter præcipua roborantia vinacea numeranda sunt quæ materie moribicæ reliquias disculant calore actuali, &

• Vel componi etiam poterunt facilli efficaces, ex foetis grauis iuniperi contusis, & predicto modo in sartagine calcatis.

Inunctiones etiam conuenient ex ol. chamom. aneth. lilior. irino. nardino, & rutac. quæ partes extiores relaxando, motum humorum ad eas conciliabunt, vt sic interne minus afficiantur.

• Oleum (corpionum Matthioli inunctum, est etiam valde efficax.

Ad potentius refolucendum aqua balsami Guidonis, inunctiones admodum erit præstantissima.

Vnguentum de althæa partes extiores laxat, & materiam morbosam blande discutit: idcirco circa initia eo iungi poterit totum crus, & tibia vsque ad extremum pedem, iuxta ignem luculentum.

In progressu vero sequens potentius & calidius admove-ri poterit.

• Ol. Iulmbricæ de lateribus, & de terebinth. ana. j. j. ol. vulpini 3. j. gummi ammoniac. & sagapeni aqua vitæ soluta. an. 3. v. callores pinguis 3. ij. euphorbi 3. j. ceræ q. l. fiat vnguentum.

Sapo durus cum spiritu vini dissolutus optimus, inunctione facta ad ignem.

Oleum de lateribus insum, post sex cucurbitulas parti dolenti, & in ambitu eius admotas, calidè impositum, postea tegendo linteis valde calidis. contumacem dolorem ischiadicum vna die curat.

Lacina Commentarij Duse. vnguentum sequens tanquam mirabile commendat.

• Succor. rad. & iolebuli, an. j. j. olei chamom. 3. vi. Bulliant ad succor. consumptionem. Deinde adde ceræ q. l. acceti guttulas aliquot ad penetrationem fiat vnguentum.

Cataplasma ex iberde maltum laudatur ab Authoribus quod hæc planta huic affectui curando sit valde efficax. Id componi poterit in hunc modum.

• Ol. Iulmbricæ M. v. decoquantur in vino & contendantur, addendo farinæ lupulor. orobi & fabar. ana. 3. iij. pulueris rutæ ficæ. lilior. chamom. & rad. colici, ana. 3. j. ol. terebinth. vnc. sem. ol. Iulmbricæ q. l. fiat cataplasma.

Platerus plurimum prodesse testatur, si salui recens in tegulam causam ignitam posita, sepeque ne aduratur agitata, & hoc modo semicotta acetato perfundatur. tegulaque linteis obducta sub ægri cota ponatur, vaporque mede excitatus excipiat.

Non parum etiam conducit panis recentis de furno extractus valde calens, per medium sedus, aqua vitæ irroratus & admotus.

Ad materiam morbosam foras extrahendam conuenit cucurbitula in summa parte doloris, quæ ad os sacrum pertinet, quater repetita sine scarificatione.

Ad idem valde conferunt hirudines octo vel decem parti affixæ, quæ a Paulo & Aureliano probantur. Et Zacutus Lusitanus de decem horarum spatio dolorem ischiadicum sustulisse asserit, qui omnibus aliis remediis antequam non poterat.

Emplastro vero in frequentissimo vsu sunt, & hac in re plurimum possunt. In eorum tamen vsu hoc perpetuo obseruandum, quæmadmodum de aliis in genere dictum est: vt primo mitiora admoveantur, quæ si parum profuerint, ad vehemensiora transire debent potentius. Quem etiam ordinem nos in eodem formula discubendis obseruamus.

• Picis nautalis 3. ii. sulphur commun. subtilissimè triti 3. iii. malliches 3. i. terebinth. 3. i. Melle, ceræ empl.

• Picis nautalis 3. ii. gummi ammoniac. bdellij in aceto dissolut. ana. 2. i. sulphuris vici, turbith. hermodact. an. Voc. sem. callores Drach. extiores parum, ceræ q. l. fiat emplastrum.

• Gummi ammoniaci & sagapeni in aceto dissol. & denno inspirat. an. 3. i. emplastrum chion cum gummi 3. i. j. Li- quebant omnia simul. Deinde adde cinnabari & aris viti, an. Voc. auripigmenti & viridis aris, ana. 3. ii. fiat massa emplastris. Si vici exteuerint, ponatur linteum inter partem & emplastrum.

• Si malum pertinaciter hæreat, ad vesicatorium transire.

dom est, quod parti admotum materiam morbosam euellit. Emplastrum igitur vesicatorium applicandum est, vel solum, vel vt mixtus agatur, vnde aliqui ex prædictis, æquis partibus permixtum: sic enim per longum tempus in parte poterit detineri. Vel sequens de nouo dispensari poterit.

• Picis nautalis, ceræ picis albe, an. vnc. i. sem. colophon. 3. i. thuris malliches, an. 3. ii. euphorbi, ladan. sulphuris vici, opopan ammoniac. bdellii, galbani, sagapeni, an. 3. i. llyrac. calant. benon. an. 3. ii. cantharid. 3. iii. galangæ, caryophylli an. 3. ii. llyrac. liquid. q. l. fiat emplastrum.

In duritum affectu causticum tibiæ lateris dolentis materiam morbosam deriuat, & morbum interdum tollit. Zechus admoendum esse vult parti tibiæ exteriore. Si vero suspicio fuerit cathari à cerebro delinquentis, alterum etiam occipiti admoendum est. Id enim aliquando ischiadicum dolorem antiquum curauit, qui non aliis remediis vinci poterat. Tum denique alia remedia cerebri intemperiem corrigentia non erunt omittenda.

Zacutus Lusitanus causticum retro aures insultat, quando fluxus à capite irruit, cum miro successu in vnum se vocasse asserit, & peculiari història confirmat. *ib. l. 1. c. 1. s. 1.*

Toto curatio decurrit clysteres frequentes iniiciendi sunt, vt materiam morbosam portio ad intestina deriuetur. Tum etiam ad dolorem causam proximam discutendam sequens aliquando profuit.

• Vni generosi 3. i. sem. ol. nucum & rutac. an. 3. iij. ol. terebinth. vnc. sem. Melle, ceræ clyster. iniiciendus quoties dolor urget.

Clyster verò sequens humores à parte affecta potenter extrahit, propter viciniam quam habet cum intestinis.

• Pulpe colocynt. 3. i. surfuris macri M. i. vini albi 3. i. sem. Coquantur ad libi. Ex colatura fiat clyster, qui seruetur per horam.

Dolor ischiadicus interdum à bile, & humoribus calidis generatur: qui quidem dignoscitur cum dolore est acerbissimus, & pungitius similis, exacerbationes alternis diebus sequeles efficiuntur, habitus est gracilis, temperamentum biliosum, ætas iuuenilis, regio & tempestas calida, dolores calefacientibus exacerbantur, morbi percellerunt biliosi, vicius calefaciens, exercitatio vehemens: tunc enim ad bilem & calidam intemperiem remedia dirigi debent. Ideo conuenient venæ sectio, purgationes cholagoge, nunc lenientes, nunc etiam vehementer purgantes, additis dyagrydiatis, vt materia morbosica educatur: iulepi refrigerantes, clysteres molientes, & refrigerantes lac. balneum. alique remedia in calida hepatis intemperie proposita. Hoc perpetuo cauentes, vt aperientia videntur, instantia potius eligantur, qualia in catarrho calido & tenui proposita fuerunt.

Dolore acerbiori existente narcotica exhiberi possunt, præsertim syrupus de papauere, quo dolor sedatur, & fluxus cohibetur humoris instillatione.

At longè potentius operatur laudanum apiatum ad g. iij. vel iv. exhibitum: quod etiam in clystere ex nulsulo, vel lacte dissolutum, præmixto alio laxante, dolorem sæpe in momento sedat.

Topica etiam minora, vt ol. lilior. violæ chamamel. & amygd. dulcium cataplasmata ex lactuca, solano, endiuia, farina bardocum oleis prædictis: & circa declinationem fomenta, linimenta, emplastris mitiora, & minus calefacientia.

Materia dolorem ischiadicum efficiens aliquando suppuratur, & in abscessum conuertitur: quod docuit Hipp. 3. *epid. an. història Epuloni*, qui talem abscessum passus est, & ex eo capidus interit. Si abscessus aperitur, vicius remanet (ordium & cacoethes, quod etiam ad tabem perducit. Eam tamen cum vlcere curatam sæpe à se fuisse gloriatur Zacutus Lusitanus. *ib. syn. l. 6. lib. 1. de cocto ligni sancti*, & radice lalis panice. Quæ obseruatio legenda, & sedulo meditando est.

CAPVT III.

De Rheumatismo.

Post arthriticis affectus propriè dictos, & Rheumatismo agere operæ pretium est, propter magnam analogiam, quæ inter hosce affectus intercedit: quæ sanè tanta est, vt vulgus medicorum quæ Rheumatismi naturam ignorat, eum arthritidem vniuersalem nominare soleant. In hocque enim affectu dolor articuloz reperitur: sed in hoc differunt, quod in arthritide soli articuli dolent: in Rheumatismo verò non solum articuli, sed etiam totum corpus, media scilicet inter articulos spatia, musculi nimirum, eorumque membranæ, ac præsertim periosia, totiusque corporis habitus: imò verò interdum corporis partes internas, vt ventriculus, intestina, venter, pulmo, rheumaticos affectus experientur.

Licet autem catarrhus rheumatici nomine donetur apud Græcos: differt tamen ab eo rheumatismus: quia in genere quidem fluxionis est: sed alterius naturæ ab ea fluxione, quæ vulgò catarrhus nominatur, qui quidem à cerebro tantum exoritur, & vnam aut alteram solummodò partem infestat, cum rheumatismus ab internis visceribus, tum venis & arterijs procedat, & in corpore vniuersum effundatur.

Hic affectus, morbus nouus non esset, tamen à veteribus non est sufficiens descriptus. Illius delineatio habetur apud Hipp. lib. de locis in homine, & apud Galen. 1. de differ. febr. c. 1. de compos. med. secundum genera. Sed omnium maxime insignis ac perspicuus locus hunc affectum explicans, in lib. 1. de differ. febr. cap. 7. continetur, his verbis, *Fluuium quædam ratione prouenit sicut rheumaticæ, nempe affectus per vndelet corpore infuso, principibus vero illius partibus, paululum licet infus sanguini, grauari tamen solent, namque ad carnes cutis partes protrudentibus.* Vnde legitimam rheumaticæ affectionis naturam in eo sitam esse constat, iuxta Galeni doctrinam, quod corpus vniuersum esse impotentia sit affectum, vt ubi principio eius partem aliquo sanguine grauari coarctat, licet non sit in copia plurimum excedens, ad carnosas partes & habitum corporis transmittat.

Illud autem crude & simpliciter admittere non potest, quod dicitur à Galeno, partes principes lingue grauari cum ad carnes cutis partes protrudere. Ide enim inflammationes & tumores in illis partibus exorirentur, aut coarctat experientia in rheumatismo nullum tumorem, nullam inflammationem, nullamque caloris mutationem in partibus dolentibus vtplurimum apparere.

Causa igitur proxima & immediata huius affectus est humor serosus, qui propter tenuitatem, partes in tumorem non eleuat, & propter subtilitatem minime suppurationi idoneam, nullam vniquam abscessum producit, led tantum dispositionem quandam inflammationis ac feri hecæoe oriundam.

Origo autem primaria huius affectus hepatis adscribenda est, quod seruida interpretet affectum, atque debilius redditum, alimentum non satis nutritioni conueniens generat, & totum corpus pari imbecillitate afficit, vt ita loquimur, imbecillitatem receperunt reddat maxime aduocum. Ex eisdem verò hepatis imtemperat ac imbecillitate, multus fit prauorum humorum proventus, qui in venis & arterijs diutius retentus, prauam quandam acquirunt corruptionem, ibique coalescunt, & in feri, atque ichorum naturam abeunt, & tanquam onus graue expelluntur à natura ad partes ignobiliores: cum iatis robusta non sit, vt eos extra corpus omnimò euminate valeat. Illi autem humores serosi & ichorosi summa acrimonia præditi, partes ad quas defluunt, lacerant, & pungunt, vnde dolores & cruciatus oriuntur. Licet autem hepar primariam huius affectus originem præ se ferre à nobis conseat: à cerebro tamen humores istos interdum, immediate defluere ex eo patet, quod læpe dolores in ceruice incipiunt, postmodum verò ad humeros & brachia descendunt. Verum prima humorum ærium generatio fuit in hepate seruida, & ad cerebrum translata, confluunt postmodum in subiecta partes.

Quamuis autem modo veluti critico humores isti aëris expellantur, motus tamen eorum non est ita subitus, sed lentè & paulatim efficitur: cum nempe humores illi prauè & corrupti in venas seruent & ebulliant, ad postmodum à venis sensim expellantur, ac veluti eumouentur, vnde nauis vis venarum, facis appositæ, motus illi appellari solet.

Humorem autem serosum esse causam præcipuam horum dolorum multiplici ratione conuenit. Primo quod nullam coloris mutationem, nullamque tumorem vtplurimum partibus inducit: licet aliquando, cum humor valde copiosus est, in exiguum ac præteritum tumorem partem eleuet, qui tamen facit discutitur. Secundo, quod dolores isti admodum mobiles sint, & nunc hanc, nunc illam partem inuadunt, & ab vno loco in alium subito mutantur, priori subito immuni reddito, ac dolore omnino vacuo: quæ tepentis mutationes non nisi ab humore mobili, summaque tenuitate præditi fieri possunt. Tertiò, quod sudoribus læpe morbus iste terminetur. Quarto, quia pleoræxia serosa multa in hisce exortantibus apparent indicia: nempe vrinæ tenues ac copiosæ, potus quantitatim excedentes, & magna feri copia in sanguine detectio apparet.

Licet autem serosus humor sit causa præcipua & frequentissima dolorum qui in Rheumatismo contingunt, non est tamen à ratione alienum, status aliquando concurrere ad eorum productionem. Cuius rei coniectura facere potest subita doloris permutatio de loco in locum, & quod non est pondus, aut grauitas in partibus dolentibus. Hæc est Ausennæ sententia, qui hunc affectum describere videtur, illi quæ generationem flatibus tribuere, *seri 1. lib. 3. tract. 2. cap. 7.* his verbis, *In dolore subito ex flatibus expulso angust, & grauitas minuitur: & aliquando est cum punctione, quandoque etiam cum corrosione, & in statu dolore quidem grauitas nulla est. Et quandoque etiam cum ipso sit permutatio doloris frequens de loco ad locum.* Hæc Ausennæ: quibus sequens subiungit, quæ ad rheumatismi descriptionem propius accedere videtur. *Et flatus est quandoque in tunicis membrorum, & villis, sicut in celica fistula: aut in tunicis muscularum, & sub membranis, & super illas, aut in circuitu muscularum, inter coram musculis, aut in ipso membro latens, ut in musculo in priore.*

Si quis verò obijciat, morbos à flatibus oriundos: non tando durare, cum flatus facile discutiantur. Respondemus, flatum in partibus dolentibus contentum facile discutit, vnde excedens dolorum permutatio contingit: sed minime adest in venis, ex qua fieri potest continua flatuum eleuatio, qui postmodum ad partes prædictas deferuntur. Multa autem flatibus generandis idonea est humor crassus, viscidus, & pituitosus: quem in rheumatismo laborantibus sæpius redimere ostendit sanguis ipse detectus, qui non raro crassus & glutinosus est, pituitum crudum & putridum reterens.

Diagnosis huius affectus, ex in quo dicta sunt, facile elici potest: paulo vterius tamen explicanda est. Primo igitur partes doloris, affectus, nempe musculi, eorumque membranæ & periosia hunc affectum à reliquis omnibus distinguunt. Licet enim dolores venerici, artus & internodia occupent, & maxime periosia, differant tamen in eo, quod non ita vniuersaliter corpus totum infestant, neque jam continui sunt, noctu tantum, & parum interdum ex cruciantes, neque vtplurimum à conuersis officiis ægrotantes auertant: cum rheumatismus ipso lecto penitus affligat, vt se se vix commouere valeant, neque à nimis tritu cum maxima molesta, & dolorum exacerbatione moueantur. Ac denique alia iis venericæ signa adiunt, vt præceperunt, vt gonorrhœia, bubo venericus, caries pudendi, & similia.

Alia etiam symptomata hunc affectum concomitantia ad illius diagnosis plurimum conferre possunt. Adnotare enim manu partibus dolentibus, calor, & acrimonia: ferus percipitur: ichris vtplurimum adest, sed ea præterea interdum verò nulla. Sanguis qui detractus plane corruptus est, crassus & glutinosus, tunc post multas phlebotomias sero copioso diffusus, ita tamen mutatus, vt sanguinis speciem

Cap. III. De Rheumatismo

399

eum amiserit. Postquam cessant, vel intermisit dolor, nulla remanet umbiliculus in parte, et in arthritide contingit. Purgantia medicamenta & topica ab initio usurpata nihil profunt, imo morbum & dolorem augent: in declinatione vero utraque sunt proficua.

Quod ad prognosim attinet: affectus iste raro, aut nunquam vitæ periculum infert, sed longitudine sua magnam parit molestiam duos eum vel tres menses perleuat si sit sine febre imò vero interdum, præcipue si non recte curetur ad annum, vel plures annos extenditur. Franciscus Portus, qui eleganti carmine decadem medicam scripsit, agens de rheumatismo, refert leipsum per biennium ferè hunc morbum expertum esse, quem tandem superavit adnitentibus scx Medicis Parafienfibus, illius temporis illustribus, Passio, Ellinu, Belliquestro, Saniacobeo, Seguno, Hollerio.

Si cum febre rheumatismus oritur, breuior esse solet, sed datis cruciatibus, & acerbioribus ægrum excutit: & tunc intra 30 vel 40 dies soluitur aut maximam saltem patitur diminutionem.

Rheumatismus alijs morbis superueniens, vt apoplezia, & conuulsioni, periculum immittit, translata materia morbifica à partibus internis ad habum corporis.

Sadiores in declinatione morbi aduenientes, salutaris. Vixit crasse & multæ in declinatione produentes, morbi solutionem asserunt.

Ad curationem huius affectus, materia morbifica reuclenda, iungenda & euacuanda est, viterum intemperies corrigenda, omniumq; partium, tam mandantium, quam recipientium robur conseruandum est.

Quæ omnia sequentibus remedijs præstari poterunt.
 3. Fol. malvæ violar. betæ æquæ borrag. an. M. i sem. anil. 3.ii. Coquantur ad quart. v. in colatura dissolue mellis violæ & luyri recent. an. 3.ii. Fiat clyster in iocundis horæ, comoda, & iteranda linguis, vel alterius diebus per integrum morbi decursum.

Reiecto clystere vna aperienda est alterutrius brachij, & detrahendæ sanguinis 3. viij. vel ix. Non refert ex quo bacchio sanguis præsum detrahatur, quandoquidem pluries iteranda est phlebotomia, atq; adeo vtriusq; brachij vix læpis erunt peritendenda: sanguis igitur diebus ab initio sanguis detrahendus est donec morbus remiserit, & dolores immixti fuerint. Nec refert si per 2. 12. aut etiam plures dies sanguis detrahitur, quandoquidem ille morbus hoc habet peculiare, vt ex frequenti vixæ sectione vires non deiciuntur, licet in alijs morbis solet contingere. Ideoque vixæ in vixæ in huiusmodi affectionibus, dum vixæ seditionem adeo frequenter præcipi bene agrotantes, vel adiacentes tercantur à toties repetita phlebotomia: hæc relictionem addere, vt continetur singulis diebus misso sanguine donec immixti fuerint dolores, aut vires multum debilitate. Cum autem huius euacuationis vixæ continuandæ, vixæ deiectione non emergentem agrotantes ibere pariantur, cuiusque frequenti iterationi faciliem aditum præbet, faciliem autem illam tolerantiæ facit sanguinis conditio, qui in hoc morbo admodum putredus semper educitur. Copiose huius sanguinis euacuationis vixæ tam obediens experientia: siquidem ex ea sedulo conuincitur morbus qui longes esse consuevit, vt in propoli dictum est, intra satis breue spatium non raro euacuitur. Et docet eadem ex perentia hæmorrhagiam largi hæc morbo superuenientem cum omnino relouere. Hoc subiantere vixæ illi Hipp. Aph. 74. secl. 4. Quibus sperantur ab affectu futuris ad articulos, non liberat ab affectu vixæ, multa exordia, & multa, quæ in laboribus febribus quædam quibusdam incipit fieri, fieri etiam ex naribus succurrere sanguis, inter admodum foetida sit. Humor enim decubitus, qui ad articulos fuat, cum rheumatismo quandoque habent analogiam. Tum etiam idem Hippocrates quandoque rheumatismi sublimitationem proponere videtur. Perierit, illiusque generationem suppressa hæmorrhagia conuicta a diebus vixæ. Quibus ex artibus dolores sunt, & tumores, & sedantur non per aliquam modum si compertum fuerit a magno, & in vixæ sublimitationem aditum, & quæ sequuntur. Postea addit: Et autem hæc morbus sit, quibusq;

peritiam & inuentionem sanguinis ex naribus fluere solent desit.

Dum phlebotomia celebrantur, clysteres (vt antea dictum est), linguis vel alternis diebus vixandum etiam iulepi exhibendi, qui viterum intemperiem corrigere, & humorum acrimoniæ atque agitationem cohibere valent. Huius vixæ maxime conducit aqua papaueris rhabdona, quæ cum valde proficua sit in hoc affectu, sola exhibenda est mane & sero ad Vnc. vi. cum syrupo de limonibus vel granator, ad formam iulepi: quamquam sine syrupo non minus sit efficacia.

Pro potu ordinario psylla ex hordeo, gramine, & liquiritia, vel ex decocto rad. aceris, vel tinctura rosarum vixari poterit: à vino prius abstinendo, quod omnium vixationum vehiculum est maximum.

Purgatio in huius affectus principio, augmento, & fluxu nullum affert auxilium: imò vero noxia est: fluxiones enim irritat, & dolores intendit, quemadmodum in omnibus inflammationibus dispositionibus euenire solet. At in declinatione necessaria est, & multoties celebranda atque blanda medicamentis, vt per epuratum cacochy nua in vixæ corpore retinens educatur. Ad hanc finem potio sequens præstari poterit.

3. Sem. mundat. de tamarind. an. 3. sem. anil. & cremoris tart. an. 3.ii. Coquantur ad 3. iij. In colatura dissolue manæ & syrupo rosar. an. 3.ii. Fiat potio per intervalia, iteranda pro arbitrio Medici curantis.

Si forma boli magis ardeat, ita componi poterit.

3. Cassiæ recent. extractæ 3. v. cathol. duplie. 3. ii. rhabarb. puluer. & cremoris tart. an. 3. i. Cum la chæso fiat bolus.

Si efficacia purgare defideret, adde bolo, vel potioni rad. iap. 3.4.

Si purgationes istæ non sufficiant ad affectum (sepe admodum contumacem) prius eradicandum, ad vehementiora purgantia, vt electar. diaphenic. diaphron. solut. & alia huiusmodi confugiendum erit, modò sebris abfit. Ego semper hunc affectum subtili, politum prædicta remedia rem abolere nequeunt, mercurio dulci sexies sublimato, aliquoties exhibitio ad gr. xx. cum scammoni vel resine iapæ gr. x. Cuius curationis exemplum videre est in oblationibus meis, nempe oblat. 4. em. 3. & vixæ clyster ex vino emetico paratus hunc affectum euacuat in nobili muliere, vt habetur oblat. 32. ostendit centuria.

De sudoribus idem dicendum est, quod de purgantibus iam dictum est: cum in principio, augmento, & fluxu non esse proficua, imò vero plurimum nocere: quod vulgares Medici experiantur, qui vixæ cathartici specie delusi, & morbi contumacia peccati, ad sudorificia confugiunt, vnde morbus grematur, & dolores intenduntur. Attamen in declinatione, post debitas purgationes, nulla febre præsentē, plurimum conferre possunt: eaque parari possunt ex decocto chinæ vel salis persilæ: vel polipi possunt sudores in laconico cum vapore spiritus vini, aut decocti alciui appropriati.

Poli sufficientes euacuationes: imò dnm illare celebrantur, partium principum, & totius corporis roborationi incumbendum est: quam indicationem Galenus 1. de diff. febr. cap. 6. vixæ rheumatismum affectionem exponit, reliquis præferendam aliter his verbis. Afferit ergo in his curandis sepius est, non euacuatio, sed totius corporis roboratione. Quod quidem ita intelligendum est, non quod nullalatione competat euacuatio, (idem enim Galenus huius affectus curationem orditur à missione sanguinis ac excrementa præuam qualitatē habentem, etiam adhabet purgationem,) sed quod magis & frequentius rheumatismum minus vero, & parcius purgantibus agendum sit. Certum tamen est, partes non posse roborari, nisi prius excrementorum illarum, quæ onerantur expurgata fuerint.

Illa autem roboratione refrigerandi vi prædita esse debent, siquidem (vt antea dictum est) feruida hepatis intemperies primam huius morbi originem præbere solet. Huius maxime suppellex apud auctores inuenitur: Ex his non quatuor proponemus, quæ efficaciora, & minus integrata existimamus.

Primum ex tinctura corallorum, cuius 3. ii. æger iurare poterit.

poterit, manē duabus horis ante pastum, singulis diebus vacuis ab aliorum remediis.

Quia verò rictura corallorum diu feruari nequit, ad vsum longiorem in syrupum reducitur cum saccharo cuius cochlearia duo manē sumi poterunt: sed multo minor est illius efficacia, quam tinctura simplicis.

Secundum est confusa fructus cynorrhodi, quæ gustui gratissima est, hepares refrigerat, & leui adtentione corroborat. Hanc sunicre potest arger ad nuchæ magnitudinem, manē & sero.

Tertium est electuarium triasantali quadruplicato rheo, in tabellas redactum, cuius 3.ii. singulis diebus sumi poterunt, inprecibendo parum aquæ posui ordinarij.

Quantum est tinctura rosarum, cuius cyathum vinum arger haurire debet semel, bis, ter, in die, longè à pastu. Illius preparatio talis est.

℞. Rosar. rub. siccat. 3. i. aquæ tepidæ lb. iiii. spiritus sulphur. aut vitrioli 3. i. ii. Infundatur per horas vi. Colatura addè sacchari albi lb. ii. Seruetur in vase vitreo ad vsum.

Prædicta remedia, vel eorum nonnulla alternatim vsurpantur, de natura eadem affluunt.

Curatio affectu prophylaxis ad aliquod tempus est necessaria, ne noua accumulata materia recidiva contingat. Illa igitur præcipue versabitur in purgatione periodica, semel aut bis in mense iteranda, quod commodè fiet iyrupo Magistrali sequenti, qui magis alterando, & roborando ha-

par, quam purgando prederit.

℞. Succor. recentior. pressor. & per rudentiam depurat. ex folijs endiu. cichor. agrimon. humar. lupulor. & pugil. lb. iiii. succi pomorum redolentium recentior. expressi, & depurati lb. ii. fennæ mund. 3. vi. epithym. 3. ii. rhabarb. elect. & agarie. recentior. trochisc. an. 3. i. i. macis & cari phyll. an. 3. 6. Infundantur, & decoquantur, vt artus est, donec colaturæ supersint quart. v. in quibus dissolue sacchar. albi quart. v. Fiar iyrupus perfectè coctus, de quo capiat 3. ii. semel aut bis in mense, cum iulculo pulli, aut vituli, folijs borrag. pimpinell. ceterach. & agrimon. alterato.

Venz scitio etiam vere & autumno erit conuenientissima.

Præterea ad hepatis feruorem temperandum vtilissimum erit balneum aquæ repidæ, quod per totam æstatem frequenter erit iterandum: vel vt commodius vsurpari valeat, semicupium sufficit.

In eundem finem conuersa cynorrhodi, aut opiatæ iisdem facultatibus prædita, & tabellæ triasantali, frequenter vsurpari poterunt.

His accedet optima victus ratio ex cibis boni succi, & concocti facilibus, vt perdicibus, capis, pullis gallinæ, & pipionibus: præcipue verò iusculis, & consumiatis, iuribus carnum expressis, & similibus, quæ omnia sumenda sunt in mediocri quantitate, vt facilius concoqui valeant.

P R A X E O S M E D I C A E

LIBER DECIMVS SEPTIMVS

D E F E B R I B V S.

P R A E F A T I O.

C A P V T P R I M V M.

De Febre ephemera.



Agna a non paucis antea circa febrium theoriis, & therapijs volumina conscripta inueniuntur, in quibus controuersia innuuntur, & ardua disputa vires agitantur. Quæ, ut in scholis vtilissima sunt, ita & necessaria; plerisque tamen Medicis extrâ Academias artem exercitibus, tedium paruum. Illi si quidem breuiter atque dilucide eam morborum theoriam expetunt, quæ eorum natura, causis, & signis, iam diagnosticis, quam prognosticis intelligendis: & curationis (cui vix incumbunt) rite obedienda; sufficiat. Nos in toto hoc opere, vixis eorum satisfacere conantes, omnes controuersias obliuiscimus, earum tantum, quæ ad praxim maximè necessariae vixi sunt, discipulis breuiter exponemus. Quod etiam in febrium expositione obseruauimus: & prætermisimus omnibus controuersiarum ambiguis, quæ in scholis ad usum faciem controuersi tractantur, ea tantum, quæ ad praxim maximè faciunt, exposuimus. Hanc vero librum clarescens doctrina gratia in tres sectiones distribuimus, generalem illam de febrium sequentes, quæ febres diuiduntur in simplices, putridas, & pestilentes. Atque adeo huius libri sectio prima febrium simplicium. Secunda putridarum. Tertia verò pestilentium expositionem continebit.

SECTIO PRIMA.

De Febribus simplicibus.

P R A E F A T I O.

Febri quæ simplex nominatur, in tres species subdividitur, quarum alia dicitur ephemera, alia synochus simplex, seu impetuis; alia verò hectica. Ideo huius sectionis tria erunt capita. Primum febri ephemera. Secundum synochi simplicis. Tertium hecticae naturam, & curationem explicabit.

Febri ephemera plerumque generatur à causis externis, & corporis amiquis moribus vehementibus, vt ira, curis labore, dolore, vigilia, & inedia, quibus spiritus inflammantur. Item somno & merore, quibus humores, & vapores calidi intus coercentur. Item calefactione à sole, igne, hypocausto, quibus feruidus aer inspiratione attractus, & per insensiles poros admissus spiritus inflammatur. Item crapula, & præsertim cibo potuque calidiori magna copia sumpto, vt pipercatis, & vino generoso, quibus vapores sulcitantur plures, quam exhalare queant. Item excrementorum calidorum retentione, non solum secum, & vrina, sed præcipue fuligine, quæ per habitum excludi solent, si pori insensiles claudantur à frigore, balneo aluminoso, & similibus.

A causis etiam internis generatur febris ephemera, vt bibione, aliisque crurum, aut brachiorum tumoribus, præcipue dum suppurant: extremum erysipelatè, quando materia calido loco coacta, non sua putredine, sed tantum qualitate coarctat. Item valiorum obstructione leui: quæ fuligines recentes lebreum accendunt: vt in destillationibus foeli. Item illæ in calidis naturis, aut densiori corporis habitu coniungunt. Hanc febrem significant, tum ex enumeratis causis aliqua prægressa: tum pulsus celeris, frequens, & capitis dolor & calor: trigoris & horroris absentia, nec non lassitudinis, pontane, aut inappetentia. Aliquando tamen rigor, aut horor adesse potest, in his videlicet, quæ à Solis ardore, vel frigore initium habent. Calor etiam adesse tangerebus suavis, ac blandus vrina concocta, naturalis similis, nihil ab obstructione, vel cruditate immutetur. Inter 24. horas plerumque solet terminari, cum molli sudore, licet aliquando ad tertium diem extenatur: quem si transgreditur, in synochum simplicem aut putridam, vel hecticam degenerat.

A diutius curationem antiqui maxime prebantur balneo aque tepide, cuius etiam in statu sano usus erat frequentissimus. Sed cum nostris temporibus abierit in delictum, in huiusmodi febre etiam obsolescit, & minime tantus habetur, propter plethoram, cacochymiam, putredinem aut fluxionem, que in talibus corporibus possunt existeret, aut tamen ne accidant.

Sed potius curetur huiusmodi febris victu refrigerante, & humectante, ut cremore hordei, insculis refrigerantibus a potu hydrofaccharis, pulvis vulgaris, aut aque fontane, cum syrupo limon. aut capill. ven. permixto.

At vero pœ causant varietate curatio aliquantulum varianda est. Sicque ephemeræ ab æstu, vel Solis ardore competit victus refrigerans, transiit ægri in locum frigidiorum; & oxyrhodionem troni, fascipit, & temporibus advenit, si dolor adjuerit, qui ab inlotia vtprius generari solet.

Si a frigore producat, præsertim cum æger ab exercitio æstus in aërem frigidiorum repente esse constitit, sudor provocandus est, maxime in line ac fissionis.

Si a cunctis densitate & potiorum occlusione, eadem debetur curatio: & vitæ hinc casie vinum oligophorum vadebitur concedendum est, quia meratus aperit, & sudoris provocacionem adjuvat.

Si a labore duxerit originem, quies imperanda est, & victus vberior, ac concoctus facili concedendus. Si a lassitudine, frictiones celebrande. Itæ, animi tranquillitas, & hilaritas opponenda est, bulique fræanda cibo: potu refrigerante. Trinitia eadem animi recreatio convenit, & vix tenuis vltus. Si a vigiliis febris duxerit originem, somnus erit conciliandus. Si a inedia, victus echnymus, & refrigerans institutus. Si a crapula vel cruditate, inedia & cibibus abstinent conferre, non omittit, si macrum mbeantibus, lumps & adnotis: nec non clystere moliente, & laxante cruditas portio erit auferenda. Si corruptio metuarum, vomitus protrahendus est, vel purgatio instituenda. Si fiat ab obstruccione, adjuvandum est, nam plethoræ, vel cacochymia redundet, hinc plebotomia, aut purgatio decernenda est. Et si obstruccioni facile non resolvatur, in alias febres morbus degenerat, quarum curationes suis locis erunt describende.

C A P V T II.

De synocho simpliciter.

Causæ ephemerarum excitantes si incidunt in corpus plethoricum, densio habitu præditum, febrem synochum inducunt. Solus tamen sanguis abundans, venas insarciens, pluresque vapores producentes, quam expirare valent, hanc febrem producere possunt.

Hanc significant corporis habus crassus, timidus; color corporis, & faciei rubicundus; capitis dolor tensivus, somnolentia, pulsatio temporum, inquietudo, pectoris angustia, respiratio difficilis & frequens; pulsus magnus, æqualis, frequens, plenus; venæ sanguine turbide, unde lassitudo tensiva oritur; vrina crassa, calore a naturali parum recedens, sed paulo rubicundior; calor ad tactum mitis, halitus vapore persulso, febris æqualiter procedit; nempe vel in eodem tenore persistit, vel decrevit paulatim, vel crescit æqualiter, non per intervalla remittit. Vnde tres illas pertinet differentie. Quæ enim continuo augetur, epacmatica; quæ continuo decrevit, parva; quæ eundem tenorem servat, homotonos seu acmatica nominatur. Ad quartum diem extenditur, & aliquando ad septimum: tum hæmorrhagia, vel sudore terminatur, ac si viceris protrahatur, in synochum putridam degenerat.

Illius curatio sanguinis evacuatione, refrigeratione, & meatuum apertione periclitatur. Galenus p. meth. cap. 4. duobus remediis eam abolvit, missione sanguinis ad animi deliquium, & aque frigide largo potu.

Vanz lectio in hoc affectu absolute necessaria est, cum a sanguinis copia generatur: eaque statim celebranda, quæcumque hora vocata fuerit Medicus, nisi ventriculus cibis

repletus fuerit, quorum concoctio expectanda est per aliquot horas. Et licet copiose sanguis mittendus sit, dicatque Gal. loco supra citato, se plerique hac febre laborantes subito curasse phlebotomia vique ad animi deliquium, quam sequentibus alui fluxus, vomitus biliosus, & sudor copiosus. Antamen nostri in hunc temporibus abolerant, largior illa sanguinis evacuatio, quam non vacat periculo, cum refert ipse Gal. lib. de cur. per. vena. sect. 6. 12. tribus Medicis contigisse, talem phlebotomiam celebrantibus, vi pro animi deliquio mori adjuerit. Satis igitur est repetitis vicibus eam sanguinis quantitatem educere, quæ ad morbi curationem necessaria est.

Ante venæ sectionem, si alius non sit libera, aut intestina cruditate frætant, clyster emolliens, & laxans instituendus est.

Aquam frigidam quod attinet, eam Galenus tanta copia exhibendam esse præcipit, vt æger palleat, tremet, & toto corpore refrigeretur: si quæ afferat calorem ignem extingueret, solidas partes roboraret, inutiles humores per alium, per vrinam, & per sudores excerneret. Ad illius autem exhibitionem multas cautiones adhibendas præcipit, nempe, vt in vigore febris, concoctionis signa apparentibus, exhibeat: vt æger per famitatem frigide alius sit, firma habet viscera, & fœcci pelis: corpus emersum, & quadratum: viribus pollet validis atque constantibus, non sit repletus crassius viscidusque humoribus, neque tumorum aliquem habeat in visceribus, neque ventriculus, gula, aut nervorum genus debilis sit. Alioquin si conditiones istæ deterint, periculum est, ne inspirandi difficultatem, hydropem, tremorem, convulsionem, lethargum, aut alium grauem affectum præcipietur. Obsoleuit etiam hoc remedium nostrum hoc sæculo, cum omnes illas conditiones obcurrere difficile sit, & ex preposito illius vsu tanta imminant pericula. Satis enim est alius remediis sanguinem, & totum corpus refrigerantibus, aique curioribus, vt: vt iulepis, & apertientibus emulsionibus, epthematis, linimentis, & omnino victu refrigerante, iulepis parantur ex decocto hordei, aut acetosæ, & echinaceorum, vel aquæ cicchori endiuæ, acetosæ, lactis, & additis syrups de cicchorio simpli, limon. granat. oxyfasccharo, &c. Quibus etiam ad maiorem apertendi, & refrigerandi vim is conciliandam, guttule aliquot spiritus vitrioli, aut sulphuris addi possunt. Si aque destillatæ crudiores videantur, leuiter bulliant cum modico specierum, triafentali, vel diamargariti frigidi.

Emulsionem in hunc modum parari poterunt.

Æ. Amygd. dulc. excoctæ & maceratæ, in aqua ros. Vnc. i. quat. sem. frig. mai. & papav. albi, ana. j. ii. Contundantur in mortario marm. lenim. affundendo aque hordici lb. i. p. In colat. distille facchari rosac. Vnc. in. Fiat emulsiō pro tribus dosibus, bis in die sumenda. Quæ maxime conveniet, & iulepis præteretur, si vigilie adjuerit.

Epithemata cordi, & hepati admouenda, in hunc modum parantur.

Æ. Aquæ rosar. buglossi, & lactis, ana Vnc. ii. aceti rosac. Vnc. i. pulv. elect. diarnag. frig. 3. i. sem. caporæ gr. vi. Fiat epithema, admouendum regioni cordis.

Æ. Aquar. endiæ, cicchor. acetosæ, ana Vnc. ii. aceti rosac. Vnc. sem. trium fantal. 3. ii. sem. Fiat epith. admouendum regioni hepatis.

Linimentum refrigerans hepati & lumbis admouendum ex oxyrhodion, vnguento rosaceo, refrigerante Galeni vel cerato fantalino oxyrato abluat.

Si morbus prostratus videatur, a phlebotomia purgatio instituenda est, ne ierosa & biliosa excrementa putrescant, indeque putrida febris oriatur. Remedia tamen viurpanda quæ citra calorem, & agitationem id præstent, vt cassia, manna, syrupus rosac. tamarindi, carbolium, & similia.

Hoc accedat conueniens victus ratio, nempe refrigerans & humectans, eaque tenuis: ex iuliculis, cum herbis refrigerantibus paratis: prunis & pomis acidis coctis, cremore hordei, vel panarella.

Potus sit decoctum hordei, aqua simplex cocta, vel in... quam panis inunctus sit, vel cum syrupo capill. ven. limon. aut granat. permixta.

Hæc febris, seu habitualis occupat partes solidas, quæ corporis habitum constituunt, & vulgò dicuntur ipermæcia, vel camosæ; tum etiam ratione illarum partium magis fixa est, & radicata, quam alia, quæ sunt in spiritibus aut humoribus. Eam quoque ob causam habitualis dicitur, quod in habitu consistat, ac difficile à subiecto remoueri possit.

Multiplices habentur huius febris diuisiones. Primò enim alia est hæctica primaria, quæ à principio innadit: alia secundaria, quæ aliis febribus succedit. Secundò febris hæctica vel simplex est, & solitaria, vel cum febre putrida, complicata. Tertiò, alia à corde incipit: alia ab aliqua alia parte, vt pulmone, hepate, liene, renibus, vtero, aliisque partibus inflammatis, viceratis, corruptis, aut aliquo alio graui morbo oblectis. Et hæc febris quamuis igitur habeat in corde, & toto corpore, symptomatica tamen vulgò dicitur, propter primam originem, quam ab aliis partibus sortita est.

Tres hæctice gradus constituuntur à Galeno. Primus est ipsius febris hæctice motus, in quo vix corpus extenuatur: torrida tamen corporis humiditas effluuicet, absumitur, & exsiccat. Secundus complexitur augmentum, in eoque est euidens corporis extenuatio, & carnositas, atque adiposa substantia perit. Tertius statum morbi, & postremum illius tempus continet: nunquam enim vergit ad declinationem, cum in eo gradu fit incurabilis: tum namque substantia corporis fibrosa & membranacea consumitur, corpusque ita extenuatur, vt facies Hippocratica sit, & ossa pelibus tantum circumtectis appareant. Postremus iste gradus marasmus nominatur, vel potius hæctica marasmus: cum in vtero marasmo frigiditas cum siccitate coniungatur.

Causæ febris hæctice diuiduntur in externas, & internas. Ad externas reuertuntur quæcumque reliquas etiam febres generare possunt, si continua & vehemens sit calefaciendi actio, vel corpus huic febre concipiendæ apertum occurrat. Tales sunt calor solis, aut ignis exercitum vehementer, cibi & potus calefacti, excretionis immodice, vt in diarrhoea, & dysenteria: animi pathemata vehementiora, quæ dense inedia in corpore bilioso, calido & sicco: cum dicat Galenus diuturnitas, humilimodis corpora in febres ardentes, & hæcticas, abstinencia cibi triuiana, perduxisse.

Causæ internæ sunt febres ardentes, & pestilentes quoque humidum cordis abluuntur celeriter. Tum febris lenta diuturna. Tum etiam affectus peculiaris alicuius visceris, vt inflammatio vultus: vel putredo alicuius humoris in eo contenti: vel denique ipsius membri corruptio, quæ febrem lentam & hæcticam facere solet.

Horum affectuum membra peculiariter obiectum, & febrem hæcticam producentium exempla habemus laus manifesta. Nam quod ad inflammationes attinet, Galenus ex inflammatione septi transueri hæcticam vidisse refert. Ex vixere vero hæctici cum complicata in phthisi quotidie animaduertimus. Putredo humoris in viscere contenti fit in obstruccionibus magnis, vel abessevis frigidis. Membræ denique corruptio in pulmone sepe contingit: aliquando in ictere, in hominibus vniuersis, & qui calidis multum videntur aromatibus: fœces enim quædam in hepate gignitur, quæ illius substantiam corrumpit. Hanc febrem se aliquando vidisse Fernelius affirmat, & signa illius effudit, quod vixit anadidisse cupiat, carnes vero maximo odio prosequatur.

Cognoscitur febris hæctica simplex, quod continua sit, sine vi accessione, semper sibi similis, non cresces, nec decretes, nisi quod augetur vasa, duabus aut tribus horis à cibo. Calor in hypochondrijs primo tactu matius, post acer, motus, ardens. Pulsus paruus frequens, & celer: febre non percipitur ægri, patrum sunt, & ad motum diffides, & cum difficultate mouentur, eo quod virtus languat. Artus calidiores sunt partibus circumstantibus,

quod tactu post lotionem ex aqua frigida dignoscitur. Vt, na natus ali similis est, tum colore, tum sedimento. In progressu oleosa supernant, & sedimenta farinacea sunt, quod est signum colloquationis.

Speciatim verò non solum singulos gradus: sed etiam, immo mentem febrem hæcticam ita dignoscere possumus. Imminens febris hæctica dignoscitur, si causæ prædictæ præcelsit: nempe si febris ardens in corpore calido sicco, raris contextibus, in aere æstuante præcelsit, periculum est, ne ager in febrem hæcticam incidat. Et remedia cum præcautione usurpanda sunt.

Primus hæctica gradus, si cum putrida fuerit coniuncta, difficillimè dignoscitur, si sola sit, non facili. In prima die omnia signa ephemera. In die sequenti augeatur arditas, non calor. Tertia die non repetit, non aucta euidenter, non diminuta. Ac tandem vix, aut duabus horis post cibum caliditas non nihil aucta appareat.

In secundo gradu ager non percipit febre, quamuis percipiat alterationes à cibo. Ariditas manifesta est, pulsus minor & celerior, cum duntaxat quadam.

Tertius gradus signa sunt manifestissima, oculi concaui, sordes in ijs sicce, & ictualor, ossium prominentie conspicue, viuidus flos coloris extinctus; cutis vniuersa arida, præcordia vehementer contracta, vt videantur carere intestinis. Pulsus lenitur sub ventriculo in omnibus extenuatis.

Quia verò febris putrida cum hæctica non raro copulatur, utraque exactè distinguenda est, cum maximi sit incuratione momenti, quæ admodum varia tunc temporis existit. Hæc autem complicatio dignoscitur, comparando signa hæctice propostæ, cum signis febris putridæ, quæ infra suo loco describentur.

Primus gradus faciliè curatur. Tertius, vt dictum est, incurabilis est. Secundus medio modo fieri habet, & quo magis accedit ad primum, vel tertium, ita facilius aut difficilius curatur. Frequentius accidit febris hæctica à declino octauo anno ad trigentesimum quantum: eo enim tempore, calor intensior est, licet aliquando marcorem inducat. Qui verò ante hæc ætatem, vel paulo post hæctica corrumpitur, si cilijs euadunt, æ nonnullam curantur vel longo tempore palliatione vitam protrahunt, præcipue verò mulieres.

Ad curationem huius febris primum aduertendum est, num hæctica pendat à partis alicuius morbo; tunc enim curatio ad eum morbum dirigenda est, tum etiam nam simplex ea sit, an complicata cum febre putrida. Et in hoc casu, putrida primum tollenda est vena sectione, & purgatione, nec non remedijs aperientibus, & putredinem inhibentibus, febrem interim hæctica non neglecta. At verò si simplex & solitaria sit febris hæctica, solis refrigerantibus, & humectantibus, nec non analepticis curatio absoluitur: quorum materia est dicta, & pharmacia erit adhibenda.

Diæta, vt in omnibus chronicis affectibus rutilum potest, in hoc præsertim plus præstat, quam medicamentum. Illa idcirco exactè præcipienda est, vt scilicet ad totius corporis refrigerationem & humectationem dirigatur. Aer itaque si natura sua mediocriter frigidus sit, vel temperatus, tali vtendum est; si minus, corrigendus, ita vt ad frigidum & humidum declinet. Et ratione Galenus 10. meth. cap. 3. ætatis tempore, ære exulente & calidiori, ægrum degere præcipit in loco subterranco, qui frigidissimus sit, & maxime perlitatus, & ad Septentrionem vergens. Quo solo remedio nos hæctici, extrema macie confecti, intra mensem resitutum vidimus. Deinde caliditas aeris in conclauis alteranda est aqua frigida, de vase in vasa transfusa, cuius etiam streptu somnus conciliatur; tum etiam potimento aqua frigida subiecto asperso, vel herbas refrigerantibus in isto frequenter sparsis; turba quoque hominum ingredi prohibita; nam hoc quoque cubiculum calefactum. Quando vero aer frigidissimus est, eum esse admetendum Galenus præcipit, quatenus respirando accitabitur, vt qui calorem cordis maxime refrigeret; quamuis minime consideret, quatenus extrinsecus ægrum contingit, quod cutis paros concinit, & transpirationem prohibeat. Attamen manus fore ex frigida inspiratione commodum assequat, quam ex cute condensata incommodum; præter-

sim illud videri possit. Experimentis corporis probe munice-
do. Adhuc tamen si febris hectica fuerit ex vlcere pulmo-
nis aerem frigidum non conuenire ratione viceris. Sed tem-
peratum in aduicis, ad calidum vergentem: in passiois sic-
cum. Quia ratione Galenus phibitus mittere ad Tabias,
montem Vesulium dictum ubi aer siccor erat.

Cibi esse debent refrigerantes & humedantes, citroque
nutrientes, ut insula pulligallina capri, vituli, hordi, veru-
cis, vitelli ouorum cum hordio mandato, lactuca, portula-
ca, endiuia, borrag, acetosa, carnes vituli, hordi, porcelli,
phasiani, perdices, lepulculi & similia: panatella hordea-
ta, asenata, oryzata, cum saccharo, & paucis amygdalis,
vel potius cum sem. frig. maioribus. Carnes elixae prae-
feruntur assis, quae facilius inflammantur, & in bilem vertun-
tur: elixae magis humedant. Si tamen assis ager delectetur,
ea minus coquenda sunt, & temperanda succo limonum,
citri, parantiorum, vel omphacis infuso.

Pices viurpuri potuerunt, quia refrigerantes & humedant.
Sed eligendi laxatiue, quae tenera carne sunt praediti, in-
sari, aut aquis puris vtiatens.

Inter insulas poma laudantur, quia frigidum sanguinem
generant. Conueniunt quoque pyra, pruna damascena, &
betmeloida cocta cum saccharo, cum etiam pusillae man-
darae, quae in sequentem modum preparatae corpus alunt
citra calefactionem.

γ. Passil. mundat. it. i. Temperantur in aqua endiuiae, bu-
glio, & rosae, & abluantur diligenter, ut vi laxandi
remoueat. Postea in istis aquis decoquantur leuiter, ad
dico paucis saccharo ad perfectionem, cum quo seruatur
vltis, usque vltor mane, & post si equalis patris.

Quia verò hectici infirmum habent solius paribus calo-
rem, quo alimenta facile & prompae dissipantur: istis idcirco
praefcribere solent Praetici a vena solida, & viscida, ex-
tremitates animalium, carnes limonium, cancerum, testu-
dinum, ranarum. Cum enim haec carnes viscae sint & hu-
midae, facile agglutinantur partibus, nec tunc abluantur
a calore febris: siq, partium solidarum siccitatem reman-
entur. Non debent tamen quae haec alimenta reiciant,
quia egrae concoquantur, & magnam ventriculo negotium
facient. Quod diffidit ista conuincitur. In hectica inci-
piente, dum adhuc robusta est facultas coctrix, conueniunt
haec alimenta crassa & viscida. In confirmata vero non sunt
exhibenda, quod difficile concoquantur. Adde quod ista
preparata & elaborata exhibentur, ut facile concoqui pos-
sint, nempe vel elixantur ad consumptionem, vel contusa
ex illis parantur. Inter alia testudines terrestres maxime
laudantur ad hecticas febres, non solum simplices sed tabi-
ficas: & variis modis preparantur. Vel enim in aqua deco-
quantur, donec dissoluantur. Mox corticibus abiectis, caro
ab ossibus separata rursus coquitur cum echorio, acetosa,
borragine, hordio mundato, & prunis in pasta simplici.
At in hectica pulmonis coquitur cum folijs rubi, portulacae
& plantaginis. Ius bibatur, & carnes edantur per dies vi-
ginti. Vel conculum ex ijs paratur, vel conficiuntur passilli
ex carne testudinis, cocta in aqua hordii cum amygdali.
dulc. piment. frig. krais, & saccharo. Quia leuiter conco-
quantur in fumo, & in prandio ac cena exhibentur. For-
mula talis esse poterit.

γ. Carnis testudinis in aqua hord. elixate Vnc. iv. amygd.
dulc. infus. in aqua ros. Vnc. v. pimeor. eodem modo infus.
Vnc. ij. quant. sem. frig. mai. an. Vnc. i. anisi non puluerati, sed
in fumo leuiter cocti Drach. i. sem. cinam. 3. li. sacchari in
aqua ros. dissoluti ad pondus omnium, fiant moxuli.

Loco testudinis viurpuri pulpa caponis, & perdicis,
siq, confectio, quae vulgo *passa regalis* nominatur, ad hec-
ticas imitandas idonea, in hunc modum.

γ. Pulpa caponis & perdicis elixate, an. Vnc. ii. amygd.
dulc. in aqua rosae macerata. 3. iv. pincernat 3. i. s. s. sem. pa-
pau albi 3. i. gummi arabic & tragacanthas an. 3. i. s. s. manus
Christi perlatas 3. ii. Cum pauca aqua rosarum fiat passa
regalis, auro obducta.

Iis qui infirmiores habent ventriculum, gelatina, iura
& desiliata insistantia exhibentur. Gelatina in hunc mo-
dum parari poterit.

γ. Caponem electum, popliteum vituli, vel femur verue-

cis, pedes vituli num. 2. aut veruocinis num. 6. Coquantur
in aqua fontana ad sufficientem consumptionem. Iusculum
coletur per expressionem, & pinguedo remoueat. In co-
lat. dissolue facchari albi it. i. albumina ouorum num. 6. croci
vel cinam. parum. Agitentur simul, postea bulliant leuiter,
ac transmittantur per manicam Hippocratis bis aut ter.
Tandemque iusculum excipiat in vasculis, vbi concre-
scent in gelatinam. Si croci aut cinamomi sapor duplicat,
vel magis refrigerantem gelatinam desideres, idcirco eorum
loco succum limonis vel citri vnius.

Iura insistantia variis modis parari possunt. Hoc crep-
turae longè praestat.

γ. Caponem bene habitum, Deplumetur, exenteretur,
ac in frusta diuidatur, a quibus pinguedo & pellic detra-
hantur. Adde, si vis, carnem vituli aut veruocis etiam in
frusta diuisam, & omni pinguedine liberam. Ponantur in
olla vitrea, in cuius medio sit craticula ex ligno, aut alia
materia confecta, super quam frustula dicta ita concinnen-
tur, ut olla fundum vacuum remaneat. Postea olla optime
clausa suo operculo, prope luto cum farina aqua subacta,
ponatur in B.M. bullirent per quinque horas. Distillabit in
fundum usque limpidum, cum cochlearia duo vel iij. cum iu-
sculis, aut per leuiter aut quater in die exhiberi poterunt.

Huiusmodi carnum destillationes per decursum factae
hecticis insistantis sunt valde idoneae. Quae verò per
ascensum sunt, licet spiritus relictant, minimum tamen
nutriunt, ac solidam substantiam non restant.

Potus sit aqua hordii, vel solae vel cum syrupo acetoso,
aut granatorum mixta, vel aqua panata cum paucis saccha-
ro. Si tamen ventriculus admodum infirmus fuerit, vinum
aqueosum & valde dilutum concedendum est, quod coctio-
nem & distributionem iuuat. Galenus lo, *met. s. p. 3. c. 6.*
& aquam frigidam exhibet, eaque fe multos a marasmo prae-
seruasse & orianat. At tamen in istius exhibitione maxime
cautio adhibenda est. Dum enim corpus valde extenua-
tum est, periculum est ne pusillus color omnino extingua-
tur. Idcirco imminente hectica tantum conferre poterit, aut
in eius principio, & in alioctis, & corpore adhuc satis co-
pulo fortiori retere.

Morus corporis non conuenit, sed quies potius impe-
randa est, quamuis ante cibum, si vires ferant, idoneum,
esse possit: leuiter aliquod exercitium aut eius loco molles fric-
tiones, non multae, infirmitati possunt, praecipue statim a som-
no, incipiendo ab inferioribus partibus: nam interiores ha-
mores ad exteriora euocant. Ex irascendum tantum ager,
donec leuis rubor apparere incipiat: nam si vltieris per-
gatur, corpus exsiccat. Corcus in primis fugiendus est,
quo corpus maxime resoluitur.

Somnus nec longior, nec breuior sit. Nam longior vife-
rum calorem auget, recurrente ad interiora calore breuior
corpus magis exsiccat. Minus tamen incommodi ex paulo
longiori, quam ex iusto breuiori oritur, quia fomtus val-
de humectat, quod in hac febre maxime expetendum est.
Dormiant in molli strato eoque laeao, non plumeo, com-
modatque latitudine habente. Linteae sepe immittunt,
quae aqua rosarum aut ierorata fuerit.

Alum. si pigrior fuerit, prosterne glande aut clystere, ex
iusculo puli cum hordio, malua, & violaria parato: adden-
do cassiam, mel violae, butyrum, & vitellos ouorum.

Denique animus in tranquillitate & hilaritate seruandus
est, fugien do vehemens animi purgationis, & vi iram, tri-
stiam, metum.

Ex pharmacia desumptum medicamenta hecticis idone-
um, tum interna, tum externa. Inter interna, primum pu-
gantia consideranda sunt: cum adiectio hic magis necessa-
ria sit, quam detractio, vix ea conuenire possunt, nisi hec-
ticae putrida adiuncta sit. Si tamen prima regio excrementis
referta videatur, propter cruditates ac debili ventriculo
productas, rursus purgatio institui poterit ex cassia, manna,
aut syrupo rosato. Imò vero aliquando, si vires non sint
debiles, exhiberi poterit infusum rhei, cum decocto prun-
orum, tamam. in syroba. buglossi & violae.

Alterantia vero medicamenta in formam iuleporum,
iusculorum & emulsionum redigi poterunt in hunc mo-
dum.

γ. Aquae,

ꝑ. Aquæ endiu. lactuca. acetosa. an. ꝑ. vi. syrapi violacei. nymphæ. pomor. an. ꝑ. i. Misce. Fiat nulep. pro tribus dosibus in die sumendus. & per plures dies continuandus. Vel.

ꝑ. Hord. integri. ꝑ. i. molenda. cichor. lactuce. pimpinell. an. Ma. flor. borrag. buglossi. vio ar. & nymphæ. an. ꝑ. i. prunor. damalc. par. i. Conquantur ad lb. i. g. In colat. dissolue syrapi de cichorio simplicis. & de nymphæ. an. ꝑ. i. Fiat nulep. pro iv. dosibus.

Et idem simplicibus cum pullo gallinaceo. vel gallina iunioris decoctis. parati potest nulepum ad eundem vsum.

Vel

ꝑ. Radic. hinc ꝑ. i. g. bordei integri ꝑ. i. quat. sem. frig. mai. ꝑ. g. Conundantur. inque impleitur venter capri. aut pulli iunioris. Fiat nulepum. cui adde sacchari tofac ꝑ. g. Capiat longum tempus. Reficet. & impinguit.

ꝑ. Amygdal. dulc. excortic. & in aqua frig. infusar. ꝑ. i. sem. quat. frig. ma. & papau. albi. an. ꝑ. i. Conundantur in mort. marmor. semis affundendo aque hord. lb. i. In colat. dissolue manus Chersii perlatæ ꝑ. iv. Fiat emulsiõ pro tribus dosibus.

Si intensius refrigerare est animus. adde vnicuiq. dosi iu. lb. ꝑ. i. vel emulsions. talis prunel. ꝑ. i. vel ꝑ. i.

In vtu refrigerantium hoc obseruandum. ne potentiora statim. & frequenter usurpentur: calorem enim debilem. possent exiguere. Vtilius autem est sensim quani subito refrigerare. Humectantia vero semper tutiora sunt. quam refrigerantia quia lentè sua exerceat operationes.

Dum prædicta remedia usurpantur. viscerum corroboratori incumbendum est opiatâ conuenienti. quæ in hunc modum confici potest.

ꝑ. Congruæ flor. borrag. buglossi. & violar. an. ꝑ. i. conseruæ flor. nymph. ꝑ. g. pulu. electar. diamarg. frig. ꝑ. v. ratul. eboris. ossis de corde cerui. an. ꝑ. i. marg. præp. & coralli præp. an. ꝑ. i. iol. an. num. i. Cum syrupo de pomis. fiat opiatâ.

In summa ex tennatione. clysteres nutrientes frequenter iniiciendi sunt. ex iulculo puli. vel capitis veruecis. cum saccharo. & vitellis ouorum. Eorum autem quantitas exigua esse debet: alioqui compressis intestinis vim expulsiuam irritant.

At inter cætera remedia hædica maxime idonea. lac principem locum obtinet. cum omnibus dotibus præditum sit. quæ in hoc morbo desiderari possunt. quippe quod refrigerandi & humectandi vi prædium est: multum nutrit. & faciliè distribuitur. In illius vtu eadem cautiones adhibendæ sunt. quæ in phibulico curatione fuerint propolite.

Inter remedia externa balneum aquæ dulcis primas obtinet: potenter enim refrigerat & humectat. partemque epitemas relaxat. vt promptius alimentum excipiant. Apud veteres balneorum vltus erat frequentissimus. & quatuor partes habebant: in prima nonnulli calida exuebantur. In secunda erat solum aqua calida. In tertia solum aqua frigida. In quarta verò sudores. & maiores abstergebantur. Galenus in *meth. c. 19.* harum balnei partium vltimam ita moderat. vt ægti in primam partem balnei deducantur. quæ vapore balnei inalefcit. vt pori aperiantur. deinde oleo dulci perliui. in aqua calida immergantur ad corporis humectationem: post repente in aquam frigidam iuuantur. lubriq. edocantur. vt excitentur. oleoque mungantur. vt poris condensatis humiditas inducia retineatur. At verò cum iamdiu obsoleuerit illa antiquorum in balneorum vltus diligens. à Prædictis etiam nostris derelicta est illa hædica balneandorum methodus. quæ nec satis tuta iudicatur. Siquidem metumendum est. ne frigida occurrat repente corpus laderetur. ægerque subitum contrariam qualitatem occurrum ægti ferret. Consuluit enim. & compendiosius ab is factum est. dum ægtos in balneum aquæ moderatè calidæ coniungunt. manè. de positis excrementis natura vel arte. duabus vel tribus horis post assumentum nulepum. vel lac. vel virescens uinum: in quo tandem æger immorari debet. donec spontè tepelat. ac tandem telegretur. Cum enim Galenus balneum frigidum post calidum. adeo necessarium censuerit. vt calidum sine frigido nihil prodicere exsistimè frigide vices suppletur. si tandem ægti in balneo morietur. donec spontè tepelat. &

refrigeretur. At si nimis tardè hæc mutationes fiant. vt ægti tedio afficiatur. quæ frigide affusione balneum ad libitum tepelcere refrigerari poterit. Hæc tamen cautio adhibenda est. vt cum triplex qualitas in eodem balneo haberi possit. ægti in calida parum immoretur. in tepida diutius. in frigida minimum.

Licet autem antiqui ex aqua simplici balnea parare confecerint. vtilius tamen est ea magis humectantia efficere. decoctis in ijs herbas emollientibus & humectantibus. vt malua. althea. violaria. &c. vel hordæ & amygdalis confusis. præcipuè æstatis tempore. quia balneum ex decocto herbarum citius corrumpitur. A balneo ægti linteus calidulus mollior detergendus est. Postea verò mungendus oleo violaceo. amygdal. dulc. cum butyro infuso. Postmodum. vbi parum tequeuerit. nulepum. vel aliud ferculum ei exhibendum est.

Balneum ex hydroleo à Zacuto Lusitano maxime laudatur. *obfer. ꝑ. 35. lib. 3.* Prædicta admodum: eoque affert inueniendam quandam curam fuisse. cui balneum ex aqua simplici. & lac caprinum nihil profuerant. Tanta vltiaris rationem ex eo desumit. quod balneum ex aqua dulci paratum. cui olei copia adiuncta sit. tenas partes emollit: ficcas. & aredificas humectat. & poros obstruunt. ac per ficcatate conuulentes aperiendo. ad extimas. maximeque distantes corporis partes. alimentum attrahit.

Quando ægti non potest vti balneo. admoventur epitemata cordi. & hepatic in hunc modum composita.

ꝑ. Aquæ rosar. nymphæ. & portulacæ. Vnc. iij. sacci granatorum ꝑ. i. pulu. electar. diamarg. frig. ꝑ. i. ossis de corde cerui ꝑ. i. camphoræ gr. iij. Fiat epithema. cordi admoventum.

ꝑ. Aquæ endiu. lactuca. & cichori. an. Vnc. iij. acetæ ros. fac. ꝑ. i. trum fantal. an. ꝑ. i. ꝑ. i. (poli ex eboze ꝑ. i. Fiat epithema. hepatic admoventum.

Poterit etiam inungi regio hepatis vnguento rosaceo. vel cerato santalino. Verum oleis. & vnguentis parcias vtiendum: quia febrem aliquando augere possunt.

Inter symptomatica. quæ hoc morbo superuenire solent. præcipuum est alui fluxus. qui ægtos ad interitum facile perducere. Qui quidem insanandus est decocto hordei excocti. & tolii pro potu ordinario. syrupo cydoniorum. rosar. siccarum. lacte chalybeato. oryza cocta in lacte. & similibus.

SECTIO II.

De Febribus putridis.

P RÆFATIO.

Febres putridæ diuiduntur in continuas. & intermittentes. Continuæ præterantur. quando putridus vapor. seu calor generat naturam. qui à putrefactibus humoribus oritur. continuo cor adigit. calore quoque continuo in eu excitat. unde etiam febris calor in vniuersum corpus continuo. diffunditur. Intermittentes vero sunt. quando idem vapores per interualla quadam ad cor deferuntur.

Continuæ rursum diuiduntur in essentielles. seu primarias. & symptomaticas. Primariæ. seu essentielles dicuntur quando putredo in venis communibus. & extra partes priuatas accenditur. Symptomaticæ vero. quando in parte peculiari inflammata putredo. aut suppuratio fit: quæ ob valorem communicationem vapor putridus cordi continuo communicari potest: quales apparere solent in pleuritide. peripneumonia. hepatitide. alarumque partium internatum inflammationibus. Continuæ primariæ rursum duplices sunt. Aliæ enim sine vlla exacerbatione. aut remissionis a principio ad finem porriguntur. & *ætiol. ꝑ. i.* continuæ appellantur. Aliæ vero manifestas habent exacerbationes. & remissiones. & *ætiol. ꝑ. i.* continuæ generis obdormire solent appellari. Et illæ rursus ab exacerbationibus. & remissionibus differunt. ita ut tres species diuiduntur. Aliæ enim

enim tertianæ continuæ dicuntur, quæ tertio quoque die exacerbantur. Aliæ quotidianæ, quæ singulis diebus. Aliæ verò quartanæ, quæ quarto quoque die reduplicantur. Intermitteutes etiam in tertianis, quartanis, & quotidianis diuiduntur: prout earum paroxysmi tertio, vel quarto quoque die, vel singulis diebus regredi consueverint. Aliæ etiam dantur febrium differentia, quæ vel accidentales sunt, vel ex prædictarum compositione oritur, quas omnes sigillatim & breuiter explicabimus.

CAPVT PRIMVM.

De febribus putridis continuis.

ETSI variz sint febris putridæ continuæ species, earum tamen omnium curationem simul describere statutus, eo quod eadem serè omnibus conueniant remedia, quorum nonnulla secundum magis, & minus tantum varianda sunt: quod ex Medici iudicio, & artis vii magis quam præceptis particularibus dependet. Nos tamen quantum fieri poterit, in quo vnaquæque differat, suis locis annotabimus.

Febres continuæ primariæ seu essentialis generari solent ex putredine humorum, qui in venis & arteriis maioribus continentur. Et pro varia humorum putrescentium natura variz species emergunt.

Synochus putrida nullis paroxysmis, aut exacerbationibus distinguitur, sed illius vniuersum tempus vna veluti accessione, consumitur, quæ à principio ad finem pertingit. Enique, sicuti & simplices, tres constituuntur differentie. Quarum prima est, quæ à principio à d finem æqualis perdurat. Secunda, quæ paulatim augetur. Tertia, quæ paulatim decreuit. Prima acutissima, seu homotomus nominatur, sicut cum toto morbi decursu par est modus putredinis. Secunda epacutissima dicitur, cum plus putrescit, quam dissipatur. Tertia paracutissima appellatur, cum minus putrescit, quam dissipatur. Licet autem huiusmodi febres continuæ crescant, aut decreuant, aut eundem reorem seruent, hoc tamen non impedit, quin illæ quatuor habeant tempora, si ad salutem terminentur: sed alia longiora, alia breuiora, si iuxta symptomatum vehementiam considerentur. Sic enim homotomus breuissimum habet principium & augmentum; longum vero istum. Epacutissima longum habent augmentum; paracutissima longam declinationem, reliqua autem tempora citissime transiunt. Sciendum autem est, febrium putridarum tempora dupliciter considerari; vel quoad symptomata, vel quoad cõtionem, & cruditatem: quæ duo in aliis febribus plerumque coincidunt: in synochis verò non item. Earum enim tempora non tam ex symptomatum incremento, & decremento, quam ex signis cõditionis æstimari debent quæ in vniuersis præcipue apparent.

Dux autem synochi, seu continens febris species à Galeno proponitur. Vna ex sanguine putrescente, de qua agit *meth. cap. 1. & 9.* tum etiam *9. meth. cap. 3 & 5.* Altera ex bile putrescente in maioribus vasibus, de genere febrium ardentium, quam explicat *2. de diff. febr. cap. 1. & 2. de cry. cap. 6.* Prima dicitur synochus sanguinea, altera verò synochus biliosa. Licet enim rota humorum massa in venis contenta sanguinis nomen obtineat, quoniam tamen illius partes agnoscuntur, quantum magis temperata sanguis speciatim nominatur calidior, bilis; crudior & frigidior; pituita; crassior autem & faculentior, melancholia. Iam vero si pars illa magis temperata, quæ sanguis propriè dicitur, reliquis copis superet, & tota massa putredinem concipiat, synochus sanguinea efficitur. Si vero tenuior sanguinis pars, & calidior, quæ huius bilis naturam æmulatur, reliquis partibus superet, & putredinem concipiat, synochus biliosa oritur.

Ab eisdem causis synochus putrida generatur, quæ synochus simplicem solent producere. Sicque non solum cutis conspuitur, sed vasorum etiam obstructio à multo sanguine, & crassius ac lentius humoribus impauctis, hanc febrem efficitur solet. Cum enim per huiusmodi obstructions fu-

ligumorum vaporum transpiratio impediatur, putredo generatur in sanguine intra venas redundantes.

Tertiana continuæ, quæ tertio quoque die magis affligit à sanguine cacochymo bilioso in vena causa putrescente ducit originem. Illiusque causæ sunt ea omnia, quæ humorem hunc multiplicare possunt, vt hepatis calida, & sicca intemperies, alimentum calida, & sicca, ætas iuuenilis inedia, aut viciis tenuis & parcie: exercitatio vehemens, & frequens: calida & sicca aeris constitutio, vigilia nimia, & similia.

Quotidiana continuæ, (quæ barbaris *latice* nominatur, quod latenter atque absconditum quendam calorem habeat,) à pituitolo sanguine intra venas putrescente prodicuntur, & ideo singulis diebus suas habet exacerbationes. Corpora pituitosa solet adorari, vt infantum & puerorum tum etiam senum, necnon eorum qui habitant corporis obeso, otioso & crapula dediti, loaque humida inhabitant. Minus frequens esse solet hæc febris, quæ putrida difficillius putrescit.

Quartana continuæ, quæ quarto quoque die intenditur, fit à sanguine melancholico in vena causa ramis putrescente. Eamque omnia efflicere possunt, quæ humorem melancholicum generant, & quæ putredinem inducere velent. Rarissima tamen consuevit.

Differentie febrium accidentales à pranis symptomatibus desumuntur, quæ essentialibus compari solent, ab hisque deominantur. Inter eas recenseri solent, febris ardens, colliquans, horrida, afflodes, elodes, lycopaldis, epiala.

Causus, seu febris ardens propriè ea dicitur, ex Galeno *3. Epid. com. 3. text. 34.* quæ duobus hinc symptomatibus perpetuè comitata est. calore scilicet ardente, & siti inextinguibili, quantum vis ægritabant. Diuiditur autem ab eodem Gal. *com. 4. de viti. rat. in acut. 2. 13.* in legitimam, & notham. Legitima, seu exquisita est, quæ dicta duobus symptomatibus semper, & eundem coniuncta habet. Notha, verò, in qua illa symptomata sunt minus vehementia, sicut quæ est minus intensior, nec corpus ita vixit. Legitimaque propriè dicta fit ab humore bilioso intra maiora vasa cordis vicina putrescente. Notha verò fit à bile cum pituita permixta, vel pituita sola in eisdem vasibus putrescente. Hinc patet, febrem ardentem legitimam nihil aliud esse, quam febrem tertianam continuam, cuius materia acrior, & copiosior sit, & in maioribus vasibus cordis maxime vicinis continetur; cum materia tertianæ continuæ simpliciter efficiens sit in vasis corde remotioribus. Rursum exquisita febris ardens duæ sunt species. Vna, quæ à principio ad finem vnicam diuertat accessionem obinet, quam synochum biliosum supra nominamus, & synochus ardens etiam nominatur, quæ sit, cum bilis putrescens vasa omnia cordis propinquissima occupat. Altera, quæ plures infæ continet accessiones, & ardens periodica dicitur, sit ab eadem bile contenta in vasis corde vicinis, sed non omnibus, aut non ita propinquas, quemadmodum in synocha ardente. Ita vt tertiana continuæ, synochus ardens, & ardens periodica iuxta tantum differant, prout vbi magis aut minus acris copia, & cordi vicina est.

Febres colliquans est etiam de genere ardentium, quæ propter calorem ingentem, confestim pinguedinem, carnem, partiumque solidarum substantiam, vel aliquando humores in venis contentos colliquit, atque dissoluit per insensibilem transpirationem, sudores, vrinas, aut deiectiones. Excitati solet à materia tenui, acri, & biliosa, quæ vehemens concipit incendium. Eique non raro adiunguntur esse malignam & pestilentem qualitem docet Gal. *com. 3. Epid. feb. 3. text. 57.*

Horrida febris *epioides* & Græcis appellata, ea dicitur, in qua horrores frequenter solent accedere. Fitque ex mixta materia, biliosa scilicet, & pituitosa, aut ferola, quæ cum inaequaliter mouetur, horrores istos excitare solet: nempe vel succens à bile humores crudos putrefaciens, & commouente, vel tensis acris & ferola materiz portione partes sensibiles, & membranofas vellicante: vel denique natura crudum humorem frustra excutiente. Hanc retro ad

centrum calore, frigent extrema: mox eodem emicantes, iocalescunt.

Althodes etiam febri ad ardentem referenda est, in qua agri trahuntur, & frequenterbus inquietudinis anguntur, graniter morbum ferentes, cum nausea vtipurum & vomitu. Quia exoritur febris ex afflitione ventriculi ab acris & pufo humore, eius fortissimum, vel tunicas mordentes.

Elodes dicitur illa febris, in qua sudores perpetuo funduntur: si quæ ab ingenti humorum putredine, aut malignitate, substantiam corporis dissolvent.

Syncoalis febris ea dicitur, tit qua lyncope, aut animi deliquium frequenter agrotantem corripit, Dux illius species ponitur ab Auenenna. Vna ex bile tenui, acris, & venenata. Altera ex pituita multa, aut crudorum humorum copia. Prior lyncopis minima appellatur, quia fit ab humore panico, sed tenui & venenato. Posterior ab eodem vocatur lyncopis humorosa, siue repletionalis, quia multa crudorum humorum copia generatur. Idcirco ad pituitosam febrem refertur coniunctur. Et ab aliis tantum differt, quod in hac maior crudorum & pituitosorum humorum copia redundat. Et præterea coniuncta est oris ventriculi debilitas, ex qua in primis agri frequenter in lyncopem incidunt.

Epiæ febris dicitur à Galeno a. d. differ. febr. cap. 2. & fit ab inequali temper. cap. 8. quando eodem tempore per vniuersi corporis minimas particulas, calor, & frigus sentitur. Quamvis eius vna, & eadem pars contrariis alterationibus affici nequeat, ut tamen, quod de febre epiæ dicitur, de minimis particulis quoad sensum, non autem reuera minimis intelligendum est. Hanc febrem duobus modis fieri docet Galenus. Vno quidem, à pituita vitæ tum bile amata permixta, & in vniuersum corpus diffusa. A bile cum caloris à pituita rigoris lenius interit. Altero quædam à pituita vitæ sola, sed partim putrefacta, partim putredinis experire. Cum enim pituita vitæ frigidissima sit, crassa & lenta: non promptè putrescit, nec tota simul, sed tantum per partes: ita vt vna eius portio putrida sit, altera impuris remaneat. Illius igitur partem per lentas partes delata portio, quæ nouum putrescit, vixit frigidissima rigoris sensum inducit: ea vero quæ putredinem concepit, caloris sensum infert. Atque ita corpus vniuersum eodem tempore et calorem & frigus percipit. Plateus etiam febri epiæ generandæ modum excogitat, quando scilicet febres intermittentes eodem die coincidunt vt frigus posterioris accessions incipiat, antequam calor prioris declinat: vel etiam quando intermittentes cum continuis concurrunt, vt vnus febris calor cum alterius frigore eodem tempore possit concidere.

Dantur etiam alie febrium continuarum accidentales differentie, quæ cum ab febres symptomatice refertur, leant, in earum expositione iam delineanda discutientur.

Quamvis autem symptomatice febrium curatio à morbum particularium, ex quibus oriuntur, curatione dependat: earum tamen ratio proponenda est, ne cum essentialibus confundantur.

Ille igitur febres symptomatice nominantur, quæ ab humorum accessione, & putredine in aliquo viscere contenta, oriuntur. Cuius generis esse solent febres illæ, quæ sequuntur pleuritidem, peripneumoniam, phrenitidem, anginam, hepatidem, aliæque partium internaum inflammationes, vicia, vel abiectiones.

Aduertendum autem est diligenter (quod maxime est in præi. momenti, & à paucis animaduertendum) non omnes perpetuè febres, quæ cum partium inflammationibus coniunguntur, esse symptomaticas: sed quædam etiam esse essentielles, quibus inflammationes prædictæ succedere solent. Fit enim priusquam vt sanguis corruptus, aut prap humorum repletus, postquam febrem excitauit, & agitur à natura, & tanquam bilis noxus expellatur ad partes debiliores, aut humor recipiendo magis idoneas, inde in inflammationem producat, quæ febrem istam non ethic, sed illi potius succedenda est. Sic nobis frequenter in viu practico videre licet agrotantes, ab initio febre continua laborantes per vnam aut alteram diem, antequam do-

rior lateris & alia pleuritidis signa appareant. Sic multi tertio, vel quarto febris die in phrenitidem incident: sic arthritica. Item omnes antequam dolore, tumore, & inflammatione articuli vni afficiantur, febri continua per vnam aut alteram diem laborare solent. Sic quæ erysipelas tenantur, febri aliquando afficiuntur, antequam erysipelas appareat. Idipsum ostendit vniuersum dispositio, quæ in humifmodi inflammationibus notas putredinis in venis contentæ manifestas producit. In principio enim crude apparet, in progressu verò signa coctionis in diebus meretricens ostendunt. Tum sanguis e venâ admodum corruptus interdum educitur, Quæ non fierent, si febres eiusmodi essent tantum symptomatice, aut ab aliis inflammationibus simpliciter dependentes.

Ille autem febres siue symptomatice siue siue primariæ & comitatæ partium inflammationibus suis habent differentias accidentales. Sic enim inflammatio languinea fit, si febris illa phlegmonica, quod nominatur: fit si biliosa, erysipelas naturam reiciens, typhodes nominatur. Peculiariter verò erysipelas ventriculi, & intestinorum, febrem pyriam accersit, in qua exteriora rigent, & interiora vruntur. lucendum enim internum sanguinem & spiritus ad locum inflammationis attrahit, vnde calor ita intenditur, vt interiora vti videantur, cum fiti inextinguibili exteriora verò frigore afficiantur, calore & spurto delituta.

Lenta febris etiam ad symptomatice refertur consensu, quæ oritur ex latente obftructione, ac putredine visceri adeo contumaci ut aduicente impotentiæ vt substantia visceris pium quæ laetetur. Et cum putredinis portio in venas effundatur, sanguine percolatur, febrem excitat lentam. & adeo autem, vt nullo graui symptomate agro molesta fit, & æger vix se febre sentiat. Putredinis tamen aliquæ notæ in pulsu, & vrinis apparent. Interdum verò ex visceri alius putredine, ac corruptione extoritur febris lenta, quod per venas visceri infertur, putridi, & calidi vapores ac tot expient. Frequentissime autem talis febris in phlegmonica excitatur, quæ in hebdicam generat. Fit etiam interdum, cum hepatis aut lienis substantia putredinem concepit: vel cum circa mesenterium, omentum, aut pancreas, aliæque partes putredo incidit, vel etiam interdum cum foras, aut secundum in vtero putrescit. Huncque febri non solum lentæ, sed etiam aliquando acutæ, pro ratione putredinis diuersa, oriuntur. Ac denique ad hoc febrium lentarum genus referuntur ille febres, quæ in cachectici reperiuntur, & virginibus chlorosi laborantibus, quæ Fernelius ex lesole putredine in corpore eluæ leui putredine provenire lauat.

Præter hæc tunc enumeratas febrium continuarum differentias, quæ frequentissime sunt, & vulgò ab Autoribus proponuntur, dantur etiam nonnullæ à causis peculiaribus & extraordinariis oriundæ, quæ in viu practico interdum solent apparere. Exemplo esse poterit calidus & æstus relictus conf. 40. de quodam infante, vx secundum Zacharium agentis, & febre continua laborante, cum grauidis symptomatis, nempe inquietudine, moribus consensibus, & nausea continua: cui etiam malum morem esse consensum inde conieciatur, quod tam graui symptomata febri non responderent. Omnes etenim partes e terne frigeant licet interne vterentur, quo ex calore circa thoracem, & hypochondria, necnon ex arida, nigraque lingua intelligi facile poterat. Cuius causa erat sanguis putrescens in ventriculo contentus. Cum enim huic infanti loquelis impedita fuisset, ob inaturationem lingue, cui partibus subiectis colligantiam, & præsertim cum ea membrana, quæ frequenter dicitur, ideo nuper illi à Chirurgo lingua cultello à subiectis partibus separata fuerat. In quo opere aperta vena illa quæ sanguinem in ventriculum effudit, qui illic putrescit & calidus, putredinis ac velut venenosus vapores in cot & cerebrum exspirando, omentum conmemoratorum symptomatum causa fuit. Quomodo autem causa hæc animaduertita, & sublata fuerit, optere pretium est ex Zechi historia, hic recensere. Si quando, inquit in appendice huius consilij, metumisse diligenter considerare, quam difficile sit morbos interiores, eorumque causas interiores affeque in eam formam facile descendere, Hippocratem 2. de morb. vulgaribus, scilicet.

felt. 4. non sine maxima praemeditatione scriptum reliquisse in omnibus obsecris morbis tractandis oportere Medicum diligenter investigare primum morbi usum, hoc est primum occasionem unde quæ: exoritur, scilicet exum & morbi, & causam cognoscere videri oportet. Ecce exemplum. Nobilissimus infans morbus facie acutissimus, una cum causa obsecris admodum erat, nisi mihi de pueri & matris vita, & conditio- nibus diligenter percontatus ab eius parentibus significatum fuisset, quod duo dies ante primum morbi usum, a Choro- ergo quodam scilicet fuit membrana, qua lingua cum par- bus subitè alligabatur. Rursum interrogatus num ab hoc ope- ratione primum collecta essent infantulum, atque num sanguis ab ore sinxerat: utrumque negavit. Unde statim conieci ego, san- guinem a loco valvæ in ventriculum præcipitatum, obque præfatum morbi & symptomatum commoveretur causam existisse. Nec mea me scilicet opino: quandoquidem etiam aliud dictum ad eundem venimus præputat, sanguis concreti parentis quæ notabilem copiam eumant. Ad hæc una etiam cyffere, sanguis corruptus grumosus multus excrevit. Atque statim (Deo immortalis fauente) remissa fuit febris, cessavit quæ exoritur, supplantata omnia. Unde valenter & auidè manum meam hac exegere cepit, totaque sequenti nocte pla- cide dormiuit, neque in postera quamquam mali persequit.

Signa febrium putridarum continuarum diagnostica alia continentatem, alia putredinem, alia peculiaria earum dif- ferentia ostendunt.

Continuitas faciliè dignoscitur ex eo, quod febris assidua sit, & ad apyrexiam non desinit.

Putredinem verò significant calor acrior & mordacior, quam reliquarum, ab acri & mordaci fuligine, ex putridis humoribus exhalante productus. Pulsus non solum magnus & frequens, ac non raro inæqualis: sed etiam hoc habet pec- culare, vt syllole velocior sit, quam diastole: quia expulsi- vo fuligineum excrementorum magis vrget, quam refrig- geratio. Vrinæ initio crude, aut parum concoctæ. Exa- cerbationes certis temporibus factæ, quod tamen in syn- chis locum non habet. Rigor in prima inuasionè apparens. His accedunt symptomata varia, febres putridas plerumque comitantia: vt nauæa, vomitus, grauitas corporis, dolor ca- pitis, delirium, vertigo, singultus, anxietas, motus eius ven- triculis, asperitas & nigrities lingue, tensio hypocho- ndriorum, aliaque. Hanc autem præcederunt lassitudo spon- tanea, motus grauis, somnus turbulens, vigilie, hypo- chondriorum tensio, difficultas purati, & capitis dolor & pul- satio, nauæa, inappetentia, excrementa foetida, & copio- sa, crebra pandiculatio, & oliditatio, aut cotum nota- mola.

Peculiare verò febrium putridarum continuarum diffe- rentie sequentibus signis distinguuntur.

Synochus putrida eadem habet signa, quæ in simplici fuerunt propofita, sed vehementior, calor enim acrior est, vigilie, dolor capitis, asperitas, inquietudo, aliaque symptomata, vehementiora. Tum pulsus inæqualis est, vt maior syllole, quam diastole appareat, urina crude, rubre & crasse.

Biliosa febris indicat calor decurrens, pulsus valde fre- quens, & velox, urina acris, flammea, initio semper cruda, sine sedimento, nauæa, vomitus biliosi & deiectiones ina- gna anxietas, sitis, nuxus, oris amaritudo, lingue ariditas & nigrities, vigilie, delirium, lassitudo vicerola præcedens, color faciei pallidus, aut citrinus, ætas iuuenilis, temperamen- tum calidum & siccum, tempus æstiuum, victus ratio calida & siccæ, vacationes biliole suppressæ. Tertia verò continua a synocha biliosa distinguitur, quod illa tertianas habeat exacerbationes, hæc verò illis omnino caret, & eod- em tempore procedat.

Quotidianam continuam indicant, calor initio magis va- porosus quam mordax, post nonnihil acer, sed inæqualis, propter humoris crassiem, quæ difficultat dissoluitur: vri- nae initio alba, aquosa, & conturbata, post nonnihil rubra, & crasse: pulsus tardior, tardior, & minor, quam in reliquis febribus sit, nulla aut exigua, iudior rarus, nisi adfit pitui- ta lassitudo subitunda laxa, & subulada, omolentia, inap- petentia, excretiones puriores, temperamentum frigidum & humidum, ætas senilis, tempus hyema- le, victus frigidus & humidus, pituitæ euacuatio sup-

pressa, quotidia exacerbatio.

Quartanam continuam significant calor minus acer, quam a bile, sed acrior quam a pituita: similiter quoque sitis maior quam in quotidiana, minor quam in tertiana: pulsus initio tardus, rarus, languidus, post validior, crebrior, valde inæqualis. Vrina in principio tenuis, post varia: corpus aridum & macilentum, color fulvus aut obfuscus, temperamentum frigidum & siccum, ætas incli- nans, tempus autumnale, aut magnas inæqualitates habens vita multis curis & sollicitudinibus implicata, hæmorrhoi- dum fluxus suppressus, tumor lienis, exacerbatio quartana. Causæ seu febres ardentes signa pathognomonica sūt antea propofita, nempe calor corporis decurrens, & sitis in expu- gnabilis. Hoc tamen auiscandum est, si tuis aliqua super- uenerit, sitim inde minui, ab humore scilicet qui ex vicinis locis attrahitur, quæ annis nunquam, durante febre, illa auisc- tatur. Signa verò quotidiana sunt ea omnia, quæ febrem bili- osam indicare supra declarauimus. Ea tamen quæ notam ardentem significant, prædictis multo remissiora sunt.

Colliquantem febrem significant, subita corporis con- sumptio atque emaciatio: oculi concavi, collapsa tempo- ra, nares acutæ: deiectiones rufæ, pingues, fetidæ, viscosæ, compulset, succre, biliole, & lipuiole: vrina pinguis & olidæ.

Febres horrificæ & asfodes cognoscuntur per ea, quæ in earum deſcriptionibus propofita sunt.

In febre elode madet continuè lentè humore cutis, & calor ad tactum non multum acer est. Distinguitur maligni- tas a copia putredine, quod in causa maligna vrinæ terè naturales vel ab illis non admodum diuerſe apparent: vel quædam vrinæ inuacant infatè tæ arancurum, quando ſic colloquatio pinguedinis: vel ſi cum vrina corpuscula eruf vel hordei speciem referentia prædeant, quæ carnis colli- quationem denotant: vel denique vrinæ multitudine per multos dies apparens, quando sanguis & humores colli- quantur: His omnibus accedit maxima vrinæ exolatio: pulsus paruus contractus, neque valde frequens est. In ma- gna putredine vrinæ crasse & conſue, pulsus magnus, molis, frequens.

Syncopealem febrem significant hypothyria, & animi defectus frequentes. Minuta verò ab humorola distinguitur quod in illa biliole, in hac pituitolæ febres signa supra re- censita apparent.

Epiala febris ex eo solum dignoscitur, quod eodem tem- pore calor & frigus in toto corpore perſentitur.

Febres denique symptomatice, cum etiam comitatæ, co- gnoscuntur ex iis, quæ in earum historia propofita sunt.

In singulis autem febrium putridarum continuarum speciebus signa prognostica deſcribenda sunt, quibus earum euentus præſagiri poſſit.

Ac primum, quod ad synocham putridam ſpectat, cum illa de genere ſit febrium acutarum, periculo non vacat. Attamen ſi concoctio ſigna euidentia appareant die quarto, & nullus comitatur error, ſalutariter die ſeptimo terminabitur. Si verò tardius ſigna concoctionis appa- reant, ad vndecimam vel decimam quartum extendi po- terint. Si verò concoctio ſigna nulla appareant, ægrique tormatitem faciem ſeu infatè pergerit, turgidam habeant, mor- bi longitudinem ſignificant. Vrina quantum rubicundior ab initio, cæteris paribus, tantò ſecurius, & citiò morbum ſo- lutum ſignificat, ſi in ea ſigna concoctionis appareant: ac cum crudioris ſignis, morbi periculum minuat, præci- pue ſi vires ſine debiles. Vrina alba peſſima, mortem quæ vt plurimum portendit. Ex ſynochæ differentiis paracmalica leſior, ac malica periculolior, epacmalica periculoſiſſi- ma. Præterea ſynochæ exquiſita & benigna rite curata, ſe- ſcuta: non exquiſita, & malignitatis particeps, cum ſeruis ſymptomatis, & virium debilitate, periculola.

Biliole verò febres quæteus acutæ, ſunt etiam pericu- loſe, idque magis vel minus, pro maiori vel minori inten- ſitate ſymptomatum vehementia, & virium robore. Inter- peries æſtimatur non ſolum abſolute ex ipſo caloris gradū, ſed etiam comparate ad ſtatum ægrotaſis naturalem, vt quod maior eſt ab eo recedens, maius imminet pericu- lum. Sic febres ardentes in ſene, vel hyemis tēpore adueniens, Ccc 2 etha:

Inter spiritum vitrioli, voliter addi possunt. Vel paratur tractura rosarum, colore, & sapore iocundissima, in hunc modum.

℞. Rosar. rubr. ficcarum ʒ. i. aque tepide ʒ. iii. spiritus sulphuris aut vitrioli ʒ. ii. Infundantur per iii. aut iv. horas frigide. Colatur adde sacchari albi ʒ. iv. aque rosar. ʒ. ii. Fiat iulep. clarus pro potu ordinario.

Iulepus Alexandrinus non parum etiam utilis, & iocundissimus est, qui ita componitur.

℞. Aquae fontis ʒ. i. aque rosar. succi limon. & facchari albian ʒ. iii. Coquantur lenio igne dum defumaserint.

Quod ad reliqua diarum spectantia attinet, formus maxime utilis est, vigilie noxiae. Nismus tamen formus calore natium obruit, & excrémentorum euacuationem impedit. Quies necessaria est in febribus acutis in longioribus vero levis exercitatio utilis. Danda enim opera est, ne ea quae secundum naturam expelli debent, retineantur: licet omnis ammodica euacuatio quae vires exhaurit, cohobanda, omnique vehementes perturbaciones eliminando.

Inter chirurgica praesidia phlebotomia principem locum obtinet. Non solum enim plenitudinē euacuat, siue ad vasa sit, siue ad vires, siue in toto, siue in aliqua parte; sed etiam influxum humorum obstruentium reuellit, totum corpus refrigerat, & perspirabile reddit, putredinem arceat, & putrescentium humorum concoctionem adiuuat. Statim igitur, & ab initio morbi sanguis detrahendus est (nisi vixium infirmitas prohibeat, vt in febre syncopali, aliisq. casibus,) idque alio prius laxata emetate, aut supposito. Quante sanguinis iudicabit plethora, vires, aetas, anni tempus, consuetudo, aliaque circumstantiae. Vt res in syncho putrida, & ardente febre sanguinem mittenda ab animi deliquio. Sed maius tunc est, (vt in syncho simplicis curatione a nobis dictum est,) partis vicibus quantitatem necessariam educere, quam agrum lubio in vite dictamen conuocare. Autem in febre ardente, & tertiana continua vena sectione prohibetur, nisi vena crassa, rubraque fuerit. Metuit liquidum ne bilis magis effluat, cuius frenum sanguinem esse dicit. Verum a phlebotomia expeditur haec sententia, cum huiusmodi febres haemorrhagiae sepe a natura ipsa iudicentur, tum phrenitidas interdum aliaque inflammationes producant. Deniq. cum phlebotomia potenter refrigeret, ebullitione potius cohibet quam extiter, cum non solus sanguis, sed bilis etiam cui eo permixta, educatur; ita vt in ea massa quae superest in venis maioribus, eadem maneat sanguinis ad bilem proportio, quae prius inerat. Imo vero, cum vena fecatur, & vegete sint acri vires, & sanguis confertim erumpat, solas putridas, & naturae molebus excruntur, remanent in venis puriore, quod a paucis Authoribus est annotatum, quoniam in vin praesidio passim obseruatur. Si enim sanguis & vena guttatim effluat, purillimus est, quia motu proprio & vena egreditur. At si cū impetu erumpat, impurus & putris apparet, natura detentorem massae sanguinis partem expellente. Parca tamen sanguis mittendus est in naturae admodum biliosis, & plethorica, & sub canicula, quam in alia natura, & temporibus. In plethorici vero, & melancholici febri bus minor copia sanguinis mittendus est, & perpetuo summa ratio habenda, est concomitantibus, & contraindicantium cum febres quodcumq. vt plurimum cōtingant in pueris aut senibus, regio ne frigida, aut tempestate hyberna, quae sanguinis quantitatem a morbo, vel causa morifica indicatam immutauit. Quādo febris a nimio labore, parcius mittendus sanguis. Si ex nimio viceris vsu febris cōtingat, phlebotomia perniciosa.

Circa tempus vena sectionis aduertendum est, non statim ab assumpto alimento venam esse aperendam, sed peracta ventriculi concoctione, & alio ab excrētis libera. Praeterea tempore remissionis febris, sanguis est detrahendus, non autem in vigore illius: tunc enim natura vim impetumque morbi, ac vena sectionem terre nequit. Quod ad iterationem phlebotomiae spectat, si ea ad euacuationē necessaria est, eodem die infundenda; si reuulsiois causa, diuersis diebus. Nam vbi ea euacuandum est, praecipue in acutis, subito corpus in alium statum transferendum est, tum sepe accidit, vt morbus mox principium percurrat, vt postquam vena sectione non ita commode vi liceat. In reuulsione

vero recipimus ad motum humoris, quia rectius fit, si diuersis vicibus & intervallo interiecto natura cōtuario motu quasi affluat. Intervallo enim temporis sanguis in partes effusus reurgit in venas, & iterata vena sectione voliter extrahitur. Iterandum esse vena sectionem intelligimus, si sanguis primò detrahitur valde putris fuerit, cuiusque in venis magna copia superesse videatur.

Imò vero licet sanguis ab initio purus, ac minime corruptus appareat, non tamen descendendum est ad illius detractionem, quin potius ea continuanda est, donec impurus & corruptus appareat. Et certe vtilissime obseruari potest in febribus acutis praecipuum ab Hippocrate traditum. *4. de vitiis rat. in morbis acutis*, in pleuritidis curatione: vt scilicet sanguinis detractiones continuentur, vique ad coloris mutationem: vt si ab initio corruptus educatur, continuetur euacuatio, donec purior appareat; & contra si ab initio laudabilis prodeat, eouique educatur, donec impurus, & corruptus extrahatur.

Est tamen quaedam diuersitas adhibenda in vtroque casu. Si enim ab initio sanguis laudabilis educatur, iteratio debet fieri ex eadem vena: vt sanguis putridus in profundo corporis residens, citius educatur. Si vero ab initio sanguis putridus educatur, ex altero brachio sanguis est detrahendus, & consequenter ex vtroque brachio alterandae sunt phlebotomiae.

Si vero symptomatica demonstrent putredinem subesse in interiore ramo vena: causae descendentes, vt aestus & dolor lumborum, vrinæ rubor, & crassities; post duas aut tres phlebotomias in brachij celebratis & laphena sanguinem mittere conueniet, eamque euacuationem bis aut ter repetere.

Si in postremis sanguinis missionibus portio quaedam laudabilis appareat, ita vt non adeo putridus videatur, vt autem, signum est naturae restaurantis & relictum nouum sanguinem, & probum in putridi vacuati locum. Contra vero, si quo magis educatur, eo deterior appareat, signum est morbum in penus ruere, & putredinem augeri; vnde partium interiorum narcosis metuenda est.

Vena in cubito, vel basilica, vel mediana vtriusque, secunda ex illo brachio dextro frequentius, est similiter vero interdū, cui videlicet maior tensio in sinistro hypochondrio quam in dextro percipitur. Aliquando tamen in pede vena vtiliter aperitur, si reuellendum sit & vires fitti debiles, & materia caput petat, & capitis dolor ac vigilie infestent.

Friciones in febribus putridis raro viuantur, nisi in syncopali bus; quarum curationem in symptomatum curationibus, in fine huius capitis trademus.

Cucurbitulae vero frequentius viuantur, praecipue cum scarificatione; & sunt vicariae vena sectionis, quando vires, aut aetas illius vim non permittunt.

Pharmaceutica remedia duplici genere comprehenduntur, quorum alia euacuantia, alia alterantia nomenclantur. Sub euacuantiis comprehenduntur purgantia, vomitoria, sudorifica, & diuretica. Sub alterantibus vero refrigerantia, attenuantia, incidentia, aperientia, roborantia. Quorum omnium compositionem & vsus, iuxta praecox ordinarij methodum, seriatim describemus.

Atque vt ad purgantibus incipiamus, maxime controuertitur apud Autores, an illa in principio febrium putridarum exhibenda sint. Quod diffiduum missis dispensationum ambagibus, ita resoluendum est. Ratione materiae febrem putridam continuum immediate producentis, quae in venis maioribus continetur, purgationem in principio non conueniet, nisi ea turgeat, id est ita exagitate a natura, irritata ob prauam eius qualitatem, eamque expellere conante; vt indic excretionis magis disposita sit, & ex illa turgentia metuendum sit, ne in aliquam partem nobiliorem irruat; quod tamen quia raro contingit, vtriusque illius conuocatio expectanda est, antequam per medicamentum purgantia eiusdem euacuato suscipiatur. Ratione vero materiae in prima regione contentae, si plurima illa sit, quae febrem augent, naturam grauet, eamque ad materiam in venis contentam concoctione aucta purgantia altero a vena sectione die exhiberi poterunt, sed leuiora, quae primam tantum regionem euacuant. Humores autem vitiosos

& excrementis in prima regione, hoc est ventriculo, intestinis, intestina, aut circa præcordia redundare cognoscimus ex nausea, oris amari: dicitur, si dolore stomachi aut aliteris partibus in ventre inferiori contenta: alia fluxus, alique symptomata, quorum ratione aliquando purgatio: si venæ sectioni præferenda. Et tunc autem humiliorum medicamentis, calidæ, nianæ, tamarindis catholicum, plethoricum lenitum: da perant simplex, tyrosus rosaceus, de cichorio compositus cum theo. quæ variis modis concinnari poterunt, in hunc modum.

℞. Calidæ recentis extrahat. pulvis tamarind. ʒ. i. Cum saccharo fiat bolus. Vel

℞. Catholici ʒ. vi. eliciari lenit. vel diaprun. simpli. ʒ. ii. tremoris tartari ʒ. i. Fiat bolus. Vel

℞. Fol. enuli cichor. acetos. an. M. ʒ. i. tamarind. ʒ. ʒ. Coquantur ad ʒ. iiii. In colat. dissolut. caliculis ʒ. ii. manne & syrapi rosac. an. ʒ. i. Misce. Fiat potio.

Si medicamentum paulo fortius desideres, addere potes rhabad ʒ. i. vel ʒ. iiii. in aqua condue, vel cichorii infusum cum lactulo citrino: modo verò & interdum si febris non sit intensior, leuata ʒ. iiii. in decocto addi poterunt.

Quidam rhabarbarum reiciunt, quia calefact: tum etiam mannam, & tyrosus rosaceum, quia dulcia cum sunt, facili in bilem vertuntur. Verum cum aquis vel decoctis refrigerantibus rhabarbarum infusum, vel manna, alioque dissoluta, oculum afferre possunt incommodum: præcipue si in diæti decoctis addantur tamarindi, qui ad hunc vnum maxime commendantur, vel pulpa eorum simplex hibetur.

Nonnulli videntur in biliosis febribus sero lactis caprinis, quæ appositæ: nam & ardorem febrem temperat, & bilem euacuat. & viscera corroborat. In eivtho vno ferè lactis infundunt per noctem rhab ʒ. i. vel ʒ. ii. Vel addunt syrapi rosac. ʒ. ii. aut tres exhibent mane, & postea alias duas libras propinant, ne totum serum medicamenti sapore inficiatur.

Purgantem quæ sic in principio febrium putridarum, vulgus Medicorum vocat minoratum: eam verò quæ fit concocta materia, eradicationi: quæ etiam in principio conuenit (vt dictum est) ex sententia Hippocratis: si materia turgeat. Illa autem turgens, seu organum materis moribundæ cognoscitur, ex eo quod æger percipit in variis partibus diuites leues ac fugaces, admodumque mobiles. Varius etiam patitur in facie, alique partibus coloris mutationes, vt nunc rubet, nunc pallet, aliqua faciei parte. Ac denique anæstætiis, & iniquitandibus maxime torquetur.

Illud tamen Hippocratis præceptum de purgatione in turgentia marces, in præcordia non obferuat, sed potius apparente humorum organo ad phlebotomiam tutius confulimus: sicque facilius præuenimus, ne humores commoti irruant in aliquam partem nobilem, qui ad medicamentum purgante magis exagitant, promptius in eam præcipituri possunt.

Aliquando etiam in principio harum febrium vomitus procouidendus est, cum videlicet æger tum nausea aut vomitus valde virget: tunc enim natura per superiora materiam moribundam euacuat nititur, & Medicus illius modum adiuvare debet, sæpeque accidit vt magna materis copia in ventriculo, & vicinis locis contineatur, quæ per vomitum quamplurimum educenda est: cum nulla tam copiose & excrementis materie concocto expectari queat: & quodcumque ingeritur in humorem cõsimilum immateretur, aut peccantem materiam augeat. Recte enim aminorat. Fern. 4. 3. morib. 3. 3. omnem alium in ventriculo, lieno, pancreate, intestino & causis hepatis contentam per vomitum commodè expurgari, quæ interdum medicamentis per inferiora purgantibus, etiam pluries exhibitis deturbari nequeunt. Sic nõ fit, vt materia per vomitum nequa, febris ab initio tollatur, quæ longa aliquot futura esset, materia illa in peptiores corporis partes transiit, & sanguini permixta.

Ex vomitoris autem medicamentis, cum triplex eorum gradus constituitur, mitiora eligenda sunt, vt aqua hordei tepida cum oleo an. g. galino, vel communis, vel cum aceto: ubi exigua quantitate. Item syrupus acetosus, aut oxymel.

simplex, cum iure puli, vel decocto sem. anethi, staphyl. aut atriplicis, quibus etiam oleum addi potest. Quæ omnia ad ʒ. i. vel maiorem quantitatem exhibenda sunt, nam in minori quantitate assumpta retinentur in ventriculo. Cui autem debiliora hæc vomitoria non sint valde efficacia, ad mediocritate aliquando confugere licet, quæ in tertiana intermittente quatuor in ira proponuntur.

Clysteres verò non solum in principio motu ante venæ sectionem, fed etiam toto illius decursu iniciendi sunt singulis, vel alterius diebus, si alius liber non fiat, compositi ex decocto emollientium & refrigerantium, vt hordei, prunor. malor. violariæ, mercurialis branchæ vrinæ, atriplicis, lactucæ, endiuæ, semperui, nymphae: dissoluendo catholicum, calissim. diaprun. simpli. saccharum rubi. mel. violaceum, mercuriale, ox. nymphae, violac. &c. In febre tamen intensiori lactus olea non addere, qui facili inflammantur.

Nota primò, semperui maioris in decocto vnius clysteris, iquamus tres, vel iiii. tantum esse præscribendas, quia potius misce refrigerat, & maiori copia viarum purgatum incitina labefactare possit.

Nota secundò, in omni febre biliosa clysteres non actu calidos, sed leuem tantum teporem adopesse iniciendos. In pituitosis febribus sunt decocta ex herbis emollientibus, cum sem. an. i. tenuiculis carthami. flor. chamom. & meliloti: dissoluendo lieram, diaphan. mel rosaceum, mercuriale, oleum chamem. anethum, vel commune.

Cum vero, vt supra annotatum est, integra & absoluta purgatio, quam eradicationem nominant, non nisi concocta materia influenda fit, Medicus ab ipso motu suo post primam venæ sectionem, & primam viarum euacuationem, ea medicamenta viarum debet, quæ humores crudos præparant ad concoctionem, & euacuationem, simulque calorem febrem temperant: putredinem aream, & obstructions referant qualia sunt nulepi, sulcus, ærnuliones, alique infra recensenda.

Iulepi componuntur in materia biliosa, ex syrups de limonibus, granatocum, de agrella, acetoso simplici, de succo acetos. & cichorio simplici, ox. saccharo, cum aqua endiuæ acetosæ, graminis & cichorii.

Vel melius et decoctis rad. acetos. cichorii. fol. acetos. capill. ven. cariole. dentis leonis, seminum frigidorum, tamarindorum, cum syrups prædictis.

Interdum verò ad intensius refrigerandum, sal prunella additur ʒ. ʒ. ponderis, pro vnaquaque iulepi dosi, vel spiritus vitrioli, aut sulphuris ʒ. i. ad moderatam aciditatem.

Acida in biliosis febribus nunquam omittenda, quia amara dulcificantur per acidamque si intensa sint in suo gradu, vt spiritus vitrioli, aut sulphuris: ipsius alios, & colocythidis amaritudinem delent. Bilis autem flava suo amaro spoliata, mortua est, & innoxia.

Ex succis etiam parari possunt iulepi, summe efficacis, & gustui gratissimi, in hunc modum.

℞. Succ. pomor. redolent. recent. extrahit, & per resistentiam depurati ʒ. iiii. succ. limon. ʒ. iiii. aqua ros. ʒ. i. succi granat. ʒ. i. sacchari alb. ʒ. ʒ. Fiat iulepi. clarificans pro vni. dosibus.

Si b. valde acris, & tenuis sit, quæ organum faciat, & vel diarrhoeam, aut grauem aliquam aliam fluxionem pariat, incrasantes iulepi componendi sunt ex aquis lactucæ, portulacæ, papau. rhead. nymphae, rosar. cum syrups violaceo, iunibono, de rosis sicca de succo portulacæ papau. rhead. papau. albi vel ex decoctis lactucæ, portulacæ plantag. flor. nymphae, papau. rhead. & viol. cum syrups prædictis.

Notandum tamen, syrupum violaceum, alioque dulciores solos non esse exhibendos: cum quia laxant stomachum, cum etiam quia antequam in venas penetrent, ventriculi calore in vaporem calidum conuertuntur, qui postea firm intendit. Idcirco aliquid syrups causalem acetosi semper admiscendum, vt facilius penetrent venas, & in eis calori febrili resistent.

In progreßu febris, apparente concoctione, decoctis prioribus adduntur rad. alparagi, liquoris, sel. agrimon. pumpanellæ, hepaticæ, capill. ven.

In febribus pituitosis & chronicis magis incidentia, atropinica, & aperientia preferuntur: a debiliorebus tamen incipiendo, qualia sunt typhus acetosus, capill. ven. hyzantinis, cum decoctis agrimonie, pall. ven. betonicæ, liquoris pailul. In progressu vero prædictis adduntur typhus de duabus, & quinque radic. acetosus compositus de hyffo, oxymel simplex & composit. Decocto vero adduntur rad. aperturæ, iul. hyffo, cardui bened. & (si materia sit valde impasta, viscidâ, & lenta) chamædrys, & centaury minore. Quibus si alii tartari, & spiritus varioli addantur, fortius operantur.

In febribus melancholicis adduntur quæ vim aliquam humectantia obtinent, ut frivapus violæ, buglossi, borrag. de pomis circa macta: Postea verò de fumaris, de ephuyano, de 5-rad. oxymel scilicetum, cum decoctis primum buglossi, borrag. ceterac. capit. ven. fumaris, lupulorum, deinde cuscute, cordi, centaury man. corticum capparis, fraxinæ, & tamarici.

Ac denique in nothis febribus, ex variorum humorum, miscella oriendis, predicta remedia commoenda sunt, ita tamen, ut eorumque predominantem humorem recipiant, maior desinens praescribatur.

Pro delicatioribus uiscula medicata, iulporum loco, prescribi solent tum etiam ne egi custodem remedi diu ius uispari redio afficiantur: eaque componuntur et predictas rad. et herbas, gultus gratiores eligendo, cum pullo gallinaeo, vel truitulo gallinae aut caprique interitum, quando magis refrigerandum est, etiam per uiscag. Drach. vel turpis uiscrosi tritus aliquot adus possunt.

In febribus tantum lentis & diuturnis a contumacibus ob-
structionibus productis chamædori succo lacte amaro, cum cy-
tharæcis in inficula decoqui possit: & Montanus in confir-
matis decoctionem cicorij & chamædoris in inficula velut ad-
mirandam prædicat, in quibus febres longa cum obstru-
ctionibus continuantur.

In febribus pituitosis chamæm. præstans, c. Zacut. *op-
ferre. 30. Prax. admod. lib. 2.*

Ensalifones etiam hic locum habent, & iulepis graciosiores
vt plurimum esse solent. Tum maxime virescunt, vbi fe-
bris sicca vicerum intemperem habet contem, vel ca-
terum tunc tenent, vel pulmonis, & parium (pericardium,
phlogosim) vel denique, vt remedium formulæ immu-
tentur, ne zeger longioris iuleporum vius tadio afficiatur.
Harum autem emulsionum compoſicio in præcedentibus
curacionibus deſcripta eſt.

Aqua frigida magna copia exhibita, in febris etiam puerilis continuas a veteribus viarum solebat, & a recentioribus quamplurimis laudatur. Verum quemadmodum in syncho simplici suspectum illius viam esse diximus: sic iam prudenter Medico consultum fore dicimus ea abstinere, propter rationes dicto loco propositas.

• Conferat tamen aliquando in magno estu fecili aque frigide bonum haultum ad Voc. x. vel xij. cum guttis aliquot peritus vtrius exhibere: ab ea enim iudra interdu affectus producatur, quos Galenus aque frigide tribuit, ad th. vel xij. exhibere. Cum tamen inde ea pericula metuenda non sint, quia Galenus ipse ex propollera magno illius aque frigide copie exhibitione saepe contingere fatetur. Spiritus enim vtrius facit quo minus aqua obstructions augere, quin potius eas aperit, et cito penetrat, atq; vicia persuadet, nec moratur in hypochondrijs, vt aqua frigida simpliciter ad aquas mineralibus et acidulis valde affinis euadit, quae licet magna copia iumentis, non graue hypochondria, et citissime reiciantur, nec non obstructions referendi oportuerit, huius sunt.

Ad vires refrigerandas, quæ in omni febre vehementi plurimum deiciuntur, conueniunt opurgæ, & condæ orborantia, compofita: ex coctis radicibus, foliis, acetosis, ac ocellis, huiusmodi lactæ, & floribus, bullis, portæ, violæ, cichorij, rofarum: pulpe citræque, & yugæ acidiæ citra nominatur. Quibus adduntur pulueres coali, margaritæ, rufuræ eboris, cornu ceruæ, diamarg. fregulæ, rufæ diarrhod. abbat. confect. alkerkes, de hyæantho, & horumque vulgo in frequentes, aut fimiles formulas rediti folent.

4. Confectur floz, bortaş, bugloş & rofar, an. 3. ii) confect.

alchem. 3. i. g. pith. clofar. diamar. frig. refur. ebria. corall. prep. & margar. prep. an. 3. facchar. colic. ad pondus omnium. folis auri num. ii. Fac coaditum, auro coopertum, quo utitur frequenter ex cochleari per se, superbibendo parum aq. potus ordinari, vel cum eadem aqua pro poru. adificatore, vel cum sulcus.

3. Conseruaz cichorii, acetosellæ, lactuæ, & acidi citri ana
3. 6. pulu. lantuli citrini, & margarit. præp. an. 3. 4. spiritus vi-
trioſi 3. 6. Cum fyrupo violaceo fiat opiata.

ꝑ. Conierur fior. bugloſi roſarum & violar. ana ꝑ. i. aqu.
 endiu. acetola & borrag. ana ꝑ. i. Milceantur ſimul. Calde-
 fiant ſuper cineres, & per columnatꝝ iantur. Deinde adde
 coctedalkerm. 3. ꝑ. pulu. elect. diamagt. frig. 3. ꝑ. corallj
 præpar. margar. præp. & ralar. eboris. ana 3. ꝑ. Ilyrupi de
 limon. & granat. an. Vnc. ꝑ. Miſce. Detur ſingulis vicibus co-
 chlear. 1.

Pro delictationibus, & in magna virium exolutione julepus lequicus gustui gratissimus componi poterit.

4. Aquar. auctoia naphie, & rofar an. j. i. 6. fyrupi de li-
mon. & granar an. j. 4. 6. confect. alkeru. 3 j. Milce, Viatur ex
collicar. frequenter.

Vitruptus per aliquos dies remedijs alterantibus, & humoribus noxijs preparantibus ac concoquantibus, eorum, purgationi incumbendum est inclinate febre, & quando concoctionis signa apparent, vitando des criticos. Idcirco licet humoribus iudicamentis, quam que in principio vitruptus precipitamus eius generis fani leni, rhabarbarum, & gargaris catholici cum duplex, & similia: quorum materia, & dosis decenterbus humoribus & naturis approprianda peritio Medico eruat ac commodata. Nonnulli etiam ad diagrydiata audere transire, ut, per diapran foliat, diaphtenica, etiam cum de liquo rolar, atq; dactylorum, que tamen in febribus continujs rarissime vitruptus sunt, cum sciamus quoniam humores maxime inflammare soleat, & situm vehementer excitare: idque precipue in febribus ardentibus, quibus plurimum noxia sunt diagrydiata medicamenta. Iam vero rhabarbarum, est benignum ac pratitissimum medicamentum, in valde biliosis febribus apud nonnullos lippitum est, propter calefaciendi & causticandi vim, quam infingitur proutum est. Quamvis illius noxia magna ex parte precauri valeat, ut antea dictum est, eius infusione facta in aqua refrigerantibus, eamque perimulendo cum decocto samaris minorum, & herbarum refrigerantium, addendo cassium, syrupum rolar de cichor, comol, & similia.

Si febris purgatur hatur, purgatio erit identidem repetenda interiectis preparantibus, & consequntibus, donec tota illius materia subacta fuerit. Alioqui si ante integrum febris solutionem a purgatione cessetur, periculum erit recidive. Quod tamen preceptum restrictione quadam indiget. Si enim post repetitas pluries purgationes febris lenta perseveret, quæ agrum sensim absumat, & in tabem præcipitare videatur, optimum erit purgationes intermittere, & febrem lenta viâ ratione, alterantibusque remedijs oppugnare. Contingit enim aliquando, vbi prava quædam est vilis; cum affectu, & immutatis febris causis, v. quædam medicamentis exhibentur, tamdiu morbus peristat. Fatigatur enim natura, quæ deinde vires resumptas, morbi causam, concitat, & concordat expellere.

Si tamen febris tenax ab obstruccionibus oriatur, quas in pueris lepræsimè contingit, frequens purgatio, æquiuersissima, per epioralium humores cūcens morbum auferre folet: si præsertim ex rhab. componatur, quod & obstruccionem aperit & vificat corroborat. Cuius elogium a Montanorum celebratur, *conf. 10. de febris hic* transcribi meretur. Ille curam propones pueri, si febris leuca ex obstruccionibus laborantis, *inter reliqua*, inquit, *quæ semper certa dicit a me longe experientia per chartam obstruenda vi singulis distribuas* *insuffulionem rhab. in aqua endusa*. Nunquam enim vidi febrem ex obstruccionibus tunc tunc non esse iuliatam, si modo petri-
crassissimæ quædam in ossa vix perseverauerit. Quandoque enim crassissimæ humores impellunt, & obstruunt, quæ ob caloris imbecillitatem non facile tolli non poterant, ex rhab. assumptis curata vidi. Confem igitur accipere libram aquæ endusæ, in qua drachmam rhab. infundis, in paupio leni inuolutum. Dein

de singularibus Vnc. iij. illius infusiois, sicut aliqua expressio, accipi ubi circa auram, & est eiusmodi descriptio: rum, neque descriptio ab hac potest, quia quod videtur omnino & febrem, & obstruiones suisque substat. Adferunt enim, proculdubio, si reliqua recte sunt, & curantur consentiant. Hoc Montanus. Apud nos autem in communi via est bochetum thabardari, quod huiusmodi putris, febre lenta cum obstruccionibus laborantibus, scilicet exhibemus pro potu ordinario Et sic, thab. drachmam semis, vel Drach. j. (propter puer aggruus, vel facilius eius laporem ferre potest) crassiusculum tritam, & nodulo inclinum infundendo in aqua: totius it. ij. vel ij. frigide per diem integrum. Eiusque vius continuatur per mensem, aut diutius, si morbi contumacia id possit. Etque inter diu, si febris admodum remissa sit, & corpus pituitolam, aliquid vini additur, ad ingratum thab. saporem corrigendum.

Post purgationem materię morbificę, natura plerumque in morbi declinatione per vias excernere, reliquias conuertit, quod ex his copositionibus, vel crassioribus colligere licet. Illius motus adiuuandus est diureticis medicamentis, usque temperatis: qualia sunt emulsionis, & apertis in iolepis, & iulculis supra descriptis: quibus, si febris admodum remissa sit, aliquid radic. ioleculi, & petroselin. vel fol. absinthij, a dii potest. Ique praeteritum in febribus putridis, vt quotidiana continua.

Si vero natura ad habitum corporis materię morbificę reliquias propellat, iudicioria usurpanda sunt: non calida, illa quidem, quę magis proprie iudicioria sunt, alia temperata, quę eadem ferē sunt cum diureticis: & prout attendendi vi predicta sunt, humores disponunt, vt facilius a natura per locum sibi magis conuenientem expelli valeant. His tamen addi possunt aque cardui bened. Cabiose, spiritus vitrioli, & alique in febribus malignis sursus describenda.

Pręter interna remedia, extrinsecus etiam vicia adhibentur, ad calorem febremque temperandum, partium principiorum robur confirmandum, vel poros caris relaxandos, & fuligines, caloremque febrem foras attrahendum. Epithemata nemum linimenta, aliaque cordi hepati, aliique partibus admoventur. Quę calori temperando destinata sunt, non nisi in itatu, aut declinatione admoventur, dum calor ad exteriora se se diffundit: non in principio, vel augmento, dum circū viscera adhuc resistunt, etiam insistant crasi.

Cordi epithema admoventur, in hunc modum componi poterit.

℞. Aquar. buglossi, acetose, nymphae, rosar. an. Vnc. iij. aceti rosar. vel iucci limon. j. pulv. electar. diamarg. frig. & trisantal. an. Drach. i. camphora, & croci ana gr. v. Misce. Fiat epithema, applicandum tepide cum panno scarlatino.

Ad magis roborandum, & odoris gratiam epithemati conciliandum, addę aque naphz Vnc. ij. confect. alkerem. Drach. j.

Vbi magis roborare est animus, epithemata solida cordi applicantur, in hunc aut similem modum composita.

℞. Confect. buglossi & rosar. an. Vnc. j. confect. alkerem. Drach. ij. pulv. electar. diam. frig. Drach. iij. Cum succo limon. vel aqua rosar. fiat epithema solidum, applic. post liquidum.

Vel forma linimenti magis carpicum ita paratur.

℞. Confect. alkerem & de hyacinth. ana Drach. ij. pulv. elect. trisantal. & diamarg. frig. an. Drach. ij. Cum aqua rosar. fiat instillat. quod linimatur regi cordis.

Ad roborandum quoque & fuligines, caloremque febrem foras euocandum, maxime conueniunt polli columbini, propter spissam sedā, & regioni cordis applicati: qui etiam non raro sinapifari solent pulueribus carpicis, vt diamarg. frig. & trisantal. Vel antequam applicentur, regio cordis confectione alkerem & linimento cardacio illinitur.

Hepati quoque epithemata admoventi solent, in hunc forte modum composita.

℞. Aquar. endiuic. cichorii, acetose, & rosar. ana Vnc. iij. aque lactuce Vnc. j. aceti rosar. j. sem. pulv. electar. trisantal. Drach. i. sem. spoli. Drach. sem. camphora Scrup. sem. Fiat epithema.

Ad potentius refrigerandum, ex faccis aliquando epithema conchi poterit, in hunc modum.

℞. Succo cichorii, endiuic. an. it. sem. succi lactuce & aceti rosar. an. Vnc. iij. tritum instillat. Drach. ij. Misce. Fiat epithema.

Non solum autem hepati, sed etiam vniuersę hypochoondriorum regionis epithemata refrigerantia adhibere, vtilissimum est: illa enim non solum pepalorum promouent, sed etiam viderum interperiem emendant: & impediunt, ne partes principes in marasimum lethalem incendant.

Eadem hepatis regio inungenda erit sequenti linimento, quod etiam rebus atque lumbis applicari poterit.

℞. Vnguenti ros. j. sem cerati instillati 3/4 succi endiuic. j. sem. ol. rosar. & cerar. an. lvi fiat linimentum. Cui addatur aceti rosar. parum vinctum tempore.

Tellus etiam refrigerantia vlticē adhibentur, propter maximum consensum, qui ipsi cum partibus principibus intercostalibus ideo refrigeratis totius corporis incendium magna ex parte refingitur. Ad hunc vltim tale epithema componi poterit.

℞. Aquar. nymphae, plantag. rosar. & cichorii, ana Vnc. iij. aceti rosar. Vnc. i. sem. vini Vnc. i. Misceantur, hisque immergatur linimentum, quo actū frigido testes inuoluantur.

Manuum & pedum refrigerationes maximum quoque inuolumentum alterant, ob eundem consensum, quem habent cum toto corpore, propter artorias, venas, & nervos, quę ad illas partes defluunt.

Neque timendum est, ne excrementorum distillationem impediatur. Si quidem pauci sunt, quę ex illis partibus effluunt: & ideo maius est refrigeratione inuolumentum, quam nocuum erigat.

Manibus itaque contrahantur pilae marmoreę, eburnę, anser. aut plumbeę. Vel macerantur manus in aqua frigida, cui vini & aceti tantillum maximum sit. Plantas pedum, admoventur olei lactuce, nymphae, aqua & aceto immersa. Vel ad vitramque partium lotionem decoctum frequens parati poterit.

℞. Fol. lactuce violar. semperuiui, portu. ac. fol. vitis, salicis, an. M. i. cap. papau. num. xii. vel tolemaid. (si adit vigilie) M. i. aceti j. i. vini albi j. ii. aque fontis q. d. Fiat decoctio. Cui addes, si lubet, lixiui parum, ad corroboracionem articulorum. Hoc lauentur manus & brachia, pedes, & tibiae, tepide, bis in die, aut semel hora somni.

Aduertendum porro est, antiquos balneis aque calis frequenter vios esse in febrium putridarum curatione, vt videre est apud Galen. lib. de morbo cap. 7. 11. meth. cap. 9. & 10. rom. 1. ad Glanc. 9. Etque vel frigida administrabant in febre vehementissima, vt ardente exquilita, vel tepida in declinatione febrium, & concoctionis signis apparentibus. Verum nostra etate, non sine periculo huiusmodi balnea administrari possunt, & in vno tantum casu conueniunt: quando scilicet lebris in diuturnitatem abit, & corpus calidum & ficcum, ac aequalium occupans, in hecicam degenerare posse videtur.

Hoc etiam pro coronide addendum, soluta per crissum lebre materię morbificę reliquias purgatione esse auferendas, & precipue si per sudorem aut hemorrhagiam facta fuerit crisis. Huius enim euacuacionibus tenues tantum materię portio educitur, crassius vero relicta nouum concepti incendium, & reciduum efficit. Sola itaque crisis, quę fit per alui fluxum, solē esse secuta. Cui tamen non ita fidentem est, vt ad omni purgatione prius abstineamus. Sorcent enim adhuc praecordia, & affluens alimentum corrumpunt, vnde aut recidua oritur, aut alterius morbi causa. Itaque multo sanius est (quod a recentioribus nonnullis fuit obiectum) lemē acutę iterum repetito blando cathartico, ita reliquias omnes ablegare, vt omnia recidua metus omniūque morbi alterius occasio tollatur.

De symptomatibus febres putridas comitantibus.

Omines ferè Auctores, qui de febribus scripserunt, symptomata febres comitantia, vel illis superuenientia eorumque curationes in fine operis descripserunt, ut omnibus febrium generibus optime ac commodari valeant. Quod eorum consilium tametsi minime improbandum censeto, attamen commodius multo ad praxeos vsum censuerim illa febribus putridis continuis immediate subnotantur, cum in his potissimum, & vehementia esse soleant, & peculiare medicas exposuissent.

Quamuis igitur plurima symptomata, multis ex superenarratis reuocentur, causæ, morboque accommodatis emendari soleant pauca tamen ipso morbo molestiora, peculiarem curam requirunt, quæ hæc sunt.

Dolor capitis, vigilie & deliria, iisdem propemodum remediis curantur aculentibus, repellentibus, deriuantibus, resoluentibus, & anodynis. Reuoluentia sunt clysteres emollientes, & laxantes, purgationes blandæ, phlebotomia, cucurbitulae, iociones pedum: Repellentia sunt frontalia, oxirrhodina, vnguenta, vel linimenta. Deriuantia sunt fectio venæ frontis, vnguenta. Ad resoluentia referuntur olea nonnulla, & animalia capiti adnota, quæ etiam sunt anodyna. Per vsum autem prædictorum remedium exuberant iulepsæ, & emulsiões ad humores calidos & acres temperandos, ac demulcendos. Hicce omnibus accedunt narcotica, non nisi maxima virgine necessitate, & reliquis non contentis viis viarunda. Quotum omnium medicamentorum materia in phrenetidis & doloris capitis a causa calida curatione, descripta reperitur. In eorum tamen, administratione hoc vnicè obseruandum, ne insitane crisi in vsum vocetur motum tam naturæ perturbare, & crism impedire valeant. Auid tunc de cætera, cum de narcoticis præsertim illi audire dunt.

Ad vigilias & deliria plurimum confert caraplasma plantæ pedum adnotum, ex cucurbitis recentibus coactis, foliis semperui maioris lactucæ, & similibus. Tum etiam iociones pedum ex decocto h. ibarum refrigerantium. Sic enim frigidas per nervos cerebro communiatur.

Conuulsiões in febribus, præcipuè malignis, aliquando contingunt, a malignis vaporibus cerebri meningæ vellantibus. Quibus mederi oportet clysteribus reuoluentibus, ac cucurbitulis, cum exhibendo frequè iter in iulepsæ, aut iulepsæ puluerem epilepticum de gæsta vili dictum, aut alium consimilem. Ac denique iungendo spinaum dorsii oleo chamææ, violacæ, amygdal. dulcem, & de nucce Indica.

Somno profundo febribus superuenienti eadem adhibentur remedia, que in torporoso affectuum curatione sunt descripta; hoc tantum obseruandum, vtea que intus assumpta nimis calefaciunt, minime viaruntur.

Sitis fabricantur sedatur præcipuè potu refrigerante & humectante. Attamen illi intensior sit potus moderatus ei non sufficit, (immoderatus enim plurima insert incommoda: & ægrum non raro in vix discrimen præcipitat) aliis auxiliis tallenda atque demum cenda est.

Primo itaque frigidas aer inspirare, æger in silentio maneat, ore clauso per nares expiret, & somno indulget. Deinde abluatur ex aqua hordei tepida, aut aqua qua decocta sunt iulubæ, lebelitæ, pruna, lactuca, portulacæ, & similia.

Teneat in ore æger frustum rad. liquoritæ cortice mundatæ, & in oxyratæ macerata. Vel colluat ex aqua hordei, aut simplicis cum modico aceti, aut cum succo granatorum, limonum, vel tancino spiritus vitrioli.

Vel teneat in ore acinis granatorum, aut laminam mali citrini, limonis, vel auranti maceratam in aqua rosarum, saccharo adiecto: vel holones lactucæ, endiuæ, aut portulacæ, folia acetosæ, talisulæ anguræ, cucurbitæ, cucumeris in aqua frigida prius maceratas. Vel ceratæ acidæ, vel ribes, vel tamarindos, vel frutulum crysalli, vel prunorum acidarum nucleos, quibus uouuili pulpe adhzreat, & similia.

Vtile est etiam ad sedandum sitim, saccharum aqua rosarum madefactum cum spiritu vitrioli, atque iterum exliccatum.

Si leuioribus hîc sitis tolli nequeat, permittendus est potus, non intus exacerbationum, neque in augmento, nisi paucissimus: sed in vigore, & potissimum vbi ad declinationem vergit: tunc enim largior potus calorem foras diffundit, & sudorem aliquando mouet: præcipuè in febribus intermittens paroxysmis, in quorum declinatione ad satietatem non raro potus haurire conuenit. Varia potus materia in huiusmodi febribus conueniens superiori capite descripta est.

Si verò sitis ab humore bilioso in ventriculo contento ducit originem, si per vomitum, aut declinationem expurgandus est: Vomitus promouebatur, si æger sit nauticabundus, syrapi acetosi simpli, 3. i. s. cum aqua hor. aut decocti raphani 3. i. s. Sin minus, pergetur bolo ex cassiæ 3. i. & pulpe tamarind. 3. ii. vel manne 3. ii. in decocto prunorum & tamarindorum dissolutis: vel potione sequenti.

Æ. Cassiæ recentæ extractæ 3. vi. mucilag. sem. psyllii 3. ss. decocti hor. prunor. & tamarind. 3. i. v. syrapi rosat. 3. i. Misco. Fiat potio.

Lingux & faucium ardor, siccitas, & fæcibiles curatur variis remediis, diuersis partibus admotis, & in ore detentis in hunc modum compositis.

Æ. Mucilag. sem. cydonior. 3. i. mucilag. sem. malux 3. ss. specier. diarr. frig. & sacchari candian. 3. i. sacchari albi q. i. Fiat elix. gma. Vcl

Æ. Mucilag. sem. psyllii, aut cydon. extract. cum aqua lactucæ, vel ros. 3. ss. syrapi viola limon. aut granat. 3. i. s. Misco. Capiat parumper interualla, & in ore detineat. Vcl

Æ. Sem. cucumeris 3. ss. sem. cydon. 3. ii. gummi tragacanth. 3. i. s. Contundantur leuina, & gummi dissoluantur in albumine oui. Miscoantur omnia, & sunt trochisci ore detinendi. Vcl

Æ. Sem. psyllii, x. ydon. an. 3. ss. gummi tragacanth. 3. ss. sacchari candi 3. ii. Cum mucilag. gummi tragacanth. fiat trochisci. Vel limbo raro includantur, vt sunt noduli, qui macerantur in aqua rosar. & ore tepuerunt.

Si profundius alperitis hæserit, fiat gargaria ex decocto hordei, rad. altheæ, fol. lactucæ, portulacæ, flor. violar. addito melle rosar. syrapi, violar. vel saccharo cando, vel oxy. mel. simpli, & simili.

Si sordes lingue adhzreant, vt plerumque fit, sapè detergenda est linco alperiori intendo oxytrato. Qui etiam succus semperui, & tal prunellæ interdum addi poterit.

Si ardor fit intensior, cum insigni lingue nigredine, margi rethigerantia cum humectantibus permiscoantur, in hunc modum.

Æ. Succorum lactucæ, semperui, limonum, an. 3. i. mucilag. sem. cydon. sacchari candi, an. 3. ss. sacchari albi q. i. Fiat looch. Vcl

Æ. Semperui recentis 3. ii. aceti rosar. 3. ii. aquæ hordei 3. i. Coquantur ad tertiam partem consumpt. In colat. dissolue talis prunellæ 3. i. s. alum. 3. i. syrapi viol. & de moris an. 3. i. Fiat gargaria. Vcl tal prunellæ solum in aqua semperui dissoluitur, coque vltimè lingua, & fauces abluantur: nec non eius particula absorberi potest vt ad ceophagum simili ardore alit. etum peruenire possit.

Exterius verò guttur & collum linatur ol. violacæ, & butyro recenti in aqua rosarum lotis, quibus veluti vitium guttur humectari possit.

Ad refrigerandum admodum possunt, vnguentum rosaceum, refrigerans Galen. & similia. Sed multo efficacius admoventur folia lactucæ, & portulacæ trita, ac duobus linetis inclusa. Vcl millepedes contusi eodem modo admoventi possunt.

In magno pectoris ardore, qualis in febribus solet contingere, totum pectus iunguentum est oleo violacæ, nymphaeæ, & amygd. dulcium, luto vero æstu plurimum virgæ, fomenta eidem parti admodum debent ex decocto hordei, lactucæ, nymphaeæ, borraginis, violarum, & similibus composita, quibus irrationales ex oleis prædictis debent succedere. Quandoquidem, ex præcepto Galen. & Aucennæ, in huiusmodi febribus magna cura thoracæ, vt potè calo-

et aloris formæ, habenda est. Ea verò remedia, iuxta Trallian præceptum, raro frigida, quia intra calorem repellunt nec tepida, quia laxant: sed actu calida, potentia verò frigida admodum debent.

Dolor lumborum in febris excitatur a sanguine feruido & copioso in vena ebulliente. Sedari autem debet clysteribus emollientibus & refrigerantibus. emulsionibus & lemnibus frigidis paratis, addendo sal prunellæ: in quibus eorum partem ex vnguento refrigerante Galeni cum succo semperni maioris & camphoræ, vel vnguento populeone, vel ol. rosæ nymphaeæ & papaueris, vel epithimæ ex aqua plantaginis rosarum, aceto rosaceo, & cantharidæ: oxymethodino ex aqua rosarum, oleo rosaceo, & aceto parato. quæ omnia actu frigida in afflate, subtepidâ in alij temporibus admodum sunt.

Inquietudines quæ in febre affodæ, & paroxysmis tertianæ intermittens solent contingere, curantur præcipue purgatione humoris biliosi ventriculum, aliaque partes sensibiles velicantibus: per vomitum, aut fecellum, propterea hanc vel illam viam magis affectare videtur: tum clysteribus ad inferiora reuellit. Mox quæ omni arte procuratur & potus frigidus exhibetur: nec non iulepi refrigerantis, quibus interdum syrupus de papauere, vel laudanum tantillum vtilissimè permiscetur. Etiam in vigote paroxysmi syrupi de papau. j. vtiliter exhibetur.

Syncope in febribus lyncopalibus vulgò dicitur fore contingere, quarum duo genera constituuntur, vt in superiori capite dictum: & vna dicitur lyncopalis minutæ aliter verò humorosa. Quarum curationes, vt potè ad aliarum febrium putridarum curationibus longè diuersas, prædicti symptomatis ratione, huic loco referuauimus.

Syncopealis minuta, quæ a biliosis humoribus, acerbis, & venenatis generatur, hunc modum curanda est. Aer sit frigidus, & humidus, partemq; altringens, vt exolutio prohibeatur. Vicius tenuis refrigerans, & insilans, ex iulculis pulorum cum aceto, portulacæ, &c. decoctorum, quibus addi potest aqua rosarum, succus granat. & parum sacchari. Panis insusus in succo granorum, vel aurantium exhiberi poterit: si vicius paulò plenior sit concedendus, nec non cremor hordæ, aut panatellæ cum succo granatorum, aut limonium. Tum iura restaurantia ex carnis expressis cum dictis succis. Robulioribus exhibetur vitelli ouorum cum omphacotis illis gallorum, carnes pulorum, gallinæ, perdis iisdem succis alterate.

Potus tempore palfus, si non adfit inflammatio, alicuius visceris, sit vinum aequolum non vetustum, nec vaporosum. Extra pallus, aut si aliqua sit inflammatio, aqua hordæ, aut aqua panata, cum syrupo granat. limon. acidi citri, iulepo rosar. &c.

Somnus extra paroxysmum conuenit, in eodem nocet. Ac denique maxime fugienda, quæ iram, tristitiam & similes affectus concitant.

In paroxysmo flabellis refrigerantibus & irrorationibus edonatis, spirituum relaxatio superaddenda est. Facies aspergenda aqua frigida, vel rosarum, cum aceto. Eadem quoque resque in vris, & maxime in mulieribus frigide foueri poterunt.

Si calor cum spiritibus, ab corde ad exteriora non reuocetur, tuellendus est frigidioribus, extremorum, ac velicationibus cum nates sæpe apprehendantur, poli vellantur, nomine proprio sæpe æger inclametur. Detur mica panis in succo granat. insula, aut vinum tenue odorierum, aqua rosarum diluunt. Et virgente necessitate, aqua cinam. cum aqua rosarum. Interim iura restaurantia non omittantur, quibus confect. alhermes, aliaque admisceri poterunt. Potus quoque cordales sæpe ex cochleari exhibenda, in hunc modum compositæ.

Re. Aquæ ros. Vnc. ij. aquæ naphæ Vnc. i. aquæ cinam. vnc. ij. confect. alherm. 3. anagris. præp. & corall. præp. an. 3. f. manus Christi perlatz 5. vi. Mille. Fiat posio. His accedere possunt opiatz, & condita superiori capite descripra.

Medicula panis adhuc calens aqua rosar. & aceto irroretur, & oris, naribusque admoventur.

Corq; epithimata refrigerantia, & toborantia applicentur.

Ad poros densandos, & impediendam dissolutionem, inuoluatur æger linteo consperso puluere rosar. balauftiorum & fiantiorum: vel irroretur linca aqua rosar. cum modico aceto.

Totum corpus, præcipue dorsum, insinatur sequenti linimento.

Re. Ol. rosar. omphac. Vnc. i. myrtill. cydon. mucilag. semphylijan. 5. vi. gummi arab. dissoluit in aqua. 3. ii. ceræ albæ q. l. Fiat linimentum.

Ventriculi ratio præcipue habenda est, quod in eo præcipue humor noxius conuulsetur. Illuenda autem est illius regio oleo rosaceo, & cydon. tum imponatur panis totius maceratus in succo cydon. & granat. acidorum. Vel magno virgente æstu foueatur tepide decocto portulacæ, & rosarum, vel etiam succo solani portulacæ, vix accretæ, adiecto ol. rosar. & cydoniorum.

Sublata lyncopæ, & resectis viribus, ad febrem eiusque causam tollendam conuertendus est animus. Quod fiet alterantibus, & euacuantibus, quæ febribus ardentibus idonea iuxta capite descripsimus.

Syncopealis humorosa, quæ ab humorum pituitosorum, & crudorum multitudine produciuntur, contraria ferè est curatio ei qui minor alcripta est. Siquidem aer debet esse temperatus, ad calidum inclinans, lucidus, purus, & fuscus. Cibi boni succi, & facili concoctionis præparati cum hyssopo, fœniculo, aliisque. Potus sit vinum tenue, & oligophoron. Somnus & vigilæ moderatæ.

At frisiones in primis maxime commendantur à Gal. 12. meth. c. 3. quæ ab initio morbi celebrandæ sunt iuxta aliorum superne decolorum, primum in pedibus, cruribus, post in brachijs, humeris, & orlo. Lintea prius suffiantur styrace, signo aloes, thure, & caryophyllis, &c. Vbi a fritione ætus abundè incalescit, mungantur oleo anethino, chamæ. irino, costino, aliisque relaxantibus. Huiusmodi frisiones plurimum laudantur, quia calorem cum spiritibus, ac materiam noxiam vires suffocantem ad exteriora euocant.

In paroxysmo æger excitandus est narium apprehensione, aurium fricatione, pilorum auulsione, inciamarione, &c. Præterea ori & naribus odorata admoventur, vt aqua cinam. hor. aurantium, acetum infusionis caryophyllor. mica panis intincta in iugo Hippocratico, quæ etiam per os exhiberi potest, aut ipsum Hippocraticum solum, aut a qua cinanom. auro ponit cardiacæ sequens.

Re. Aquar. mellis, orism. & flor. aurant an. 3. i. aquæ cinam. Vnc. sem. confect. alherm. 3. i. supri conditur cort. citri & caryoph. li noitatis an Vnc. i. Mille. Fiat posio, quæ detur ex cochleari frequenter. Opata etiam in hunc modum componi poterit.

Re. Conserug. flor. buglossi, anthos. & cort. citri conditæ. Vnc. sem. nucis molchæ condit. 3. ii. confect. alhermes 3. ii. l'pexer. chambreg. diamolch. dulcis an 3. i. Cum syrupo condit. cort. citri hæ opata.

Cordi admovent possunt epithimata, & polli columbinis ventriculo & testibus fomenta, aliaque admiscerant, quæ in vinum imbecillitate suere propolita.

Dum hæc sunt, ad frisiones identidem redeundum est, quæ nunquam in hoc affectu omittendæ.

Re. cit. aliquidum viribus materia morbifica educenda est per clysteres & purgatione (in quibus hanc cum agitatione ventriculi, mu prodeit) quæ blandæ, & frequentes esse debent, interdictis tamen præparationibus idoneis.

Inappetentia omnibus propemodum febribus communis est. Dum enim ventriculus calida intemperie afficitur, famæ immittitur, & sitis augetur. Aliquando tamen ita dantes appetentia, vt ægri vi. insula haurire possint. Fite quæ illud cibi fastidium a viscosis humoribus in ventriculo collectis, aut illius tuncis imbutis, vel a corruptis, malignis; vaporibus ventriculi obidentibus. Curari debent euacuatione causa morbificæ per vomitum, aut fecellum idq; ab initio, diluto rhab. & tamarindorum. In declinatione verò, si febris non sit valida, tum hiera picta in decocto hordæ, ciciorum, absinthij aliorumq; detergentium dissoluta. His succedere debent clysteres detergentes, qui con-

(scutiq;

febrile quædam ventriculo reuellunt. Præterea ex-
hubenda sunt frequenter acida & refrigerantia, vt fy-
rup-limon, granat, cerasa dicitur per se, vel cum qua-
frigida exhibitæ. In declinatione, aut cessante febre,
sympus de abstinethio pontico vtiliter dari poterit; vel
solus, vel cum syrups, aut succis acidis permixtus. Cibi
offerantur ægro magis grati. Vt enim docet Hipp. Aph. 1.
sect. 2 paulo deterior fed iuuatior cibis, & potius melioribus
infusioribus preferendus. Per rara autem intervalla cibis non
multis affumatur: frequentior enim & copiosior inappetentiam
vel sanis inducit. Condiatur verò cibi, modo tuf-
fis abfit, omphacio, aceto rosas, succo limon. Si æger ita
abhorret ab omnibus cibis, nihil omnino affumatur, in qua-
tunc clysteres acriores bis aut ter in die: additis penis ex-
crementis clystere deiectione. Soluta omnino febre, si
remans inappetentia, æger modice leu exerceat, vtatur qua-
pambus, si affragra, succo locum mutet, & migret ad acrem
tridigmetum. Ad tandem si hæc non sufficiant, vtatur
vinum abstinethie, & pilulis de hiera, que hamores ventriculi tunc
imptos potenter absterunt.

Singultus & vomitus febrilis (apertucentes) status oppugnantur remediis quorum maxima est singultus, & vomitus curatio: huius a nobis descriptis erit repetenda, & singulis febricitantibus, huius & appropinquatis congregetur, cum deficiat ex iudicio accommodanda. Caeterum, si tamen manifeste esse vomitus criticus vlla ratione cohibetur, singultus interdum ex immo dolo refrigerantium vlu procedit, testatur Lemnius, referente Scaevola, huius verba, *Singultus in febrilibus nunquam sequitur intermptionem refrigerantium, sed ipsius interitum. Quo modo afficitur incensula temeritate. Afferturque plerumque, ut, adque Symphora, contra omnia remedia apertucentia opposita, fulsit.*

Fluxus alius febribus putridis superueniens, si citatus sit, cohibendus non erit; quæ lymphæ multæ illius intro-
it vires admodum non deiciat, si humor vitiosus ad partes
principes recurat. Quando cohibendus citius sit purgatio
non blanda, & simul alteretur clysteribus detergentibus, &
roborantibus assumptis, & admodum incalidatis, roborati-
bus, & astringentibus. Quæ omnia ex diarrhæa curatione
enac defumenda leuioribus incipiendi, & ad fortiora, si
non citius irruerit, paulatim progrediendi.

[illegible]

Per os verò exhibenda in craffantia, aftringentia, & rob-
rancia: vt hordeata ex decocto lactuce, & sem-iri parata:
iufcula infufantia cum fucco granatorum, agrella, pulue-
ris corallor. margaritar. ubi eboris, infatolium, aut ba-
liffiorum, lulpei ex aquis rofar. lactice, portulac. cum
fyrupo granat de rofis ficcis, aut cydonior. Opate ex confu-
fionis rolarum, corallor. margaritar. recta figillata, puluer. dia-
paurg. frig. trufantia, &c.

flammarione. Quare nunquam omittenda cura hypochondriorum, capitis, thoracis, vteri, ænium & vesicæ: ut omni ratione inuestigemus quæ harum partium infirmitatibus laboret, & ei, quoad fieri potest, subueniatur.

C A P V T UL

De febre terciária intermitente.

Febri tertiana intermittens fit a bilioso humore excrementio, in prima corporis regione contento, ac putrescente.

Ille autem vel legitima est & exquisita: vel illegitima, op-
tha seu furia.

Legitima seu exquifita horis 12 terminatur, & produci-
tur a bile naturalis putrefcente. Nocha verò feu puria paro-
xyfmos habet 12 horas excedentes. Opod fi 24, horas exce-
dat, cruenta extenfa nominatur. Fitque vel a bile præterna-
turali putrefcente, vel a naturali, aliis humoribus, prædeter-
minatis petiuit, permixta.

Item tertia alia simplex est, alia duplex, alia triplex. Simplex dicitur, cuius paroxysmi tertio quoque die, hoc est alterius diebus, recurrit. Duplex vero, quando paroxysmi singulis diebus insidunt. Et quoniam in hoc quotidianum non differat, et tamen dicitur nigrum per signa propria, dicitur aut per tertia redundans indicantia, que suis locis exponitur. Aliquando tamen in tertia duplici duo paroxysmi cadendi die apparent, altera de remanente libera: idque recentiores nominant vocat duas tertianas, et a tertia duplici dicitur ungu. Que tamen distinctio est casu non momentanea. Triplex tertia fit quando duorum dierum spatium ut apparent paroxysmi. Rarissima est hic febris. Unum tamen illius exemplum proponitur a Galieno *crif. cap. 9*. Et nos aliud videmus anno 1637 in quodam viro nobili, cui singulis 16 horis febris tertiane paroxysmi succedebat. Et singuli paroxysmi intra 10 aut 12 horas per sudores judicabantur. Fuit autem diuersa illi paroxysmi a diuersa materia, in diuersis locis putrescente, ita et vaqueque remanente focum obstruat.

Humores autem febres tertianas producentes, in prima potissimum regione cumulantur: hepate nimirum, cystide felica, ventriculo, mesenterio, pancreate, aut venis illarum partium.

Eorum cause sunt illæ omnes, quæ bilem excrementi-
tiam generant: nempe caliditas & sicca hepatis intemperie,
atque iuuiculis, aeris contributo calido, vigiliæ, ære: itæ,
ieiunia ciborum calidiorum vius, exspiratio nimis. Hinc ac-
cedit ad tertianæ noctis productionem, cause pituitas,
& sociolachrymarum generantes. Hinc illi qui calidiori hepate
præditi sunt, & ex crapula ac prava victus ratione multas
crustaceas generat, ex bilis cum crudis humoribus permix-
tione, tertianæ noctis obnoxii sunt, Hinc etiam afflicti
tempore crudi humores, ex caloris naturæ immobilitate,
fructuum effluuii & nimio potu genitibilibi permixti, tertianæ
noctas pariunt.

Signa diagnostica tertianae exquisita sunt, quod haec febris flammam cum infirmitate rigoris incipit quae a quocundam distinguitur, in qua levis tantum horror, aut trigelatio apparet. Deinde rigorem sequitur calor intensus, acutus, & morbus fitis intolerabilis, respiratio magna, & frequens, vigilae capitis dolor, & interitum dolens. Rigorem etiam sequitur interitum vomitus biliosus, vel alui fluxus. Urina aliquando flava est, raris, vel rubra. Accessiones vltra tres horas non extenduntur, & sudoribus terminantur. Praeterea praecedunt causae bilium generantes supra enumeratae.

In tertia notha signa omnia predicta sunt remissiora, quam in exquisitis intensiora quae in quorundam. Et propter maiorem, vel minorem pituitae copiam admixta fuerit: paroxysmi ad tertianae equisunt, vel quotidianae paroxysmi magis vel minus accedunt tum ratione intentionis, et symptomatum, tum ratione durationis ipsius paroxysmi. Ita et tertianae notae paroxysmi ad sexdecim, octiduum, et pures horas extenduntur. Quamquam interdu possint esse breuiores, ob macrae paucitatem, &

APPENDIX.

In febri acutissimarum & perniciosarum curatione, hoc diligenter aduertendum, rarissime eas fieri sine interna & peculiari vlcera cuiusdam affectione, & plerumque in-

juxta octo, decem, aut duodecim horas terminari.

Prognosis delinuntur ab Hipp. *Aph. 59. f. 4. Tertia*, inquit, *exquisita septem circulis, ad summum indicantur.* Et *Aph. 43. eisdem, cessant.* Febris quæcumque modo intermiserit, periculum abesse significat. Quod tamen intelligendum est de tertiana febribus omnis malignitatis expertibus. Dantur enim tertianæ malignæ, & pestilentes, quæ quamvis evidentes habeant intermissiones: ægrotantes tamen non raro de medio tollunt. Præterea multa febris tertianæ possunt supervenire, quæ vitæ periculum inferre possunt, quamvis febribus ex se periculosa non sit.

Scribit Haly. & vulgatissima docetur experientia, in tertiana laborantibus, si vicia, aut pusillus in labijs & natis erumpant, finem febris præfigere. Est enim quedam veluti crasis, quæ ad illas partes fit.

Alij illius febris tertianæ superveniens, materia iam concocta, eam soluit. Et hæc vnicæ est via, quæ huiusmodi febres perfecte indicantur. Cum enim illarum locus in cystide, fellea, vel hepate, vel intestino, alijsque partibus primæ regionis continetur, etiam si quæ singulis accessibus affertur exhalatio, in habitum corporis irrepsit, vel sudoribus, vel insensibili transpiratione, vel papulis expurgatur: manet tamen crassamentum, quod nisi beneficio nature, vel medicamentorum per alium expurgetur, aut febris diuturnæ, aut obstructio, aut recidivæ, aut aliorum morborum, contumacia causa esse solet.

Breves & leviæ esse solent febres intermittentes, si bonus sit totius corporis habitus: si viciosa bene sint affecta: si veræ aut æstas adit: si æger non multo utatur alimento, & parce bibat. Contra vero longiores, & contumaciores esse solent, si prava adit ieiunia, aut lenis affectio: si æger abunde humoribus præturis, aut melancholicis si hyems, vel autumnus viget: si æger multo utatur alimento, aut potu multo calorem opprimat.

Curatio ut in alijs febribus ad febrem, eius causam, & vires dirigenda. Febris indicat refrigerantia: causa, eadem refrigerantia, tum concoquentia, & euacuantia: vires roborantia.

Ac victus ratio primùm instituenda est refrigerans, & humectans eadem profus in tertiana exquisita, quæ in febribus continens fuit propofita. At in tertiana notha, eaque simplicia paulò plenior victus imperandus est, præcipue si illa in longitudinem abeat: tunc enim solida alimenta exhibenda sunt die intermissionis, & quæcumque vel sex horis ante accessum. In tertiana verò duplici, quemadmodum in tertiana exquisita, solis iussibus, alijsque sorbilibus alimentis æger nutriendus est.

Potus gratissimus in tertiana notha, æs Foretio.

Æ. Aquæ sonis th. cinam. 3. sem. lactarii Voc. iij. Hæc cruda per manicam Hippocratis traiciantur.

In accessione autem alimentum exhibendum non est, juxta sententiam Hipp. *Aph. 1. f. 7.* Natura enim, ut docet Galen. in comment. cibi concoctione auocat a concoctione humorum morbosorum. Adeo quod in accessione tetro vapore universum corpus perfundatur, qui cibum tenet læsum partem labefactam, & maxima parte corruptam. Attamen si accessio adeo longa fuerit, vel corpus ægrotans adeo calidum & siccum, gracile, & ræpe teneatur, ut facile dissolvatur, & ad finem paroxysmi sufficere non valet: etiam in accessione cibandus æger est, quod melius fiet in statu, quam alijs temporibus. Quamvis etiam in principio, & augmento, vitæ necessitate, cibum offerri possit. Sic enim Gal. 10. *methe.* 5. hæc febre laborantes, calido & sicco temperamento præditos, quibus ad principium accessum cibum in lyco, opem iudicet, etiam in principio accessum cibum coactum est. Ad idque imitacionem Amatus Lusitanus *cur. 68. cent.* 4. pichrococo & meram bibem commenta, videt, syncope oriebat, panem totum agrella asperum, paroxysmi iusto exhibuit, sique prædicta symptoma inhibuit.

Illud præterea tum in hac, tum in alijs febribus intermittens est observandum, ut æger ante paroxysmum, neque potum, neque cibum assumat, neque somno indulget. Vultus tamen alium deponet, in quo clystere, si opus sit: si quæcquid illi ante iuxta paroxysmum iniiciatur.

Instituta igitur victus ratione idonea ad materiam motu, sic evacuacionem statim progrediendum est: quæ cum in primis vijs heret, non solum clysteribus, sed etiam medicamentis alium laxantibus, tum vomitorijs educcenda est.

Clysteres in tertiana exquisita sient ex decocto emolliente & refrigerante, cum castia, catholice diap. simpli aut solutio. In notha vero fiet decoctio ex emollientibus & incipientibus, dissolvendo diapheum, mcl rosæ, &c.

Alium laxantia medicamenta in tertiana exquisita erunt eadem, quæ in febribus continuis fuisse propofita. In notha vero addetur agaricus, fenna, catholicon, diapheum, aliaque ex curantis Medici iudicio, iuxta varias ægrotum constituciones, eligenda. In quacunque, vero specie cremor tartari vultus medicamentis addi poterit, quia obstructiones aperit, potenter deiegit, & nihilominus refrigerat. Medicamenta purgantia die intermissionis exhibenda sunt idque maius horis, ut vulgò solet fieri, si intermissio in eas horas incidat. Alioqui tempus inter duas accessiones inmedium eligendum. Et quamvis hora diei ac noctis exhiberi potest medicamentum, modo illa ab accessibus plurimum distet, & ventriculus assumptum prius alimentum concoxisse videatur.

In tertiana autem duplici difficile est horam exhibendi medicamentis eligere, cum non raro tres aut quatuor tantum horæ duobus paroxysmis intercedant. Imò interdum adeo longi sunt paroxysmi, ut aliter incipiat antequam prior desierit, unde febres subintres ntes nominantur. Tunc enim occasio præceptæ exactam Mædici diligentiam postulat commodior autem exhibendi medicamentis hora ita eligenda est: ut in tertiana duplici non subintres, in fine paroxysmi exhibeatur, ea ad lequentem paroxysmum distantia, ut antequam ille invadat, operatio medicamentis abolata sit. In febre autem subintrente exhiberi debet medicamentum in declinationis principio, simul atque tantillum remittere incipit. Et in utroque tribus horis ab assumptæ medicamentis iussulum exhibendum est: ita tamen ut tres aliz superint horæ ab assumptæ iussulo: antequam paroxysmus invadat. Atque adeo sex horis ab assumptæ exhibendum est medicamentum ante proximum paroxysmum.

Quod ad vomitoria spectat, ea quæ de ijs in continuaturum febrium curatione dicta sunt, hic etiam commodius aptari possunt: cum humorum illius in ventriculo, intestino, & causis hepatis contenta, quæ huiusmodi febres solet procreare, per vomitum aliquando educatur, quæ tamen interdum medicamentis potè inferiora purgantibus, etiam exhibitis, deturbari nequeunt, ut rectè Fernellius annotavit. Atque ita si in principio paroxysmi æger vomitibus torquetur, cum nature morum rectè sequeatur Medicus. Et cum mitiora vomitoria pietatemque non sufficiant ad mediocritatem vendendum est: quale in primis est alarum, & cuius in pulverem redacti 3. 6. 3. 11. vel 3. i. exhibetur cum iussulo, aut alio liquore convenienti. Alij decoctum illius exhibent, quod paratæ ex 3. iij. rad. alari de coctis in iussulo o pulli, vel aqua hordei & passulorum. Chymici vitriolum album præparatum, & saltem vitrioli viuprant, tum etiam aquam benedictam, quæ ex croco metallosum fit: quæ quævis & cetera medicamenta ex antimonio delumpta, sicuti maiorem in primis vijs stabilentem nonnumquam feliciter euacuant, ita prudentem & peritum, qui ea exhibeat. Medicum decidant. Alioqui luti veluti culter acutus in manu infantis, aut ghadius in manu iunioris.

Expurgatis primis vijs vno saltem medicamento, venæ apertæ est die intermissionis. Imo vero si corpus fit plethoricum, & vine rubræ, ac crasse appareant, curatio vultus a phlebotomia iussu habuit, melius enim postmodum purgatio procedet.

Si languis valde calidus, adustus, aut putridus appareat, phlebotomia erit iteranda: quod tamen a Medici iudicio pendere debet, iuxta propriam ægrotantis constitutionem.

Post purgationem & phlebotomiam, præparationi humorum incumbendum est per iulepos, in febribus putridis propofitos, quo, ut materia varianda est, prout putrit, vel

et, vel melaneholia bili permixta est. vt etiam dicto loco annotatum est.

Interim verò dum prædicta remedia sunt, calor febrilis temperandus est epistematibus refrigerantibus cordi, & hepatis admotis, qualia in febris continuus fuisse propofita. Hæc cautio adhibita, vt non nisi in summo febris vigore, aut potius in declinationis principio admoveantur.

Hepatis etiam, & iumbus vnguentum rosaceum aut refrigerans Galeni applicare poterit.

Clystres etiam emolientes, & refrigerantes in fine paroxysmi, vt ante illius inuasionem erant vtilissimi.

Præparata materia per aliquot dies vsu iuleporum, portatio iterum instituenda est: ex fenna, rhab. catholice, & syrupo rosaceo: addendo agaricum, si redundet piruitz. Et si æger sit robustus, addi potest diaprun. solut. electar. de succo rosar. vel diaphanorum.

Purgatio iterum, post vsu iuleporum corpore si accediones redeant, & ad longius tempus continuari videantur, signum est humores crassos & pertinaciter inherentes febrem fouere, & obstructions producere: quorum ratio ne abstergentia, aperientia, & incidentia viatorum sunt. Eorum autem præcipua sunt, absinthium, quod valde commendatur a Gal. ad Glauco 3. & centaureum minus, quod ratione virtutis eorumque habet in curandis febribus, febri septi nominatur. Quia ramus ea calida sunt: rigidorum commixtione temperari possunt in hunc modum.

℞. Rad. gram. cichorii, & asparagi, an. Vnc. j. fol. agrim. accor. & echinorhizæ, ana. M. absinthij vulgaris, & centaurei minoris, ana. M. sem. Coquantur ad 8. i. In colar. distillat. syrupo limos. 3. i. Fiat iulep. pro tribus diebus matutinis.

Finitis iulep. purgans medicamentum verum exhibendum est. Vei vomitorium, si natura per illam viam euacuationem affecerit. Tunc enim, apparentibus scilicet conductionis signis, huiusmodi febres feliciter per vomitum non raro curantur. Et Gal. ad Glauco. cap. 10. multos solo vomitu ab hac febre curatos esse scribit. Immo vero quod diuina docet experientia, æquam benedictam huiusmodi febres vtriusque eradicare, nisi continuas viscum obstructions obstant. Multa huius rei experientia propofita sunt a Martino Rulando in centurijs curationum. Sed vehemens est, vt antea dixi, medicamentum, nec nisi summa cautio exhibendum. Quidam huius aquæ 3. j. cum infusione Vncle. m. o. lenius exhibent: sique magis per secessum, quam per vomitum operatur.

Alij viupar. guttam gummi, alij mercurium dulcem cum limonio. Quæ remedia cum potenter euacuant, febres huiusmodi facillime eradicant, sed robutionibus tantum corporibus exhibenda.

Hic remedia vtriusque febres tertianæ, non solum legitime, sed etiam uoluntate solent succumbere. Si tamen, adhuc pertinaciter obstant, (vt sæpe fit) solentis purgatio instituenda est, apozemate per triduum propinato, ex materia iuleporum, addendo fennam, rhabarbarum, agaricum, syrupo ros. de cichor. comp. & similia. Imo vero, si cetera ante huius apozematis vsu tertiana febris soluta sit, vtilissimum est apozema exhibere, si spontaneum alij profusum non contigerit. Infusa enim est illa solutio, & reciduum minuscule reliquæ euacuationis, quæ per sudorem aut insensibilem transpirationem fuit, portione tantum, humorum tenuiorum euacuant, crassiori inanis remanente, quæ non nisi per alium educi potest.

Antequam apozema exhibetur, si tendio sit in hypochondrijs, admoveatur locus emollientis, attenuans & roborans: in hunc modum compositus.

℞. Rad. althææ, gram. & asparagi, ana Vnc. i. rad. enule camp. & cortic. median. tamaricis, an. Vnclem. fol. maluar. volar. agrimon. capil. ven. & absinthij, an. M. sem. hui. & fenugr. an. Vnc. i. flor. chamom. melior. ros. an. P. i. Coquantur in tribus aquæ paribus, & vna vini albi sub hinc addita, cum aceti Vnc. i. Foucatur hypochondria calidè manè & sero per biduum ante vsu apozematis.

Post totum illud autem eodem paribus sequenti linimento. ℞. Ol. lilior. amygd. dulc. & tamaricis, ana Vnc. i. vnguenti de althæa Vnc. i. ceræ parum. Fiat linimentum.

Si non obstantibus hiis remedijs pericula febris in lon-

gitudinem abeat, & facies tumida, & sub pallida appareat tum pedes vesperi intumescant: his remedijs æger tractandi sunt, quæ ad hepatis obstructions vulgo præscribi solent. Inter cætera verò maximè laudatur a Montano decoctum cichorii, & chamædrys in iusculo, quod dicit esse adhibendum in febribus longis ab obstructions pendentibus.

Notandum tamen est, febris tertianæ longitudinem a calida & sicca icteris intemperie aliquando foueri, quæ humorem biliosum, nouarum accedionum somitem, concituo producit. Quod sæpe obseruatur in multis, qui sicco & squalido corporis habitu præditi, & omnino biliosi, citra tensionem viscum, & citra humoris copiam, per tres aut quatuor menses, calidiori præsertim anni tempore, tertianam passi sunt. Hic valida purgantis, valde aperientis, & calefacientis aocent. Sed vidu refrigerante & humectante, inleptæ, & iusculis simili facultate præditi, tractandi sunt. Ite superflui humores clysteribus emollientibus & refrigerantibus, cassia, tamarindis, catholice, & syrupo rosæ insensim expurgandi. Sed præsertim balnea aquæ tepidæ hic miranda præstant, calidam & siccam intemperiem viceribus impressam extinguendo. His vtatur æger die intermissionis citra sudoris profusionem.

Interdum etiam febris tertianæ longitudo a praua quadam diathesi viscum alicuius icteris præsertim aut repletis dependet: quæ purgationibus quantumvis repetitis curari nequit, quia praua illa qualitas in viscere remanens, humorem nouum quotidie accumulat, quæ accediones fouet. Quæ quidem praua qualitas diureticis, sudorificis, atque resolutiuis auferitur.

Hic facultatibus prædita sunt, absinthium, centaureum minus, carduus ben. edis. rad. dictamnij, pimpinellæ, tormentillæ, aliaque ex quibus sunt decocta, pulueres, & similia, per plures dies exhibenda ante accedionem.

Vulgo exhibetur theriaca ad 3. j. cum vino albo, ante accedionem tribus vicibus repetendo.

Alii nucem iuglandem cum saccharo, aut melle conditam eodem modo exhibent.

Vbi theriacæ caliditas timetur, sola primum exhibetur, & deluper aquæ plantaginis cyathus propinatur. Hoc frequenter vtebatur Varandæ præceptor meus tanquam specifico.

Idiplum præstare potest vini Hippocratici cyathus vnus ante accedionem exhibitus, eoq; remedio gratissimo multi curati sunt.

Sedulo tamen aduertendum est, vt hæc omnia remedia non nisi præmissa diligenti purgatione exhibeantur.

Zechus in frequenti vsu habet pilulas sequentes, quæ ad aperientias obstructions, hepatis roborationem, & viscum dyscrasias tollendas, vni efficacissimæ.

℞. Trochisc. de rhab. de eupatorio, & de absinthio, an. 3. sem. puluer. elect. diarrhod. 3. i. Cum syrupo de absinthio, fiat massa pilulæ de qua capiat 3. i. manè per triduum, superbibendo iusculum, ex cichoraceis, & capillariis paratum.

Montanus vero exhibebat per multos dies trochiscorum de absinthio, vel de rhab. Scrup. cum iusculo, in quo hordeum, rad. petroselinicorum, & borrago bulliant.

Exterius illarum hepatis regio manè & vesperi ante cibum linimento parato & ceteri fantalini Vnc. i. succi cichorii Vnc. sem. succi absinthij Drach. ij. & aceti rosar. momento.

Ventriculi pariter regio hoc illinarum linimento. ℞. Ol. nardini, de absinthio, & cydon. ana Vnc. sem. gallia molch. 3. j. ceræ albæ q. d. Fiat linimentum.

Præter remedia hacenus propofita, quæ regularem, & methodicam curationem respiciunt, multa alia dantur specifica, & empirica, tantum interna, quam externam a prædictis laudata, tum apud vulgus vtilitissima: è quorum infinito propemodum numero, nos hic selectiora proponemus. In horum autem remediorum aliorum referenda sunt ea, quæ supra ad corrigendam prauam diathesim, icteris, aut melenferum impressam, & febres longas efficacitem, sunt propofita. Quibus sequens cum fructu addi poterat.

Alterum est decoctum chinæ & guaiaci ad xxv. dies ex-
bitum: quod licet à Medicis timeatur in huiusmodi febris-
bus, propter nimiam calefaciendi & exsiccandi vim maxi-
me tamen commendatur ab ijs, qui de Indicis aromatiza-
tione libellos scribere. Aduertendum autem est, Zacu-
tum Lusitanum in regione frigida & humida Medicinam
exercuisse, vel totius hæc remedia vituperari possunt. Ideoq;
in alijs calidioribus, nonnulli corporibus valde pituitosis &
cachecticis exhibenda:

CAPVT V.

De febre quartana intermitente.

Quartana febris illa est, quæ paroxysmos habet quarto
quoque: dæ recurrentes, hæc ab humore melancholico
in prima regione putrescente.

Humor autem melancholicus alius naturalis est, ex crassi-
o & terrestriori alimenti portione genitus, frigido &
incomptemperamento præditus. Alius præternaturalis, ex bi-
lis adultioris onduis atq; idè calidus & siccus. Hinc duæ
quartane species oriuntur. Quæ enim à melancholia natu-
rali hinc legitima quartana nominatur: quæ verò à præter-
naturalis spuria. Quamquam spuria etiam generari possit à
melancholia naturali, cum bilis portione admixta.

Cursum febris quartana alia simplex est, alia duplex, alia
triplex. Simplex est, cum vnus tantum paroxysmus quarto
quoque dæ contingit. Duplex verò, quando paroxysmi duo
per duos dies continuos accidunt, tertius autem dies paro-
xysmo vacuus est. Triplex denique est, quando singulis die-
bus paroxysmi contingunt, quemadmodum in quotidiana
& duplici tertiana. Hæ autem duplices & triplices quan-
tane sicut ab humore melancholico in vasis locis putresce-
nt.

Signa diagnosticæ sunt primum ea, quæ humorem me-
lancholicum in corpore redundantem significant. Quibus
addendum est quaternarius circulus, tanquam signum pa-
thognomicum. Sed & forma paroxysmi, ab aliarum fe-
brum paroxysmis diuersa, eius diagnosticum constituit. Inci-
pit enim cum oclatatione, pandulatione, & grauitate to-
tus corporis: cuius sequitur frigus, postmodum horror, &
rigor, quo alia consurgit videntur: unde dolor qui à qua-
rtanæ percipitur, *oculus* nominatur. Calor etiam
paullatim accenditur in materia frigida & crassa. Pulsus rari-
or & tardior, quam in reliquis febribus. Vrinæ in princi-
pio albæ, tenuis, & aquosæ in progressu verò coloratioris,
& crassiores redduntur. Talia autem signa in quartana le-
gitima apparent. In spuria verò vehementia symptoma-
ta maiori humore tenuiore, & calidioris significant.
Attamen non in eo solum spuria quartana à legitima di-
stinguitur, quod in illa calor, sius, vigiliz, & alia sympto-
mata vehementiora sunt: sed etiam quod legitima primò
& per se affligere incipit, nulla alia febre prægressa. Spuria
verò alijs febribus tum continuis, tum intermittentibus
succedit, ex humoris aduisione dictas febres committentis,
qui per illam aduisionem in melancholiam præternatura-
lem degenerat.

Duplex quartana per accessionum periodos facile di-
gnoscitur. Triplex verò à tertiana duplici, & quotidiana
distinguitur, non solum signis humorem redundantem in-
dicantibus, & paroxysmorum formæ etiam quod ante-
quam fiat triplex: apparuit primum simplex, aut duplex
quartana. Nunquam enim, aut per quam rarissime febris
quartana à triplici incipit, sed simplex, aut duplex in eam
degenerat.

Quod ad prognosim attinet, febris hæc longissima esse
consequitur, & quæ autumno incipit, vt plurimum tota hye-
me perleuat, nec nisi accedente vere finitur. Imò nonnullæ
ad autumnum vnum, vel plures extenduntur. Et hæc tamen
breuius sunt. In omnibus autem perpetuo coctionis si-
gna sunt attendenda, quæ eam breui forem iniri significant:
& cum his vrinæ etiā nigre bonæ ægræ rebus apparent.

Quartana legitima longior est spuria, quia hæc fit ab hu-
more tenuiori, illa à crassiori.

Tutissima esse solet, præsertim legitima, nullo graui ali-
cuius visceris affectu commota spuria vero periculosa est.
Tum si hepatis, aliudve pars præcipua, & graue aliquod dam-
num patiat, in hydropem degenerat.

Senes qui sexagesimum ætatis annum superant, febre
quartana affectu, vt plurimum moriuntur: quandoquidem
calor eorum debilis materiam adeo continuam superare
non potest.

Febris quartana intermittens in continuam mutatā, vt
plurimum lethalis est. Quia fit mutatio illius febris, quæ lo-
ras mouetur in eam quæ intrò. Quod hyeme maxime con-
tingit, dum excurrentibus fociis frigus se opponit, eoq; in
intima corporis penetralia repercutit. Id etiam contingit
medicamentorum purgantium acriorum & vehementio-
rum intemperstio via. Inde enim ex simplicibus quartanis,
duplices, triplices, & continuæ generantur.

Quartana & epilepsia superueniens, eam soluit, iuxta Hipp.
*Aph. 70. sect. 5. A quartana non admodum conuulsus est, et
pauca, si vero prius capuatur, & quartana superuenit, li-
beratur.* Ratio autem huius rei est, quia præpositi Gal.
in comm. quia materia crassa epilepsiam efficiens, longo huius
febris calore attenuatur & concoquitur. Nec non conuul-
sio totius corporis, quæ in rigore fit, facilius excutitur.
Addere possumus, præuos humores in cerebro, & alijsque
partibus, aut etiam in venis latitantes, ad hypochondria, &
ignobiliores partes, vbi est quartanæ minera, transferri, &
prædictas partes delere.

Dysenteria febris quartanæ superueniens salutaris, iuxta
sententiam Hipp. *Aph. 48. sect. 6. Lentius difficultas intesti-
norum superueniens bonum.* At in quartana vt plurimum lien-
male afficitur, & melancholicus humor quartanæ, & lien
affectu communis est. Hoc tamen intelligendum est de dy-
senteria, quæ intra breue tempus finitur: quæ enim lon-
gior est, lethalis esse consequitur, vt habeatur *Aph. 43. eus-
dem sectionis. Quæ lentius difficultas intestinum corrumpit-
ur, & superueniens longam dysenteriam aqua inter cutem
aut lentius intestinum excipit, & moritur.*

Hæmorrhagia & naribus febris quartanæ superueniens,
pessima est. Quia humor quartanæ efficiens nequit per
nares euacuari, propter crassitatem & frigiditatem. Et cum
talis euacuatio symptomatice sit, & dæ perleuat, hydro-
pem accersit: statim prohibenda est, aperta vena basilica, vbi
quæ sanguis putris emanat, cū è naribus purus excreatur.

Curatio quartanæ duplex intulenda est, ad duas illius
species referenda. Longe enim diuersa esse debent quæ spu-
riæ, ab ijs quæ legitime debentur remedia.

Atq; vt à quartana legitima incipiamus, ad illius causam
expugnandam statim animi conuertendus est, præsertim etiā
ipsa febre. Cum igitur illius causa sit humor frigidus & sic-
cus, crassus & terrestris, calefacientia, humectantia, & at-
tenuantia vituperanda sunt. Tum etiam opportunis temporibus
materia peccans erit euacuanda, quod tamen non nisi lon-
go tempore præstari potest: propter firmam humoris
contumaciam, & morbi longitudinem. Antequam verò ea
remedia in vsum vocentur, vitius ratio idonea præscriben-
da est. Vtatur igitur ager cibis boni succi, facili coctionis,
tenuis substantiæ, & modicis et calefacientibus atq; humec-
tantibus, vt caribus iuniorum animalium, & auium mō-
tanarum, ovis recentibus, & forbilibus, piscibus saxatilibus.
Concedatur in statu & declinatione pice salici, capræ
& oliuæ Gal. 1. ad Glau. etiam piper, & sinapi coniectum. Ex
herbis commendantur borrago, buglossum, pimpinella,
spinacia, radix iunculi, petroleum, ac præ cæteris rapum, quæ
in aqua prius coquenda, postmodum in iulculo pingui, quod
quartanariis utilissimum est. Crato in consilio à Schenckio
collectis, he multos quartanarios curasse Glauierum secundo
rapum decoctum, cum saccharo, & butyro permixto. Ex
fructibus poma, & pruna, cocta passulæ, ficus pingues,
amygdalæ, dactyli, nucleoli pinci. Ad denig. ad condendos
cibos conueniunt, cum mōmōm, aux mōchata, crocus.

Abstineat ab us alimentis, quæ crassa & tenacia sunt, ac
tardiores exitum habent, vt à carne porcina, bubala, ceru-
na, leporena, & auium palustrum. A leguminibus, brassica,
pane surruraco, caseo, nucibus, castaneis, & canibus mul-
to sale conditis, aut fumo induratis. A fructibus & oleribus
crudis, aceto, & omphaciorum aqua humorem melancholicum
fermentare creduntur, quemadmodum omnia acida.

Potus fit vinum album optimè dælectatum, aut rubel-
lum, tenue & oligophorum, cum aqua in qua cortices ta-

per quadratum in B. M. Postea coferuntur & exprimantur. Insuper addit extraſti aloes cum aqua endiuiz & acetole parati 2. i. myrrhe in vino ad ignem diffoluitur, & colat 3. i. falis tartari 3. i. Eaſuporentur omnia, & inſipiantur ad lentum ignem addendo ſub finem ſpeciem diather abbat. & leni. Gal. an. 3. i. falis abſinthij & tamaricis an. 3. i. fem. extraſti croci 3. i. fem. Fiat maſſa pilular. ad vſum dictum.

Purgans etiam medicamentum valde familiare, & paratu faciliſſime, ſed vtiliſſimum, componi poteſt ex decoſti abſinthij 3. i. in quib. ſentia 3. i. inſuſe fuerunt, ſumendo per intervalia.

Purgantia hæc medicamenta exhiberi ſolent pridie paroxyſmi, quia ægri tunc temporis robuſtiores ſunt. Non pauci tamen ante paroxyſmum ea exhibenda eſſe contendunt, quia per accenſionem agitata materia facilius ad expulſionem redditur. Hanc ſententiam ſuſcipit auctoritate Hipp. *lib. de affectionibus*, qui pharmacum decoſum purgans exhibendum eſſe vult in ipſa apprehenſione. Et quoniam ex Gal. ſententia, liber ille Hippocratis non ſit, ſed generi illius Polybi; non tamen idcirco fidem ei derogandam eſſe volumus, cum & Polybus ille var doctiſſimus fuerit, & experientia frequens huic ſententia ſubſcribat; propterea ab Arcelano, Genſili, Amato Luſitano aliſque propoſitur, qui horis quatuor ante accenſionem exhibendum eſſe medicamentum præceperunt. Quod tamen maxima cautione, & Medici prudentia opus habet, cum inchoatam euacuationem luperculines horror interceptat. & in accenſione fiat humorum morus, pharmacum motui contrarium, unde ingentes turbæ in ægrotantis corpore excitari poſſunt. Ideo non niſi in robuſtoribus corporibus hæc methodus tentanda eſt.

Maiores & communiores eſt Medicorum conſenſus in vomitorijs medicamentis inſcio paroxyſmi exhibendis, quia natura eo tempore ad eam euacuationem magis prona eſt. Neque dubium eſt, vomitum in principio paroxyſmi excitatum, & pluries cum paroxyſmi incipit, reſpectum maiorem, breuioremque morbumque eſſicere. Vomitorium materia in febris tertiana curatione expoſita eſt. In febre tamen quartana aliam reliquis præferendum eſt, ad 3. i. in puluer. redactam, & cum vino albo exhibitam, ac ter, aut quater repetitam.

Temporibus purgationum intermedijs clyſteres frequentes iniicendi ſunt, qui naturam ad intima humores noxios expellere aſſueſcunt, & æquid de materia morbiſca in venis melancolicis contenta lenim educant.

Perſiſtente morbo, cum plerumque daturus ſit & pertinax, interdum quieſcere oportet, & à remedij per menſem, aut circiter abſtinere, ut interea natura diuturno remediorum vſu fatigata, ſefe recolligat, & humoris morbiſci concoctioni incumbat. Poſtea vero ad præparantia & purgantia redeundum erit.

At vero in morbo diuturno iſdem perpetuò remediorum formis inſiſtendum non eſt, ne ſis natura aſſueſcat, ægri vero nimio eorum tedio afficiantur. Tum quia à minoribus ad validiora tunc pergantia, tum aperientia tranſeundum eſt. Variæ purgantium formale ſupra propoſitæ ſunt. Aperientia vero, præter iulepos & apoſtema prædicta, ſequentia in progreſſu morbi viſuari poterunt, concoctionis ſignis apparee incipientibus.

Æ. Vini albi 3. i. rad. enulae camp. Vnc. i. cortic. rad. caprar. 3. i. ſummar. abſinthij ſilvatici ſucci 3. i. Inſundatur per triduum in B. M. Seruentur omnia ſimul, & huius vini capiat æget 3. i. vel tres ſingulis diebus, manè horis duabus ante paſſum. Sequentes verò pilule, vel ſcorum, vel ſimul cum vino prædicto viſuari poterunt.

Æ. Rad. gentiane 3. i. an. riſſoloch. rotund. 3. i. g. artemiſie 3. i. bromidee ſiccæ 3. i. u. myrrhe & croci an. 3. i. rad. aſari 3. i. aloes 3. i. Cum oxymel. ſcilicet fiat maſſa pilular. de qua capiat 3. i. ſingulis diebus per ſer. vel paulò ante aſſumptionem vini prædicti.

Hinc pilulis chalybis præparatus vtiliter addetur, ſi æget poſt eorum aſſumptionem deambulare valeat. Chalybis enim vſus in omnibus febribus chronicis vtiliſſimus eſt, obſtructiones conſumates, que illas fouere ſolent, potenter diſſoluendo.

Vel ad aperiendum ſimul & roborandum opiati ſequens vtiliter præſcribi poterit.

Æ. Conferuntur rad. enulae camp. conferunt, fol. abſinthij, & capul. ven. an. 3. i. cortic. citri condit. 3. i. conſect. alatern. 3. i. i. myrobol. condit. n. u. i. pulu. elect. diather abbat. 3. i. ſalis abſinthij & tamaricis an. 3. i. croci 3. i. Cum ſtyropo condit. citri, fiat opiata, de qua capiat ad magnam caliditatem ſingulis diebus manè, duabus horis ante prandium. Vel ſi manè æget ſumat alia remedia, poterit capere opiata duabus horis ante cenam.

Ad idem commendatur, tanquam remedium præſtantiſſimum, extraſtum chamedrys, cum ſale tamarici permixtum, in formam pilularum.

His accedunt diſcutientia & diaphoretica, quæ in declinatione morbi, ad illius reliquias diſcutiendas, apparentibus concoctionis ſignis, vtiliſſima ſunt. Non ſolum enim dictas morbi reliquias diſcutiunt; ſed etiam intemperiem longo morbo contractam corrigunt, habitum corporis malum emendant, ac ventriculū hepatisque viſcera, diuturnitate morbi debilitata, corroborant. Ex his primum locum obtinet theriaca, ab antiquis & neotericis ad vſum commendata. Exhibetur hora vna ante paroxyſmum 3. i. pondere, cum vino aut decoſto chamedrys. Vel ſi nimia caliditas timeatur, cum decoſto agrim. ſucco, vel aqua plantag. Reiterandum eſt medicamentum per plures paroxyſmos. Poteſt etiā exhiberi manè extra paroxyſmum per aliquot dies: Sed paulò ante paroxyſmum ſciſciopus operatur, quia augmentum frigoris prohibet humoremque febris cauſam, tam efferueſcere incipientem, commodius diſcutit, & hoc morbo paroxyſmū vel imminuit, vel ſi materia paucior ſit, proſuſ tollit. Hic tamen ſumma cautio adhibenda eſt, ne theriaca, vel ſimilia medicamenta calidiora, cruditatis temporibus exhibeantur, ſumunt enim humores putridos unde conſuſo & febris incrementum; ita ut quatuor ſimplices in duplicem & triplicem modò verò continuè aliquando degeneret. Quemadmodum contigit Eudemo Peripatetico vt reſert Gal. *lib. de prægn. ad Poth. c. 2. & 3.* In quo quartana ſimplici, exhibita à Romanis Medicis intemperilius theriaca, in triplicem verſa eſt. Poſſimum tamen, apparentibus concoctionis ſignis, exhibita eadem theriaca à Galeno curatus eſt.

Ex alijs diaphoreticis, commendantur à nonnullis radices chinæ, ſalis parillæ, quarum decoctum primarium, & ſecundarium per 10. dies exhibitum, conſumates quartanas interdum curat. Efficacius autem operatur, ſi decocto primario purgantia niſceantur.

Alia etiam remedia ante paroxyſmum exhibentur que huic febrī creduntur ſpecifica, & verius declinationem, viſurpata ſepiſſime paroxyſmos inhibent, & quarta nam curant. Horum autem præcipua hæc ſunt.

Æ. Fol. plantag. recentij M. acetofe recentis M. 3. acet. & theriaca, an. quart. i. Deſtillentur, & huius aque capiat æget 3. i. diſimidia hora ante paroxyſmum. Vel

Æ. Sacchari candi 3. i. i. zinzib. 3. i. campore 3. i. Fiat puluis. Detur 3. i. cum aqua calida.

Crocus in puluerem redactus ad 3. i. cum vino albo exhibitus ante accenſionem, eam valde imminuit.

Semen ruæ ſylueſtris ante paroxyſmum exhibitum cum vino albo, curat.

Heumias aſterit, ſequentiſ. trochiliſca, vnica exhibitione, & hyemas tēpore, multos fuiſſe liberatos à febre quartana.

Æ. Seminis rutæ petrolei. myrrhe & theriac recentis, an. 3. i. opij 3. i. Fiat trochiliſca parui. Dabis vnum cum aqua ante paroxyſmum. Narcotica equidem ex miam vim habent ad cohibendum paroxyſmū. Sed niſi maior humoris morbiſci portio antea euacuata ſit, & obſtructiones plurius imminuat, noxam inferre poſſunt; cum humores vicioſos in corpore retineant, & obſtructiones, aliſque morbos grauiores generent. Attamen in exigua quantitate exhibitæ, ad aperitibus, incidentibusque permixta, vt in ſilice trochiliſca minus nocere poſſunt.

Ad cohibendum etiam paroxyſmum, hora vna ante illius inſuaſionem purgantia leuiora vtiliter exhibentur, que ſollicitando naturam potius, quam purgando, humores reuellunt, ea nomine talia præſcribi poſſunt.

Æ. Senæ mundat. poly pod. quæ thyſiſepichymian. 3. i. flor. borrag. P. 4. Fiat decoctio ad 3. i. Capiat hora ante paroxyſmum. Vel

Ddd 3

Æ. Senæ

℞ Sennæ mundat. ʒ.iii. turbitib. ʒ.i. cinamom. ʒ.ʒ. croci & xinzib. an. ʒ.ʒ. sacchari. ad pondus omnium. Fiat pulvis, dividendus in tres partes. Capiat unam ante paroxysmum, cum vino albo.

Quercetanus in Pharmacopoea maxime laudat pilulas de lagapeno Camulii, quarum vnum tantum exhibet in toto paroxysmo, continuando aut aliquot dies; & paulo post mungendo spem in dorsi incrementum compositio est theriaca quae vngui oleo laurino, vel picea. Tunc duabus aut tribus horis post pilulam de cocco canentem, exhibendo iuleculum, & cum res aperuerint, & corrugae, buglossio, thymo, & totum caputculum paratum.

Dicta autem sunt inunctiones ad rigorem leniendum vitiliginis lunt, & frequenter virescens, et amfi piliat: cum habuerint. Sunt enim in eorum virescens ad rigore & vehemens, et importunus est. Fuitque huiusmodi inunctiones non loqui et praedicti. Sed etiam alii quamplurimi sunt, camentis et oleo anethoni, chamemel, irmo, cedro, caraceo, de piperebus, aliisque calidioribus, cum aqua vitae, et oleo cytophyli, caliore, sinapi, pipere, aliisque permixtis. Aliis autem operantur huiusmodi inunctiones vna ante paroxysmum ipsius ad ignem, iunguntur, et ad ignem in lectum calidum deferantur, et lateres calentes vno perfusa odorantur, ac linteis involunt, plantis pedum, vbique inunguntur, et operantur.

Dum prædicare media viſpantibus hinc cura ſpecialis habenda eſt, quoniam ea pars in hoc ſtatu perpetuo afficiat. Locumque duo continentis poſſunt ſomenta, linimenta, & emplaſta, quæ ad hinc obſtructantes vulgo præſcribi ſolent.

linò vero interdum balneum aquæ tepidæ post plures coactiones aptissime conducit, non solum ad liemum, euasitandum; sed etiam ad totum corpus humectandum, & excoctionem mæretæ mortificæ adiuvandam. Debeo intermedium his vlturpi potera, cauendo tamen diligenter, ut tepidum laueni administretur. Si enim calidius fuerit, periculum est, ne isti humores in varias partes præcipitentur, & periculosius ab eis illis producantur.

Denique non omnino negligenda sunt, quae carpis ad-
monere solent, cum etiam non infima notae auctores illis
aliquid tribuant. Ronsardus enim loquenti remedio ma-
gno cum successu se viam esse asserit.

cal. Folior. lacin. b. l. pedis. c. olambini. ruta. an. M. f. cal. the. p. portem. M. l. lalis. v. parum. Omnia li. quial. ruta. carpis. adque. aut. ante. accifionem. Crato. ra. dices. vitica. conifus. & cum. aceto. macerat. as brachiorum. & pedum. ariter. applicat. Et. refert. Sennerius. quem. querendum. cum. roto. au.umno. & hyeme. quid. laborat. fect. tandem. que. acutiffimis. in. finiftra. fcapa. a. dolores. per. fentient. mulieres. cuiusdam. perfuafu. ramunculum. carpo. applicat. & poffula. excitata. a. febre. & dolore. liberatum. tuliffe.

Spuria quartana iisdem fere remediis curari debet, quae pro tertiana curatione huc propofita; addendo m decoctis iuleporum & apocimurum, ea quae hamorem at; abilarum peculiariter respiciunt. His etiam accedere poterunt omnia remedia niagis temperata & minus calefacientia, quae pro quartana legitima hactenus fere propofita.

Conuenient itaque in principio borrago, bugloflum, fumaria, lupuli acetola, cichorium, cetetac, leoliopendria, agrum ponit redolentia. Quorum decocta, aquæ inllaritate, & interdum fucci de purati in iulep, apozematis, aut fyrupi magiftralis forma præfcribi poterunt.

In proctellu vero praedictis addere licebit cortices radicem caparrum, mediam, tanarici, euclai, campanam, polypod, abfinchum.

Dum vitulus aeger hīcē preparantibus, purgantia frequenter intermiscenda sunt, eaque vīsurpanda pridie accensionis, & bis in septimanā iteranda. Ad hunc finem variæ formulæ componi poterunt. Sed pro delicatioribus palatā laxans, syrupus de pomis Sapor. len. compof. aut mīsculū pulv. borraginē, oegoglio, & pūmpinella alteratum, cum iule 3. uel Vnc 6. vitulus vīsurpanda poterunt.

Venz lectio non omittatur in principio, & languinis copia detrahatur, quæ languinis quantitati & qualitati, &

zgotantis etati ac temperiei conuenire videbuntur,
si morbus in longitudinem abeat, vii languinis feruat fe
remittit, vomitoria vtiliter vsurpat poterunt in ijs præci-
piuntur qui nauicam & vomitum in accessionum mitius pa-
tiuntur. Inter vomitoria iebri quartana proficua, alarum
(vt supra dictum est) principem locum obtinet, in vino
albo ad ʒi. exhibitur, & puerbis vicibus repetitur, si
vna aut altera exhibitione morbus diffusus non fuerit.

His accident locus & limentia, pochochondris adhibita ad prauam vicerum diathefin corrigendam, (quæ nouam continuò accessibilibus mareniam supeditat) humorque valde impactum emollicendum & attenuandum; quæ tu hunc modum præscribere poterunt.

q. Rad.altheae, lilior. enulae camp. cortic. rad. cappar. Se
mediant tamaricis. an. 3. fol. malui, altheae. parietari. bor-
rag. buglofil. pimpinellae, albinthui. an. M. sem. lini. et
pettioel. an. 3. R. lior. chamom. meliloti. anethi. uana P. I. Fiat de-
coctio in tribus partibus aquae, et vna vini alba sub finem
additi qua foveantur hypochondria bis in die, 30 pafu.

g. Vnguenti de alihza j 4, olei lithor. chamam. rofacei & abfinrhaz, an. j. lem. Fiat linimentum applicandum post lotum.

¶ Vt olea folia vtiliter apponuntur cum lina succida .
Ac denique balneum aquae tepide, vel folius, vel in qua
amygdalis & temperata liquatur, vel ex hordeo &
amygdalis, vel compositis folijs fieri, ad hauc affectum expu-
gnandum cum certis conuenientissimis. Siquidem vicerum in-
temperantiam corrigat, atque bilis siccitatem ac feruorem
emendat, dura erigunt, vasa relaxat & lasat, & crudos hu-
mores concoquit. Quapropter frequens illius vsum erit con-
uenientissimus, adhibitis cautionibus, quae supra enume-
ratae sunt.

Illius autem operatione maxime iuuabitur, si in ingref-
fu balnei præparantia medicamenta, & obstructions rele-
uantia exhibentur. Inter quæ primas obtinet decoctum
abfinthij, & enulæ campanæ, quod omnibus humoribus con-
tumacissimis preparandis accommodatissimum est, modo
nisi viscerum feruor non contra indicet. Quo in casu
aliorum fura conuenientiora, ad mutationem & repatriationem

Dum verò hæc frunt, leues pergasiones inæquenter ite-
rande sunt, vt supra mōximus. Et in vera declinatione,
concoctionis signis appareantibus, etiam specifica in qua-
tana leuissima deficiant in vltim vocari poterunt.

In toto autem morbi decursu thoraci prospiciendum est, ne ager in tabem præcipitetur, humor enim peccans vim erodiendi habet.

CAPVT VL

*De febribus compositis, seu complicatis, & speciatim de
hemiptericis.*

GALIENA de crifit. 177. Et 9 lib. 2. de diff. febr. 7. Et Afc. fen 1. lib. 4. tract. 4. cap. 16. multas proponunt febrium compofitiones. Quatenus falicet vel complicantur putride cum non putridis ; vt dum hedice putrida complicatur ; vel putrida cum putridis ; idque pluribus modis. Nempe vel continuu cum continuis ; vel intermitentes cum intermittentibus ; vel intermittentes cum continuis.

Continuarum duarum compositio apud Auctores controuertitur, & in praxeos uia uix animaduertitur.

Intermittens complicatus cum altera intermittente, vel eisdem generis, vel duobus. Eisdem generis intermittentes complicatae sunt tertiana duplex, aut triplex; item quartana duplex, aut triplex, quae suis locis fuerunt expolizae. Diversi generis sunt, quando tertiana cum quotidiana, aut quartana complicatur; quod etiam rarissime in usu practico obstruere solet.

Intermittentes cum continuis duobus modis compli-
cantur nempe tertiana intermittens cum quotidiana conti-
nua; vel quotidiana intermittens cum tertiana continua.
Et utraque hemitritæus nominatur, quæ in duas species
predictas diuiditur.

Illa tamen verè & propriè hemitritæus est, quæ fit ex tertiana intermittente & quotidiana continuata; quæ fit ex flava bile extra, & pinguia intra vasa putrescente. Ab Hipp. & Gal.

& Galen. in 1. Epid. horrida nominatur, quia non solum horrorem facit initio accessibus; sed etiam toto morbi decursu; & precipue in principio & augmento; & conturbat in vnum duobus accessibus, febris tertiana scilicet & quotidiana, cum multis reduplicacionibus; quæ nihil aliud sunt, quam motus horridi inæquales, in eadem accessione etis intervalis recurrentes. ob mutuam pugnam duarum febrium in qua si pituita superauerit, sequentur horrores, extremorumque perfrigerationes. Deinde vero vincente bile, corpus calêre, & febris ad vigorem tendere videtur, cum rursus redeunte ad pituitam victoria, denovo refrigeretur, horreantque & pugna hæc durare conuenit, donec febris ad vigorem peruenierit. Hinc fit, vt alterius diebus tantum isti rigores appareant, dum scilicet paroxysmus tertianæ iriget, & cum quotidiana coniungitur.

Dum vero quotidiana sola iriget, nullus solet fieri horro. Nocendum tamen est, qualem reperiri febres malignas, quæ sine commixtione tertianæ & quotidianæ, sine vilo concursu bilis & pituitæ horridæ sunt, in quibus horrores contingunt ex vaporibus acerbis & malignis, qui ex materia corrupta febrium malignarum eleuantur, & partes sensibiles irigunt ac vellicant.

Hæc autem semitertiana propriè dicta, vel exquisita est, in qua æqualis bilis & pituitæ pretercentas copia redundat, quæ tam descripta est, vel nota, quæ rursus duplex est. Vel enim bilem habet exsuperantem, vel pituitam. In ista maiora sunt tertianæ symptomata: in hæc quotidiana. Angustia bilis eruperat, horridior in tota febris, & aliquando rigorem bilis associatum feruidior fit huiusmodi febris. & aliqui bilis per vomitum, aliorum, aut sudores exierunt. Pituita vero præualeat, frigus vehemens in artibus, societate partes, & pauci adhibet horrores; & quædam thigæ, & diutius conuulsiuntur, & diutiusque accensio, & quædam, & longum post tempus consistit; non tamen aut situm, aut magnam affert incendium.

Dignoscitur ista febris ex ijs quæ dicta sunt quod continua & horrida sit, cum multis reduplicacionibus, maximeque symptomatibus quod accessio diebus imparibus inuadat cum horrore; paribus vero cum aliquo tantum frigore extremorum. Pulsus in ea frequens & inæqualis. Urinæ crudæ, tenues & decoloræ, interdum turbide sunt, cum nullo, aut malo sedimento. Differenciæ vero dignoscuntur ex ijs, quæ propolita sunt, æqualem vel inæqualem bilis & pituitæ quantitatem indicantibus.

Quod ad prognosim attinet, periculosa est ista febris, & in ea ventriculus, parsque neruosa plurimum afficitur. Et consecrari habet lingue ficci, æstus, tumida, animi deflectionem, vigiliam, & interdum delirium ac soporem. Inter acutos morbos, ratione bilis, & inter chronicos, ratione pituitæ, ab Hippoc. numeratur in 1. Epid. Et dicit Auic. ad memem vsque septimum interdum progreditur, necnon in morbos chronicos ac febrem hecticam interdum definere.

Curatio huius febris ex ijs defumenda est, quæ ad tertianam & quotidianam expugnandam necessaria sunt: Et cum continua sit, ea methodo erit tractanda, quæ ad omnes continuas putridas, cap. 1. huius festimus, propolumus. Ita vt bile magis dominante, ea quæ bilem respiciunt, magis virescant. Pituita vero præualeat, eam præparantia & purgantia magis prescribantur. Ac denique utroque humore æqualiter redundante, utraque remedia pari propotione miscantur.

SECTIO III.

De Febribus pestilentibus.

PRÆFATIO.

Autores sere omnes qui de febribus scripserunt, febrem pestilentem à maligna distinguunt, ac de singulis eorum diuersimodè tractant capitibus: ut febris pestilens nomine verum pestem intelligant, malignam vero eam, quæ vulgò purpurata nominatur, aut quæ licet epidemica sit & contagiosa, minus periculosa est, ex eaque

plures seruantur, quam intereant: cùm verè pestis officio in eo consistat, vt ex ea plures intereant, quam seruentur. Attamen cum huiusmodi febres inter se differant tantum secundum magis & minus, seu maiorem & minorem malignitatis gradum, & eadem methodo curantur, ea eademque materia medica oppugnari debeant: conducibilis nobis visum est, omnes illas febres in eodem capite includere, & generali febris pestilentis nomine donare. Atque ita sectio hæc postrema duobus ablinetur capitibus, quorum primum erit de febre pestilenti; alterum vero de variolis & morbilis. Cum enim ijs febres maligna perpetuo adiuncta sit, merito in hac parte ab omnibus Aut oribus tractari solent.

CAPVT PRIMVM.

De febre pestilenti.

Febres pestilens ea dicitur, quæ non intemperie sola aut putrida tantum calore, sed etiam maligna & venenata, qualitate infecta est. Hæc, vix plurimum, popularis & epidemica esse conuenit, vt eodem tempore quamplurimos homines ea correptos videre liceat. Aliquando tamen sporadica est, ex prauis humoribus & venenata qualitate, adeptis, oriunda.

Contagiosa enim est, ita vt non solum ex causa communis, nempe aut alimentorum vitio, sed etiam ægrotantium consortio, contrahi valeat.

Febres maligna etiam vulgò nominatur, cum plurimi tamen morbi maligni & cacocætes nominentur, ob prauam & leuam symptomata, in quibus venenata qualitas nulla reperitur, in qua sola pestilens morbi essentia consistit.

In quacunque igitur febre venenata illa qualitas reperitur, seu diaria sit, seu hectica, seu putrida, pestilens iure merito dicenda est. Quamvis diaria & hectica valde controuertantur, de quo videantur Auctores.

Illa autem venenata qualitas ex humorum corruptione oritur, quæ non in simplici temperamenti immutatione, aut vulgari putredine consistit, qualis in febribus putridis reperitur, sed in totius naturæ, & insitæque substantiæ destructione. Quæmadmodum vinum dum in acetum, conuertitur, omni modum corruptionem patitur dum vero in vaporem commutatur, simpliciter putrefcere censetur.

Difert autem febris pestilens à peste, tanquam species à genere, quia pestis dari potest sine febre, vt docuit Hippoc. & Epidem. multis in locis; tamen etiam Galen. expositione eiusdem libri, & lib. 6. de med. facultatibus, cap. de terra Samis. Quapropter ratio suffragatur, cum venenata qualitas non habeat necessario sibi adiunctam putredinem, à qua febris exoritur. Potest enim venenata illa qualitas produci in humoribus per integram substantię eorum corruptionem, & de noue forme introductionem, a qua dependet illa maligna qualitas. At certum est, quoties noua forma introduitur, priorem corruptam, ac ealiquæ mutationes esse necessarias alterationes præuias, non autem putredinem, ideoque humores talem corruptionem pati posse citra putredinem. Quia tamen humores corporis nostri putredini maxime obnoxij sunt, atque tantam corruptionem pati possunt, quin putredo etiam interueniat. Quapropter rariore sunt illæ pestes, quæ febrem non habent comitem. Imo vero per intensam, profundam, ac fœdissimam (vt vocant) putredinem, talis corruptio plerumque faciliatior solet. Ita multæ febres, quæ a principio non sunt pestilentes; si Medici ignorantia aut negligentiâ, vel ægrotantium inobedientiâ, vel curarum externarum leuitia malè tractentur, intensiori fœdâ putredine, in malignas & pestilentes desinunt. Quod vero sapere corruptio putredinem præcedat, colligitur ex ijs qui per contagium peste afficiuntur: in quibus maligna & venenata qualitas prius communicatur, eaque corrumpuntur humores: hæque postmodum corruptionem patiendo subleuantur. Vnde fit, vt peste affecti prius interdum diebus febrem careant, quæ deinde apparere incipit, cum putredo accenditur. Simile quippiam apparet in parte gangræna affecta, quæ prius corrum, iur, postea vero putrefcit.

Fit

Fit igitur febris pestilens, quando humores corrupti & venenati qualitate adempti ad putredinem deveniunt. Et sic illa duplici modo cor afficit, nempe calore putrido, & maligna qualitate.

Hac autem humorum corruptio non semper est vniuersalis, sed aliquando magis, aliquando minus intensa est; & pro variis illius gradibus, venenata qualitas ex ea producta magis vel minus perniciosa est. Vnde febris malignitas maior vel minor exoriri solet. Hincque exorta est vulgaris distinctio februm pestilentium apud Medicos, in pestilentem simpliciter vel proprie dictam, & malignam; pestilentem vocantes proprie dictam qua vera pestis est, quae peculiarem hunc habet characterem, ut ex ea plures intereant, quam seruentur, malignam vero simpliciter appellantes eam, quae minus perniciosa cum sit, ex ea plures seruantur, quam intereant.

Febris pestilens differentiae desumuntur, vel à materia, in qua venenata illa qualitas producitur; vel à loco, in quo eadem materia continetur. Et ita sequuntur februm putredinem differentias, quae ratione materiae putrescentis diuiduntur in synochos, tertianas, quartanas, & quotidianas; propterea materia putrescens est languis, bilis, melancholia, vel pituita. Ratione vero loci, in quo humores putrescentes continentur, in continuas & intermitteutes diuiduntur; propterea dicti humores, in venis, vel extra venas flabulantur. Itae febres pestilentes, aliae dicuntur synochi, aliae tertianae, quartanae, vel quotidianae, aliae continuae, vel intermitteutes. Quomodo dixerit Hipp. *lib. 43, sect. 4*, febres intermitteutes periculo carere, quomodo eorumque intermittere: quod tantum intelligendum est de ijs, quae nullius sunt malignitatis participes. Videremus enim singulis ferè annis, in hac saltem regione febres tertianas intermittere, quae summe malignitatis sunt participes, tertia, vel quarta accessione agros de medio tollere, quae eos in grauissimum vitæ ducuntur coniungunt maxima symptomatum leuitas.

Aliae sunt autem febris pestilens differentiae ab intento, & remisso, propterea scilicet aliae sunt maiores, aliae minores, vel minores malignitatis participes. Maiores, vel minores sunt, plures dicuntur, propterea maiores, vel minores est putredo, cum calor praeter naturam ex ea emergens, intensior aut remissior est. Maligniores vero aut benigniores, pro maiore, aut minore qualitate venenatae intentione. Hinc fit ut aliquando febris pestilens habeat summam putredinem, & malignam qualitatem in summo positam, cumque leuissima esse consuevit, in eaque ratione malignae qualitatis, facultas vitalis maxime affligitur: ratione vero homine putredinis caeterae quoque laeduntur facultates, & itaque subleuantur symptomata. Aliquando vero in hac febre putredo est summa, & maligna qualitas remissa; tumque febris molesta est ratione putredinis, vitalis autem facultas minus affligitur. Contra aliquando putredo remissa est, prauius autem qualitas intensa: tumque febris ratione putredinis non ita praua, propter symptomata, & remissior apparere vires tamen magis labi solet. Quandoque enim ita remissa est putredo, ut tere nulla sit, maligna vero qualitas admodum intensior sit: ita ut, quae nec aegro, nec astantibus videtur molesta; sed motus omnino primo aspectu videtur, cum tamen et vix illa admodum sit. Adhaec enim maligna qualitate vires deiciuntur, corque omnino oboritur. Haecque non solum agros & astantibus, sed etiam ipsi interdum Medicis imponit, cum nullo nec crudelitatis, nec prauius, humorum signo praesente, pulsus etiam in statu ferè naturali consistit, & corporis calore ad tactum, prae in fronte, miti ac b'ando apparente, & ad intus ducatur. Simile quippiam in prima etiam differentia foret contingere, cum scilicet summa malignitas coexistat est. Eiusdem enim opportuni remedijs putredine, ac signis futuræ salutis apparentibus: mors tamen interdum non corredda maligna qualitate sublequitur.

Ac denique differentiae febris pestilens desumuntur ab adiunctis, eaque plurimum sunt & euidentissimae. Nullum enim est prauum symptomata, nec vilius morborum exitium genus, quod cum hac febre interdum non coniungatur. Symptomata sunt, dolor in capite, vigilae, delirio, sopores, inuiculae, & vomitus, appetitus deiectio, syncope, virium languor, singultus, inquietudines, alii fluxus, sudores,

& similia, quae alijs etiam febrium generibus sunt communia.

At vnicuique datur symptoma, febris pestilenti proprium, & peculiare, quod in reliquis febribus non contingit, maculae nimirum purpureae in toto corpore, & praecipue lumbis pectore, & dorso apparentes, moribus publicum plerumque similes, quae petiulae, seu petechiae ab Italjs vulgo nominantur, & febres hoc comitate, propterea, purpuratae, seu petechiales appellantur. Neque enim in omnibus febribus pestilentibus apparent huiusmodi maculae purpureae: sed quodam apparent, febris pestilens indicium praebent certissimum. Purpureas autem maculas nominamus, quia vt plurimum colore purpureo infectae sunt. Non raro tamen violaceae, virides, laeuae, aut nigrae apparent, & tunc longè detestiores sunt, maioremque malignitatem significant. Licet autem vtriusque huiusmodi maculae pulicum moribus similes sint, maiores tamen aliquando sele produnt, ut rescent vires, seu liquores flagellis inductos, tumque deteriores sunt. Aliquando vero am plissimae sunt, & partes in regras magnaque corporis partem: brachia nimirum, crura, vel dorsum occupant, tumque partes rubore infectae apparent: qui intra paucas horas laepe euanescent, atque iterum reuertuntur, quasi per paroxysmos, cum febris suas patitur exacerbationes in quibus languis ebulliens, ad superficiem corporis exhalationibus tenuioribus emittit: à quibus nulla fit cutis eleuatio, sed ea tantum rubro colore inficitur. Non raro tamen ex huiusmodi ebullitionibus cutis in varijs partibus eleuatur cum rubore quodam: & tumores quosdam in cute efficit molles & latos, qui intra paucas horas euanescent, & vulgo ebullitiones sanguinis nominantur. In his atque praedictis est semper aliqua malignitas, sed ita leuis, ut nullum minetur periculum, nisi morbi progressu intransierit euadat. Differunt autem maculae praedictae, pulicum moribus similes, ab exanthematibus, quae etiam in huiusmodi febribus interdum apparere solent, eaque annotauit Hippo. *Epidem. 2*, habentque eminentiam, & sunt de genere tumorum, qui ad suppuracionem, vel exulceracionem, quandoque deueniunt. Maculae autem purpureae nullae (vt dictum est) habent eminentiam, & antiquis incognitae, posterioribus tantum facilius à recentioribus describitur sunt.

Quod ad morbos attinet, qui cum febre pestilenti coniunguntur, idem quod de symptomatibus dictum est, affirmare licet, plerumque nempe morbos cutiales cum his febribus coniungunt, nempe phrenitides, anginas, pleuritides, peripneumonias, hepatis inflammationes, dysenterias, alioque quamplurimos. Sed praecipui morbi, qui in febre pestilenti reperiuntur, duo sunt, nempe bubo pestilens & carbunculus, qui intensissimam esse iudicant venenatam qualitatem, & non nisi in vera pelle reperiuntur, eaque vt plurimum conuati solent, ita vt ipsius petis nomine apud vulgus indigitari solent.

Causae febrium pestilentium aliae sunt internae, aliae externae, internae autem immediatae, aliae mediate.

Immediata huius morbi causa (vt ante monuimus) est corruptio humorum cum putredine coniuncta. Ex corruptione prauam & venenatam acquirunt qualitatem, ex putredine vero febris generatur.

Causae vero mediatæ sunt plethora, cacochymia, & obstructions. Plethoram autem non ad vala, sed ad vires intelligimus, quae cum non ita à natura regatur, facile corruptionem & putredinem concipit. Cacochymia vero seu prauorum humorum copia, facile corrumpitur atque putrescit. Obstructiones denique omnia febrium genera producere aptae sunt: quarecque humores in loco calido & humido conditi, si non libere transierint, facili putrescunt. Causae internae mediatæ ab Auctoribus vulgo morbosus apparatus nominati solent: & tanta est illius efficacia, vt folius interdum febre pestilentem remittunt, quae maligna simpliciter, aut purpurata vulgo nominatur, producere valet, à quae causae externae & communis interuentu. Videmus enim saepe in consuetudine nimis epidemica, & nullo morbo populariter grauitate, quodam ex praua humore in consuetudine febribus huius corpore, quae multis malignitatem febrium symptomatis, etiam maculis purpuratis patet, sunt.

Circa

ra admodum calida & hœrida, ex quibus insignes putredines solent exoriri: conijciendum est à maligno quodam syderum influxu morbos illos pestilentes originem traxisse. Adde quod pestes in media hyeme sæpius solent, quas nulla in primis qualitatibus insignis alteratio præcessit. Tunc enim occultis syderum viribus humilimodis morbi assignandi sunt, cum illæc Astrologorum sententia vim habeat corrumpendi aerem, non laxa in eo insigni aliquâ mutatione secundum primas qualitates. Et illud est diuinum in morbis, quod agnouit Hippocrates. & Galeno interpretare in acre quidem effluat à colico & minus manifestis causis produciatur. Tum etiam ab eodem Hippocrate 2. *Epist.* 1. quando dicit, *morbum & tempus sibi inuicem correspondere, nisi quod in superiors natura interuenit.*

Neque oblitus, quod ex Platonis sententia in *Epinomide* adducitur, nempe coelum & syderum concursus semper bonum in hæc inferiora influere, ab ijsque non nisi conseruationem ac beneficium inferri. Et Arist. 9. *Metaph.* iudicium his quæ sempiterna æque æthera sunt, neque malum neque errorem adeo corruptionem inueniri. Aucthoris verò 1. *C. 2. 24. Corpora* inquit, *caelestia continent elementa, conseruant ipsa, & vniuersaliter sunt eis quasi forma.* Vnde colligitur, non posse eadem veneno & maligna qualitate afficere. Adde quod, si aliorum influxu morbi pestilentes exarcentur, illi eodem tempore mundum penè vniuersum afficerent, cum illi influxus causæ vniuersales sint, & celorum circumpactione omnes mundi plagas afficiant. At humilimodis morbi aliquam tantum regionem peculiariter inuadunt. Ac denique si falsa diceretur malicia, Deus quæ creaturæ autem malicijs dici possent, quod est impetare pincissimum.

Hæc, inquam, propozite veritati nihil offiunt, ijsque in hunc modum laus fieri potest. Omnes substantiæ creatæ duobus modis considerantur: vel quatenus euntia sunt, & ad complementum vniuersi & perfectionem concurrentia, & tunc omnia bona sunt; ens enim & bonum reciprocantur, nihilque à Deo opt. max. omnium bonorum autem creatum est, quod malum simpliciter dici debeat. Vel considerantur ratione operationum, & tunc possunt dici male, quatenus alteri creaturæ damnum inferunt, ex insita antipathia, & inimicitia. Quamuis autem humilimodis antipathia penè innumera in mundo reperiatur, non desunt tamen omnes dici bonæ, ratione sui auctoris, nimium Dei & ratione vniuersi, cuius perfectio in varietate, potissimum consistit. Præterea rerum creatarum operationes duobus modis male dici possunt: absolute & simpliciter, vel secundum quid: Absolute male dicuntur, quando, omni tempore, in omni loco, & occasione perpetuò malum efficiunt. Et nulla potest reperiri creaturæ, quæ in hoc sensu mala sit. Secundum quid male dicuntur, quando vni nocent, & alteri posunt. Et sic nihil adeo noxum reperitur in rerum natura, quin ex alia parte suos etiam habeat vius, quorum gratia creatum est. Sic omnia venena, quamuis homini, aut alijs animalibus vniuersissimè, tamen conuenienter vti possunt, multa bonæ & comoda videri asserit solent. Et in re medica nulli rebus reperitur adeo lethale venenò quæ ex eo artus perniciosa, salutaria medicamentis eliciantur.

Ac denique aliorum adiones in hæc inferiora duobus modis considerantur, vel respectu totius mundi lublunaris, elementa omniaque mixta continentis: & tunc coniorum ac syderum adio simpliciter beneficia est, generans, conseruans viuificans, omniaque alia beneficia præstans, quæ ad conseruationem vniuersi necessaria sunt. Et in hoc sensu verissimum est, hæc inferiora à cælis, syderumque influxu locuti ac conseruari. Vel considerantur respectu peculiaris nature, ac conditionis huius, vel illius elementi, huius vel illius vniuersi. Et tunc nullum est inconueniens dicere, ari quoddam influxus alicui elemento, vel vniuenti, hoc est illo modo, secundum aliquam sui partem affectis, & noxijs atque perniciosos quod quidem ex ipsorum aliorum auxilio minime dependet (sunt enim periculisissima cuiusdam nature) sed potius ex rerum his lublunarum imperfectione, quæ insignem mutationem sine propæ lubluntæ coeptione pati minime possunt. Vix autem ille aliorum nature, & nature, quæcunque, ex ratio eorum concursu in hi-

isce inferioribus productæ, à summo rerum opifice constitutæ sunt ad conseruationem vniuersi, quod tam variis, & tam inuicem repugnantibus naturis conflatum, tantæ etiam in aliorum influxibus diuersitate indiget, vt omnia in quodam velut æquilibrio conseruet. Ex qua tamen influxuum diuersitate vix fieri potest, quin aliqua rerum adeo inter se difficiatur particula interdum patiatur, non in tota aliqua specie (quod tenderet ad destructionem vniuersi) sed tantum in aliquibus indiuidijs, minime resistentia præditis & vt plurimum male affectis, & in aliqua tantum aeris parte, maligni influxus receptioni magis disposita. Vnde concludendum est, ea vitia præcipue dependere ex defectu rerum inferiorum. Siquidem multa loca videre est adeo perfectæ æris conditione, & æquali hominum temperie donata, vt quantum maligni aliorum in concursus influant, nunquam tamen pestifera lætentur.

Ad idem causarum genus referri solent luminarum defectus, & eclipses, in solis meteoza, & præsertim cometæ qui nunquam apparere solent quin morbic epidemici ac pestilentes, variæque in mundo mutationes sublequantur, propt. multarum lublunarum experimentis confirmatum est. Vnde ille peruulgatus Claudij vericulus.

In celo vniquam / pestilens impati cometa.

Cuius rei telus luculentissimus hic cometa ille erinitus, qui anno 1618. versus Orientem apparuit die 27. mens. Nou. & deinceps toto ferè mense. Dec. conspexit est mobilis, & fulgidus. Illius pars densior, & solidior soli obscurus ortusque tuebatur, & tum clari splendore, tum magnitudine in æthum compacta, & conglobata Venerem longe superabat. Reliqua eius pars tenuior, minus à sole illustrata propt. reuoluentem suam, in barba proreæ modum diffusa procedebat, & versus occalum porrigebatur. Primum apparuit hic cometa lub Libæ circa Aequatorem; sed primario & peculiari motu inde ferebatur ad septentrionem per pedes Virginis, per medium Bootem, & caudam Viræ maioris. Ac tandem paulatim decrecente lumine, dissipata materia disparuit inter Viram maiorem, & Draconem. Motu communem syderum ferebatur ab ortu ad occalum, sed paulo velocius stellis motum videbatur. Nam primis apparitionis sue diebus orti solebat paulo ante horam, quantam matutina, postea vero hora quarta, & ante quartam orbabatur, atque ita deinceps donec mediam noctem, & concubitu ortu suo antecederet. Hanc vero cometæ morborum malignorum, & pestilentium, nec non etiam bellorum, quibus vniuersa penè Europa hæctenus decalata est, prælagum ac prænuntium fuisse, & credere non alienum est.

Quamuis autem æter in causas mediatas febrium pestilentium & malignarum principem locum teneat certum tamen est alias res non naturales ad eandem generationem concurrere, pro vt illi breuiter & sigillatim exponere aggredior.

Secundum postea aerem locum obinent alimenta, quandoquidem ex praua victus ratione contrahitur morbosus apparatus, qui est causa sine qua non, & efficiens interna febrium malignarum, & pestilentium. Vnde à Gal. *lib. 2. de tribus, & malis iunctis, & 1. de diff. feb. cap. 3.* exoritur demonstratum est. Illa autem alimenta praua dici consueverunt, & horum morborum causæ multis hominibus.

Primo quicquid, quando fructus terræ & arborum, ex praua anni constitutione, puta humidioris, vel siccioris, vel ex nebulis corrupti, & a cœnosis putridissimæ locis emissus, vel aliqua tempestate, aut maligno denique syderum influxu corrupti, prauos hincos ingelli producent.

Secundo, quando magna adeit annonæ caritas, & penuriae vnde vulgare illud, *stans pars aliquid, postis post famem.* Tunc enim inops plebeica virores, prauisque alimentis sese implere cogitur, vnde praua exoritur sacculorum. Et quod multo deterius est, quando penurie copiosa illa succedit, fese namque multis cibus libris ingurgiant, qui à languente partium calore ac tepore concoqui nequeunt, & inde malignam contrahunt putredinem.

Tertio, quando alimenta quæ natura sua bona sunt, aliqua ratione putredinem quandam, aut prauam qualitatem acquirunt. Talia sunt triticum, hordeum, legumina, & alia fruges.

fruges, quæ vel diutius aëre, vel male expozite in loco humidiori, aut alter male affectæ, rubiginem, aut qualitatem quandam putredinis acquirunt. Tales sunt carnes diutius aëre, aut male olentes, vel quæ non tantum hominis, sed vi morbi extinguntur: quemadmodum natus salus Obsequens, in insula quæ Lipara appellatur, mare ab Aetne montis ignibus ex terra motu magna vi euomit, in caluiculis, pelceque conculcatis, sique ad litus recessit cum incole ausus velleuerant, grauem pestilentiam fuisse subiecutam.

Neque minor est in pota efficacia, quando, vina putrida & corrupta lantur, vel aqua bibitur ex putridis, & cænosus hicbus, aut alio quouis modo infectis. Quemadmodum histosarum fide proditum est, numerosos exercitus, ex humiliori aquarum via, popularibus morbis fuisse deuastatos.

Duc tres non naturales hæntes expozite, nempe aër, & alimenta, præcipuam vim obtinent ad febrium malignarum generationem. Reliquæ verò quatuor, nimirum excreta & retenta, motus & quies, formæ & vigilia, animi pathemata, nimis sunt efficiæ, & concurrunt tantum in causæ adiungentes, vel corpora disponentes ad malignam putredinem concipiendam, vt ex earum expozitione statim apparebit.

Retentiones nimium in mulieribus, aut alterius vacuationis conductæ in vires vt hæmorrhoidum, & hæmorrhagiarum, & alii fluxus, qui in nominibus per interualla tolet conuigere; si in constitutione epidemica accidunt, morbum malignum solent producere. Illa enim, quæ tanquam superflua, & naturalis ocre grauius exueruntur, si intra corpus retineantur, facile concipiunt putredinem. Sic nimis euacuationes aut sanguinis, aut aliorum humorum, corpus sua tunc debilitant, efficiuntque vt calor nativus inobscuro lactus, aeris visio, aut pestilens inquinamenta facile recipiat.

Quod ad motum, & quietem spectat, certum est nimium otium efficere, vt calor nativus liberam euentilationem, minime recipiat, atque adeo humores putredinem concipiunt. Sic nimis exercitatio poros valde aperit & calorem dissoluit, vnde fit vt corpus de bilis reddatur, & magis penetrabile, contagi fœnitaria facile recipiat.

Nimius etiam otium multum facit excrementorum proventum, & corpus replet humiditatibus, quæ facillime putrescunt. Nimis vero vigiliæ cruditates gerant, & ille facile putrescunt, quia a calore nativo iactis commodè non reguntur: tum quia ex his multæ sunt obstructions, & quibus prohibita transpiratio, & tandem putredo generatur.

Denique animi pathemata corpus vehementer exagitant, humorumque conturbare, atque adeo ad hanc litem capessendam maxime disponent, atque in primis timor & tristitia, quæ spiritus vitales introrsum reuocatos usui suffocant, vnde cordis vires ita franguntur, vt minus quæno resistere, penitente morbi insulubris obfistere videntur. Imò verò humores commoti in venis, & vehementer conturbati, & naturalis constitutione deueniunt, malignamque putredinem concipiunt. Adeo vt nonnulli existimauerint, in obidionibus & calidis, morbos pestilentes non tam ex praua victus ratione, & caduereum fetore, quam terrore, metu anxietate, & in ortus formidine prouenire, quæ humores exagitet, eosque tumultuari ac fœditate faciat.

Signa febri pestilenti, alia futurum morbum indicant, alia præsentem demonstrant, alia præteritum commemorant. Quæ omnia proponenda sunt, quia à primis præsertim ut desumuntur, a secundis curatio, ab ultimis præcautio quædam in us, qui nondum febri pestilente correpti sunt, quæ futuram febrem pestilentem prænuunt, a tribus desumuntur: nempe a corporis dispositione, a præsentia casualium, & a quibudam mediis dispositionibus.

Corpora ad febrem pestilentem disposita sunt, quæ prænot congesti, luccos ex praua victus ratione, & præpostero ita rerum non naturalium vii antea enarrato. Vel quæ pectora onerata plurimum fe ingurgitant, ut interpestus, ac mordacitate replent. Præterea quidam cacothymia & phlebotia expertes, ad hunc morbum concipiendum sua disponent corpora, dum mollescimus pathematis animæ exorant, vel immodice veneri indulgent; ab hisce animi duabus causis frequentius multo febri pestilenti produci consuevit: quandoquidem ab his, etiam in bonos humores corruptela facile inducitur. Animi animi accidentia spiritus à proptis distrahunt operationibus. Venis nam omnes virtutes labefaciunt. Ad trahunt spiritibus, virtutibusque labefactis, humores in alienam transiunt naturam, corruptelam quandam consequuntur.

Denique quibus membra principia imbecilla, aut labem quandam affecta fuerint, siue ab ortu, siue a prauo victu, aut alia quapiam causæ externæ qui calido & humido temperamento prædicti sunt, qui rarij aut densiori habitus corporis donati, omnes febri pestilenti concipiendi dispositi sunt. Si quidem corpora calida & humida putredini obnoxia, tatarum muiaris patet, densa non libere transpirant.

Præsentia casualium, quæ febrem pestilentem producere possunt, eam futuram portendunt: atque adeo præpostera tempestatum conditio, anone caritas, bella, & alia causæ supra enarrate, quando apparent, hunc morbum imminere significant.

Medie dispositiones sunt, quando præsentem corporis dispositione & causis supradictis, videmus in homine inestitiam solutam, timorem inexplicabilem, colorem faciei immutatum, ad oblata non bene fe habere, in formis prauis perturbatis, lassitudinem spontaneam, sitim, vigiliis, nauis insularis facile erit conuigere, febrem pestilentem imminere: hæc enim omnia indicant humores alienam naturam adipisci, & corruptela concipere, ad quæ febri pestilenti oritur.

Præsentem febrem pestilentem, desolantis signa ex parte proponenda sunt. Ideo omnes locos percontandi, ex quibus morborum diagnosi elicet possit, qui quidem locum a triplici genere symptomatum desumuntur, quia symptomata sunt effectus morborum: & causæ non nisi per suos effectus commodè significari possunt. Atque adeo alia signa ab actionibus letis, alia ab excretis, alia verò a qualitatibus mutatis erunt delumenda. Quibus locis quæritur erit adiungendum, ab affectibus superuenientibus desumptum. Ad quæritur rectam intelligentiam sequentia præmittenda sunt.

Primo sciendum est eadem fere symptomata febrem tum pestilentem propriè dictam, tum malignam simpliciter significare, & vtriusque signa per maius tantum & minus inter fe differre: ita vt in pestilenti sit magis symptomata mutata, in maligna verò minor. Elle tamen nonnulla accidentia, quæ magis propria sunt vni, quam alteri suis locis indicabimus.

Secundo notandum est, nullum dari signum harum febrium vere pathognomonicon, quæ scilicet posito febri pestilenti necessario ponatur, & subito auferatur; nedum bubonem, aut carbunculum in vere pestilenti, cum in multis etiam vere peste laborantibus non appareant, & denique bubones ac carbunculi malignitatem exertes: Neque maculas purpureas in febre maligna, quæ multis à pluribus Medicis purpuræ nominetur: cum in multis ea laborantibus nulloquam comparant, & interdum erumpere solent in mulieribus nimium suppressionem patientibus, & in nonnullis pueris ob letum quandam sanguinis exaltationem, nulla tamen apparente febre, quod nobis in vtriusque non raro videre licuit. Attamen et omnia signorum syndrome, & col ectione, certa harum febrium diagnosi facile stabili possit.

Tertio aduertendum est, omnia signa a nobis proponenda in omnibus & agrotantibus non reperiri: sed partem tantum eorum, quæ tamen sufficientia ad morbi speciem ad amissum consilium dant. Pro varia enim corporum dispositione & morbi intentione, aut remissione, quæ hæc symptomata, nunc illa magis elucere solent.

Denique sciendum est, febri pestilenti & malignæ signa (quibus in aliis etiam febribus reperitur) veritatem quandam pathognomonicon in hac febre dupliciter agnoscere. Primo quia in hisce febribus peculiaris quandam conditionem præ se ferunt, quæ in alijs febribus non reperitur. Nam capitis dolor, nausæa, vomitus, caloris modus, & cætera signa dum pestilentibus febribus accidunt, peculiaris conditione

sem & malignam acquirunt, qua differunt à se ipsâ, dum in alijs febribus apparent, quod vel mediocriter exercitatis in operibus artis innotescit. Secundò, qua symptomata inter se non seruant eam proportionem in his febribus, quæ in vulgaribus reperitur: ita ut calor ad tactum mitis, pulsus non valde immutatus, exigua febre offendat: cum ipsa tamen dolor capitis ingens, vigilæ, & interdum deliria, alijs quæ symptomata febrem ardentem consequi solita, pleniusque coniungantur. His positis signorum seriem deliribamus ab actionibus letis incipientes.

Quia igitur corin hoc affectu potissimum afficitur maligna & venenata qualitate, ardeat illius actio, nimirum pulsus varijs modis immutatur, pro temporum varietate, ac diuersa morbi conditione. Interdum enim in principio est ferè conuulsus, & sanctorum pulsus simillimus: ut docet Gal. 3. de prag. cap. 4. In progressu tamen & morbi augmento frequens, paruus, debilis & inæqualis apparet. Frequenter tamen perpetuò maior erit, quam pro ratione caloris adacti: quia tot lætissimi à maligna qualitate selemagia exagitat, quam euacuandi caloris necessitas requirit.

Hanc etiã febrem significare valent cardiagia, seu oris ventriculi dolor, quem tanquam malignum damnauerat Hipp. 1. progn. his verbis: *Oris ventriculi dolor cum præcordio dolet, & capiti dolor, malignum.*

Sitis aliquando magna, quæ superat caloris febrilis copiam ac modum, quando verò eiusdem carentia, cum in tanta febre, & lingue siccitate, vtrumque enim malignitatis est indicium.

Ingens ciborum inappetentia, quæ multi omnia alimentorum genera, non secus ac ingratiissima medicamenta, horrent. Hæc autem solet exoriri à malignis vaporibus ventriculi afflictiombus.

Nausea, vomitus ab eadem causa, in principio præcipuè morbi eueniens, siquæ ita diuersus, ut nonnulli assumptum alimentum statim emant; alij statim quidem ab assumptu iuculetur, non iuculum ipsum, sed vana humores reijciant, ita quævis alimenta probe retinentes à quam, iule, emulsiões, omnem denique potulentiam materiam assumptam statim emittunt, superflue interim sibi ingente, cum lingue siccitate & nigredine.

Horror frequens, & inordinatus, sæpius in die contingens, ab halitibus acerbis, mordacibus & à natura nostra alienis ad partes sensibiles delatus, & vicinis: qui in alijs febribus putridis raro contingit, quoniam in ipsis halitus eandem non obtinent malignitatem. In febribus tertianis intermittentibus malignitate præditis, ex horrore & frigore malignitatis signum interdum desumi potest. Contigit enim aliquando, ut in principio paroxysmi, accedente leui frigore, aut horrore, tanta caloris retrocessio accederet, ut caro prægelida ellet, faciesque moribundi limilima appareret, pulvisque adeò exiguus, ut omnino nullus videretur. Subsequēbatur postea calor, qui tamen in augmento, nec in statu ad tactum validus, nec acce perciebatur: inò caro vel tepido calore prædita, vel subrigida & vique ad declinationem peruehatur. Pulsus accenso calore magis apparebat, sed paruus, inæqualis, frequens & admodum debilis erat: itaque alia febrium putulentium symptomata comitabantur, quæ satis confirmare poterant, non solum continens, sed etiam intercurrentes dari febres putulentes, ut antea monuimus.

Totius corporis lassitudo, granitas, & veluti membrorum contractio in principio morbi apparent, ob prædictos vapores in totum corpus delatus.

Capitis dolores, vigilæ, & deliria, quæ omnia sunt ab eadem causa, vaporibus scilicet acerbis venenatis: qui prope cerebri membranas impetunt, dolorem capitis efficiunt, propterea ipsam cerebri substantiam calefaciunt & excitant, si lenis sit alteratio, vigilas tantum efficiunt; si verò intensior, etiam deliria produciunt. Ad hæc verò symptomata multum confert præter calorem & siccitatem, venenata qualitas, quandoquidem in febribus vulgaribus talia, symptomata non sunt, nisi multo maior sit intensitas. Dolor vero in hac febre hoc sibi peculiariter vendicat, ut varius admodum sit, nec perpetuò eundem locum assilens.

Interdum enim scipit tantum, aliàs occiput, frontem, aut superciliam lapicinas dolor occupat. Interdum & alias partes, ut scapulas, latus, dorsum, aliamque corporis partem. Interdum eidem parti continuò afflixas, alias locum iustans, & nunc hæc, nunc illam deliraciana.

In nonnullis humoribus & comatosi affectus contingunt, in his scilicet, qui habent cerebrum pituitosis excrementis repletum: quæ quidem pituitosa excrementa à vaporibus calidis ex partibus inferioribus eleuatis, quantitas, & functiones cerebri impediunt.

Vrina aliquando vitæ sanctorum similis, quando scilicet humores pus peccant maligna qualitate, quam putredinem & primis interdum diebus talis perseverat, postea fit crassa & perturbata. Interdum in statu concocta apparet, licet ad interitum ruant agrogantes. Interdum tenuis est, & cruda, nullum continens sedimentum, aut illud excrementi potius naturam referens, quam veri sedimenti. Frequentius tamen crassa & turbida apparet, ac intensior coloris, & crassum, rubrum, ac conturbatum, diffusumque habens sedimentum. Ac denique omnes prauæ vrinarum dispositiones in hoc morbo possunt contingere, pro varijs humorum putrescentium ac corruptorum alterationibus.

Alii fluxus bilioidi, qui vel ex te oriuntur, vel à leui causa irritantur, vel leui clystere, aut pharmaco; & poltea contumaciter perseverant, analogos ad interitum perducunt. Sic refert Hipp. 3. Epid. in putulenti constitutione bilis delicti, plurimos alii fluxus, & dysenteria fuisse sublaros. A maligna enim qualitate humores ferociore redditi naturam impense sumunt & irritant, ita ut eos per vias sibi obvias eicere conentur. In illis autem alii excrementis ingens fœtor inesse solet, ex ingenti putragine humores occupante.

Lumoricorum copia, in principio potissimum huius morbi, externi confusius, insignis enim putredo humores maxime disponit, ut ex his lumbrici generentur.

Sudores frequens, parui, minuti, & inutiles principio morbi producentes.

Calor ad tactum mitis ac blandus, ut iux febre videantur, unde Gal. 3. simpl. cap. de febre, & Aul. sen. 4. lib. 1. c. de febre pestilenti, docent febres pelliculas calorem matrem & placidum frequenter habere. Et ratio est, quia febres huiusmodi magis sunt à maligna & venenata qualitate, quam à vulgari intemperie, vel putredine.

Oculorum rubor in hoc affectu frequentissimè apparet, quia à vaporibus acerbis sursum eleuatis cerebri meningis quandam veluti inflammationem concipit, & camque tunc aduare, quæ ab eis ducit originem, facile communicant.

Denique macule purpuree pulchrum morbum similes, petecule, vel petechiæ à recentioribus appellatæ, propriè & peculiariter febrem malignam significant. In nullo enim alio febri genere reperiuntur: vtpote quæ ex praua & venenata sanguinis, vel à horum humorum qualitate putredini coniuncta oriuntur. Apparet tamen aliquando in alijs affectibus, ita febrem petulicentem maculæ quædam prædictis consimiles, sed à diuersissima causa producentes: nempe à lingua tenuitate nulla, quia calore aut facultate expultrice agitur, extra capillares venas in cute efflorescit. Illæ potissimum solent contingere in his, qui sanguinis fluxum parantur, ex eo quod ille factus fuerit tenuior & aquosior: nam etiam in leuissimis, & diuturnis viscum ostensiones patientibus, siquæ omnibus, ut summum dicam, qui propter vicerum debilitatem, sanguinem generant aquosum, & ex cachexia proclives sunt. In his enim sanguis tenuior factus, modo per nasas, modo per aliam partem effluit, modo etiam à capillaribus exiens reus in partes cutaneas transiit, ubi retentus proprium amittit colorem, & vel huius, vel rugæ, vel paucius efficitur, variæque macularum differentias proferit, quæ tamen à maculis febrium putulentium diuersitate sunt, & nihil aliud quam sanguinis tenuitatem aquosam, atque viciatilitatem recoria præ se ferunt. Hæ autem maculæ febribus, putulentibus superuenientes, ab humoribus putrescentibus & praua qualitate infectis oriuntur. Præterea huiusmodi

maculæ aliquando criticæ, aliquando symptomatice erumpunt. Criticæ quidem cum vel ex parte, vel totaliter superata putredine, praeque correctâ qualitate, natura corruptum humorem ab internis ad externa transmittit, tumque semper sequitur minimum morbi. Symptomatice verò, cum natura materis morbosæ quantitate vel qualitate, praua stimulara, ante illius coctionem, & praeque qualitate correctionem ad partes cutaneas materis portionem transfertur. Et hinc nullum subséquens aggrauatum leuamen, sed potius factio multâ naturæ cum morbo certamine, deusitæ magis, quam vincens natura indicium est.

Colores harum macularum diuersi sunt, & diuersitatem humorum ostendunt a quibus generantur. Rubræ siquidem à sanguine puriore, viridæ, puniceæ, lividæ, & nigre à sanguine bilioso, & magis vel minus adfuso. Quod ad quantitatem spectat, alia sunt plures alia pauciores, huiusmodi maculae apparent, quâdoque maiores, quâdoque verò minores. Apparere incipiunt aliquando quarta, quinta septima, vel nona, vel alia iudicatoria diebus ad bonum fuerit extiterit, aliquando etiam alijs diebus, cum minus fida & vitiosa fuerit. In omnibus interdum corporis partibus, si equen- rissime tamen in iumbis, pectore, & ceruice apparere solent.

Affectus verò febribus pestilentibus superuenientes precipui sunt exanthemata, pustulae oris & viceræ, carbunculi, bubones, & parotides.

Exanthemata à maculis purpureis differunt: ex eo quòd maculae ad qualitates mutatas ipsius cutis, cum nullo modo emouant; exanthemata verò ad tumorem genera reiciuntur. Sunt cum varorum instar aliquando alia verò minoræ, granis magis finissima. Aliquando rubra sunt, à sanguine generaliter simul alba, à pituita, vel ferofissima, à bile purpurea, à bile exulta, livida, vel nigra maxima exultione, vel mortificatione. Quædam symptomatice, quædam criticæ, quædam medio modo erumpunt. Alia exacerantur simpliciter, alia suppurantur alia vicerantur.

Ad hæc reuertitur pustula in ore apparentes, quæ omnes prædictas exanthematum differentias nanciscuntur, & aliquando adeo malignæ sunt, ut cibum & potum, agrositas vix tolerent. In tenera ætate sæpe mortem afferunt, cum sibi ipsi vim ad ingerendum cibum non inferant. Hæc pustula peruenit in vicera degenerant, quæ maxime agrositas parit motum leuissimum, motum lingue, & precipue degubones impedimenta.

Aliquando tamen immediate, & non his pustulis præcedentibus, generantur viceræ in ore, aphthæ Græcis appellatæ, quarum plures sunt differentie. Alia enim sunt superflue, alia profunda, alia munda, alia fordida, alia benigna, alia maligna: alia cum crusta, alia sine ea. Et crusta aliquando est alba, aliquando fusa, livida, aut nigra. Quæ sunt profunda, fordida & maligna, & cum crusta nigra, deteriora.

Carbunculi & bubones in varijs corporis partibus, sed precipue circa corpora glandulosa solent accidere: quia exulcentia facilius à maligna quantitate irritata, à partibus intercorporibus, precipue nobilibus ad exteriores perniciosa, materiam expellit: unde à cerebri ad glandulas post aures, à corde ad axillas, à rectore ad inguina, materia hæc transmittitur, vnde parotides & bubones generantur. Quæ tumorem genera in febre verè pestilente potissimum apparent, præsertim bubones, qui apud vulgus pestis nomine donantur. Et carbunculi, & parotides, etiam in febribus malignis erumpunt, sed quæ summam malignitatis gradum adperire sunt, & ad verè pestilentium naturam proximè accedunt.

Signa commemoratiua potissimum vsu veniunt, quâdo vocantur Medici ad visitanda delusorum cadavera, in illis temporibus, in quibus vagantur morbi pestilentes, aut quædam eorum est suspicio, ut inducant an ex his morbis interitus acciderit.

Et primum in dictis cadaveribus apparent aliquando maculae, de quibus supra mentio facta est interdum verò vices, ac si flagellis percussa fuissent: hæc enim sunt venenati morbi indicia quâdoquidem in his qui ex assumpto veneno perempti sunt, eadem signa solent apparere. Illæ autem maculae pestilentem morbum magis significant, si lividæ,

aut nigro colore infestæ sunt. Idem etiam testantur etiam themata supra enumerata, præsertim si pravo colore infestæ sint: etiam multo magis bubones, parotides, & carbunculi. Quibus addi possunt signa, quæ in decursu morbi apparuerunt: Eorum enim commemoratio certam demonstrationem efficit.

Prognosis febrium pestilentium adeo incerta est, ut nihil de eorum euentu possit certo consilium, donec manifesta victoria alterutris partis naturæ scilicet, vel morbi, indicia appareant: quod non solet contingere, nisi circa finem status, aut principium designationis. Ideo prudens Medicus differre ac suspendere iudicium solum debet de morbi euentu, in principio & augmento.

Proponenda tamen sunt indicia præcipua, ex quibus magnam elucere poterimus coniecturam, an morbus lethali ter aut salutariter finiturus sit, quorum admodum quid sperandum, aut metuendum sit, poterimus prævidere, sine certa tamen fiduciam experientia nos docuit, plurimos cum perniciosissimis signis evasisse: alios verò cum salutari- bus à medio sublatos. Omnia autem signa prognostica, prætermittimus, quæ omnibus morbis acutis communia sunt, de quibus fusi egit Hipp. in Prognosticis, Coacis, Prothetice, & Epidemias, cum etiam in Aphorismis, quæ hæc etiam suum locum habere possunt. Sed illa tantum proponemus, quæ febribus pestilentibus magis peculiaris sunt, ab illisq; certior prognosin elici possit.

Illæ autem ex ipsidem fontibus delumuntur, ex quibus diagnostica delumpea sunt.

Primo igitur hisce febribus, pulsus æqualitatem, ac tenorem scrupulis, licet febris maxima appareat, spei semper aliquid præstat. Contra vero inordinatus, inæqualis, & contractus, periculosus, præsertim si à principio debilis appareat. Lix autem pulsuum differentia non ita perniciose sunt in febribus malignis, quæ in interdum in febribus vulgaribus. Quamvis enim pulsus intermittens in tuene sit lethalis, ut testetur Galenus, plerumque senes & pueri cum pulsu intermittente liberatos vidisse, inueniem verò neminem: In febribus tamen malignis non iuvenes notis, paucos, pulsam intermittente per multos dies habentes, evasisse vidimus. Pulsus sanorum pulsibus similes admodum periculosi significant enim naturam præ umbellitate à coctione abstinere. Vbi enim prava & perniciose qualitate vires admodum debilitantur, natura debilis facta concoctionem materis non aggreditur, humoremque qui morbum excusat non attingit: unde non tentata coctione, nec labor sequitur, febrisque vel nulla, vel minima est. Huius rei exemplum habemus in tumoribus externis, in quibus quâdo pars ferè obruta est, à copia, vel prava qualitate materis, nec doloris nec febres sunt: cum vero natura aduersus materiam illam pugnare aggreditur, eamque in pus conuertere tentat, febris tunc temporis plurimum intenditur. Sic in febribus malignis ægri interdum à febre immunes videntur, cum tamen in pus, & ad interitum ruant, ut videre est apud Hipp. Epid. 3. sect. 1. ægri, val Hermocrates à 20. die ad 24. febris expers vultus est, cum tamen 26. obiit.

Delirium in hac febre frequentissimum, est neque movendum cum à somno conspiciatur, tum precipue si cum copioso sudore euascat: Signum enim est materiam à cerebro ad corporis habitum reuocari. At periculis delirium periculosum est: in veram enim phrenitidem degene- rare significat.

Contractiones, & subsultus memborum in hac febre frequenter contingere soliti, consilium motus sunt, & admodum periculosi, idque magis, si cum delirio coniungantur, maximum enim cerebri lesionem significant.

Mutus tremuli manuum & lingue fœnelli esse solent, & plurimum damnantur ab Hipp. 1. progn. Maximum enim argunt virum imbecillitatem, & naturam ostendunt à morbo delusam.

Surditas licet in principijs morborum acutorum periculossima sit, iuxta doctrinam Hippocratis, tamen in ista morbi apparere saluti potendit præcipue in febribus malignis. Er nonnullis observauimus, hæc febribus laborantibus, quibus surditas in statu superuenit, alij symptomati-

Ecc

quam;

quantumvis periculosis existisset, omnes euasisse indicium enim est cerebrum satis valorem noxios humores ab æternis partibus ad exteriores deducere.

Sternum autem ex Hippocratis prædictis, in morbis etiam existitibus (modo non sint affecti pulmones) perniciosis adferunt. At in febribus malignis, quantumvis levis symptomata periculum portendant, securitatem pollicentur.

Cardialis frequenter aut (singulis) periculum minatur, & ventriculum grauius a venenata qualitate affici significat.

Maxima ciborum auctio periculossissima est. Significat enim ventriculum a magna qualitate superatum, eoque temperiem omnino euertiam, ut laudabile alimetum sibi in statu naturali familiarissimum, respuat & auectetur.

Suppletio omnium euacuacionum in principio, & augmento morbum bonus habetur. Significat enim materiam morbificam tantam non esse malitiam, ut naturam irritet ante debitum tempus, sed naturam adhuc vincere, & suo tempore excreturam, modo non addit nota aliqua decubitus humorum ad caput, ventrem, aut aliquam ex præcipuis partibus. At in statu morbi nihil excreto, sed signa in aliquo principalium membrorum deteriora apparere, malum est. Indicium enim est, aut morbum diutius duraturum, aut dubium admodum præstiturum salutis (perit). Materia frigida quæ pluribus diebus euacui non potuit, aliquid grauius damnum in eodem membro adfert, ut phlegmædem, lethargum, aliaque post videremus, vel 14. diem orientis, quæ difficillime quibuscumque adhibitis auxiliis expugnari valent.

Sanguis per venæ sectionem educatus, si nulli præ se ferat perniciem, sed purus, & secundum naturam se habere videatur, perniciem non significat. Evidens enim signum est plus acie venenolæ qualitatis, quam putredinis, aut putredinem in venis cordi proximis latitare, quæ venæ sectione educi non possit.

Ex urinis in febre petiliens nulla ferè prognostis elicitur, aut admodum incerta. Non solum enim consilia, perturbata, æuora aut crassior videntur, ut in alijs febribus mala est, sed etiam illa quæ urinis sanorum cõsimilis est. Imò verò multæ coctionis signis manifeste in urinis apparentibus, illique denique recrudescunt, quæ mediocriter lubri sunt. Attamen urinae concoctæ, & laudabile æuorera habentes, idque multis diebus perleuerant, & de die in diem magis seles videntur, ac in matutinis fundum sensum descendens, certam salutem perpetuo pollicetur, etiam in febribus malignis ac petiliens. Ficti enim non potest, ut lacus naturalis valida & robusta, quæ in hunc virus effluat, aduersus malignam qualitatem non iurgat, æuoræ tandem superet. Ideo sepe in febre maligna laborantibus, grauius illique symptomatabus afflicti, & in maxima altitudine trepidatione, scilicet eorum ex coctionis signis in urinis perleuerantibus, summa fiducia præsumitur.

Urina pinguis & oleaginea, nigra, aut lutescens, cum hypoflasi nigra, aut lutescente, æuoræ exitum prænuunt.

Copiosa admodum urina, quam febris imminutio non sequitur, perniciosa est, quia colloquutionem significat.

Sudores in hac febre, etiam cum requisitis accidant coctionibus, nedum in die decretorio raro solent eam ex toto iudicare. Imò interdum primo ne ex iudice febris temperetur, deinceps verò symptomata ingrauescant alia, post pulvis sudores succumbit æger. Sudores enim copiosi morbum non immunes, ex coactione totius corporis oriuntur. Neque ob id credendum est, hunc habere febre nuquid prodeesse criticos sudores. Nam quo minus venenositatis lãbris obtinuerit, eo magis prodele poterunt, ut in alijs febribus vulgaribus. Oueruacione etiam compertum est, longe vitius esse si frequentibus sudoribus æger a principio morbi corripitur (dummodo ex iudice non se detegit habet) signum enim est naturam paulatim materiam parare, & per sudorem euacueret.

Alii fluxus incertum omnino est præsignum. Nam in principio morbi sepe labibet fluxus, quod etiam aliquando esse lethale signum experientia docuit. Rursum præmissa aliqua coctione, fluxus est alii fluxus laborantem incertum, nonnunquam verò licenti. Ita tamen distinguendum est, Cum venenola qualitas præpolet,

quo magis a principio per alius fluxum prelabitur materia, eo securior est. At cum ex humorum potestate maiori parte morbus oritur, deterius se habent hi quibus alius a principio soluitur.

Macule purpureæ cum plures sunt, maiores, & caloris benignioris, & criticæ erumpunt, naturæ victoriam prænuunt. Si verò pauciores, minores, & præui caloris, & symptomatice excreantur, naturam succumbere significant. Reterea si retrocedant, postquam apparuerint, pessimum signum est, indicant enim materiam morbificam ad interiora relucere.

Exanthemata in varijs partibus apparentia maiori malignitatis foboles sunt, quam macula purpureæ, atque adeo maius periculum portendunt.

Carbunculi & bubones maximam testantur malignitatem, & maximam periculum minuant, cum eas febres committant solent, quarum peculiaris character in eo constituitur est, ut ex alijs plures intendant, quam feruerent. Anthracis, & bubones quo longius a corde consistunt, citius increunt, & ad maturitatem perueniunt: eò minus periculosi sunt. Attamen si derrepent, & cum prauis symptomatibus tumores augerantur, malum est. Carbunculi valde magni, sed colore sanguineo vixere depalente, aut qui in gangraminam mutantur, & thales sunt. Quæmadmodum etiam in quibus cordi vicini sunt, aut guttur occupant. Experientia obseruatum est, carbunculos plures paucos esse periculosiores, & contra bubones plures pauciores esse feliciores. Parotides in febribus malignis & purpuratis, in augmento & statu lethales. Si verò vel tantulum inclinante morbo apparere incipiant, & ad suppuracionem veniant, salutare.

Curatio febres petiliens in duas partes diuiditur. Quarum vna continet præseruationem illorum, qui ea non dum correpti sunt, altera curationem actorum ægrotantium.

Præseruatio præcipue consistit in ablatione causarum, quæ corpora febri petiliens recipiendi idonea efficiunt, eamque in ipsa generare possunt. Illæ autem sunt interne, vel externæ. Internæ sunt corporis dispositiones, plethora, cacochymia, & obstrucciones. Externæ præcipue sunt aer vitiat, & contagium vagans. Corpora huius morbo disposita sunt, quæ a natura vel accidenti sunt præter modum humidæ, debilia, laxa, & ara densa & compacta. Humidiora corpora excruciant: quæ autem sicciora sunt, in eodem statu conseruanda. Humidiora igitur vitare debent vitium plenioris, magis quæ potius, & omnia alimenta humidiora, & aquales sunt in primis fructibus, oleis, piscibus, lactuina, ærem asitrum, puluerem, & præcipue nocturnum, otium, omnium longiore præter meridianum, balnea, & alia omnia quæ corpus humectare possunt.

Corpora debilia victa anæleptico, & roborantibus medicamentis iustantur. Rara & laxa eademque humida, præcautione indigent. Densa verò & compacta, quia febri petiliens recipiendi omnium maxime disposita sunt, a plethora, cacochymia, & obstruccionibus magis sedulo liberanda sunt. Quæ causæ cum in omnibus corporibus hanc febrem producere valeant, tanquam causæ internæ, ut antea dictum est, earum remotio perpetuo incumbendum.

Plethoræ debet vitare lectio, modò nihil contraindicet, ut tempus anni calidius aut frigidius, & petiliens æer latus, in quo non est mittendus sanguis, nisi plethora ad vala manifeste virget, vel consuetæ alius sanguinis euacuatio per metes, hæmorrhoidas, aut hæmorrhagiam naturam oppressa fuerit. Exhaustio enim sanguine facilius inspiratus æer petiliens imprimet actionem, difficultiusque, si morbus superueniet, ad eodem patiens ob vires aliquotulum immutatus, euadet. Quæmadmodum his, qui post lectam venam venenam hauerunt, facilius hoc penetrat, & illi difficultius liberantur. Tum etiam in metu veneni assumpti a venæ sectione abstinentur. Sic etiam Galenus lib. 1. de differentiis feb. cap. 4. ubi præseruationem a febre petiliens proponit, purgacionem quidem, & obstruccionum aperiacionem præscribit, minime verò phlebotomiam facit mentionem.

Cacochymia debet purgatio, eaq; humoribus peccatis purgatio appropriata, præmissa præparatione idonea si ea necessaria videatur, hæc autemque adhibita, ut bene Galenus

existant piaculari esse erantematis apparentibus sanguinem lecta vena detraxere, quod tunc temporis humor ferantur a centro ad circumferentiam, qui motus omnino adiuuandus facile per venæ sectionem contrarius omnino motus humoribus conciliatur, sanguis qui trahatur a circumferentia ad centrum cum facta paruius interiorum inanitione, necellarium sit sanguinem in exterioribus partibus consistere, ad interiores recurrere, quod dicitur docuit Gal. 6. de fani. menda cap. 10. languinem nimium lecta vena a corporis mole vniuere ad internas partes remigrare. Et idem Gal. com. in 6. Epid. Simoni fili, de quo Hipp. Ieremem habuit, latus pullulas habent, vomitum ea de causa non profutur conserat, quod succi ad eutem vergentes per eam finit euacuandi.

Attram sanonibus doctorem sententia fanticum est, maculis purpureis apparentibus in morbi principio, & 13 diebus, quibus venæ lectio celebrari conuenit, si antea sanguis sufficienter detractus non fuerit, etiam tunc temporis quantitate moderata esse detrahendumque viliu inde, minime periculum, cum illa exanthematum eruptio, quæ sit in principio morbi critica non sit, sed tantum lymphomatosa, ex insigni sanguinis ebullitione, & humorum malignorum ac putrescentiam feruore oriunda; atque adeo non possit impediri naturæ motus, qui nullus est tunc temporis. Si enim corporis exilitate phlebotico, cum luto crasso ac rubro, exanthematum apparentium ratione habita sanguinem non detraxeris, vis natura tantum humorum copiam superare poterit, & periculum erit, ne illi in partem aliquam interioreni irruant, in eaque perniciosa inflammationem generent. Sanguis tamen eo tempore cautus, & minori copia detrahendus est, non ut venæ admodum inaniantur, vnde retrahendo humorum ab exterioribus ad interiora possit succedere, sed tantum ut nimia eorum plenitudo tollatur, quia dempta venæ nouum sanguinem non attrahit, sed in se concludit, ac nonnihil laxatur, & coarctatur, ut melius sanguinem in is relictu continere ac regere valeant. Sicque iuuatur motus & exulsio naturæ ad luperficiem corporis. Leuata enim parte oneris, quo premebatur, illud quod reliquum est, iaculis excurit & expellitur. Quod nobis in Medicina faciendū passim innouit, dum ipse eadem die quia fecatur vena in acutis febribus, imò paucis interitum possit venæ sectionem horis copiosis sudoribus, colicis, & ac salutaris erumpentes conspiciamus. Imò verò, quamuis latis valida esset natura, ut totum illum sanguinem redundantem regere sufficienter valeretur in corporibus phleboticis sanguis plerumque crassior esse solet, & per huiusmodi ecchymata, tenuissima, tantum sanguinis portio exhalet, crassior in venis remanens magis ac nigius computresceret, & longe periculosiorem morbum crederet. Consultandum tamen exitum, paulo post venæ sectionem plures cucurbitulas admoovere, ut motus humorum ad exteriora magis adiuuetur, de quarum cucurbitularum admittitione paulo inferius agitur. Notandum autem diligenter, quod supra a nobis dictum est, reuulsio esse obseruandum, quo exanthemata apparent incipiunt. Si nempe in principio morbi, & ante quartum diem id fiat, quo tempore eorum eruptio critica esse non potest, & nullum agro leuamen ea ex emergit, sed potius lympomatosa ingrauescit, vnde venæ lectio nullo modo pertrahenda est. Ad si post quartum diem erumpunt, idque magna copia, ut inde ager melius habeat, ac lympomatosa remittantur, latus multo est ad venæ sectione abstinere, & plures cucurbitulas sicificatione affigere, ut motus illi humorum ad exteriora multo promoueat.

Que de venæ sectione hædum a nobis dicta sunt, intelligentia veniunt de ea que fit in brachio, quo consilium multitudinem sanguinis uniuertit. Aliquando tamen lectio venarum inferiorum vtilissima est, si nempe vires debiliores fuerint, & prædictam venæ sectionem antea viurpatam vitentis ferre nequeant. Tum præcipue confert hæc phlebotomia in mulieribus; est enim, ut inquit Orbius lib. 7. c. 10. mulieribus propria, multumque efficax, quippe quæ naturalis excretionis modum iuuat. Imò vero circa medium euacuationem mulieribus vtilis est ista vacuatio, quia ex lege nature in vetus victo vicinis plurimo sangui-

ne abundant. Confert etiam ijs, in quibus metuenda est translatio humorum ad cerebrum, quæ frequenter in hunc febribus locum contingere, & phrenitidem generare. Quod facile iudicabitur, si supra in prognostico dictum est, rinites, albes, & decoloris, quæ ita se habentibus, lectio venarum in interiorum erit vtilissima. Reiet etiam Orbius hæc sententia, de febre phlebotica correptum, detraxis per venas inferiores sanguinis mixturam, & omnes qui eodem remedio vti essent, libere liberatos.

Eadem vires obtinet apertio humorum hoidum, quæ huiusmodi applicatione perficitur. Cum enim hoc modo sanguis paulatim educatur, minima consequitur virium exortio. Ab inimicis tamen viceribus, in quibus solet incendium adesse, & mali fomes, sanguis reuelitur. Melancholicis præcipue plurimum conuenit, quia in ijs natura pierunque per has vias limolam sanguinem educere conatur.

Possit sufficientem venæ sectionem, reuulsiones celebranda sunt per cucurbitulas, tum scaras, tum scarificatas. Scaras quidem, quando simplex reuulsio mollienda est, scarificatas vero, quando sanguinis redundantis copia penitus abici non est per venæ sectionem, quæ vires viceris ferre nequeuerunt. Siquidem multo minori virium iactura sanguis per cucurbitulas educitur, & præterea venæ (parius itas latantes ad exteriora retrahatur.

Sed de locis in quibus applicande sunt cucurbitule, inter Auctores non conuenit. Alij enim, & imprudens Itali ferè omnes, centent partibus inferioribus, cruribus scilicet, & naribus tantum esse applicandas, ut materia venenata a corde ad distansimas partes reuelatur. In scapulis vero ac dorso non conuenire, quia humores noxios attrahunt ab alijs partibus velius cor. Alij contra scapulis & dorso admotas cucurbitulas ac maxime conuenire existimant, ut humores & vapores venenati trahantur a centro ad circumferentiam, qui motus nature motus in hoc morbo maxime consentaneus est. Nos autem in omnibus locis prædictis cucurbitulas adiuuandas esse censemus: oportet uouemque a partibus inferioribus incipere, ut portio quædam malignitatis ad remotiores partes retrahatur. Sed quia in partibus illis inferioribus admotæ cucurbitule venenatos humores ac vapores a corde & partibus illi vicina inferioriter retrahere nequeunt, conductibile est partibus dorso vicinis scapulis scilicet ac dorso admoovere. Hoc enim modo nature motus maxime iuuatur, cum experientia doceat macularum eruptionem ad illas præcipue partes fieri, quæ frequenter cucurbitularum admotione plurimum adiuuantur. Quod præ ceteris Mercatus eleganter tradidit, his verbis. Interim tamen, dum corpus alij remedijs tractatur, cucurbitas paruas seu plures aut plures adhibere oportet. Quod si maxima fuerit embellitas, & venenata, & ac scarificationem, aut cum leuissima. Sin autem & sanguis vniuersi aliquod lapsum cognouerimus, cum scarificatis, in quo sane vltio & indicatione consiliosissimum est eas scarificare, per, in ac, & regione cordis affigunt. Quod sane inuenti, ita se esse motus vniuersi demoustrat, & accretas, & pulsis magnitudinem, & alia scissima accidentia ab eis protinus subsidere videri. Quare vnde domus venenata accidentia quodammodo misceant, ut superferre vniuersi sub eis desinendo non est.

Ratio vero, cum prioris sententia assertores inueniuntur, parui est momenti quæ, inuertit hoc in humores noxios ab alijs partibus ad eor reuolantur. Hoc enim forsitan alique possit habere locum in principio morbi, præterea totum euacuationem phlebotomia sufficienter celebratam, admotæ, nullum tale possunt inferre periculum. Quod luculentissimo pleuritis exemplo fit manifestissimum, in cuius principio si cucurbitula lateri dolenti admoueatur, attrahit fere dubio fluxionem magis ac magis ad partem affectam. Sed cum, post multas sanguinis missiones admoventi solet, non solum nihil ab alijs partibus ad affectam adtrahitur, sed illud quod parti inhiunt, & inaneque illas exteriora porionem trahit, ut inde integre lapte morbi fluuijo subuequatur. Quamuis in hoc affectu trahio ad partem affectam magis metuenda sit, quia externa ferè & cucurbitule vicina est. Zæcius Lusitanus lib. 23. lib. 3. prax. admiranda plurimum conueniat cucurbitulas scarificatas, prope inguina, & an-

les admoti: his enim vitiosis succus ad partes ignobiles, & communia emundatoria attrahitur, ad quæ natura solet eum vultus deponere.

Inter reuulsoria remedia meritis etiam referuntur frictions partium extremarum, cum leni alpersio, frequenter repetita. Sed præcipue commendatur illa, quæ fit in toto corpore cum linimento Aetii quod in hunc modum componitur.

℞. Ol. amygd. dulc. & aque fontis, an. j. iiii. falis niri j. ii. Bulliant ad aquæ consumptionem, & manibus hoc oleo inunctis perficeretur calide totum corpus manè & sero. Aetii oleum fabinum præscribit. Sed quia calidus est, meritis a Baptista Montano oleum amygdalarum dulcium substituitur. Hoc linimentum cutis poros aperit, vt natura commodius vapores venenosos ad eam transmittere valeat.

Potenter etiam prauos ac venenosos ichores attrahunt, & reuolunt vesicatoria variis partibus admotæ. Vulgo adhibentur posteriori parti ceruicis hinc enim & materiam veneficam efficiunt, & de capite deriuant, comatosique affectibus, qui non raro in hisce febribus solent contingere, perturbandis inferuntur. Atamen vbi maxima est malignitas totum corpus occupans, & leuissima symptomata regunt, vnicuique vesicatorium non sufficit, sed plura admo- uenda sunt. Soleo ego in magna morbi leuitate quumque locis admo- uere, ceruici nimirum, vtriq; brachio, parte, interiori inter cubitum, & humerum; & vtriq; femori, parte etiam interius inter anguina, & genua, cum locis facilius.

Sumum huius remedi vltim ex Galeno elicere possumus, qui lib. 5. meth. c. 12. refert ex febre pestilenti omnes euasisse, quibus euascerationes in variis corporis partibus contigerant, euacuata nimirum per ea vicia materia morbifica. Cum tamen ex huiusmodi euascerationibus strangu- ria sepius contingat (cathartides enim virtute specifica impunctum vesicam) opportunum erit eo tempore emulsiones exhibere, quibus vix acrimonia temperabitur. Hoc etiam symptomata præcaueri potest, si emplastro vesica- torio semina amicos puluerata permiscantur, quæ hac facili- tate donata sunt, vt prohibeant ne cantharides nocuum- mentum vesicæ inferant.

Inter reuulsoria remedia referri etiam potest cataplasma ex raphanis Cratone laudatum: Raphanus inquit, quia magnam vim habet attrahendi malignitatem materiam, vnde est scabens eius pedibus, sale & aceto prius mundatis, alligare. Sequens vero cataplasma ad eundem vltim vtilius esse poterit.

℞. Raphani, & bryoniæ vtriusque, ana j. ii. sem- mallurii horrentis j. i. granorum paradisi j. ii. falis marini j. iii. Mixta irrorentur aceto fortissimo, & excipiantur q. s. saponis liquidi. Fiat veluti cataplasma, applicandum plan- tis pedum & illis pectus calide, hora somni.

Huc cataplasmati vtiliter addi poterit folia tute, vtriq; saluæ, scorod. steruus columbinus, succus rutæ, & acetum.

Cataplasma ex cochleis confectis similem habet efficaciam, potenter attrahit ad inferiora humores, & vapores noxios; quæ admodum Galenus illud maxime commendat ad aquas hydropicorum potenter trahendas, & discutendas.

Hæc reuulsoria remedia locum habere solet toto morbi decursu, post vniuersales euacuationes, phlebotomiam scilicet, & purgationem, de cuius vi nunc agendum est, vt a remediis chirurgicis ad pharmaceutica progrediamur.

Primum autem inter prædictos controuertitur, vtrum in febre malignarum initio purgatio debeat inferri. Multi hanc omnino reiciunt, non solum propter vulgatum Hippocraticis præceptum, *concordia esse medicanda, non cruda*: sed etiam quia in hoc morbo humores maligni a pur- gantibus medicamentis nimium exagitantur, & malignam qualitatem lætius diffundunt, naturaque acriter stimulan- tes perniciosus alui fluxus inducunt. Cum aliqui in hisce febribus fluxus colliquantes sepius contingere, ægrosq; de medio tollere soliti sint. Alii vero contendunt, tamen esse interdum prauorum ac venenosorum humorum copiam in primis viis stabulantem, vt nisi purgantibus medica- mento in principio tollatur, aut valde imminuitur, reli- quam humorum massam inficiat, vt a natura, quantumvis

alexipharmaca, roborantibusque medicamentis adiuta superari nequeat.

Nos hoc diffidum ita componendum esse existimamus; nimirum in huius morbi principio, quantum fieri potest, a purgantibus medicamentis abstinendum esse, ob rati- ones in priori sententia allatas: & putridorum humorum illuuiem in primis viis flagrantem, quæ maxime equidem curationi impedimento esse consuevit, clysteribus frequen- tibus potius, quam purgantibus medicamentis, esse educa- dam. Si tamen tanta sit in prima regione cacochymia, vt clysteribus sufficienter educi non possit videatur, quod præcipue contingit, quando humores prauis in ventriculo redundant, tumque adest lumina inappetentia, oris ama- ritudinis, nauæa & vomitus; vel quando adest lumbrico- um copia: vtilissimum est tunc temporis purgantibus medica- mento eam educere, vt materia morbifica in venis conten- ta postmodum commodius edomari valeat. Quæ quidem materia ante concoctionem educi non potest, & in illa tan- tum locum habet sententia Hippocratica, *concordia esse me- dicanda*. Sed materia in prima regione contenta, & excre- mentorum illuuiem, nulla præmissa preparatione, aut con- coctione educi potest, & solis clysteribus, vt antea dictum est, peritumque expurgatur. Illa autem medicamenta, pri- mam tantum regionem euacuata, & ex benignioribus eligenda sunt, vitando vehementia, immo etiam mediocria. Atque adeo vlturari tuto poterant cassia, manna, tamarin- di, styracis rosaceus, & de cichorio compositis. Vix- que licet ad leniam, & rhabarbarum transferant, aut saltem non nisi in exigua quantitate, maligna vrgente cacochymia, ceteris permiscere. Horum medicamentorum formulæ in febrium putridarum continuarum curatione, & purgatione in principio earum insituenda, propostæ sit.

Enemata vero non solum in morbi principio, ad pri- mam regionem ab excrementis liberandam; sed etiam to- to morbi decursu vlturanda sunt, si alius sponte non fluat, idque singulis, vel alternis diebus. His enim quotidiana excrementa educitur, & quædam materię morbificę por- tio sensim detrahitur. Tum etiam humores partes vt gen- tes ad contraria loca, eaque nature consentanea, retrahuntur. Hæc autem enemata ex decocto emolliente ac refrige- rantem componenda sunt, aditus laxantibus benignioribus acris enim & diagydiata nimium irritant naturam ad ex- cretionem & læpe alui fluxus perniciosos inducunt.

Immo vero lætus est nulla purgantia in vigore morbi enecatui admiscere, ne alui fluxus excitetur, qui huic affec- tu frequentissimus est. Ita vt potius fomenti interioris rationem obtineant, quam remediis laxantibus.

Quod si alius in morbi decursu liquida appareat, non, idcirco ab enematis abstinendum, sed modice detergentibus & refrigerantibus vtendum. Et in iulepis dissoluendum est syrupus granatorum cum puluere coralli preparati.

Dum prædicta remedia in viam vocantur, febrilis caloris, putredinis, & maligne qualitates correctioni incumben- dam est remediis frequentibus.

Ac primum iulepis alterantes in febrium putridarum cõ- tinuarum curatione propostis erunt conuenientissimi, ex decoctis præcipue rad. acetos. cichorii, graminis buglosi, lapathi acuti, sol. endiuæ, cichorii acetos. pimpinellæ, cap. ven. tamarindorum. Quib. addenda erunt, quæ pro- prietate specifica venenatam qualitatem oppugnant, alexipharmaca vulgo dicta, vt tadsces pentaphylli, tormen- tillæ, carlinæ, sol. scorod. card. benedict. icabiolæ, scorzonæ, vinarie, flores calendulæ, & vetonica rubra, fusilla limonis, aut citri & limonia corandem: cortices pomorum todolentium, ralsura cornu cerui &c. cum syrup. de limonibus, granatorum, acetolo simplici de succo acetos. & oxybaccaro. In istis frequentius acida medica- menta, vt succus mali citri, vel limonis, spiritus sulphuris, aut vitrioli admiscenda sunt; putredini enim, & venenatæ qualitatē maxime resistent.

De malo citius refert Athenæus, in Aegypto quondam homines morte damnatos, feris expostos, ab aspidibus quondam demoritur fuisse, & nihil inde damni perperlos: eo quod cum ad supplicium decerentur, quædam muliercula commiseratione ducta, cicera poma ad refectionem, & siqua

Ecc 3 conq;

compescenda, illis edenda obtulisset: quibus assumptis nihil a lethali virulentarum bestiarum ictu uox preleserit. Omnes autem mali citri partes vni quamdam alexipharmacam obtinent: ideo vititer in talescat dilectum cum rad. & herbis prædictis ad iulepos conficiendos decoquitur, & præterea vititer aque potus ordinari infunditur, æquagranit ad cortice, & aciditatem a lacto coëliat quamvis solus succus refrigerandi facillate prædictus sit.

Spiritus aceti sulphuris, & vitrioli a Chymiatris præcipue lumenis effertur ludibris. Et præstantes eorum dotes diutina experientia comprobare effecerunt, vt apud Galienos iam diu recepti sint, ac communiter viarpari. Vt verò pateat, quanto in periodo apud priores habebatur, sufficit nobis vniu Mundereri verba hic in medium afferre, quæ habentur *cap. 15 lib. de pestilentia*, vbi de spiritu vitrioli, & sulphuris alijs: ea sulphure paratis medicamentis agens: *Nulla inquit, est potestas, cuius vis non fragrantia nulla infestio, quam non superet: nulla humorum deprauatio, quæ per se non superetur. Sanè ut liberrime loquar, si mihi vis vitriolatum medicamentorum usque vel interdueretur, vel inleberetur, ego ad pestis curatorem nunquam, vel saltem, infero accedere.*

Iidem iulepis interdum addi potest sal prunelle quod poterit refrigerat, & febrem aliorum extinguit: habetque præterea vni quamdam diaphoreticam, cuius ratione febris, si maligna vitilissimè accomodat.

Iuleporum loco pro delicatioribus interdum substitui poterunt iucula medicata, æ folijs borraginis, acetosæ, pimpinellæ alijsque herbis gustui gratioribus cort. pomor. redol. pulpa, & acido citri, cum pullo galinaceo, inique sal prunelle ad magis refrigerandum interdum addi potest.

Emulsiones etiam purari poterunt æ amygdalis dulcibus, sem. trag. mai. cum decocto iuleporum. Et ad maiorem qualitatē venosæ oppugnatione, feminibus prædictis addi poterunt semina citri, napi, & card. benedicti. Ad laporis verò gratiæ, stypti prædicti admisceri poterunt.

Toto autem morbi decursu alexipharmica viurpanda sunt, non solum iulepis, iuculis, & emulsionibus permixta vt antea dictum est, & iam viderat dectur: sed etiam in alijs formis comminara. Quia verò non omnia indiscriminè viurpanda sunt, nec quolibet morbi tempore, vt eorum vñus legittimus probè distinguatur, in quatuor classes distinguenda sunt. Prima continet ea, quæ præter speciem qualitatē quæ venenis testibus, frigida & sicca sunt ac modicè astringunt: sicque putredinem cohibent, cor firmant & roborant, venientium coercent, nec tam facili in totum corpus diffundatur, partiumque dissolutionis compressione quadam obstitunt, vbi volus atrena, terra sigillata, corallus, radia pentaphylli, tormentilla. Secunda comprehendit ea, quæ frigidiore sua, & substantiæ tenuitate putredini testibus, & malignitatem coercent: vt succus limon. spiritus sulphuris, & vitrioli, tum acida omnia, & ipsum acetum. Tertia comprehendit calida, & diaphoretica, quæ venenosæ humores & vapores a corde capellunt, eosque a centro ad circumferentiam educunt: vt angelica, cōgeoliz, dictamnium, vlmara, scordium, cardus, beuedicius, scabiosa, theriaca, nixthridium, aqua theriacalis. Quarta denique continet ea, quæ specifica vi, sine vilo putramur qualitatē, & cessis, venenatam qualitatem oppugnant, vt lapis bezoardicus, coniu ceta, & monocrotopus, itochili viperini, & finitima.

Prima, secunda, & quarta classis remedia in principio, & augmento magis conueniunt. Terme vero inflatu, & declinatione. Maxime autem varianda sunt hæc medicamenta, & miscenda, pro vario malignitatis, aut putredinis gradui pro varia febris intentione, vel remissione, & vario ægrorum tempore, tempore, lexi, ætate, alijsque circumstantiis, quarum decilio ex Medici iudicio atque prudentia tota dependet, neque certis regulis determinari potest. Hoc tantum admonemus, quod est notissimum: quando scilicet vehemens febris exardet, refrigerantibus, & acidis præcipue inhiendum calida verò & diaphoretica non esse exhibenda: quæ tamen maxime conueniunt, vbi febris remissior est, & maligna qualitas præcipuum facili negotium. Ex his igitur varia componi possunt medicamenta

pro arbitrio Medici curantis. Ne tamen tyrones eorum formulis omnino desistantur, nonnullæ hic subnectendæ sunt, ad quarum imitationem infinitas alias in rem præsentem conuenire poterunt.

℞. Rad. acetosæ buglossi, tormentilla, an 3. j. fol. endiuiz, cit. chorij acetosæ, pimpinellæ, an 3. i. amarindor. 3. j. Coquantur ad 1b. 3. In colat diluile syrup. de limon. & granat. an 3. i. 6. Fiat iulepis pro iudicibus, bis in die sumendus: addendo vnicuique dosi collect. de h. acinthe, 3. i. lapid. bezoard. 6. vi.

Hæc iulepi forma in lebris initio conuenire poterit. Ea tamen intentio admodum exalente, & temperatura corporis biliosa, addi poterit vnicuique dosi falis prunelle 3. v. vel spirit. sulphuris aut vitrioli q. i. ad moderatam aciditatem, vel vtrumque simul. In febre verò noui admodum intentia, addi poterunt decocto radices carling. & pentaphylli, tolia (scordis) & scabiosa.

℞. Amygdalæ dulcor. 3. i. sem. melonum, cucurbitæ, napi, citri & card. bened. an 3. i. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo decocti iulepi prædicti 1b. 3. syrupi de limonibus 3. i. i. i. falis prunelle 3. i. Fiat emulsiō pro iudicibus bis aut ter die sumendus.

Toto morbi decursu vititer æger in iuculis, confectioe ne hyacinthi: vel puluere sequente gustui non ingrato.

℞. Coralli præparati, margaritarum præparat. rasuræ ebors, cornu ceti, & lapid. bezoard. an 3. j. Mice Fiat puluis de quo detur 3. scum singulis iuculis.

Nouatores hodierni, gemmas, margaritas, corallium, & omnia cardica in vniuersum ab vñ medico proscribere conantes, & febres omnes ætatem malignas, sola venesectione, & apotematibus simpliciter refrigerantibus curantes: hoc saltem experimento circa corallium, & margaritas conuincunt: quod si in puluere tota, si in aceto, succo limonum, aut spiritu vitrioli, aut aqua forti infundantur, omnem horum liquorum acrimoniam tollant. Vnde videre est eadem medicamenta minus assumpta, humorum acrimoniam, & malignam qualitatem demulcere, & ad moderatam reducere. Quia igitur nonnulli perierunt aut corallorum in succo limonum, aut aceto destillato factas degustarunt, hoc probe norunt.

Vbi maligna & venenata qualitas plurimum viget, alexipharmaca in iulepis, iuculis, aqua potus ordinari, & omnibus quæ assumuntur exhibenda sunt: vt alioquin & indefinenter conflictu infensus hostis oppugnetur.

Lapis bezoardicus solus ad gr. v. vel vj. exhibetur cum aqua vlmariæ, coronetæ, cardui bened. aut alia consimili, non solum ad malignam qualitatem oppugnamdam, sed etiam ad diaphoreticam adiuuandam: virtute siquidem sudorifica pollet hic lapis vulgo creditur. Quam tamen, probati Auctores non pauci in dubium reuocant, quod nullum febrensiu effectum ex lapidis illius exhibitione videre poterunt. Et certe (vt ingenue fateat) non potest magna fiducia huic lapidi adhiberi, quandoquidem etsi verò æ genuino lapide bezoardico ex facilius concedatur, quæ illi adhibentur: quia tamen magnus illius pretium est, vt quamplurimum propale in eo adulterato strenuam, operam inuenerint, vix alios quam in adulteriosis hodie habere possumus. Cuius rei testimonium iuculentum inde elici potest, quod rerum indicarum scriptores resistentur lapidem bezoardicum apud ipsos Indos rarum, & magni pretij elicum apud nos tamen magna copia, & satis vbi pretio repenatur.

Maiores fides haberi debet radici illi, quæ nostro seculo ab Hispanis ex India aliata est, quam contraygerum nōminant: quod vocabulum herbam alexipharmacam significat: quoniam illius puluis aduersus venena præsentissimum est remedium, æque per sudores, aut insensibilem transpirationem euacuat. Illamque plantam exultant, aut commune esse alimentum, quo animalia la piden bezoardicum generantia veluti conuenerunt, ex eaque præcipue vñ alexipharmacam tribuit lapidi bezoardico. Radix huius puluerata 3. j. vel 3. ss. exhibet potest, cum aqua cardui bened. aut alius medicamentis permisceri.

Mundero puluerem sequentem prædicat.

℞. Sacchari candidi 3. i. 2. ynzab. albi 3. i. 3. camphoræ 3. i. Fiat puluis.

pulsus, cuius dosi 3. i. cum liquore idoneo. Monet verò idem Autor, in magnis capitis, & ventriculi doloribus cautè esse vitandum camphora, quam tamen maxime commendat in morbis pestilentibus, & temperatè datam plus prodesse afferit, quam vel pretiosa quorundam medicamenta, bezoardica. Huic pulveri calidiorem censo ratione vim aëboris, & ad illius rationem frequentem compotus quo vim fœlicis efficitur.

℞. Bezoardici miner. 3. ii. falis prunellæ 3. ii. camphoræ 3. ii. Melle. Dosis 3. i. cum aqua card. bened. aut alio liquore idoneo.

Ex fragrantis pretiosisque pulveribus concinnari possunt quorum tamen vires multi videntur, alias suscipiunt, vidè ab Aristum temporibus vique ad nostram ætatem, & varis compositionibus officinalis ex ipsis paratis inveniuntur, vt electuaria de genibus, & confectio de hyacintho. Verum in morbis venenatis sinaragum insignem vim habere prædicant nonnulli, inter quos numerandi sunt Aëzoar, Mindererus & Zæcus Lusitanus. Aëzoar 3. i. res. trait. 4. 5. relet scilicet ex veneno laborantem, hoc solo remedio hille curantur. Mindererus lib. de pestilent. cap. 15. narrat le mulieri febre pestilenti corripæ, quæ omnia remedia auerfabatur, pulv. rem. lequens exhibuit, quem sine odore, vel sapore transiit, ut potenter quæ alium pro abactis fructum symptomatum iudicioribus, & in salutaris promptus conseruit morbo venenali.

℞. Sinaragi præparat. 6. d. card. dion. ana gr. vi. acinthis præp. gr. x. Melle. Fiat pulvis pro vna dosi.

Zæcus vero Lusitanus ℞. 3. ii. lib. p. ac. 2. i. dion. ana, relet nobillem quandam Lusitanum, tumore aui fluxu ex veneno assumpto laborantem, & in tabern ueductum, & quo affectu nullo abitergentium, & attingentium, & alexipharmacorum vii liberari poterat: totu sinaragi visu curant, iussit, cuius pulv. rem. humbat in coctura cydoniorum alterius diebus ad gr. x. & cum quinquies lumpsit, & fluxu immuniti euasit.

Medici Moniplicentes vtuntur in hac febre, tanquam alexipharmaco valitimo, vniua calicendi vi prædicto, trochiscis viperinis, qui ad collecti venæ theriacæ vulgò concinnari solent, colque exhibet a 3. a ad 3. 6. cum aquis cardiacibus, vel iulepis.

Melior tamen foret caro viperina effuscata, nulla venenola qualitate prædita (vt vulgò creditur) potius virtute alexipharmaca potenter, quam vi decoctione multum immunitur ad trochiscos enim parandos in aqua decoquitur. Ideo præstantiores effectus obseruamus ex corde & hepate viperarum, sola effuscata præparatis.

Tertæ classis alexipharmaca, quæ nimirum diaphoretica & sudorifica sunt, nonnulli in statu morbi, aut declinatione (vt antea dictum est) exhiberi debent. Quod quidem intelligendum est, dum in febre maligna simpliciter, & purpurata viurpantur: nam in vera peste ab ipso morbo initio viurpanda sunt, vt venenata qualitas breui hominem augatur, citò & potenter oppugnetur, malignæque vapores discutiuntur. In vno vero in maligna simpliciter, si venenata qualitas putredini præualeat, videtur, etiam à principio exhibenda sunt in minori dosi: ea eligendo quæ minori calefaciendi vi prædita sunt, & permiscendo iulepis, aliisque medicamentis refrigerantibus supra propofitis.

Horum autem medicamentorum diaphoreticorum varij sunt gradus. Alia enim calidiora, vt angelica, zedoaria, dictamium, theriaca, mithridatica, aqua theriacalis. Quæ quidem nunquam exhiberi debent, quando febrilis ardor maxime viget, sed tantum eo plurimum retensio, & malignitatis signis valde prævalentibus. Alia vero minori caliditate prædita sunt, vt scabiosa, cardus benedictus, vlmæra, scordium, quæ tutius etiam vigente febre administrari possunt. Et hæc in vi prædicto maxime distinguenda sunt. Quod ad formulas spectat, vniuersales eas variare possit, pro vario caloris febrilis, & malignitatis gradu. Nos tamen eas, quæ maioris efficacie et effusissimas, his describimus.

℞. Aquæ vlmæriz, & card. bened. ana 3. ii. succi limon 3. i. theriac. vet. 2. 6. ii. vel 3. a. pro vi maior, vel minor calefaciendi metus est, Melle. Fiat potio, sumenda tepide, corpus te-

gendo paulò plus folio. Si magna sit vehementia symptomatum, recens theriaca magis conueniet, propter vires opij adhuc in ea vigentes, quarum ratione vehementia symptomatum temperabitur, & humorum effusio cuncta coarctabitur: in vno vero interdum quando vires theriacæ non videntur idoneæ, præcipue in morbi principio, vel augmento laudantur opiatum ad gr. x. exhibentibus alexipharmacis permiscendum multum prodest. Illius enim virtute narcotica & congelante, feruentis spiritus cordi infestissimi, figuratur qualis & materia moribunda, quæ dum est in fluxu, perniciosissima est) sinitur ac penè humoris manet. Vnde contingit, vt natura à malignis humoribus, & spiritibus non lacerata, recoleat, & in viribus, alexipharmacorum virtutem facilius sibi applicet.

Aqua theriacalis ipsi theriacæ præferenda videtur. Cum enim tenuissima & valde spirituosissima sit, facilius citiusque penetrat, totique corpus permeat, ac sudores proficit. Quia vero plures habentur illius descriptiones, varia eam dosi esse debet, propter vires magis, vel minus calidis medicamentis composita est. Nos præcipuus hic proponemus.

Ac primum aqua theriacalis Baudouini præstantissima est, vt pote valde temperata. Non enim alium recipit liquorem, quam acetum & iucum limonum, quibus calidè ingredientia valde temperantur. Ideoque ab 3. 6. ad 3. i. exhiberi possit in aquis vel decoctis indorificis. Quamuis tamen præceptis præ cæteris quæ à variis Autoribus proponuntur, hæc minus calefaciens est, & pos tamen aliam excogitamus paratam, facillimam, quæ maiori refrigerandi vi prædicatur minus f. brem, quam malignam qualitatem oppugnet, sicque toto morbi decursu, & in quocunque illius tempore viurpari valeat. Eiusque compositio talis est.

℞. Limones recentes & succulentos no. xii. Cortices & femina eximantur, succus exprimitur, & aquæ cortices prædictos, & feminas succi cordii 3. ii. succi acetosi, rutæ caprariz, scabiosæ, & card. bened. ana lib. i. raturæ cornu cerui 3. i. v. theriacæ veteris 3. i. v. Cortices limonum in tenues laminas diuidantur, femina contundantur, & herbe, quæ minus habent succum, inter contundendum quous limonum irrorentur, omniaque defillantur in B. M. Huus aquæ detur 3. i. per se, vel cum aliis liquoribus permixta.

Aque theriacales calidiores sunt cum vino albo, aut spiritui vini, & quæ caustius & in minori dosi exhibentur, magis tamen penetrant, & sudores mouent, ac præcipue in vera peste locum habent. In certis tamen casibus à Medico prudens in viam vocari poterunt. Ex variis earum descriptionibus nos duas insigniores hic proponemus.

℞. Rad. angelicæ, carlinæ, gentianæ, tormentillæ, zedoariæ, cornu cerui, ana 3. i. trumfantur ana 3. 6. theriacæ 3. i. iii. camphoræ 3. i. Contundantur omnia, & infundantur in vini albi generosi lib. ii. in loco calido, per triduum. Deinde defillantur in B. M. & aqua feruetur ad vsum. Dosis erit a 3. i. ad 3. 6. iulepis refrigerantibus addendo spirit. vitæ, ad inflammabilitatem illius corrigendam.

℞. Spiritus vini opt. rectificatus lib. 5. theriacæ vet. Vnc. vii. myrrhæ electæ Vnc. iv. croci Orientalis Vnc. i. camphoræ Vnc. i. Infundantur per 24. hor. in B. M. Postea defillantur in eodem balneo, & eliciatur aqua fumme efficax.

Chyma bezoardica sua miner alia valde prædicant, quod sudorifica aut saltem diaphoretica sunt, nullam tamen calefaciendi vim habent: idque probare contendunt ex insipido eorum sapore, ratione cuius etiam delicatioribus quibuscumque aëroantibus & ingrata medicamenta respiciuntur facile possunt exhiberi. Laudant præterea illam quam vocant mixturam simplicem, vel mixturam spiritalem, ex aqua theriacali camphorata, spiritui tartari & vitrioli compositam, cuiusque Drachi iulepis, aut potioribus alexipharmacis admixtæ.

Medicus febrium malignarum curationi incumbens, varia in promptu habere debet alexipharmaca, & quæ per vires immutare, ne natura vii & eadem assidue viurpato, nimium allueat, illiusque vires contemnat. Adde quod non vna & eadem semper est veneni natura, sed pro varietate, & corporum admodum diuersa: ita vt quod vii proliet, alteri non conserat, Ideo possunt per aliquod tempus

uno vñs fuerit alicuius pharmaci ad aliud & aliud transire erit vitiosissimum.

Dum prædicta diaphoretica viſurpantur, si quando eorum operationem augere est animus, vt potentes venenæ ad superficiem corporis educant, externa quædam remedia possunt admoventi: nempe cucurbitula, cum sicce, tum scantificata plures & plures admoventes & vesicatoria, de quibus antea dictum est, quæ in statu morbi præsertim maxime conveniunt, & quo tempore sudorifica medicamenta exhibentur, ac etiam oil. corpon. Matthioli, quod ab omnibus prædictis multum commendatur; virus enim in profundo corporis reſidens ad exteriora evocat. Idem corporis emunctoria, vt inguina, & axillæ: tam etiam pulsus temporum, manuum & pedum, hoc oleo calente frequenter inungi debent: nempe ter, aut quater in die, vel etiam tertia quaque hora. In huius olei penuria parari potest linimentum ex theriaca succo limonum diluola, addendo croci & camphoræ tantillum.

Si quando natura veneni malignitate oppressa, & quasi densata nihil prorsus agere, sed vñs quodammodo maribus collum submittere videatur, fortissima quæque diaphoretica, etiam maiori doſe exhibenda sunt, vt conſternati cordis vires, quasi flumibus quibuldam concitentur. Tumque aquæ theriacales, aut bezoardica potentiora & maiori penetrandi vi prædita, quæ etiam addita camphora plurimum intendi poterit, viſurpanda sunt. Externis verò tunc temporis foras loquens assumptorum vim mirifice iuvabit, malignorumque vaporum diaphoresim promovebit. Hæc enim methodo non pauci ab Orci, confinio liberati sunt.

Rad. angelicæ, & gentianæ, ana ʒiij. sol. mellis, origani, cordi, ana M. iij. card. bened. ʒi. flor. chamom. verbasci, milloli, hyperici, centaury, minos, flechad. anthos, & calendulæ, ana P. ʒi. Fiat decoctio, addendo sub finem parum vini albi, qua foveantur pedes, inguina, axillæ, & latera, calidè cum spongia.

Silique siccatas, ariditas & alia febrem aquæ prævalere, ac malignam qualitate offendunt: hoc foras abluendum est, & illius loco gallina per spinam diuisa, vel pulmo, aut unguentum veruicis recenter madari, ventri admoventur.

In toto curationis decursu virtutum ratio maxime habenda est, quæ venenata qualitate valde deſcendunt. Eaque fulciantur primò iulculis conveniuntibus ex decocto caponium paratis, quibus, urgente necessitate, iure carum thelaxina addi poterunt, ac præcipue aqua caponis per deſcensum in B. M. parata, vt hodie vulgo fit. Confectio de hyacintho in iulculis vires recreat, & malignam qualitate oppugnat. In iſdem iulculis gelatina cornu cerui utramque etiam indicationem implet. Labentibus omnino viribus ad conſervationem alicuius licet conſurgere, modo febrilis calor non vehemens vigeat. Ac denique vinum omnium cardiocorum potentissimum est, de cuius vi in hoc morbo, supra in victus ratione actum est. Solus vñs odor vires admodum recreat, & multo magis frustulum vini affatum iu vino odore, & aqua rolarum neceratur, ac patibus oblatum.

Tum etiam confectio alicermis, & de hyacintho porioſus alicerpharmacis admisceri solent. Vel in maxima virium imbecillitate potiones merè cardiacæ conneſcuntur possunt in hunc modum.

ʒ. Aquæ naphæ & roſar. ana ʒi. iij. confect. alicerm. ʒi. iij. rupti de pomis ʒi. iij. succi limon. ʒi. iij. Fiat potio. Si febris non ſit intensa, aqua cinam. ad Drach. vi. in ipsadi poterit, & interdum ambra grisea ad gr. v. vel viij.

Necque tamen in maxima virum ruina, calida illa roborantia tantopere metuenda sunt, vt febri augmentoni forſitantes ægrum ab imminenti mortis discrimine liberare nolimus: quandoquidem vngentioris perpetuæ maior ratio habenda est, & reſectis aliquantulum viribus, quod roborantia calida plus æquo inflammantur, refrigerantibus validis, vt sale prunellæ, & spiritu vitrioli, in iulepis & potu ordinario permixtis possimodum contemperari poſſit. Hæc methodus à prudenti Medico obſervata, non solum in roborantium, sed etiam alicerpharmacorum & sudorificorum calidiorum & exhibitione feliciter succedit.

His accedent epithematum, & animalium applicatio regionis cordis, foras genitalium ex conſeſione alicermis in vino diluola, sacculi ventriculo admoventi, & alique tum interna, tum externa remedia in afflictoſis cordis, & de viri imbecillitate paulo ſufius à nobis deſcripta.

Quod ad epithemata spectat, in his cautio adhibenda est. Sequidem Auctores quamplurimi vñs eorum reſciunt, quod ex refrigerantibus, & repellentibus componi ſoleant, aquas nimirum herbarum frigidarum & acetosa quibus venenata qualitas ad cor repercutitur, illi quæ diaphoresis, quæ perpetuè adiuuanda eſt, impeditur. Verum ratio hæc vñs epithematum, nequid impedire, cum ea ex aquis cordialibus & diaphoreticis, nulla quæ aſtringendi, aut repellendi vi prædita, & fimo acet. (quod tamen multi admittunt) componere poſſimus, additis cardiacis, iſque simul iunctis ſicut epithemata, non solum cordis robur ſuſtinentia, sed etiam poros cutis aperientia, vt per eos maligni vapores facilius tranſpirent. Huiusmodi epithematum exemplum tale eſſe poterit.

ʒ. Aquæ. scabioſ. & card. b. n. an. Vnc. iv. aquæ naphæ vnc. i. confect. alicerm. ʒi. iij. pul. elæ. & diamarg. ʒi. i. croci, & camphoræ an. gr. vi. Fiat epithema, applicetur regionis cordis tepidè, frequenter.

ʒ. Conſect. alicermis vnc. iij. sem. pul. elæ. triaſant. & diamarg. ʒi. an. ʒi. i. sem. aquæ naphæ parum. Fiat linimentum applicandum eidem parti poſt vñs epithematis prædicti.

Epithemata etiam hypochondriis admoventia, hic etiam omittenda non ſunt, propter rationes in febrium putridarum curatione circa eorum vñs propoſitas, quorum etiâ materia inde deſumpt poterit.

Deuſta tandem remediis prædictis maligna, & venenata qualitate, remiſſa quæ febre, de morbo ad declinationem vergente, coſtioniſque ſignis manifeſte apparentibus: purgatio inſtituenda eſt, quæ ægroſant viribus conſtitutioni, à Medico exercitatio aptari poterit. Nos in tyronum gratiam vñs exemplum hic propoſcimus.

ʒ. Senne mundat. Vnc. ʒi. sem. anſi. ʒi. i. ſol. ſcabioſ. & ſcordi. an. M. iij. an. ʒi. i. Drach. iij. Coquantur ad Vnc. iij. colat. diſſolue rhab. in aqua bugloſi cum ſantalo citrio infuſi ʒi. iij. manne & ſyrupi roſar. ana Vnc. i. Miſce. Fiat potio.

Neque verò vñs purum in morbi declinatione & ſtatu conſueſcentia, vñs purgatio ſufficit, ſed ea non raro bis, terque per intervalla repetenda, vt præci humores ſundius eradiceantur. Alioquin periculum eſt recidive, aut ſaltem ægroſi longè tardius conualeſcant. Quia natura, eſt ſtatis potens ſit illas materias morbiſice reliquias contere: ad tamen non niſi multo tempore præſtare poſſet, & interim corpus præſtillum robur tardius recuperat.

Ad integrum huius eragationis complementum, ſuperſeſt tantum, vt de correſtione ſymptomatum, quæ hinc morbo ſuperuenire ſolent, aliquid dicamus. Eorum autem curatio eadem prope modum eſt, quæ ſeſt. ʒ. huius tract. ʒ. i. iij. propoſita, vbi ſymptomatum febres putridas comitantium curationes tradimus. Et ſi alia ſymptomata cum ſiſque febribus malignis accidunt, eadem ſerè ſunt, per magis tantum & minus differentia: Idem eadem remedia in vñs morbo iſs aptari poterunt. Nos tamen in hoc loco, quæ frequentius à nobis in febrium malignarum ſymptomata edoſandis viſurpata ſunt, quæque magis proſeque, paucis annotabimus, ſimulque morborum huius febrilibus ſe per venientium curationes propoſcimus.

Ac primum in dolore capitis, vigiliis & delirio conueniunt in principio reſtelleſta omnis generis, vt perſe venarum inferiorum, & hæmorrhoidum; & ſylſteres emollientes, ſiſtiones partium inferiorum, cucurbitulæ primò ſitis poſtea dorſo, & ſcapulis admovent, tum ſicce, tum ſcantificatæ & vesicatoria, quæ in delirio ſimplici, à materia biliſa excitato, brachis & ſemioribus erunt admoventia. Si vero cum delirio ſopor & ſomolentia adſint, etiam ceruicæ deinde repellentia fronti admoventia, & ox. rhyodina, de quibus hoc notandum, eſt minus conuenire in febribus malignis, quam iu putridis ſimplicibus; quia venenatorum vaporum diſſilatio omni arte procuranda, non autem intus retinenda. Ideo leuiora prius repellentia admoventia ſunt, & de venientia.

lementia dictorum symptomatum ad fortiora confluere
nos cogat, diu non sunt vituperanda.

Inter repellentia leuiora recentetur frontale commune, ex flor. nymphaeae, violae, & rolar. sem. frig. mai. & granis alkermes, vapore aceti irroratum. Quod si non sufficiat, frequens admochebitur.

& Vuguenni populei Vnc i. conferuz rofar. & violar. an.
Vnc. sem. ol. rofacei Vnc. vi. acet. rofac. Drach. ii. Misceantur
omnia, & excipiantur stupis pexis, & duobus lincis
inclusa fronti applicentur.

Interea emulsiōnes quatuor sem frigida, mai viurpatri poterunt; a quibus vapores frigidi, & benigni ad cerebrum transferri, & dicta symptomata demulceri solent. Quae si non sufficiunt, narcotica addentur, quae acutum, & malignum vaporum ascensum ad cerebrum mirum in modum prohibent, & conuulsus concitant. Ea tamen parua, doxi viurpanda, vt syrup de papau §.vi. Vt virgente necessitate laudari opati gr.ii. cum conserua rolarum vtiliter exhibebuntur: vel in sulpho, quo dissoluentur, vel illius loco theiaca recens ad ʒ.ss. Haec tamen narcotica raro, & in parua doxi viurpanda, quia venenum concentrant, quāvis ludicriosa & nonnullis habeantur.

Polli repellens per vium, aut alterum diem viisurata, ad deservantia veniendum est, inter que recensetur viciatiorum ceruici adnotum, de quo supra, qui addenda est scilicet vena frontis: ex caque detrahendus est sanguis ad x. vel vi. et facilius succedit, dummodo sufficienter anrea per venas brachij lumbi detrahitur haerit. Affligant etiā hirudines ponte aures. Quod remedium vite quidem est, sed proxi minus effax, quia per hirudines tenuissima lumbi sanguinis pars educitur, cum per venam frontis aliquando in phrenetide sanguis impior, et magis corruptus educatur, quam ex vena brachij. Tandem in statu phrenitidis, aut de inclinationis principio, refolescentia admoventur, præcipue verò animalia, aut eorum partes, ut pulmo veracius, qui pullis columbinis, et catellis commoventur est, eo quod totius ferè caput molliter amplexitur. Hæc autem animalia humores noxios in cerebro contentos partim resolvunt, partim concoquunt atque maturant, ut natura postmodum eos facilius expellat. Male de monnullis in principio phrenitidis admoventur, quia calorem augendo, fluxionem ad cerebrum magis promouunt, et delirium intendunt.

In huius inflammatione, siccitate, & nigredine conueniunt remedia dicto loco propofita, præfertim ea quæ ex aqua, vel lacte femperuius & tale prunellæ compofita funt. Quibus fequens ex Minderero addi poterit, quippè quod maxime conferre experientia docuit.

3. Butyr recens in aqua rosar. loti 3. ii. falsis prunellae 5.4. Millec. & leuocur in aqua frigida. Detur pisi, vel fabae in macinatum sepius in die, & diu in ore detineatur. Curationes probe succedentes signum est, si fuligo atque decedat, lic lingua rima deficiens huic medere incipiat: si ficque cutis remanet, tanquam excoriatae decedat, ita ut vel laucium tumentia agri liceatur cysicare. At tum palatum doluit, & tenuissima curcula quae conuelliur, ob teneritudinem vix quicquam ferre potest, sed leui acore, & vix perceptibili cor rhombia offenditur: quod cum praegrela inflammationis signata adhuc ferat, nona pelle vitendum, ac sic perimus & reingrandum; & perianandum occurrit. Huic vix conuenientissima erit sequens galatina.

Lac calens gar gatzatum lenit inflammationem temperat linguam & fauces humidat, & venenum attrahit.

Pilaie fequentes commodè vlturari poterunt.

¶ Sem. cucumer. mundat. & contuf. ꝑ. gummi tragac.
abyſſinimē puluerat. ꝑ. albuminis oui q. i. Formentur pilu-

z, quas teneat in ore frequenter. Vel

4. Sem. cucurbitæ, & melon. mundat. & papæ. albi, ana
i. i. liquor. & tragacanth. ana ʒi. ʒ. Contundatur & pulve-
rentur, cum mucilag. sem. cydonior. extracta cum aqua
rosar. fiant pilule in ore detinende.

Quia vero hæc lingua inflammatio, siccitas, & nigredo ex interno incendio procedit, ad illius extinctionem convenienti iulepi valde refrigerantes, quibus addetur sal prunellæ, & spiritus vaccioli. Tum etiam in aqua potus ordinari eadem permisceri poterunt.

Situs intensissima curatio dicto loco sufficienter fuit propo-
sita. Sed in febre maligna feliciter extinguuntur duobus
remedijs proximè laudatis, nempe sale prunellæ, & spiritu
vitrioli in iulepis aqua potus ordinarijs.

Insuper, in capite, vultu, vultus, et lingulis curationes ex dicto loco delumendum sunt. De vomitu tamen hoc addendum, cum interdum febre maligna correptos ita diuocet, ut omnia iniecia in terra rejiciant, et quamvis fides, et linguis ficitas. Si nigredo adfuit, nullum tamen potulentum materiam genus ferre possint: sed omnes iulepos, emulsiões, pituias, et aquam etiam simplicem flatum post aliamptionem euocant. Huius symptomati gratissimum flatum, medetur, quasi miraculo, (si abfingit) ad 5 i in fucci lim, recensius cochlearis exhibui. ut experientia didici.

Alii fluxus in hoc morbo frequentissimus est, in eoque Medici prudentia valde necessaria est. Si enim cohibetur propellere, materia venenata intus retinetur. Si vero non cohibetur, vires deiciat, ægrumque non raro ad interitum ducit. In illius curatione ita procedendum. Si ita moderatus sit, vires non deiciat, cohibendus non est, sed clysteribus roborantibus tantum moderandus. Si verò immodicus sit, et vires admodum deiciat; colligatus esse conficiat, et auctetur cohibendus; quod lumina efficacia præstat herbæ veli. Accedat ad 3.æ vel laudanum opium ad gr. ii. vel iii. Scipæ tamen obstrictus, alii fluxum permittimus, ex quo æger ad interitum rucce videbatur, ponitur diaphoretica magna dosi exhibitis, quibus mome- ro cohibuit fuisse, lugum scilicet veneno, quod interitina aiaqvisera vellendo, fluxum illum syncretis cohibeat.

Lumbrihī hoc morbo laborantes capiffimē infestant, & ex lumina humorum putredine copiosi generantur. His ex corpore edacendis Conueniunt clyfferes dulces, & potiones contra vermes, præcipuē quæ ex decocto fcorchi parantur. Siquidem fcoridium ad verus malignitatem & lumbribus æqualiter confert. Vt autem illis caliditas temperetur, cum portulaca, acetofa, & cornu cerui decoqui poterit. Tum etiam cornu cerui vitum vtiliter decoquetur. Siquidem Furcillus ex fcorchio & retiaur, nullum remedium, æque profuiffe febre maligna laborantibus, in quibus lumbrihū copia & alui fluxus aderat, ac cornu cerui vitū, cum iulepis idoneis ad Drach. i. exhibitur.

Quando maligna, & venenata qualitas in hisce febribus valde predominatur, vt ad peltulentum proprie dictarum naturam accedat, in ijs plerumque sunt paronides & carbunculi. Eorum ideo curatio hic subiectenda est.

In parodis principio, quamprimum illa appere incipit, pars recipiendi laetanda, si tumor legniter increvit, attrahentibus admotis, & alexipharmacis, ac diaphoreticis exhibitis, naturæ ad eas partes materiam morbosicam expellens motus adiuvandus est. Ad partem laetandam siue infectio ex vnguento de althea, admoat postmodum lana succida. Atteratro fiet admotis carulis, aut pulvis columbinus, quibus etiam dolor temperabitur. Validius attrahunt emplastra ex fermento, cancis, cepis, columbino flectore, addendo butyrum, panguedinem gallinæ, axungiam suillam recentem, & ol. liso. vel amygdal dulcium. Si attrahentibus hiæce pars nimium calefacit, & dolor nimis intenditur: hæc eorum intermissio per intervalla, admoventium interim cataplasmata de mæca panis, aut olea prædicta, lana succida excepta, vel vnguentum de althea, vi supra. Et quia pars vni est capax materiam morbosicam sufficienter recipiendi: ad portionem illius demandandam admoventium est vesicatorium posteriori parti cuticulis, simulque diaphoretica supra enumerata frequenter viutpanda. Evacuata materia ad partes exteriores, tenetur superparto, admoto cataplasmate ex rad altheæ, l. olei. cancis, farina lini, axungis, & oleis prædictis composito. Suppuratione facta tunc anteriori, reliquum materis concoquat, continuato cataplasmate, vel admoto emplastro diachyloæ. Vicus mundificetur digesti-

quo communi ex cerebriſtina, vitellis quorum & oleo roſaceo. Tum etiam viciuſ teneatur diu apertum admodum turundav: totum virus per illud ſufficienter expurgetur, & tandem ad cicatricem perducatur. Hoc tamen obſervandum, tumorem iſta creſcentem, vel periculum ſuffocationis imminuat, ante perfectam maturationem eſſe apertendum: ſic enim aliqua materia portione eſſuſa, tumor aliquantulum ſubſidebit, & ſuffocationis periculum evitabitur. Pari modo ſi intensiſſima ſit malignitas æger morbo ſuccumbere videatur, antequam tumor ad maturatam perſectiſſum ſit, apertendus etiam eſt ante tempus, ut veneni vis expret, vnde ſalutis ægri lubique non raro conſuevit. Hacque ratione in vera peſte bubones ante ſuppurationem aperti ſolent.

Denique ſilentio prætere neſciſ eſt miſigne experimentum, quod nati contigit in febre illa epidemica, quæ Monſpelii quæſitæ graſſata eſt anno 1633 ita vt media ſere pars ægrotantium interiit. Particulariter verò quibusdamque parotides ſuperſenſibant (quod ſolebat contingere circa nonnulli, vel viderentur morbi diſtincti) omnes iſtra biduum interibant: præterea, nec, aut eodem tempore accedente delirio ſupor, motibus conuulſiſ, & pulſu inæquali, frequenter, inmutato, & quali forſitanante. Cum autem plures huiſmodi vididiſſem, qui neque alexipharmaciſ frequenter adhibitis, neque attrahentibus porotidiſ ad motuſ iuſati porotidiſ animo reſoluitiſ, ſi qua via liberari poſſent, à tam certo exito: Tandem cogitare cepi, idem parotides febris hiſce ſuperuenientes finaliſ eſſe iudiciuſ, quod locus in quo huiſmodi non eſt capax totam maturationem morbiſuſ expiendi, quæ intus retentiſ opprimit ægrotantem, ac proinde opus naturæ inchoatum ſolummodo, euacuationibus ſuppleri poſſe, venæ ſectiōne ſcilicet & purgatione: cum etiam Gal. 3. de compoſ. medicis ſecundum ſitum, & de parotidibus, in earum curatioſe phlebotomia præſcribat. Verum huiſmodi indicationi maxime obſtabat ſumma virium inbecillitas, quæ tanta erat, ut iam veſtari ægrotantes viderentur in agone mortis, quæ etiam breui ſuccederet. Gal. vero ſic præſcribat: venæ ſectiōem in parotidiſ curatioſe, duas proponit conditioneſ, nempe ſi ad ſitum ſanguinis redundantiſ, & vires ſerant. Quæ conditioneſ hic omnino deſerant: præſens enim ſufficienter ſanguis detractiſ ſuerat, tum per phlebotomias iteratâſ, tum per cucurbitulas ſcarificatiſ: tum etiam maxima aderat virium ruina. Hiſce omnibus perpentiſ, autem hanc Cora. Celliſ ſententiâ, aliâſ inquam, hic maxime locum habere cenſui, multa ſcilicet in præſcripto periculo reſſe ſerui, quæ aliâſ eſſent omittenda, & ſatis eſſe æque remediaſ in vno, aut altero experiri, quam tot ægros certo exito reſolueret. Hoc etiam animo addebat, quod ſumma illa virium deſectiō ab oppreſſione magis, quam ab exolutione productâſ videbatur. Ideo enim lubidoſ vires coſuebant, quod aſtura non poſſet graue onus excutere, eſſeque inammutatam ſubſistentem in ſpectandâ fuerat. Adde quod phlebotomia iſta poterat miſuiſ, vel nullum inde periculum eſſe metuendum, ſi miſimum ſit, vel tres ſanguinis prima vice tantum educerentur, tentandâ gratiâ, & ſi riſe ſuccederet, maior deinceps quantitas detraheretur. Hac igitur via rem exequi placuit. Et cum mercator Monſpelienſis nomine Bernardus, primus occurreret, eique parotides, aut cum ſimilimar die morbi vindexima emperet, cum pulſu, aliſque ſymptomatiſ ſupra enumeratiſ: phlebotomiam præſcribo ad vnciſ in quantitate Chirurgiſ ſenex & priuſ celebrare reſuebat, meuenſ ne æger ad extremaſ redactiſ, in ipſa operatione expiraret: mea poſtmodum præſentia, & authoritate confirmatâ, ſanguinem miſuiſ ad vnciſ ſu. Tribus aut quatuor horiſ elapſiſ ægrum iterum inuſiſ, & pulſum paulo validioreſ inuſiſ, inmutatâ inſequentiſ. Iteratâ phlebotomia ad vnciſ. Pulſus inde multo melioriſ & reſuſ. Sanguis detractiſ admodum corruptuſ apparuit. Sequenti die propinquit medicamentum ex ſenna, rhab. & ſyrupo roſaceo. Sequæ æger à mortis conſilio liberatâ eſt. Omnibus deinceps ægrotantibus, quibus ſucceſſebant parotides, venæ ſectiōe primam, idque patetiſ ſi vicibus, & ſequentiſ die purgatiſ, me præſcripta eſſe ſequæ omneſ (Deo ſit laus & honor) quatuor hoc modo tractati ſunt, ſecundâſ: et euſerunt, neque viliſ amplius toto illo anno ex ſar viduſibus interit.

Aduertendum tamen eſt (quod in prognofi notauiſſimus) parotides ſepe citriſ, & viciſter apparere, & ex iſis ægroſ à morbo liberari quando ſcilicet in declinatione contingunt. Idque facile apparet ex remiſſione ſymptomatum, quæ illarum eruptionem ſoleat præcedere, & tales accidere ſolent in febris minoris malignitate prædictâ. At vero in prædictâ temporis conſtitutione tanta erat febris epidemica malignitas, vt parotides ſepe in ſtatu morbi, & ſymptomatiſ, ac lethaliſter empererent, donec prædictiſ remediâſ earum pernicioſa ſubſideret.

In carbunculo febris ardentiſ ſuperueniente, ſi ante illiſ apparitionem ſanguiniſ ſufficienter miſuiſ non fuerit: aut ſi æger viciſſorem venæ ſectiōem ferre non poſſit, aperiat venâ carbunculo vicinior, vt maior fiat attractiō materiæ virulentæ ad partem affectâ. Poſtmodum tumor vndique in circuli ſcarificetur, idque ſatis profundis ſulcibus: & aqua ſalfa calida fouetur aliquantiſper, vt ſanguis concretioſ impediatur, euiſque effluſus adiuuetur. Mox cauſtiſ granum in pulſula medio applicetur. Toti autem tumori ſequens cataplaſma admoſneatur.

℞. Fol. rutæ, & ſcabioſæ, contuſa. M. ſicum ſiccâ. contuſa. par. i. J. ſermenti acris Vnc. i. piperiſ puluerati Drach. i. vitelliſ ouorum numerâſ. Miſce. Fiat cataplaſma, quod per biduum applicetur.

Deinde vero ſequens admoſneatur.

℞. Succorum ſymphyti maiſ, ſcabioſæ, calendulæ, an. Drach. ſcheraræ vet. i. v. J. ſalis Drach. i. vitelliſ, quor. mo. i. Miſce. Applicetur tumori.

Poteſt etiam ab initio tumori applicari cataplaſma de amogloſſo in Pharmacopœa Bauderon. deſcriptum.

Ipi vero elchar poſt cauſtiſ applicationem admoſneatur vnguentum baſilicum, cui addatur theriacâ, ſcorpionum, & vitelluſ ovi.

Poſtquam tumor incrementum ſuſceperit, ne materiâ maligna reſtat ad interiora, illiſ ambibus illatur vnguentum de bolobis aut ter in die. Supra elcharam vero, vtiſ uſuſ caluſ procuretur, applicetur vnguentum baſilicum, cum butyro, aut aſtanga ſuilla permixtum. Poſt elcharâ caluſ viciſ detergeatur vnguentuſ ſequentiſ.

℞. Succorum calendulæ, abſinthii, ſcabioſæ, & apii, an. ſi. myrrhæ electæ, rad. iſeos Florent. aloes, ſarcocoliſ, ana Drach. i. meliſ roſati Vnc. i. Fiat vnguentum, continuandum vique ad integram curatioſem.

C A P V T I I.

De variolâ & morbilliſ.

AD febres malignas & peſſilentes meritiſ referenda citillâ, quæ variolâ & morbilliſ comitari ſoleat: cum epidemica & contagioſa ſit, plurimoſque pueros, quibus præſepue ſoler accipere, de medio tollat.

Quæſam ſit inter variolâ & morbilliſ differentia, apud Autores omnino non conuenit. Viciſ vero obtinuit, vt variolæ nominetur pulſulaſ maiores, variſ peſſimiſ, vnde nomen fortè ſunt: quæ ad ſuppurationem peruenire ſolent: morbilliſ vero ſit pulſulaſ perexiguâ, & veluti cuiſ alperitateſ cum interſa rubedine, inſtar cryſtallatuſ, quæ intra quinque vel ſepem dieſ, ſine ſuppuratione diſcutiuntur, & ratione rubediniſ interſe, apud Galloſ la rongeole vocari conſueuerunt: variolæ vero la perſe uerolæ & in Occitania, la puerle. Eſt & tertium puſtularum genus pueriſ familiarè, & variolâ ſimile, quodâ magnitudineſ & figurâ, ſimile in eo ad iſſ diſtinguitur, quod variolæ cum rubore & inflammatione appareant: hæ vero albæ ſunt, & veluti veſiculæ, ſeroſo humore replete, quæ intra triduum diſtumpuntur & exſiccantur, nullumque ſiftere ſolent periculum, & puerumque ſine febre erumpunt. Id puſtularum genus, a noſtrobis ſecundâſ la veroleſ, nominari ſoleat ab Italiſ, rangelone. Eaſque deſcriptio reperitur apud Viduum Vidium, ſiſ verbiſ: Sani quæ præter duas ſpecieſ cryſtalluſ aduocant. Sicut enim appellare quâſdam veluti veſicuſ plenâ aqua, inſtar cryſtalli ſpſendentes, quibus cæciſ variolâ diſtinguuntur, hæc vulgo nominant rangelone, in quas non ita ſecundâſ omneſ homineſ, ſicut in variolâ & morbilliſ, loſneq.

sub istis ita grauius affliguntur. Quoslibet non videntur ita qua terra species morbillis & variolis by pustula aduocanda.

De variolis, & morbillis Auctores multa dispugnant, ac praesertim vtrum hi afflicti sunt morbi notui, ac veteribus incogniti, & à qua causa proximè atque immediatè producantur. Cum autem nos luminam breuitatem in praedicationibus nostris obire afflicti, omnes conuentiones praetermittere conuenimus, notas & simplices earum definitiones proponentes idèque sic, quod de praedictis questionibus censendum sit, pauca explicabimus.

Ac primam variolas, & morbillos minimè nouos affectus esse censemus, cum ab antiquissima causa, nempe sanguinis materni impuritatibus oriatur: quam cum Arabes agnoscerent, minimè nouum morbum esse conseruunt. Si autem eorum temporibus primum grauari coepissent, illud (peccatum ab eis fuisse annotatum. Ac quanquam ab ipso primum exacta eorum descriptio tradita sit: Hipp. verò & Galenus, alique antiquiores viri de mentionem fecerunt: arbitrari oportet, idè peculiarem de intractionem à veteribus hinc non esse inditam, quod sint tantum accidentia febribus lyncis & malignis superuenientia, & eruptiones criticae, proprium, & peculiare morbi genus minimè constituentes. Vel quod in Graecia, propter aeris clementiam, ita leuis fuerit affectus, vt Medicorum curam non meruerit. Quam admodum apud Indos Occidentales, propter famis aeris clementiam ita leuis esse conseruatur, vt vix animaduertitur fuisse ante aegyptum Hispanorum in eas regiones. Postquam verò Aethiops quidam eo delatus variolis pestilentialibus correptus est, communicata per contagium maligna, & venenata qualitate, tam immaniter grauari coepit affectus, vt magna indorum pars de medio sub lata fuerit. Cum enim antea impuritates illae ex materno sanguine relinquebantur, ob clementiam aeris à natura facile discuti conseruissent: accedente postmodum venenata qualitate graues morbos effere.

Sanguinem verò matrem esse veram causam variolarum & morbillorum, inde praecipue colligitur, quod ex hominum matribus vix vnus reperire liceat, qui semel saltem in vita hos affectus non patitur. At morbus omnibus hominibus communis à causa aliqua communi necessario dependet: quibus sunt generationis principia, lemen nimum & sanguis maternus. At semen non potest esse causa variolarum & morbillorum, cum ab eo morbi hereditarij & tota vita perdarantes oriuntur. Superest igitur, & sanguinem matrem, quo nutritur foetus in utero, hos affectus provenire. In illo enim quinquiesimum partum quendam impuritates continentur, quae partibus fetus labem suam communicant: & ita à labis paribus imprefa massa sanguinis inficitur: eique, à causa praecarctica excitata, ebullitionem concitat: cuius beneficio fit fermentatio & depuratio tum sanguinis, tum ipsarum partium. Hoc docent Arabes luculento vni exemplo, quod dum adhuc recens, & multi nutrimentum retinet in dolum muci dum, aut praua alia qualitate mictum immittitur, à dobo quidem malum illam qualitatem recipit. Dum verò per ebullitionem depuratur: non modo ipsum, sed etiam dolum purificat. Ista autem ebullitio, seu fermentatio vtiplurimum puerilis contingit, aliquando tamen grandioribus, & virilem aetatem adeipit: quia semper à causa aliqua externa commoueri solet, qualis est in primis certa aeris dispositio huic morbo analoga. Vnde fit, vt nunc variolas, nunc morbilli grauari soleant: quod illa aeris dispositio, nunc his, nunc illis fit magis analoga.

Neque impuritates illae sanguinis materni ipsam matrem nutrire possint, in haque similes affectus generare, quamuis dictum fuerit ab Hipp. *De natura pueri*, tres esse partes in sanguine, vnam purissimam, qua nutritur foetus alteram impuriorem, qua nutritur mater: & tertiam impuriorem, qua in venis vteri affertur toto gestationis tempore, & post partum per lochia expurgantur. Primo enim cum mater habeat partes duriores, & solidiores, ex non tam facile recipiunt impressionem, quemadmodum foetus corpus tenellum atque molliissimum. Deinde portio illa sanguinis purissima, quae affertur in venis vteri, &

secundinarum toto gestationis tempore, inficit in transfusa sanguinem, qui deferitur per ea loca ad foetus nutritiōem: vnde foetus contrahit malum qualitatem. Quae suo tempore causa est ebullitionis in sanguine foetus. At veto portio illa impurissima in dictis locis remanens non inficit corpus matris.

Praeterea mirandum non est tamdiu differri aliquando eruptionem variolarum, & morbillorum, vt in vili aetate nonnullis corripiant. Non enim substantia in corpore remanent impuritates illae, vt multi existimant: corrumperent enim mora longissima & putredine deterrimentum acquirerent. Sed ab ipso tantum praua quaedam qualitas partibus foetus imprimitur, quae tandem humorum partem aliquam inficiens, naturae molestior redditur, quae tunc temporis inlargens, infectas illas humorum portiones ad cutem propellit.

Cum autem in sanguinis massa duplex excrementum reperitur, vnam crassam, alteram verò tenue: ex crasso variolae generantur, ex tenui verò morbilli. Et licet vna, eademque sit praua & maligna qualitas, vtrumque excrementum attamen quia diuersa est vtriusque excrementi natura, diuersa etiam est causa externae ad vtrumque analogia. Vnde fit, vt aliquando variolae, aliquando morbilli populariter grauentur.

Quamuis autem variolae in toto corpore erumpere soleant, maiori tamen copia in facie, pedibus & manibus apparere conseruuntur, cum aliter euenire solet in maculis purpureis, quae in febre purpurata contingunt: illae enim in pectore & dorso praecipue apparent. Cuius differentiae ratio inde desumenda est, quod cum variolae oriuntur ab ebullitione sanguinis, cuius beneficio fit excretio ad cutem excrementi in eo latitantis, & praua qualitate affecti: hepae autem fit sanguinis fons, & origo, ab eo praesertim talis expulsiō dependet: ac hepatis emendatio sunt facies, manus, & pedes: vnde fit, vt calidiori hepate praediti, faciei rubredine & pustulis laborare, caloremque intumidum in volis narium ac pedum percipere soleant: eaque ratione maior fit expulsiō ad eas partes. Contra verò maculae purpureae in febre maligna apparentes, à corde praecipue affecto oriuntur: ut adeoque circa partes cordis v. cinas erumpunt, & praecipue circa lumbos, quia in eis vena cae ascendens, & arteria orta cordi annexae decurrunt.

Alia praeterea differentia inter variolas, & maculas purpureas annotanda est, quod nimirum variolae, & morbilli apparentes tertio vel quarto die à febris inuasiōe, criticae esse soleant, & vtiplurimum saluantes: maculae verò purpureae, etiam septimo die apparentes, plerumque symptomatice sint, & morbum reddant deteriorē, cum aliter debere fieri videtur: morbus enim crudior est quarto die, quam septimo. Huius tamen euentus ratio inde depromenda est, quod in variolis & morbi lis plenamque febris incipit à summo vigore idè non solum tertio, aut quarto, sed etiam primo & secundo die excretionis in ea vere criticae pollunt coningere. At febres malignae signis progrediuntur, & principium earum ad septimum plerumque extenditur: vnde eo tempore excretionis contingentes non possunt esse vere criticae. Quod vero variolae & morbilli tam cito ad statum perueniant, non autem febres malignae: inde fit, quia febres variolarum, & morbillorum à potestate leuissima, & sanguinis ebullitione potius quam ab intensa materiae putredine proficiuntur, eam idè cessare facit natura mediante coctione ante diem septimum, eo quod leuissima sit, & à facillimis causis orta. At in malignis febribus adeo est ingens, ac fordida putredo, vt nec decima quarta die, & interdum vigesima corrigi possit. Et ob id, maculae erumpentes ante id tempus exacerbantur: quia citra coctionem, & symptomatice coacta sunt natura eas expellere.

Fit igitur ex pulsiō variolarum, & morbillorum per sanguinis ebullitionem: Quae quidem ebullitio iuxta doctrinā Auicennae, duplex est: vna pestifera, altera verò correpticia. Pestifera seu depuratiua ea est, in qua partes tantum in puriores & excrementum sanguinis putrefacti & à natura expurgantur, vt tota massa pura postmodum relinquatur: tunc variolae sunt saluantes: quae siue vilo medico auxilio

auxilio curantur. Corruptiua verò est, in qua non solum partes sanguinis excrementitiz, sed etiam sanguis ipse fœtus computrescit: unde periculose, & lethales variolæ oriuntur, & pro maiori vel minori putredine, maioris vel minoris malignitatis participæ, plures vel pauciores sanguinis partes occupant, minus vel minus periculum emergit. Talis ebullitio corruptiva præcipue contingit, dum epidemice grassantur isti morbi, & à maligna acris confusione excitantur, à qua humorum effert viscentia, & maligna putredo ducitur; unde variolæ multæ & periculose generari solent, quæ aliquando pestis prodromi, & puniti, iuxta Rhafis sententiam, esse consueverunt.

Inter morbos acutos recenseri solent variolæ & morbilli vtplurimum enim intra quatuordecim dies terminantur. Duplex autem temporum series à nonnullis ingeniose statuitur, tempus nimirum ebullitionis, & tempus eruptionis variolarum. Tẽpus ebullitionis, vtplurimum diebus perficitur ita vt primus dies principium statuatur, secundus augmenti, tertius status, & quartus declinationis enim febres & alia symptomatica remittente solent. At principium exitus variolarum est ipsemet quartus dies, augmentum ad septimum protrahitur, status ad vndecimum, & declinatio verò ad decimumquartum, quo tempore variolæ efficeantur. Non raro tamen ad vigesimum usque protrahitur variolarum effusio.

Differentiæ variolarum & morbillorum desciuntur, vel à substantia, ratione cuius alix sunt magis, vel minus pituitosæ, sanguineæ, biliosæ, aut melancholicæ, vel à quantitate ratione cuius dicuntur maiores aut minores, plures aut pauciores, profundæ aut superficiales: vel à qualitate, ratione cuius alix rubicundæ, alix albx, subalbx, violacæ, liuidæ, nigrae, pro diversitate humorum, ex quibus componuntur, vel à tempore, ratione cuius alix citò, alix rarè erumpunt, alix citius, alix tardius suppurantur, aut dissoluantur: vel à loco, ratione cuius alix current tantum occupant, alix etiam partes internas imadunt, vt fauces, pulmones, intestina, rectum, lienem, reliquaque viscera.

Diagnosis dirigenda est, vel ad affectum iam præsentem, vel ad eundem imminuentem. Variolæ & morbilli iam præsentis, cum sensibus patent, non alijs signis indigent. Imminuentes verò sequentia signa indicant.

Dolor capitis cum pulsationis sensu in fronte, & temporibus. Somnolentia grauis. Terrores in fomnis. Deliria interdum tremores, & convulsiones. Strenuitas: Pandiculus frequens: Raucedo. Tussis. Spirandi difficultas. Calor, rubor, & punctio sensus in toto corpore. Dolor dorsi, qui aliquando solus, aut eum paucis alijs symptomatibus in febre syncho apparens, variolas imminentes significat. Cum vnum per dorsum sentantur vena, & artetia magna, in quibus sanguis ebulliens malignus acres vapores ad nervos, & membranas vicinas emittit, necesse est dolores in ijs partibus præcipue percipi. Magna anxietas, & inquietudo. Lachrymæ inuolutariæ: Oculorum splendor & pruritus: Tumor faciei cum aliquo rubore. Vehementia symptomatum ab initio, vt morbus statim vigorem attrigere videatur.

Quia omnia sunt vel à vaporibus multis, & crassis, per sanguinis ebullitionem in caput, diaphragma, aliaque partes transmissis: vel ab ipsa variolarum materia, iam ipsas partes invadere incipiente: vel à fluxione caloris vi excitata, humores in cerebro coaguantur.

Maximi est momenti imminentes variolas prævidere, sed multo maioris, earum euentum prædicere, quam sequentia signa prognostica indicabunt.

Ac primum salutare esse solent variolæ, quæ citò, & facile exiunt, ac breui ad maturitatem perducuntur.

In quibus febris levis est, sine magnis symptomatibus, quæ post exitum variolarum cessat, aut admodum minuitur. In quibus vox libera est, & respiratio facilis. Variolæ primum rubræ, & albæ, molles, distinctæ, paucæ, rotundæ, insignitæ, solum cutem, non autem partes internas afflicientes, salutares esse consueverunt.

Omnia prædicta signa, materiz morbosæ, puritatem, sobrietatem, benignitatem, & naturæ robur, valde eam expellunt.

Contra verò periculosas, aut lethales variolas ostendunt febris ingens, & non imminuta post eruptionem variolarum; significat enim humores malignos & venenatos non fuisse sufficienter ab cutem expullos, led maximum eorum partem adhuc in venis relictis. Anxietas, & inquietudo magna; ab iisdem humoribus in venis ebullentibus. Difficultas spirandi, quæ significat pulsus, aut apostema in pulmonibus; aut anginam, aut virum lapsum. Sitis ingens, quæ internum incendium indicat; & si cum ea anxietas respiratiois augeatur, mors in propinquum est. Alii fluxus, aut dysenteria, quæ significat humores malignos ad interiora recurrere, motu omnino contrario naturæ motui atque adeo lethali. Ideo ex ijs, qui huiusmodi alii fluxus post eruptionem variolarum corripuntur, paucissimi evadunt.

Vrina sanguinea lethalissimum est signum: tum etiam si per alium sanguis purus & sincerus rescitur. Interdum etiam per nares, gingivas, aliaque corporis partes fiunt excretiones sanguineæ, quæ lethales esse consueverunt. Significat enim humum sanguinis acrimoniam atque malignitatem, quæ naturam viementer irritat, & ad præposteram illius excretionem compellit.

Pessime etiam sunt variolæ tardæ apparentes, quæ materiz contumaciam, aut naturæ imbecillitatem significant. Multæ, magnæ, duplices, & continuæ, eadem materie quantitate nimiam ostendentes. Duræ eadem materie crassitiem, & incoagulabilitatem indicantes. Depressæ, ex pulticis imbecillitatem significantes: quæque deteriores sunt, si in earum medio macula nigra appareat, quæ malignitatis insigni attestatur. Virides, liuidæ, & nigrae, quæ ex bile porracea, vel atra generantur.

Omnium pessimæ, quæ vbi egressæ sunt, confestim evanescent, & tumor partium remittitur: significant enim humorum retrocessum ad interiora, & eorum quibus illa retrocessio contingit, nullam evadit, sed vtplurimum intra viginti quatuor horas perire.

Periculose etiam sunt, quando maculæ febrili purpuræ familiares, illis permiscuntur: præcipue si maculæ illæ liuidæ, vel nigrae fuerint. Significant enim non solum leviorem illam putredinem, quæ ex ebullitione sanguinis in variolis solet contingere, sed etiam intensam illam, & profundam (vt vocant) putredinem adesse, ex qua maius multo aggratanti inpendet periculum.

Fæces, aut vrina in variolis liuidæ, aut nigrae, magnam in hoc morbo potendunt periculum; significant enim humorem atrabilarium in venis redundare, & totam massam humorum indurere.

Curatio variolarum & morbillorum quatuor indicationibus perficitur. Quarum prima versatur in humorum quantitate peccantium evacuatione. Secunda in motu naturæ, seu variolarum expulsiõe adiuvanda. Tertia in malignæ & venenatæ qualitatibus oppugnatione. Quarta denique in symptomatum correctione. Quæ omnia vt commodè perficiantur, primum idonea vi&u ratio instituida est, quæ eadem esse debet, quæ in febrium putridarum curationem fuit propozita: nonnulla tamen peculiariter aduertenda sunt.

Primo vt ager in loco calidiusculo detineatur, quo cutis pori aperiantur, & variolarum eruptio adiuvetur. Ideo detinendus est in cubiculo bene clauso, quod aer frigidus nullo modo ingreditur. Multi enim puen bene aliqui variolis laborantes, frigidius aeris appellu de medio sublati sunt, repercuti nimirum materia morbosica ad interiora, eademque ratione veltibus moderate contegendi sunt: ita tamen vt aeris caliditas, aut integumentorum pondus febrilem ardorem non intendat. I&ta tegumenta ex pannis rubris plerumque concinnari solent, quia analogia quadam sanguinem ebullientem ad exteriora movere creduntur. Solent etiam multi ouem, aut veruicem in cubiculo, vel etiam cubili demerere, quod illa animalia venenatam labem faciliè recipiant, & in se attrahant; unde aegris leuamen aliquod emergere potest.

In potu decoctum hordei, vel radices acetosæ, vel decoctum rursæ eboris, aut cornu cerui voliter vi&uari solet, præcipue in principio, & dum febris est vehemens. Si vero non ita manducatur, decoctum hordei, & caricarum erit

vilissimum: vtpote humores ad cutem efficaciter expellendi: eoque vtebantur passim Amatus & Forelius cum fecerit facellus.

Præterea homines cum toto morbi decursu moderatus esse debeat, in augmento tamen cum pulcritudine erumpunt, quæturior noxius est, & sanus est plus solito vigilare.

Vigilant indicationes prædictæ implentur, a venæ sectione inchoanda curatio est, (si languis aliquatenus redundet, atque agrotantes terre posse videretur) eaque quamprimum celebranda. Si tamen Medicus primo morbo die non fuerit vocatus, vtiliter nihilominus languinem detrahet ante eruptionem variolæ um, vel dum adhuc paucæ apparent: quod tempus vulgo vig; ad quartam diem extendi consuevit, a febris inualore, lo quo tamen cautio diligens necessaria est. Si enim paulatim erumpere incipientibus, febris immunitio, & symptomatum remissio subleuatur: facius est totum negotium nature bene operanti relinquere, quæ totam materiam morbuicam ad cutem sufficienter expulsiua est. Tum venæ sectio necessaria non est, cum experientia doceat, infinitos pueros benignioribus variolis laborantes, neque pectora oneratos, hoc sanguinis detractioe feliciter curari. Quam potius aliquando in dicto calu phlebotomia notam interire poterit, cum variolarum expulsiu fieri solet, per ebullitionem sanguinis: quæ si cuius sit, a sanguinis detractioe multum inuimuetur, siqu; inuiscens euadet ad sanguinis maiorem ad impuritatis perfectæ depurationem. Contra verò si erumpentibus variolis febris intensior, anxietas, difficultas spirandi, letum cradum & rubrum, aliaque symptomata maioræ apparent: signum est naturam visum humorum onere premi, cuius non posse conuenienter regere: ideo phlebotomia esse necessariam, vt detracta portione oneris reliquum a natura facilius expellatur. Vno verò in ebullitione moræ perfectæ, seu depuratæ, sanguis detrahendus non est: in corrupta vero venæ sectio maximè necessaria efficitur, quæ minoris malignitatis est particeps, eius gradus iura fuerunt expositi. Ita autem necessaria est phlebotomia in periculosis variolis, in quibus ebullitio corrupta fieri consuevit, vt tenellula puerorum ætas illam non impediatur. Vias enim inualor, vt in quarto, & non raro tertio ætatis anno multo languis viurpetur. Parentes Medici in teneriori ætate, & iac lugentibus pueris a venæ sectione non abstinere. Quod tamen ægerrius admittit tenellula natura, lentissimum lactis alimentum & copiosius per cutem effluxus. Neque vilis est sapientibus scriptoris patrocini defendi poterit noua hæc mittendi sanguinis uentia.

In paulo grandioribus pueris vnica phlebotomia interdum non sufficit, sed illa erit iteranda, si febris intensæ perferret, vel delirium, aliode graue symptoma vigeat. Imo vero prædicta variolarum eruptio, quæ intra nouem dies maiori parte huius febris valde vigeat, sanguis denuo mittendus est, & æger tractandus, vt hore continua putrida laborantes.

Si pulcritudine sit venæ sectio, propter ætatem tenellam, vel quod tempus idoneum tunc transcurrit: fuerit: sanguinis redundancia auferri poterit cucurbitulis scarificatis, dorso, scapulis, & femoribus adnotis, quæ etiam in flatu morbi conserre poterunt, cum motus nature a centro ad circumferentiam per eas adiuuetur. Cauendum autem in puerulis, ne profundiores fiant scarificationes: Contingit enim aliquando, vt penitus adacto scalpello ab imprudens chirurgus, gossilangis ferendus & ebulliens, venulus diffusus, eo impetu per vniculicula est uat, vt difficili negotio cohereri possit.

Purgatio in hoc ætate pulcritudine est. Sit enim motus morui nature contrarius, nempe a circumferentia ad centrum: & quibuscunque variolis laborantibus alius fluxus contingit, retrocessio variolarum repentina, & mors vplurimum consequatur, vt in prognostico notauimus. Aduerte tamen, vtilitatem non raro purgationem institui ante eruptionem variolarum, & antequam febris incandescat, quando scilicet pueri sunt veluti in flatu nudo decidentis. Tunc enim si abundet cacocymia, vtiliter est purgatio helemmanatur, vt natura pmlmodum alacris expulsiu nem molietur. At variolis apparet incipientibus, purga-

tio futura est perniciofa. Tum etiam, si maxima vrgere malignitas, vt in constitutione epistemonica, quando plurimi pueri ex eo morbo intereunt, facius est omnino a purgatione abstinere, quia in morbis valde malignis & pestilentibus, purgatio in principio morbi instituta valde noxia est. Ex blandis autem medicamentis composita sunt purgantia, & habent, scilicet, cassia, manna, tamarindus, & syrupo rosaceo.

In morbi decursu si alius afflicta sit, sollicitari blandissimè non autem irritari, poterit: idque supposito, ex solo melle sine sale confecto, vel enemate ex nullo, aut lacte, aut decocto hordii, psyllularum, & liquoris cum saccharo & vitellis ouorum.

Post venæ sectionem, aliaque euactiones (si necessaria fuerint) variolarum expulsiu adiuvanda est, non solum remediis specificis humores ad cutem propellentibus, sed etiam diaphoreticis, & alexipharmacis: præsertim si variolæ epidemice, & summa malignitas periculum portendant.

Vulgarissimum est, & a Rhafi, Auesenna, totaque Arabum familia commendatum ad cutem propellens medicamentum: quod etiam a postrema recentiorum parte vlturatur, iuxta Auesennæ & descriptio nem quod sic habet.

¶ Ficum pinguium vnc. vi. lentium excortic. 3. ij. Jacce. 3. ar. Gummi tragacanthi & seminis feniculi, an. Drach. ij. Coquantur in th. i. aquæ fontis donec redeat ad tertiam partem. Detur in potu de ea Rhafis addit prædictis simplicibus croci gr. xv. psyllular. 3. v. quia crocus aperit & corroborat, psyllula hepar fitmant. Tragacanthum verò licet incraffet & astringit, ideo reliquis miscetur, vt nimiam sanguinis ebullitionem prohibeat.

Lentes a quibusdam necentis reijciuntur, quod astringendi facultate præditæ sint, atque adeo variolarum eruptionem impediunt. Sed non temere reicienda est tot, tantorumque Medicinæ procerum autoritas: quin potius statuedum est, summa cum ratione lentes excorticatas, vel leuè ebullitionem passas huic compositioni addi: vt nimirum, sua astringendi & incraffandi vi seruosum nimium humorum coercentur, eorumque impetum in aliquam partem nobilem prohibeant. In quem finem etiam tragacanthum additum est: vt antea monui. Hoc desumitur a Galeno, quæ 1. de aliment. facult. cap. 18. lentes bis coctas partes naturales roborare & alitratione quæ polent, ventris fluxum cohibere docuit. Illæ igitur præscribi, vel omitti a Medico curante poterunt, pro ut maior, vel minor attendendi, & humores ad cutem propellendi, necessitas vrgere videbitur. Si enim materia subtilis fuerit, & magna ebullitio fiat, vtiliter lentes præscribi poterunt ad intentiones prædictas. Si verò materiam crassa videatur, quam natura legitime ad cutem propellat, tunc illæ erunt omittendæ, imò & tragacanthum, & reliqua attenuantia ac diaphoretica solum permiscenda. Vnde patet, remediis moribus ab Auctoribus propofitis non esse arde infensendum: sed in variis casibus variè esse immutandas. Pro exemplo fit formula sequens, partem ex simplicibus prædictis, partem ex aliis diaphoreticis, & malignitatem oppugnantibus composita: quæ æger totibus pierumque variolis patientibus in expulsiu conatu multum conserre poterit.

¶ Rad. Ienic. & acetosa ana 3. i. raturæ cornu cerui 3. ij. fol. scabiosæ, cordij & h. perniciosa ana M. i. ficum pinguium par. ii. gummi lacce 3. ii. sem. napi & card. bened. ana 3. ii. lentium excort. 3. ii. gummi tragacanthi 3. ii. Coquantur ad th. ij. De colatura cape 3. ii. syrupo delimon 3. a. Misco. Fiat uleip. Detur bis aut ter in die.

Si malignitas maxime vigeat, vt vulgo in variolis epidemicis fieri solet, alexipharmacis præcipue infensendum est. Sicque ea omnia, quæ in febribus malignis a nobis propofita sunt, hic conuenire poterunt, habita vtrum, atque ratione. Hic inter alia frequenter vlturari poterunt, confectio de hyacinth. lapis bezoardicus, pulvis ex coral. & margaritis, ratura cornu cerui, lapide bezoardico: oleum scorpiionum Mārthiol. deliqui, ouorum utendi modus est capite præcedenti delum potest.

Neque omittenda sunt vires inflaturaria, tam interna, quam externa, a precedenti etiam capite rependa, & prudenti Medico opportunis temporibus vlturanda.

F. F. Ad.

Ad nares praefertendis acetum saepe offaciendum est. At efficacius operabitur collyrium ex succo polygoni & butiri palloris, seminis mach. & camphora supra laudatum quo intusda rutunda, saepe in nares erit immittenda. Si nihilominus variolae intra nares adhaeruerint, ille cito in eruffas abeunt, quae oleo amygd. dulc. frequenter erunt illinendae, vt breui decidant. Ac denique si exulceratio contingat, linimento ex oleo de vitellis oorum, & succo plantag. in mortario plumbeo subactis, traenda erit.

Ad faciem custodiam, nonnulli eam aqua rosacea, aliique altringentibus abluunt. Quod nati probari non potest, siquidem maxima impuritas, portio ad faciem propellitur. Illius enim cutis laxa & mollis, excrementis recipiendis maxime idonea est. Quomobrem si impuritates illae, quae a natura ad faciem amandantur, ab ea repellantur, intus remanent, grauius noxam inferre poterunt, & aequae ita naturae, nequa nequaquam impedienda est. Sed huc tantum muneris incumbere debet Medicus, vt impediat ne in facie, germinantes variolae, focos & cicatrices relinquant, a quibus facies deturpari non raro conuenit. Id vero vtiliter praestabit si cum variolae iam maturuerint, & in medio albicantes eriscent, & (quod circa nouum morbi diem solet contingere) oleo amygd. dulc. recenter sine igne empresso, cum penna illinatur bis in die, usque ad crustarum calum. Hoc enim remedium temperabilis acrimoniae maturatio, acceleratur, & crustularum calus promouetur: quae abique adherentes cutem profundius exulcerant, ob pus lobtus detraheas. Oleum nunc recenter & sine igne extractum, cum aequae rosae, pari quantitate subactum ad formam linimenti, ad eundem usum praestantissimum est.

Si ob neglecta praedicta remedia, vel insignem variolarum multum, vestigia & cicatrices remanent, illarum reparatio sedulo incumbendum est. Quod tamen integre obperire difficilissimum est: quousque plurimum in eo multum deludantur, in gratiam virginum & mulierum, quae polchritudinis conseruandae studiosissime sunt. Ex infinitis autem remedijs, quae ad hanc rem ab auctoribus descripta reperiuntur, nos selectiora tantum proponemus.

Ac primum oleum ex vitellis oorum cutem nutrit atque generat, adeo cicatricibus implendis maxime idoneum est.

Seu enim veruacundum recens siquarum & penna iunctum ad idem est efficax.

Maxime vero reparantur, scda variolarum vestigia, si

aqua mille florum, seu est stercore vacino, mense Maio destillata abluantur, & postea xongia humana inungantur.

Forelius vnguentum sequens valde praedicat.

℞. Olei amygd. dulc. liliorum albor. ana Vnc. j. pinguedinis capri 3. iii. puluer. radie praeniz. aereos Florent. & la har-gyri auriana Scrup. sem. sacchari candi Scrup. j. Huiusmodi in calido mortario bene misce, & per lintum expresse, iunge dicta loca mane & sero. Postea vero aqua & pedibus vitulinis destillata bene abluantur, in cuius defectu aqua mille flor. vlturari poterit.

Neque praetermittendum est, quod a multis praeticis docetur, vt nihilominus variolae ad maturitatem perducere ac perforantur aurea vel argentea, ne pus diutius moram trahens in parte cicatrices relinquit. Quod tamen ferè iam obsoletum est, cum experientia docuerit, Variolas perforatas tardius curari, & crustas diutius retinere, ob caloris natui imbecillitatem, quae a quae perforatione parti inducta est, unde cicatrices fidiore relinquantur. Itaque satius est ab hac perforatione abstinere, & puris euacuationem soli naturae relinquere.

Pro huius curationis cotenide, affectuum variolis inperuenientum, pruritus nempe & exulcerationis, therapia subnectenda est.

Ac primum in eruptione variolarum, aut dum maturare incipiunt, ingens dolor vel pruritus interdum regrotantes adligit. praesertim vero in plantis manuum & pedum, eo quod densior in ijs partibus cutis eruptionem probubeat.

Cui symptomati medebetur, si partes illas in aqua calida detineas, vel decocto emolliente diutius focos. In facie vero cum ingens adest pruritus, quo aegri eam seipere coguntur, unde scda illius deturpatio, & infignes cicatrices emergunt, sequenti remedio vtetur.

℞. Pol. panietar. M. j. flor. chamamel. & mellilot. an. P. sem. Decoquantur in aqua scabiosa lb. j. Colaturae adde aquae caprifol. Vnc. iij. Colatura calida madefiant saepe variolae prurientes cum bombace, aut linteo tenui.

Vicera vero, quae ex malignis & excedentibus variolis oritur, curanda sunt vnguento albo Rhafis camphorato, vel vnguento de plumbeo in hunc modum composito.

℞. Plumbiusti j. iij. thargyri j. cerussae lotae, aceti an. j. j. olei rosae j. iij. mellis rosae j. iij. vitellos oorum an. iij. myrrhae Vnc. corae q. s. Fiat unguentum.

F I N I S.



INDEX RERVM.

QVAE IN HOC OPERE CONTINENTVR.



ADOMINIS musculorum influm-
mationem signa. 147

Abortus cur magis conueniat prius &
ritibus refluens mensis. 379

Abortus quomodo per pleboscitum in-
gravidis praecaveatur, multis probatur
exemplis. 378

Abortus in utero quomodo frequenter. 379

Abortum cur efficiat tenebras. 380

Abortum futurum quomodo signa demonstrant. ibid. pica immixta non
militat. 380

Abortum cur mulieres magis periclitentur quam ex vero por-
tu. ibid.

Abortum quia symptomata & morbi sequuntur. ibid.

Abortus mensis paries flauibus cur confertur. ibid.

Abortus curatio in praefata non conficitur. 381

Abortus ut specifice impediatur. ibid.

Abortus ut scilicet efficiatur. 379

Abstrusus decolium cum semina in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Abstrusus ut scilicet efficiatur in quarta et quinta. 379

Alexipharmaca ad varias. 448

Alimentorum vitia. 400

Alimenta concocta facilius vel difficilius digeruntur ex cau-
sibus. 400

Alimenta ad calculi generationem conueniunt. 400

Alimentorum praematurae causa. 400

Alimenta fructus ad calculum. 400

Alia bonae vis ad menses mouendos & conceptionem du-
cunt. 378

Alia ut patam reddita quibus detergetur. 378

Alia & alioquin mede amara speciosa ad singulas. 378

Alia fluxus Anaxoris longius uis inducunt. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Alia ut fluxus in uero. 378

Index Rerum:

<i>Affluatium paratyphum salutaris.</i>	310
<i>Affringitibus quando locus in dolore dentium 310. in dyspho-</i>	
<i>ria.</i>	394
<i>Aflorum in hac inferiori actione.</i>	426
<i>Aliam hepatis in fluxu hepatis causa pendet ab oculis iu-</i>	
<i>pra primam qualium excessum.</i>	389
<i>Alutis gravis causa.</i>	399
<i>Alutis gravis facit in sordiditate degenerat.</i>	300
<i>Alutis inflammatorum cum loquela inflammatorum consensus.</i>	
<i>329</i>	
<i>Aues cur durissima plantarum semina dissolvunt.</i>	355
<i>Aucenna sequitur missi probidentur in febre ardenti dogma</i>	
<i>expeditur.</i>	409
<i>Aurum effectus.</i>	399
<i>Aurum interiore relucendo cur tussis excutitur.</i>	ibid.
<i>Aurum canitatis inferta quomodo auferenda.</i>	301
<i>Aurum fontis causa ibid. differensia. 300. prognos & curatio.</i>	
<i>ibid.</i>	
<i>Aurum doloris causa. 303. diagnosa.</i>	ibid.
<i>Aurum dolor cum inflammatione periculosus.</i>	ibid.
<i>Aurum doloris curatio.</i>	ibid.
<i>Auris inflammatione effecta quomodo topici tractanda.</i>	ibid.
<i>Auris suppurata curatio.</i>	305
<i>Auri inoffus medicamentis cur dolores dentium sedentur.</i>	
<i>320</i>	
<i>Autoris aqua tiberiacalis.</i>	356
<i>Autumnalis aer aerium destillatum causa.</i>	342.

B

<i>B Albi qui sint Galeno. & qui Auicenna.</i>	313
<i>Balbus in causa. ibid. differensia.</i>	ibid.
<i>paranasalium aquarum dotes ad calculi prophylaxim.</i>	311.
<i>ad vena suppressionem ad purum mucilaginoso. 345. ad chloro-</i>	
<i>sium. 148. ad suffocationis hysterica prophylaxim.</i>	363
<i>Balneum fictum in paralyti.</i>	358
<i>Balneo sulphureo in sordiditate videnti modus ingeniosus.</i>	301
<i>Balneum cu opthalmia conueniat.</i>	193
<i>Balneum aqua ducis an conferat pibosici.</i>	348
<i>Balneum an sit morbos salutare.</i>	360
<i>Balneum ex decocto remollientium & calefactionum in dolore</i>	
<i>ventriculi. 370. ad venitionem compescendum.</i>	366
<i>Balneum bis an ter repetitum quibus conualescentibus utile.</i>	
<i>373</i>	
<i>Balneum aqua tepida corpus refrigerat & humectat 399. be-</i>	
<i>per deobstruit 303. utile in illo 306. in melancholia hypo-</i>	
<i>chondriaca 317. in frastuone a calculo. 332. in chlorosi.</i>	
<i>341. in febre tertiana 356. in tertiana intermittente longiore.</i>	
<i>417</i>	
<i>Balneum aqua tepida cur minime iuuat in febre ephemera en-</i>	
<i>teranea.</i>	400
<i>Balneum vi moderatum in helictis.</i>	404
<i>Balnea apud veteres 4. partibus constant.</i>	ibid.
<i>Balneum aqua dulcis quibus in febribus continuis conuenit.</i>	
<i>ibid.</i>	
<i>Balsanum apoplepticum.</i>	352
<i>Balsanum Gaudium in paralyti.</i>	317
<i>Balsanum apoplepticum in epilepsia puerili.</i>	324
<i>Balsanum Peruvianum in vlcere pulmonum. 147. in ventriculo</i>	
<i>frigido.</i>	317
<i>Balsanum sulphurei dotes in hemorrhoidum dolore. & vlcere.</i>	
<i>306</i>	
<i>Baryana quid.</i>	399
<i>Baryburga antiscorbutica.</i>	321
<i>Bezoar dicitur lapis cur apud nos rarissimus esse debet.</i>	308
<i>Bezoardici lapidis vsus in melancholia brychondriaca.</i>	318
<i>Bezoardica chymica.</i>	376
<i>Bezoa an possit esse causa paralytica.</i>	353
<i>Bilem temperantia.</i>	169
<i>Bilem an dulcis semper praecens.</i>	391
<i>Bilem purgacis in hepatis interperis calida 378. in illo.</i>	
<i>302</i>	

<i>Bilem deprauantes causa.</i>	304
<i>Bilioforum febrium continuarum essentia & causa. 405. signa</i>	
<i>diagnostica. 407. signa prognostica.</i>	ib.
<i>Biliosi in febribus cur mitemus sanguis.</i>	408
<i>Bilis an magis effervescat a sanguinis detractione.</i>	ibid.
<i>Bilem tenuem & valde acrem incrassantes iolepi.</i>	410
<i>Bilem rhabarbari ad obstruiones puerorum.</i>	412
<i>Bolus temperatus ad ventriculum purgandum.</i>	356
<i>Bolus adstringens in diarrha.</i>	322
<i>Bolus in principio nephritici doloris.</i>	329
<i>Barbor Arabum.</i>	394
<i>Bdely quid.</i>	395
<i>Boudonia causa.</i>	352. 359
<i>Bpod vrosiles causa.</i>	361
<i>Bryonia radix ad suffocationem hysterica.</i>	362
<i>Bubo pestilens febris pestilens praecipuum.</i>	424
<i>An sit pathogenomicum.</i>	619
<i>Cur maxime periculum mouet.</i>	350
<i>Bubones plures paucioribus securus.</i>	350
<i>d Bupone remedia petita ad hydropem.</i>	312
<i>Buglossi sucus haemorem atrabilariu contemperat.</i>	319
<i>Bugula decolli praesentia in pulmonum vlcibus.</i>	346
<i>Bugula oleum ad dolorem bryaribridum leniendum efficacissimum.</i>	
<i>396</i>	

C

<i>C Acetia causa.</i>	303
<i>Cachectiarum febris qualis.</i>	406
<i>Cacitatis causa.</i>	181. 185
<i>Cafarea solitio an celebranda.</i>	382
<i>Calculus sub quo assumum genere collocandus.</i>	385
<i>Calculi causa ex Galeno & eius affectus resuma.</i>	336
<i>Ex recentioribus probata.</i>	ibid.
<i>Calculi causa antecedens.</i>	346
<i>Calculi signa diagnostica.</i>	327
<i>Calculum an semper in dicent arena cum vrinis amittit.</i>	328
<i>Calculi renum cur valde periculosus.</i>	328
<i>Calculum renum immunitas & fragentia.</i>	329
<i>Calculum excludentia.</i>	330
<i>Calculi quatuor viles aque Balneum. 331. & minoriter</i>	
<i>acidula.</i>	ibid.
<i>Calenlosi naturae calidioris quae remedia ad praerogationem con-</i>	
<i>ducunt.</i>	ibid.
<i>Calculi vesicae eandem causam materialem & efficientem. ac</i>	
<i>calculi renum agnosci.</i>	333
<i>Calculo vesicae cur puri magis obnoxii.</i>	334. 333
<i>Calculi vesicae an semper rudimentum accipiat 4. rebus.</i>	
<i>334</i>	
<i>Calculi vesicae signa.</i>	362.
<i>Calculi vesicae signum pathogenomicum.</i>	335
<i>Calculi vesicae vesicae cur extracta periculosior in viris quam in</i>	
<i>mulieribus.</i>	374
<i>Calculi in mentis penis quomodo excludendus.</i>	344
<i>Calculi vesicae vix nisi per laboromium curabiles.</i>	335
<i>Calculorum tamen aliter curatorum ex emplo vide.</i>	ibid.
<i>Calor praecipuus fluxionis causa.</i>	375
<i>Campor & odoraculista sumpta cum panis aquae resorum viti-</i>	
<i>um sedat.</i>	366. 368
<i>Cancro deprauati caro palli in tenues laminae concisa optimum</i>	
<i>anodynum.</i>	395
<i>Cancro vetri causa.</i>	368
<i>Signa.</i>	ibid.
<i>Cancro curatio palliativa.</i>	ibid.
<i>Per linimentum.</i>	ibid.
<i>Per foetus partis effecta.</i>	ibid.
<i>Per narcotica in innumissimo dolore.</i>	369
<i>Canna semis.</i>	357
<i>Canna semis causa.</i>	318
<i>Curatio.</i>	359
<i>Cannam sament obtundens pinguis & oleaginosa.</i>	ibid.
<i>Canturides vesicae & vtero iuncta.</i>	361

Index Rerum:

<i>Capitis dolorum differentia & causa.</i>	177	<i>micis mulieribus cur impediunt?</i>	381
<i>Curatio.</i>	178	<i>Centasium minus cur febrisigna vocatum?</i>	417
<i>Caput facili tremantia.</i>	147	<i>Cepa sub cineribus colla rjus in hamorrhoidum dolore.</i>	
<i>Caput omnibus in affectibus quanti momenti fuerit.</i>	147		327
<i>Caput quot affectibus origo.</i>	175	<i>Cephalos quid.</i>	178
<i>Caput & cerebrum an sint arthritica fluxionis origo.</i>	189	<i>Cephalagia.</i>	178
<i>Carunculae signum praecipuum febris pestilentis. 413. sed non verè pathognomonicon.</i>	418	<i>Cerebri frigida & humiditas inasperies morborum ferax.</i>	145
<i>Carunculae plures panciaibus periculosiores.</i>	419	<i>Cerebrum metropoli pituita.</i>	174
<i>Carunculae curatio.</i>	418	<i>Cerebrum quasi cucurbitula corpori impedita.</i>	174
<i>Cardiaca causa.</i>	270	<i>Cerebri frigida inasperies signa 2 affectus.</i>	174
<i>Cardiaca cur in varijs temperamenti exoritur.</i>	360-371	<i>Cerebri excrementa quid evacuentur.</i>	174
<i>Carus exhibitus pueri lactentibus cur in lumbros facessit.</i>	290	<i>Cerebro maxime infensi lunares radij.</i>	246
		<i>Cerebrum frigidum humidum alterantia & roborantia.</i>	149
<i>Carum destillatum iura pro beneficiis nutritivis.</i>	403	<i>Cerebrum exsiccatia.</i>	176
<i>Caros in quo differat ab apoplexia, comate & lethargo.</i>	149	<i>Cerebri abcessus & phacelus.</i>	269
<i>Carpi apoplexia in tertiana longiore.</i>	418	<i>Cerebri calidi effectus.</i>	175
<i>In quartana.</i>	420	<i>Chalybs, ex roque parata medicamenta ad obstructions solvendas potentissima. 104. in ferro hepatis. 307. in hydropo.</i>	
<i>Carunculae in prae meatu extirpandi modus.</i>	344	<i>113. in lienis obstructionsibus. 314. in melancholia hypochondriaca.</i>	319
<i>Carystocysti laus in arthritide.</i>	394	<i>In quartana legitima.</i>	421
<i>In ichthide.</i>	396	<i>Chalybeatorum medicamentorum sumptione quid obstruendum.</i>	304
<i>Cassa infusa in dolore hamorrhoidum.</i>	395	<i>Chamaedrys decoctum antipodagricum.</i>	395
<i>Castorei laus in apoplexia.</i>	112	<i>Chamaedrys rjus in febrilibus lenis & distans. 411. & in tertiana intermittente.</i>	413
<i>In comissione.</i>	159	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Catalepsis idem quod caroculus.</i>	314	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Catalepticorum hysterica suspensio.</i>	300	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataleptica hysterica.</i>	312	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataleptica ad hydropem.</i>	315	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Ad laenis scirrhum.</i>	318	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>In reum calculo.</i>	317	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>In inflammatione reum.</i>	174	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>In inflammatione vesicae.</i>	341	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>In urina suppressione.</i>	354	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>In fluxu mensium immodico.</i>	361	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataleptica ad inflammationem vteri.</i>	362	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataleptica ex tribus farinis ad vteri gangraenam.</i>	382	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataleptica ad fetum resuscitandum.</i>	186	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Ad tormina puerperarum.</i>	391	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Ad dolores arthriticos.</i>	396	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataleptica ventericuli regioni applicandum in tertiana intermittente longiore.</i>	415	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataleptica in febre pestilenti malignam materiam attrahentia.</i>	425	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracta quid.</i>	184	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracta inunctione mercuriali curata.</i>	186	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracti causa.</i>	174	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracti differentia.</i>	175	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracti febris causa.</i>	174	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracti per quas vias d capite desunt.</i>	174	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracti signa.</i>	174	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracti obnoxij non vix cerebrum frigidum, & inop calidum habent.</i>	176	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracti calidi curatio.</i>	177	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracti continuax in pulmones defluxum phlogistica sapè mittitur.</i>	245	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cataracti d rheumatismo differentia.</i>	324	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Catantum ruborum decoctum ad asthma.</i>	231	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cassificum in initio ad caput vacuum.</i>	142	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cassificum in occipio puerorum in epilepsia.</i>	164	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cassifica tibia admodum an conveniat in fluxu muliebri. 356. in hysterica passione.</i>	353	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cauteria multa applicata in affluibus soporosis.</i>	155	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cauterium sicut a cornuall applicatum in mania. 172. in dolore capitis continuax.</i>	172	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cauterium tibia de cera admodum in scirrhus hepatis. 307. similia in melancholia hypochondriaca. 317. in chloro. contrumacissima.</i>	348	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cauteria in hydropicis cur non applicanda.</i>	311	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cauteria in mesenterio diutina suppressione sibi admodum cur conuocant.</i>	311	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418
<i>Cauteria tam in brachijs, tam in cruribus abortum in cunctis.</i>	311	<i>Chamaedrys decoctum ad idem. ibid. & ad quotidianam in tertiana.</i>	418

Index Rerum:

Chyliferi vicini seu metrenobilia ad suppressos menses.	379
Chyliferi curandi virginitas.	ibid.
Chyliferi cum non admodum tui in praegnantibus.	379
Chyliferum materia in febribus continetur.	403
Chyliferi nutritives in omnivora ciborum abstinentia.	414
Congulum badi vel leporis mensium fluxum immodicum.	388
Cachectica effluvia antiscorbutica.	381
Collus quomodo abortus causa sit.	382
Colica post mater tum venetricem, tum intestinorum vitio fit.	379
Colicae passiones causa, 280 signa, ibid. prognos, ibid. curatio.	ibid.
Colicae passiones in chyliferis conveniunt.	ibid.
Celici dolor causa.	374
Celici dolor materia non semper in sola unitate continetur intestinum.	ibid.
Colica biliosa essentia.	ibid.
Gelba item biliosa quae in paralyfim degenerat.	ibid.
Colica pestilens.	ibid.
Ebolens dolor cur difficilis dignoscitur a nephritico.	375
Colicus dolor quod funestus, ibid. epidemicus viximum talis est.	376
Colica flatulosa curatio.	ibid.
Colica specificum intestinum lapi.	ibid.
Colico dolori quae cathartica conveniunt.	ibid.
Colica biliosa quae in paralyfim degenerat an conveniat phlebotomia.	ibid.
Colo inflammatio quomodo de renum inflammatione dignoscatur.	330
Colluctationis febris essentia & causa.	401
Signa diagnostica.	407
Coliculi et irritata causa.	334
Coma quid.	142
Comatis causa.	ibid.
Comatosus afflatus acutissimus morbo supervenientes periculosus.	319
Coma vigilans causa.	ibid.
Cometa quomodo sint causa pestilentium morborum?	426
Coniecta qui anno 1618, apparuit descriptio.	ibid.
ad Conceptionem quot operationes requirantur.	374
Conceptionem impediunt.	375
Concipere an possint quibus nunquam menses fluxerunt.	374
Conceptio in quibus sperabilis in quibus non.	379
Concoctionis prima vitium non corrigitur de secunda.	303
Concoctio naturalem visum fit per elixationem.	315
Concoctura de calido, liquantur ab humore.	355
Condita in basmopoe.	241
Conducent ad virescendum in febribus continuas.	413
Condytona quid 395 quid differat ab hamorrhoidibus.	ibid.
Condytonata sola Chondrygia careantur.	ibid.
Conformatio Africae.	143
Conferat ex fructu cynarodi hepar potentissime refrigerans.	399
Contra agio potiosis communicatur.	ibid.
Contra vertiginem alexipharmaca.	415
Conversio nubilorum vel fenuipitum cur prude.	216
Consultio quid.	158
Consultationis differentiae.	ibid.
Consultationis & consultationis motus diferim.	ibid.
Consultio quoque periculosa.	359
Consultationis secretum supereminere melius quam febre consultum.	ibid.
Consultationis de repletionis curatio.	ibid.
Consultum febrium supereminetium curatio.	413
Corallorum syrupus ad hepar roborandum & fluxum colicidem praefertissimus.	399
Corallorum tinctura hepar refrigerat 399 confert menses immodice fluentibus 333 rheumatismo.	405
Crallorum & margaritarum pulueratum res in febribus	ibid.
maliginis & pestilentialibus.	ibid.
Cardi afflicti 48 morbi insignes.	ibid.
Corac tunica afflicta.	189, 190
Coram carnal gelatina ad vires in pestilenti febre recreandas.	35
Corpor in vivente otiosa transfluxitia & permeabilia.	318
Crisi instante cur narcotica non usurpada.	339
Otios metallorum aqua ad suffusionem.	286
Etosis accelerare partum.	384
Cruentum sputum an sit signum pleuritidis pathognomonicon.	ibid.
Crysallina mineralia ad suppressionem urinae.	344
Crysallo tartari in insulis vendi modus.	303
Crysalli tartari laes in hepatis obstructionibus inuestigati.	ibid.
Crysalli tartari quomodo frangetur ad imposthoribus.	ibid.
Crysalli pustularum malignarum species.	349
Crysalli humoris afflicti.	385
Crysalli sicut vitiani unde.	ibid.
Cucupha ad cerebrum corroborandum.	177
Cucurbitula ubi affigenda in cancris.	159
Cucurbitula summo capiti quando affigenda in pleuritide.	159
Cucurbitula scarificata iuxta curiam glandulas aurium in flammario sedata.	206
Cucurbitula scarificata in occipito in gutta serena.	197
Cucurbitularum in hypochondrijs applicatio non semper tutum.	311
Cucurbitula sub mento scarificata angina curata.	226
Cucurbitula applicata parti dolenti in pleuritide.	235
Cucurbitula scarificata in regione cordis in palpitatione.	314
Cucurbitula ad mammae apposta in fluxu immodico mensium quando sinenda.	313
Cucurbitula ubi eliminanda in hysterica suffocatione.	164
Cucurbitula cum flamma rubida adepta status egregie discutit.	439
Cucurbitularum usus in febribus continuis, 109. in febre pestilenti variis corporis locis, 432. quo morbi tempore, 419. in variolis praeparari poterunt.	444
Cydonium, cydoniorum mela, syrups ventriculum refrigerant & roborant.	274
In Cyanoce Larygis musculi & pulmo afficiuntur.	129
Cystidis felicia obstructio una ex causis illius flauis.	303
D	
Decocta ad suppressos menses.	351
De cocta vulneraria ad viscera veteri.	306
De glutationis facilius vel difficilius causa.	214
De ichthine sinceris cur malis.	288
De ichthine chylosorum causa.	181
Deliquium animi cur hamorrhagiam cohibet.	174
Deliquium animi quid asserat a syncope.	143
Delirium sedatio.	108
Debiles ex facili.	119
Debiles appetuntur.	ibid.
Debitem doloris causa.	ibid.
Debitem dolores cui supplementur medicamentis in autumno fit.	119
Detrahit ad dolorem topies varia.	111
Dieter dolentes caturo quando adrendi.	ibid.
Dieter cur vero ista violenta non extrahend.	ibid.
Detritum casum promouent.	ibid.
Detritum nigredinis & erosione cause.	ibid.
Detrites delibat & detergit oleum viridi.	211
Destillatum refrigerans in fluxu hepatica.	108
Diabetes quid? 341. illius causa ex Galeno ibid. varietates.	ibid.
Diastros in fluxu immodico mensium cur cura difficult.	311
Disociatum album.	416

Diagnosita an in febribus continuis exhibenda.	411
Dixia sudorifica visilitas in febribus frigida humida intemperie.	181
comigenda, 156. in paralyti, 147. in gutta serena.	181
Dialapsa articularis in arthritide roburata.	326
Diaporesis causa.	310
Diaphoreticum cum philonia romosa in singulis viis causa & symptoma valde.	271
in dolore ventriculi.	271
Diaporesis chymica in febre pestilenti.	415
Diaporesis quid.	182
in quo differat ab alijs alius fluxibus.	182
Diaporesis differentia.	ibid.
Diaporesis sympathica causa.	ibid.
Diaporesis signa, sunt consensum & partium mandatum.	ibid.
Diaporesis critica quibus precipue contingit.	381
Diaporesis symptomatice critica & differentia, ibid. an vomitus & plethorica committant.	ibid.
Diaporesis a biliofa curata Largo aqua frigida posui in alio.	382
Diaporesis a ma curata a curato.	ibid.
Diaporesis in hydropico vigilia bona.	309
Diaporesis Femoralis in febre in alio.	315
Diaporesis sine tridanea obstruente noxa.	402
Diaporesis articulatoria comparata in morbis pauperant, an d principio morbi fieri debeat, an d die partus.	381
Diaporesis pulsatilis recompositio.	147
Diaporesis pulsatilis a. ventriculi coactione in uentem.	ibid.
Diaporesis in morbis quid.	415
Diaporesis in vijs quid semper obseruandum.	381
Diaporesis an flouidi malaris conueniant.	385
Diaporesis ad vires hydropem.	374
Diaporesis an conueniant grandis.	386
Diaporesis in febribus commensurum declinatione commoda.	412
Diaporesis quid.	34
Dolores in febribus sedantia.	413
Dolor ictericus quartanarijs proprius.	412
Dyscholasticus species.	245
Dyscholici per quos seruos humor a vomis in abdominis capacitate committant, ab Hippocrate indicant.	309
Dulcia an semper bilei causa.	285
Dysenteria species.	183
Dysenteria Iustit sumpta pestilentia.	ibid.
in Dysenteria unde exalceratio excitatur, ibid. quid mucositas excitata.	ibid.
Dysenteria epidemica peculiaris aeris vitio excitatur.	284
Dysenteris ab aere bile cur letales.	ibid.
Dysenteria curatio.	ibid.
Dysenteria qua purgantis maxime conueniant.	ibid.
Dysenteria an conueniant vomitus.	285
Dysenteria maligna & epidemica bezoardica sudorifica conueniant.	286
Dysenteria quomodo epilepsiam soluit.	419
Dyspepsia causa.	286
Dyspepsia quid.	219
Dysuria causa 338-345. consensum signat.	ibid.
Dysuria cur febribus praeteritis decrepitis committitur.	ibid.
Dysuria qua purgantis conueniant, ibid. qua vomitoria, ibid. qua topica.	346

E

Ebuli decoctum sudorificum est.	158
Ebulum sanguis in variolis & morbillis alia perfestissim alia corrupta.	440
Eilegmus in angina, 218. in empyemate 238. in spato sanguinis.	244
Eilegmus quid differat a syncope.	248
Eilegmus cyphodes hydragogum.	311
Elides secretum.	271
Elides proprietas in paralyti, 158. in ventriculo frigido, 356. in singulis.	263
Elidibaculi vis in casu dentium promouendo.	211

Elides febris quibus 408. signa quibus imolatis.	409
Emplostrum Galenicum ad hemorrhagiam sistens.	151, 223
Emplostra supra spinam dorsii applicanda in paralyti	157. supra
futuram conuulsiuam in catarrho.	169
Emplostrum in conuulsiu.	169
Emplostra in dolore dentium.	195
in empyemate ad pus eliciendum.	239
Emplostrum ventriculorum calefaciens.	217
Emplostra ad hydropem, 312. ad leuissimum, 315. ad vires in-	
continenter, 345. ad fluxum mensium immo diu, 362. in	
suffocatione hysterica, 383. in sterilitate, 378. in arthritide.	
392-395. ad arthritidis praecautioem.	ibid.
Emulsionem Lini in quatuordecim afflicti, 411. in synocha.	
401. in febribus, in febre maligna.	434
Emulsionem conuulsiuam species.	216
Emphyemata causa, 337. signa ibid. curatio.	216
in Emphyemate lateris apertio vbi facienda.	218
Empyri qui euadunt.	ibid. 219
Empyricorum pus quod expurgatur.	218
Emulsionem in phrenitide, 169. in inflammatione ventriculi, 355.	
in inflammatione, eorum & sica, 353. in dysuria, seu ardore	
urinae, 346. in furore verno.	318
Emphibiotis curatio.	359
Emphibiotis visitas in tota decursa febribus valguarum.	413
Emphibiotis in apoplexia mala.	350
Epiala febris effusa & causa.	406
Epiala in febre cur calor & frigus in eadem parte fructus.	
ibid.	
Epiala fructus remedia corpori admissa in tertiana intermitte.	
longiore, 418. in quartana.	411
Epidemica dysenteria aeris putulans vitio excitatur.	284
Epidemica febris potest esse sine obstruente.	375
Epidemica catarrhus.	160
Epilepsia quod.	34
Epilepsia causa.	ibid.
Epilepsia differentia, 317. signa.	161
Epilepsia an incurabilis post 25. annos.	162
Epilepsia curatio.	ibid.
Epilepsia pleuritica malarum febri sunt.	ibid.
Epilepsia ex viro causa.	359
Epilepsia cur quartana soluit.	419
Epithema vesicatorio suscipi adueto curata.	398
Epithemum exsiccatum collyria.	ibid.
Epithema refrigerantia, 169. ad hemorrhagiam sistendam	214.
in hemipar.	248
Epithema in fluxu hepatico.	392
Epithemata in vires inflammatione, 365. in synocha sunt.	401.
401. in bellica cura & hepatis aduocanda, 400. in conuul-	
siu febris declinatione.	411
Epithemata cardiaca in pestilenti febre conueniant.	416
Erbina in febribus.	148
Erbina quando & quibus conueniant in catarrho.	176
Erbina in furore narium.	319
in febribus.	244
Escarbotica an in hemorrhagia sistenda adhibenda.	214
Essentia chymica ventriculorum calefaciens, & roburans.	217
Euacuatio.	313
Euacuatio plethorica in febribus putridis conueniant quando	
neranda.	422
Euacuatio quid.	315
Exanthemata quid differant a purpurae maculis in febre pesti-	
lenti erumpentibus.	424
Exanthematum differentia.	428
Exanthemata in febribus pestilenti cur periculosa.	ib.
Exercitationes & corporis motus commoda.	147
Expectorantia in asthma, 320. in pleuritide.	215
Exploratio per cathetrem in calculi vesica suspitione an cer-	
tior sit quam digiti in oris manifestione.	335
Extenuatio in posthystica causa.	241
Extenuatio non semper est cum sanguinis penuria.	268

Exp.

flu. 331. ad menses immodice fluxus. 333. in hydropo vteri.
371. in vteri proclivitas. 378
Totus ad scitum mortuum excludendum. 383. in doloribus ar-
terialibus. 391
Foris emolliens, attenuans & roborans in hypochondriorum
eg. tunc in febre tertiana longiori. 417. in quartana spuria.
422
Fritillionis modus in bellis. 409
Fritillionum vitilios in febre synopali humorosa. ib.
Frigus quomodo sit causa & curatio. 174
Frontale in pueris. 169. in ophthalmia. 191. in hamor-
gia. 213
Fulmi immixti spiritus fixantes. 240
Furor utriusque quid. 357
Furor vteri causa. 318. signa diagnostica & prognostica. ibid.
ibid. curatio. ibid.
Furor, vterius conueniens remedia moria & melancholia hy-
pochondriaca propria. 382

G

Gallium Paratelsi in colico. 375. eius descriptio.
ibid.
Gale cui desensus circa epilepsia idiopathica causam. 161
Gale cui emplastrum ad cohibendam hamorrhagiam. 201
Galeas ex pulsa furibundis mulierum amores cognoscebat.
157
Galerii sententia de causa materiali & efficiente caliculi impu-
gnator. 335. & sequ. circa causam bullarum vterius immutatio-
num. 328. circa scabulosam in vterius subsidentia. 314
Galli omnes decedunt ad obitu. 312
Galli veteris decedunt in oblatione hepatis contumaci. 304
in melancholia hypochondriaca. 317. in prophylaxi & caliculo.
330
Gangrena vteri curatio. 369
Gargaria in paralysi lingua. 218
Gargaria refrigerantia & repellentia in inflammatione.
lingue. 216
Gargaria in angina. 217
Gelatina pro bellis inflaturanda. 403
Gemellorum abortus cur frequentior. 180
Gemmas cur puerpera in partu deponere debet. 181
Gemmarum ruboris causa in peripneumonia. 216
Gingivarum erosiones vnde. 222
Gingivarum viceribus leuissimis maxime obnoxii sunt. ibid.
Gingivarum putredinem orces sulphuris & varioli spiritus.
ibid.
à Gingivis sanguis fluit aliquando salutariter & curat. ali-
quando symptomaticus. ibid.
Gingivarum erosio in pueris indicium vermium esse potest.
391
Gingivarum affectus in scorbutu. 320
Glandes anodyna ad vesicae dolores leniendas. 337
Glandula cur fluxiones facile excipiunt. 174
Glandula mesenterium obstruente. 363
Glandositas digno. 383
Glossum ut appareat ad foris ophthalmia pertinacis.
198
Grandinis causa. 209
Grandis mulieribus cur familiaris pica. 259. cur circa quartum
mensis cur repleretur liberantur. ibid.
Grani sanguinis an vtero à partu remanentes ut agnoscantur.
385. & 386. eorum eductio. 385
Gruaci vter in paralysi. 156. in ventriculo frigido. 356. in sin-
gulis. 264
Gruatium ex sudorificis in epilepsia preferendum. 163
Gruami arabicum sanguinem sistit. 223
Gurgulionis praefectio. 143
Gustatus viti. 89. curatio. 218
Gutta serena. 180
Gutta serena in curabilis. ibid.
Si in serena an conueniat plebotomia. 181

H

Habitus corporis qualis frigidum cerebri intemperiem au-
guat. 146
Hamatites lapis in hamoptoe. 234. in phthisi. 388
Hamoptoe quid proprie. 219
Hamoptoe causa ibid. partis mandantis signa. ibid. curatio.
ibid.
Hamorrhagia narium causa. 210. 211
Hamorrhagia symptomatica in quibus morbis praecipue contin-
git. 211
Hamorrhagia à narium in quartana febre superueniens cur pes-
sima. 419
Hamorrhoides melancholicis superuenientes salubres. 173
Hamorrhagia imminens prognos. 211
Hamorrhagia non raro morbi acuti soluantur. ibid.
Hamorrhagia qua sit aq. ignis bona. 212
Hamorrhagia curatio. 180
in Hamorrhagia cohibenda an larga manu & amplo furamine
vena scilicet fieri debeat. ibid.
Hamorrhagis an imi deliquio cohibita. 213
Hamorrhagia salutaris & critica per gingivas erupio. 222
Hamorrhoidalium venarum apertura per hirudines in tertiana.
288
Hamorrhoidalium fluxus moderatus à quibus morbis praeseruet &
liberet. 254
Hamorrhoidalium fluxus immodicus causa ibid. signa tum immo-
derationis tum causam. ibid.
Hamorrhoidalium immodice fluxibus qua purgentia conue-
niant. ibid.
Hamorrhoidalium fluxum immodicum cohibentia. 256
Hamorrhoides ligandi, incidendi & vrendi modus ex operatio-
ne celebri. ibid.
in Hamorrhoidalium fluxu curatio & post curationem qua cau-
tio adhibenda. ibid.
Hamorrhoidalium fluxus melancholicus vitilis. 316. 317
Hamorrhoidalium atherio cur in calculo remem vitilissimum. 19. in
vteri scirrhu. 396. in ischiade. 367. in melancholicis prae-
pue in febre pestilenti conuenit. 423
Hamorrhoidalium fluxus cur in quartana salutaris. 419
Hellica febris sedes. 402. differentia. gradus & causa. ibi. signa.
variorum graduum ibid. signa distincta à febre putrida.
ibid.
Hellica cur frequentius accidit à 18. aetatis anno ad 35. ibid.
Hellica qua diata conuenit. ibid. an aer frigidus. 403. an ali-
menta crassa & viscosa. ibid.
Hellicos inflaurantia alimenta. ibid.
Hellicis cur alterantia potius, quam purgantia conueniant.
ibid.
Hellici quo modulo refrigerandi. 404. alacandi. ibid. à balneo
trahendi. ibid.
Hellicis lac cur conuenientissimum. ibid.
Hedera terrestris succus ad dysenteriam. 286
Helleborus omnia medicamenta maniacorum ingredi debet.
172
Hemirania & terbotomia curatio. 179
Hemirania quibus ex febribus componitur. 423
Hemirania differentia & signa. 423
Hemirantia cur periculosos. ibid.
Hepar grauius humoris font est. 313
Hepar calidum & humidum quomodo pituitum generet. 146
Hepate calido & cerebro frigido replerimum ius catarrho obi-
noxii. 175
Hepatis atonia in hepatico fluxu pendet à causa supra prime-
rum qualitatem & excessum. 289
Hepatis inflammationis differentia. causa & signa. 299
Hepatitis à pleuritide signa distinctissima. 299. à mesenterio in-
flammato. 300
Hepatis inflammatio qua periculosa. 306
Hepatis vicius ab humoribus acerbis erodentibus quomodo di-
gnoscatur. ibid.
Hepar inflammationem dulcibus offenditur. ibid.
Hepa.

Index Rerum!

pois obstruendum cause & signa, 302. curatio, 302. & seqq.			
Hepar an semper afficiatur in hydropoe.	307		
Hepatis sanguificatio an laedatur in hydropoe.	308		
Hepatica externa roburatur in hydropoe.	312		
Hermeticorum opinio circa causam siccis aucta, 260. circa ventriculi concoctionem vitiatam, 265. circa causam cholera morbi.	262		
Hermeticorum opinio circa calculorum causas probatur, 277.	277		
335			
Hiera specifica ventriculo.	311		
Hippocratis preceptum de purgatione in ergismo cur hodie non observatur.	402		
Hircini sanguinis usus in pleuritide.	235		
Hircini item sanguinis & urinae usus ad renum & vesica calculum.	313		
Hirudines temporibus & pone aures in maniacis utilissima. 171 in auris inflammatorie, 204. in lingua tumore ipsi lingue affixa.	171		
Hirudinum vidus specicus in angina.	175		
Historia de Meniali epileptica satis faceta.	160		
Hormini semina oculum a foratibus purgat.	189		
Horrifica febris essentia & causa.	405		
Humorum corruptio qualis in peste.	414		
Humorum corruptio & putredo quid differant.	ibid.		
Hydatis vesicula.	309		
Hydrargyris maxime dentes denigrat.	222		
Hydrargyris in iusto affectu magna copia exhibetur.	278		
Hydrargyris erudus an exhiberi possit contra vermes.	292.		
393			
Hydrargyris in plethysi.	247		
Hydrops pulmonis ab Hippocrate graphicè delineatur.	239		
Hydrops abdominis aliquando degenerat in hydropem pulmonum & vice versa.	ibid.		
Hydrops pulmonis signa pathognomonica.	ibid.		
in Hydropem pulmonis an lateris aperio facienda.	ibid.		
Hydrops pulmonis quia hydropogea conueniant.	ibid.		
Hydrops vniuersalis species.	307		
Hydrops ovis an semper hepate affecto fiat.	ibid.		
Hydrops acuti causa frequeniores, ibid. rariores.	ibid.		
Hydrops an ex urina suppressione produci possit.	308		
Hydrops siccus quis.	309		
Hydrops in quibus facilius curatur.	ibid.		
Hydrops alui fluxus quando salutaris.	ibid.		
Hydropici qui sanabiles.	ibid.		
Hydropici curatio.	310		
in Hydropicis cur scilicet purgantia frequenter non usurpanda.	ibid.		
Hydropici an conueniat phlebotomia, 311. an paracetesit. ibid.			
Hydropicorum potus qualis esse debeat, 312. 313. quales cibi ibid.			
Hydrops refrigerantibus curatus.	ibid.		
Hydrops ad maturum quid.	340		
Hydrops vteri 369. quomodo à simplici inflatione distinguatur.	ibid.		
Hydrops vteri particularis quomodo ab vniuersali distinguatur.	ibid.		
Hydrops vteri quomodo à gravitate & mole distinguatur.	ibid.		
Hydrops vteri prognosi.	371		
Hydropici vteri an conueniat phlebotomia.	ibid.		
Hydropici vteri curatio.	ibid.		
Hydrops capitis superueniens consilio lethali.	159		
Hydrops ab urtica medicanda.	269		
Hypocondriaca melancholia.	228		
Hypocondriacum gravitas seu sacietas obstruendi hepatis signum.	301. 303		
Hysserica passionis causa, 358. differentia.	ibid.		
Hyssericum paroxysmum excitantia.	ibid.		
Hysserica paroxysmorum causa.	ibid.		
Hyssericum symptomatum causa.	359		
Hysserice symptomata quomodo distinguuntur à syncope, 360.	360.		
ab apoplexia ibid. ab epilepsia.			
Hysserica mulieres quomodo à mortuis distinguuntur.			
Hysserica defuncta ante 3 diem non sepelienda.			
Hysserica passionis causa quomodo dignoscenda.	361		
Hysserica passio an periculosa.	ibid.		
Hysserica mulieri cur formatum superueniens bona.	ibid.		
Hysserica passionis curatio extra paroxysmum.	362		
Hysserica passionis specifica.	ibid.		
Amuleta.	ibid.		
3			
Ictus usus in fluore muliebri.	250		
Icterus quid.	303		
Icteri species, ibid. causa.	ib.		
Icterus an semper ante septimum lethalis.	ib.		
Icterus specifica.	ib.		
Icterus albus quid.	347		
Ictici varia nomina.	276		
Ictici quid.	ib.		
Ictici causarum signa.	377		
Icticium affectum quia signa distinguant à colico dolore.	ib.		
Icterus an semper exitialis in quo pass. humores facies emouuntur.	ibid.		
Ictici curatio.	ib.		
Icteo ab inflammatione conuenit vena sectio. 278. iudicia.	ib.		
Icteo desperato folijs fabrilis & argenti vna vsus an conuenias.	ibid.		
Imaginatio an ladi possit rationatione illusa.	166		
Imperforata qua.	246.		
Inanitas quomodo singularem excitare possit.	263		
Inappetentia causa, 254. prognosi & curatio.	353		
Inappetentia potui causa.	442		
Inappetentia in febribus curatio.	314		
Incontinentia urina causa.	422		
Incrassanti blandum humoremque acrem demulcent.	227		
Incrassanti humores in catarrho.	ib.		
Insaues laesentes quibus carnes exhibentur cur maxime lumbi infestantur.	290		
Inflammationibus partium internarum febres essentiales succedere solent.	406		
Influxus systerem quomodo sine causa morborum pestilentialium.	425. 426		
Inieccio per syringam in anam in fluxu hamorrhoidum immo-dico.	393		
Iniectiones vesicae vlcera detergentes & consolidantes, 40. quod instrumento immittenda.	ibid.		
Iniectiones ad ardorem urinae, 346. ad menses suppressos, 352. ad immodice fluentes, 354. in fluore vteri, 356. in vice vteri, 366. 377. in hydropoe vteri statim.	371		
Inieccio vteri cur purgans.	372		
Inquietudines febribus tantum sedantia.	414		
Inieccus an dysenteria conueniat, 287. in tenesmo.	388		
Instantanea alimenta pro bellicis.	407		
Interperies simplices cur rare.	146		
Intermittentes febres an semper periculo vacent.	414		
Intestinorum affectus.	274		
Intestinum lups ad colicam.	275		
Intestinorum motus naturalis.	276		
Intestinorum exulcerationis causa est qualitas maligna specifica.	283		
Intestina tenuia an crassa afficiantur dignatio.	284		
Intestinorum vlcerationum in dysenteria curatio.	385. 388		
Ira incommoda.	147		
Ireos nostratis succus pro vomitu in asthma, 230. in hydropoe.	310		
Isciadicus dolor quas partes occupet.	396		
Isciadicus dolor per se peruenit cur luxationem inferat.	ib.		
Isciadice deng in ischiade secta vitata.	ib.		
Isciadia que purgantia conueniant.	ib.		
Isciadem resoluenda.	ib.		
Isciadia materia aliquando suppuratur.	399		

Index Rerum.

I
Icteria quid. 343
Icteria differentia ibid. legitima causa, & signa ibid. spuria. 344
Icteria an periculosa. ibid.
Inguales vena in angina aperiri possunt. 327
Iulepi refrigerantes in pleuritide. 169
Iulepus sanguinis immodice fluentis impetum cobovens. 214
Iulepi cardiaci. 268
Iulepus in sanguinis vomitu 268. in dolore ventriculi. 271
Iulepi in colica biliosa. 276
Iulepi bepar refrigerantes. 322
Iulepi Alexandrini compositi. 409. *vsus in febribus biliosis.* 409
Iulepus in calculo ad vias leniendas. 329
Iulepi in inflammatione renum & vesicae. 330. *in mixtu sanguinis.* 338. *in ulceribus renum.* 339. *in diabete.* 341. *in urina suppressione & puncta crasse.* 344. *in dysuria seu ardore urinae.* 346. *in flore muliebri.* 346
Iulepi proboletici. 404
Iulepi in febribus biliosis. 410
Iulepi in ulceribus in bile valde atri & tenui. ibid.
Iulepi alterant in febribus malignis. 411
Iulepi pro delictationibus, & in magna virium exolutione in febribus continuis. 411
Iulepi alterantes alexiterij in febribus malignis. 442
Iulepi catuli nuci anglicis ad suffocationem hyssericam. 362
Imperi bacarum decoctum in alui fluxu. 382
Infectionum in alui adfectione. 316
Infula medicata bepar refrigerantia. 299. *deobstruentia.* 304
Infulum in melancholia hypochondriaca. 325
Infula in calculo renum. 328. *ad praeparationem ad calculo.* 330. *in dysuria seu ardore urinae.* 346. *ad menstrua immodice fluentia.* 353. *in hydropse vteri.* 371
Infula febricitantum in acutis febribus. 408. *in minor acutis.* ibid. *in longis.* 409. *in uerbis febribus malignis, & pestilentibus.* 434-435.

K

K
177a quid.
Kalaia.
Kopos.

L

L
Ac quibus siticulis salutare. 364
Lactis vsus in dysuriis ad diarrhoeam. 285
Lac putrescent cur non generet vermes. 291
Lactis serum refrigerat & beneuolent. 322-323
Lactis serij preparatio. ibid.
Lac asinum ad corpus emaciatur. 299. *quando conueniat in melancholia hypochondriaca.* 328. *in ulceribus renum.* 340. *vteri.* 366
Lac ouillum ad mixtum sanguinis. 338
Lac vaccinum ad renum & vesicae vlcera consolidanda. 340
Lac tepens reuenter multum anodynum praestantissimum in vlcere vesicae. ibid. *in oribitico dolore.* 393
Lac asinum quando conueniat in dysuria seu ardore urinae. 346
Lac chalybeationem ad fluxum muliebrem. 316
Lac asinum antipodagricum. 395
Lac cur bechicis conueniat. 404
Lactica & alba materia cum urina excreta causa. 345
Lactica oculis infusa. 222
Lacrancu collyrium ad oris & facium vlcera. 497
Lapidei ceni succus materialis causa calculi. 327
Lapidei spiritus hominum corpora alioque in saxa conuertit. ibid.
Larynx & pharynx propter viciniam in angina repleturum afficiuntur. 224
Larynx vsus & officium. ibid.

Laryngotomia an in angina administranda. 228
Laudani vsus etiam in elyphris phrenicorum. 169
Laudani vsus in catarrho calido. 277
In hamorrhagia. 214
In dolore dentium. 221
In facium & oris vlcibus. 222
In vomitu. 430
In pleuritide, seu exigua doli. 210
In cholera morbo. 269
In dysentericorum clysteribus. 285
In tenebris & per os sumptum. 289
In calculo renum. ibid.
In sychnico dolore acerbare. 327
In febre pestilenti cum alexipharmacis permixti. 345
Leuia febris essentialis causa & differentia. 154
Leniscentur ligni de collum ad cerebrum exsiccamum. 176
Leithargus in quo differat ab epilepsia, caro & comate. 149
Leithargici quomodo empyici sunt. 150
In Leithargo qualiter purgandum. 151
Leucoma quid. 289
Leucomatis differentia. ibid.
Leucopilegmata quando salutaris diarrhoea. 329
Lienis nouus vsus ex Hermiacis. 262
Lienosis gastrorum vlcibus obnoxij. 222
Lienosis dysenteria superueniens qua bonis. 284
Lien cur obstruionibus obnoxius. 314
Lienis obstruionum causa & signa. ibid.
Lienis scirrhus in quo differat ab eius inflatione. ibid.
Lienis scirrhi curatio. ibid.
Lienis scirrhi specifica vtrica mortua, herba lionis vocata. 315
Lien per ramos splenici cum omento communicat. 335
Lienis specialis cura in quartana habenda. 412
Lienis poenitentia materiam ad se trahit. 310
Lienis inflammationis signa, prognosij & curatio. 222
Lienis dolor quomodo distinguitur a colico. 313
Lienteria quid. 329
Lienteria an fiat retentio ventericuli vitio, an concollicis. ibid.
Lienteria quid differat a colica passione. ibid.
Lienteria causa signa, prognosij & curatio. ibid.
Lienteria qua purgantia conueniant. ibid.
Lienteria ad debilitate ventericuli curatio. 280
Qualia enemata conueniant. ibid.
Limatura chalybis varius vsus in obstruionibus referendis. 304
Lingua & seu in ardore siccitate & scabritie in febribus quomodo curanda. 414
Limetura hepatica resoluentia. 302
In ictero. 306
In hepatis scirrbo. 323
In hydropse. 330
In calculo renum. 329
Ad praeparationem ad calculo. 332
In inflammatione renum. 316
In inflammatione vesicae. 317
In mixtu sanguinis. 338
In urina incontinentie. 343
In dysuria seu ardore urinae. 346
In fluxu mensium immodico. 318
In hyssericis suffocatione. 304
In vteri inflammatione. 365
Linimentum Aetij ad totum corpus in febre pestilenti. 421
Lipathymus quid differat a syncope. 228
Lippitudo quid. 190
Liquida cur facilius vel difficilius deglutiantur in angina. 224
Liquores cardiaci ad palpitationem. 354
Liquorum acidorum vis. 262
Loca quodam cur pessifera labe nunquam tententur. 426
Locchia fluxus an phlebotomia in angina praecipue debetentur. 226

Ggg Lochio.

Index Rerum.

Lochiorum fluxus immodicus vnde estimandas. 184
 Lochiorum fluxus immodici causa. 185
 Lochiorum fluxus immodicus cur periculosus. 186
 Lochiorum fluxus in modici curatio. 187
 Lochiorum suppressionem quae mala sequantur. 188
 Lochiorum suppressionem curatio. 189
 Lochiis suppressis vnde mittendus sanguis. 190
 Lochoch in hamptoe. 191
 Longauitatem cur interdum arthriti concillet. 192
 Loquela infirmorum cum auditorijs instrumentis consuevit. 193
 199
 Lotiones pedum in phrenitide ex quibus componantur. 169
 Lotiones manuum & pedum in febribus continuis. 413
 Lumborum dolorem in febribus sedantia. 421
 Lumbri ad quod effectum prater naturam genus referendi. 250
 Lumbri lat an viciis vermis, an ex pluribus constent. 184
 Lumbri causa efficiens ibid. materialis. 185
 Lumbri cur maxime infestantur pueri lactentes quibus carnes exhibentur. 186
 Lumbri an ex melle & saccharo possint generari. 187
 Lumbri quae mala accerant. 188
 Lumbriorum excretio in morbis an solutariis. 189
 Lumbri enecantia. 190
 Lumbri quae purgantia conueniant. 191
 Quales elysieri. 192
 Lusarii rati cerebro maxime infensi. 193
 Lupinorum intestinorum pulvis in colico dolore. 194
 Lupini hepatis exsiccati pulvis ad epilepsiam hysteriam. 195
 Lupina cura exsiccata amuletum in suffocatione hysterica. 196
 Luxationem cetera cur ischiadica dolor inferat. 197

M

Macies etiam a sanguinis copia. 343
 Macies summa cur vna ex sterilitatis causis. 375
 Macula praecipue in viribus vnum ex febrili signis. 340
 Macula purpurea an sint pathognomonica febris pestilentis signum. 428
 Macula purpurea in pestilenti febre quae bona, quae mala. 431
 Malacia quid. 257
 Malacia causa. 258
 Malicio impediri potest conceptio. 374
 Maligna febris quae. 421
 Malignam febrem cur carbunculi & parotides significant. 429
 Malignam febrem quae purpurea macula indicent. 430
 Maligna febris, celsi aegri ab ea immunes videntur, infida. 431
 Malignarum febrium in iuuu, cur purgandum. 432
 Maligis in febribus malum citrimus alexipharmacum praestantissimum. 434
 Maligis in febribus an in doloribus capitis oxyrhodium conueniat. 435
 Malum an infitredus creatis. 436
 Malum decollum in dysuria seu ardore urinae. 437
 Malum florum c mserua. 438
 Malum in aeternum aeternum in praegnanse cur abortum portendat. 439
 440
 Mamma quid. 170
 Mamma a phrenitide differentia. 171
 Mamma causa. 172
 Mamma significatio. 173
 Mamma materia ubi continetur. 174
 Mamma effectus est valde duraturus. 175
 Mamma quae curantur sanior. 176
 Mamma curatio. 177
 Mamma impletum. 178
 Mamma vbi variis in alui distillatione. 179
 Mamma quid. 180
 Mamma i varia causa. 181
 Margaritana, & corallorum puluerum lani in febribus maligna & pestilentibus. 418

Mentis vitrioli vsus in mensibus immodice fluctuantibus. 35
 in epilepsia hysterica. 36
 Mesenterica quando conueniant in catarrho 176. in dolore. 22
 dentium. 23
 Mesliche sumpta vomitus compescit. 26
 Mesliches vsus in hydrope ad sum fallendum. 31
 Materia preparata, & indolito forma ab eodem agente praeparatur. 29
 Materia in iboribus capacitate contenta quae transcat. 28
 peboratur. 29
 Maxillarum tumorem in dentium dolore resolutum. 32
 Meatus coci in corpore sunt, per quos materia & humores transcat. 30
 Meatus & ductus patentes, per quos crassa materia in abdominis capacitate transcat. 31
 Medici, vide Parisienses. 32
 Mel resacum cum guttis aliquot spiritus vitrioli ad oris, & faucium vlcera. 221
 Mel & saccharum an lumbrius generent. 226
 Melancholicus humor vix plurimum in hypochondrijs cumulat. 145
 Melancholici plerumque sunt epileptici, & contra. 162
 Melancholiam purgantia. 169
 Melancholia morbus. 172
 Melancholia vari gradus. 173
 Melancholia causa proxima. 174
 Melancholia morbus est cum immixtissimus. 176
 Melancholia flegellum Medicorum. 177
 Obrobrum. 178
 Melancholia curatio. 179
 Melancholia hypochondriaca sacra. 180
 Melancholia hypochondriaca causa. 181
 Melancholia hypochondriaca cur quae & adulescentes minime obnoxii. 182
 Melancholia hypochondriaca signa. 183
 Melancholia hypochondriaca cur affectu stasiosa vocata. 184
 Melancholicorum vaporum varia symptomata. 185
 Melancholia hypochondriaca curatio. 186
 An conueniat aquarum thermalium potus. 187
 ex Melancholici humoris malignitate qui effectus excutitur. 188
 189
 Melancholia symptomata scorbuticis similia. 191
 Mensibus cui lochijs fluentibus in praecipui angina an toleranda sanguis. 225
 Mensium suppressionum causa. 348
 Mensium suppressio vltra sex menses an insanabilis. 349
 Mensium suppressio cum summa excretionem larga sanguinis miffione a Galeno curata. 350
 Mensium fluxus immodici causa. 351
 Mensibus immo. l. fluentibus an conueniant phlebotomia. 352
 Menstrua alba, vide Fluor muliebris. 353
 Mercurius quomodo preparandus ad epilepsiam. 163
 Mercurij coniunctio catarracta curata. 186
 Opibet alia de sperata. 194
 Mercurius praecipitatus ruber ad polytum & sarcomata. 188
 Mercurius crudus an exhibendus in dysenteria. 189
 Contra vermes. 195
 Mercurij dulcis Lani contra vermes. 196
 Mercurij dulcis vsus in obstructiombus. 197
 In hydrope. 198
 In calculo renum. 199
 In ischiadico dolore. 200
 In rheumatismo. 201
 Mercurius vmbilicis externis vlcera interna & externis medicandi & consolandi. 340
 Praeparatum diaphoreticum. 341
 Mercurius vna quibus obstructum. 342
 Mesenterij tumor quomodo ab hepatis inflammatione distinguatur. 300
 Mesenterij intestinis & lumbis alligatur. 309
 Mesenterij infarctum morborum parens, & Melitum maritima. 112
 Me-

Index Rerum.

Mefenterij affectus cur ab Autoribus omiffi. *ibid.*
Mefenterij obftructionum caufa & figna. *ibid.*
Mefenterij inflammationis caufa. 323
Mefenterij inflammatio quomodo à diaphragmatis tumore diftinguitur. *ibid.*
Mefenterij inflammatio plerumque in abfcerfsum degenerat. *ibid.*
Mefenterij abfcerfui non omnes funt ab inflammatione. *ibid.*
Mefenterij abfcerfui cur femper periculofi. *ibid.*
Mefenterium in longo alui profufione praefcriptio quantum valuerit Sprinchio Medico. 282
Mefenterij fulminei exitiarum, & rigidorum permanentium. hiftoria. 249
Meftenchygefeu clyfteres veterini ad menfium fuppreffionem. 352
Non praefcribendi virginibus. *ibid.*
Mellus fanguinis caufa. 337
Mellus fanguinis aliquando criticus. *ibid.*
Mellus fanguinis pericula. 338
Mellus fanguinis lac oculum rale. *ibid.*
Trogibici Gordonij & de carabe. *ibid.*
Mellefi in decollum in haemorrhoidum dolore. 297
Mellepedum laus in calculo renum. 336. in calculo veficae. *ibid.*
Modus & artificium faciem. & ingeniofum ad vterum prolapfum repomendum. 372
Monfperienfis purpurata febris anni 1623. descriptio. 412.
Morbi partium à diæta, partim à fpiritu. 160
Morbillorum à variolis differentia. 418
Morbilli & variola aia fene morbi noui. 419
Morbillorum caufa. *ibid.*
Morbillorum erupcio cur interdum tandiu differt. *ibid.*
In Morbillis & variolis erubillito duplex. 439
Morbillorum duo tempora, ebullitionis, & eruptionis. *ibid.*
Morbillorum differentia. *ibid.*
Morbillorum imminutum figna diagnofica. 449
Morbillorum curatio. *ibid.*
Morbus cur Ledi paretis illafo fefu, & contra. 276
Morbus conuulfus quomodo à conuulfione differat. 118
Morbus deprauati fymptomata quomodo inter fe differant. *ibid.*
Morbus in dyffenteria cæcæ quid & vnde. 283
Morbus infirmum quando melius audietur. 199
Morbi cur iurdi aborti. *ibid.*
Morbi dyffentia quid. 187
Morbi dyffentia 187. curatio. 188
Myrtilla feu myrtilla à nunci fuffitu flatu, infla ftepitus pulneris tormentarij. ex viro expofita. 372
Myrtilla aut conitit ventericulum reborant. 257
Myrtillorum decollum in dyffenteria. 285

N

Narcotica vi paralyfim generantia. 151
Narcotica cum cautione adhibenda. 166
Narcoticorum vfus in catarrho cæcæ. 177
In opthalmia. 193
In aurium dolore. 204
In haemorrhagia. 214
In dolore dentium. 221
In fingula. 264
In cholera morbo. 269
In dolore ventericuli miffa cum purgantibus. 271
In clyfteribus ad dyffenteriam. 285
In fluxu hepatico. 290
In icufmo & per os fempta, & admata. 291
Narcotica an in pleuritide conueniant. 294
Narcotices quando locus in renum calculo. 146
In renum & vefica inflammatione. 352
In dyabece. 243
In dolore inmani cancri vterini. 363
In arthritide. 391
Narcotica quondam vi inefi vaporibus in dyffentia paffione. 318

Nafalia virginibus, non autem Boffia praefcribenda. 358
Nephritici lygni infufio in hepatis obftructionibus. 304
In melancholia hypochondriaca. 319
Nephriticus dolor quando maxime periculofus. 320
In Nephritico dolore quando locus narcotici. *ibid.*
Nervi quinta coniugationis rami communes lingua & auribus. 399
Nerui partes cur humoribus imbuta in arthritide non conuulfantur. 389
Nodofa arthritidis recentis remedia. 124
Noduli anodynij ad veficae dolores. 337
Nofus qualia vlcera. 223
Nonatores bodierni cardiacorum vfum oblegentes capuntur. 383
Nutritiois perfecta munia, bene ingerere, digerere, exegere. 274
Nuxinglans & mofchata condita ventericulum calefaciunt, & reborant. 312
O
Obftructionum partium infimi venteris fymptomata. 174. 176.
Obflectrix partium praepofita modo excrementum quomodo dirigere debet. 383
Obftructionis hepatis caufa & figna. 101
Obftructionibus trueratis maxime conferant remedia ex taro, vitriolo, chalybe. 304
Obftructio cyftidis fcillea caufa. 305
Obftructiones graues, & contumaces praecipua caufa hydropis. 310
Obftructionis lien cur obnoxia. 314
Obftructionum in melancholia hypochondriaca caufa. 315
Obftructiones partium infimi venteris, praecipue vterum curant. 347
Merum, chlorofoe caufa. 180
Oculorum affectus. 381
Oculi amica & aduerfa. 184
Oculi prominentes fuffufioni obnoxij. 184
Oculo vno tantum inflammato maiores dolores cur fiant, quam vtroque. 190
Oculorum vlcera cur periculofa & difficilia curata. 195
Oculi cancer vi curatur. *ibid.*
Oculus à variolosa noxa defendenda. 448
Oleum magna efficacia ad parturientium tormina. 187
Olea an conueniant in arthritide doloribus. 391
Olei fcorpium Matthioli laus ad vrus in poftilenti febre euacuandum. 418
Olfactus fymptomata. 208
Omentum per quos duftus cur lieme communicet. 315
Omenti veteris vfus aduerfus abortum. 331
Omenti morbi cur ab Autoribus non defcripti. 335
Operationes rerum creaturarum quomodo male dici poffint. 345
Opthalmia differentia. 189
Curatio. 193
Opthalmia copiofiffima fanguinis miffa conuenit. 191
Opthalmia iufto culyry repellentibus non vitendum. *ibid.*
Opthalmia an balneum & vnum conueniant. 195
Opthalmia desperata vnguento mercuriali curata. 194
Opata cephalica reborant. 148
Opatis cephalicis quid praecipui admittendum. 176
Opata in epilepfia. 163
In manie. 171
In catarrho. 176
In gutta ferena. 181
In hamoptoe. 240
Opata cardiaca in palpitatione. 352
Opata cardiaca & refectant. 213
Opata in ventericulo frigido. 216
Opata ad fanguinis riuulum. 162. ad vlcus ventericuli. 278
In lienteria & callata paffione. 286
In dyffenteria. 289
In fluxu hepatico. 299
Opata hepar refrigerant. 301
Deobftrata.

Index Rerum.

<i>Ex chalybe.</i>	304	<i>Parasitici Medici notati de sanguinis missione in pueris tenel</i>	
<i>In hydrop.</i>	311	<i>lali & lac jugentibus.</i>	440-44
<i>In levis scorb.</i>	314	<i>Parovides in febribus malignis, & purpuratis quando praeipu.</i>	
<i>In melancholia hypochondriaca.</i>	318	<i>satiales.</i>	431
<i>In miltu sanguinis.</i>	338	<i>Parotidum curatio in febribus malignis.</i>	437-438
<i>Opia purgantes in renum ulcere.</i>	339	<i>Paroxysmus epilepticus aliquando permittit.</i>	161
<i>Opia consolidantis vim habens in ulcere renum & vesicae.</i>	340	<i>Paroxysmus epilepticum a curantia.</i>	ibid.
<i>Opia ad incontinentiam urinae.</i>	340-342	<i>Paroxysmus hysterici saluati.</i>	361-363
<i>Ad fluxum malebrem.</i>	356	<i>Paroxysmus in quartana cubitena.</i>	421
<i>In furore vetero.</i>	358	<i>Parti mandanti & recipienti consideranda in catarrho.</i>	374
<i>Ad veterum roborandum & venereum stimulantem.</i>	377-381	<i>Partis difficultatis causa.</i>	382
<i>acris abortum.</i>	381	<i>Quomodo distinguenda.</i>	ibid.
<i>Opia antispasmodica.</i>	391	<i>Partis difficultis quomodo fiat obsteritrici errore.</i>	ibid.
<i>Opia pro bestia.</i>	404	<i>Partis naturalis intra 14. horas fieri debet.</i>	ibid.
<i>Ad vires reficiendas in febribus continuis.</i>	407	<i>Partum accelerantia per os sumpta.</i>	ibid.
<i>Cardiaca in febre synopali humida.</i>	414	<i>Partum accelerantia venarum inferiorum scellio.</i>	383
<i>Aperiens & corroborans in gastrica legitima.</i>	421	<i>Partum specifice proprietate inuati.</i>	ibid.
<i>Opium timidi auris an adhibendum.</i>	202	<i>Partis die an criticorum diuina computatio fieri debeat in.</i>	388
<i>Opisthotonus conuulsivus species.</i>	158	<i>Partis morbus perperarum.</i>	390
<i>Ordo in alimentis sumendis propefferus concisionem vitia.</i>	349	<i>Paffia iecori amica.</i>	403
<i>Organi quid.</i>	409	<i>Quomodo praeparanda pro bestia.</i>	ibid.
<i>Quomodo cognoscantur.</i>	410	<i>Talla regali ad bestias instaurandot.</i>	248
<i>In Orgasmo praxis ordinaria cur phlebotomia potius, quam</i>		<i>Patetiam animi vis praecipue ira, & tristitia.</i>	215
<i>purgationem adhibet.</i>	ibid.	<i>Patetiam animi sanguinem sursum impellant.</i>	427
<i>Oris tortura conuulsivus.</i>	313	<i>Patetiam animi vis quantum conferat ad pestem inferen-</i>	413
<i>Oris varia collationes in dolore dentium.</i>	319	<i>dam.</i>	412
<i>Oris ulcerum curatio.</i>	322	<i>Pelloris ardorem in febribus temperantia.</i>	319
<i>Oreorum dolor quartanarum proprius.</i>	418	<i>Pedum, & manuum refrigerationes quomodo febrium incre-</i>	412
<i>Orum induratum ut apponendum in opthalmia.</i>	393	<i>diua temperent.</i>	359
<i>In ulceribus cornes.</i>	395	<i>Pellus veruena calens conuulsione.</i>	386
<i>Oculi induratis aceto, Auroris alui fluxus inueteratus curatus.</i>	308	<i>Ad purperarum tormia.</i>	337
<i>Oxyuri vsus in cobibenda haemorrhagia.</i>	314	<i>Pellus ventriculorum calefacientes.</i>	250-251
<i>In vomitu sanguinis.</i>	268	<i>In Pericardio palpitationis causa satis frequentes.</i>	236
<i>In dysenteria in cholera morbo.</i>	269	<i>Peripneumonia eadem essentia cum pleuritide.</i>	ibid.
<i>In ilico affectu.</i>	278	<i>Peripneumonia differentia.</i>	237
<i>Oxyterium cur non exhibendum in fluxu mensium immo-</i>		<i>Peripneumonia quae comitibus habeat cum pleuritide.</i>	ibid.
<i>diis.</i>	385	<i>Peripneumonia cur phrenitide periculosa.</i>	ibid.
<i>Oxytel simplex & salicem ad obstructions lienis.</i>	314	<i>Peripneumonia curatio.</i>	ibid.
<i>Oxyrhodina in phrenitide.</i>	308	<i>Peripneumonia mulieribus, mensibus stentibus, vnde miltu-</i>	ibid.
<i>Oxyrhodina in febribus malignis in dolore capitis an conue-</i>		<i>das sanguis.</i>	175
<i>niant.</i>	350	<i>Peripneumonia insensibili quam copiosa fiat euacuatio.</i>	351
<i>Oxyra causa.</i>	ibid.	<i>Deflaria ad menses suppressos.</i>	358
		<i>Non praescribenda virgibus.</i>	358
		<i>Deflaria adstringentia ad menses immodice fluentes.</i>	357
		<i>Deflaria 356. in furore vetero.</i>	357
		<i>Deflaria purgans in suffocatione hysterica.</i>	358
		<i>Deflaria in vteri inflammatione.</i>	358
		<i>In hydropo veteri.</i>	358
		<i>In vteri procidentia.</i>	358
		<i>Deflaria veterum expurgantia.</i>	358
		<i>Deflaria ad satum mortuum excludendum.</i>	358
		<i>Deflaria febris quid a peste differat 413. quomodo cur affici.</i>	414
		<i>Deflaria febrium variis causis.</i>	421
		<i>Deflaria labor certa lege cur non tententur.</i>	421
		<i>Deflaria leuium morborum quomodo causa sine prama alimenta.</i>	421
		<i>Deflaria cur post senem.</i>	421
		<i>Deflaria morbis quantum conferant animi patetiam.</i>	421
		<i>Deflaria febribus futura signa.</i>	421
		<i>Deflaria febribus quomodo praecautenda. 339. curanda.</i>	421
		<i>An vna?</i>	421
		<i>Vena sectio.</i>	421
		<i>Quibus ex vena.</i>	421
		<i>Quo febri tempore.</i>	421
		<i>Deflaria febri initio an purgatio conueniat.</i>	421
		<i>Deflaria febri alexipharmaca varia.</i>	421
		<i>Petechiae, seu peteculae quid.</i>	421-422
		<i>Pharynx quomodo afficitur in angina.</i>	422
		<i>Phlebotomia in omni sanguinis fluxu est remedium remu-</i>	422
		<i>rium.</i>	422
		<i>Phlebotomia in phrenitide cur amplius pro vna fieri non debet.</i>	422
		<i>163</i>	422
		<i>Phlebotomia liberalissima in opthalmia facienda.</i>	422

- Plebotomia an dysenteria conveniat.* 384
Plebotomia an conveniat hydropsi. 311. *scirrho lienis.* 334
- 315
Plebotomia in omnium partium infra renes positaram affectibus à ventis inferentibus at derivationem celebranda. 345
Plebotomia utilis in febribus continuis. 408
Plebotomia vsque ad vomit deliquium in syncho putrida, & casu an facienda. *ibid.*
Plebotomia ceteroad indicationes in febribus continuis. 409
Pleuritis quid. 166
Pleuritis differentia. 167
Causa. *ibid.*
Pleuritis cur violenter letalis. 168
Pleuritis curatio. *ibid.*
Pleuritis an purgatio conveniat. *ibid.*
In Pleuritide topica refrigerantia cautè adhibenda. *ibid.*
Pleuritis cur interitum vena suppriuit. 177
Pneumonia immensus causa. 143
Confirmata. 145
Pneumonia inter hæmorrhoidum morbus principem locum obtinet. 143
Pneumonia (ape emittitur catarrhus consumax in pulmone de-fluens). *ibid.*
Pneumonia deplorata signa. *ibid.*
Pica morbi causa. 119
Pica virginitas chlorosi laborantibus, & gravidis cur famiharis. *ibid.*
Pica que vox & incommoda sequitur. 160
Pilula priantem purgantes. 400
Pilula in paraly. 317
Pilula in catarrho falso. 177
Pilula ad dolorem capitis. 178
In gutta serena. 181, 182
In tumore molli & laxo lingua. 116
Pilula de balneo celebrata in fluxu hæmorrhoidum. 198
Pilularum de cynglosto vsus in cysteribus ad dysenteriam. 185
Pilula ad hepatis obstructions continuaces. 303, 304
Ex chalybe. 305
In iurbo hepatis. 306
Pilula ad hydropem. 310
Pilula de ammoniaco ad lienis obstructions. 314
Pilula in melancholia hypochondriaca. 317, 318
Pilula ad calculum immittendum. 310
Ad praeruptum à calculo. *ibid.*
Ad multum sanguinis. 336
Ad vicia renum & vesicae. 340
Pilula ad suppressos menses. 350, 351
Ad fluxum muliebrem. 355
In paroxysmo hysterico. 362
Extra paroxysmum. 364
Ad vicia vteri. 366
Pilularum vsus in gravidis cur suspectus. 379
Pilula Zecoli ad obstructions tollendas, & hepatis roborem. 417
Pilula vsuales in quartana legitima. 420, 421
Pinguis ventriculi relaxans. 359
Pinguis de china totius corporis cur conceptionem impedit. 375
Pilula metropolis cerebrum. 145
Pituita quomodo attrahatur à capite & pulmone. 175
Pituitam producens. 146
Pituita an conveniat vena scissio. 147
Pituitam purgans. *ibid.*
Pituita acris & falsa catarrhi serini causa. 143
Pituita paralytici efficiens in quo differat ab ea que convulsione. 118
Pituita varia differentia variis effectibus producat. 418
Plantaginis succus ad mellum sanguinis, & quancunque hæmorrhagiam viscidum. 338
Pilula antiscorbutica. 321
Pilula cur frequentius inflammatur quam alia membra. 123
Pleuritis differentia. 113
ad Pleuritidem morbum qui dolores referantur. *ibid.*
in Pleuritide vera que partes afficiuntur. *ibid.*
- Pleuritis in quibus educenda cum peripneumonia.* *ibid.*
Pleuritis materia. *ibid.*
Pleuritis supra pathognomonica. *ibid.*
Pleuritis (puria quomodo distinguatur à legitima. 31
Pleuritis signa prava. 114
in Pleuritide diuturna quando mala. *ibid.*
in Pleuritide an semper mittendus sanguis vsque ad mutationem coloris. *ibid.*
Pleuritis di topica convenientia. *ibid.* *cum febre valde acuta, & vigiliis an narcotica conveniant.* *ibid.*
in pleuritide quando purgandum. *ibid.*
Pleuritis specifica. *ibid.*
Plumbi lamina perforata supra renes gestata ad praeruptum à calculo. 332
In mella sanguinis. 339
In furore veterino. 317
Podagra que curabilis. 391
Podagrica morbi an semper 40. diebus terminetur. *ibid.*
Podagra an vomitus conveniat. 395
Podagra, & alij arthritici doloribus quantum valeat emplastrum diapalma. *ibid.*
Podagrica dysenteria superueniens cur bona. 172
Potius semen & radix ad epilepsia specifica. 112
Polypi causa, & curatio. 208
Potro licet sordida in calice bibula qua in paralytici degenerat. 176
- Potus febricitantibus quando concedendus.* 413
Prægnantibus cur famiharis pica. 158
Prægnantium morbi cur periculosi. 378
Præputi primis & vltimis gestationis mensibus. *ibid.*
Prægnantium diata in morbis acutis. *ibid.*
Prægnantibus an mittendus sanguis. *ibid.*
Prægnantes cur iactes, & frequentius nunc purgentur, quomodo tempore Hippocratis. 379
Prægnantibus cur suspensus pilularum vsus. *ibid.*
Et viciniquæ cysteres. *ibid.*
Priapismus quid. 158
Procidens seu prolapsus vteri. 372
Procidens causa. *ibid.*
Prolapsum veterum reponendi ingeniosum artificium. *ibid.*
Itis purulenta qui. 145
Pisina ex jena cum sale tartari purgat & aperit potissimum. 304
Puerilis epilepsia curatio. 164
In Pueris inappetentia cur gravior, quam in alia ætate. 171
Pueri lactentes quibus carnes exhibentur cur à lumbricis maxime infestentur. 290
Puerorum lenta febris ab obstructione rhabarbarum præter sustinuum. 408
Pueris tenellis qua ætate in variolis mitti possit sanguis. 440
Puerpera cur gemmas deponere debet. 318
Puerperarum febres unde oriantur. 387
Puerperis an mittendus sanguis. *ibid.*
Puerperarum in morbis critici dies an à partu computandi. *ibid.*
Pulmo cur fluxionem facit exipit. 175
Pulmones in angina (ape afficiuntur. 225
Et in pleuritide. 233
Pulmonis effectus tum in substantia, tum in vasis. 229
per Pulmonem transumpta materia per quas vias expurgetur. 233
- Pulmonis hydrops ad Hippocrate graphice descriptus.* 319
Pulmonem ex calcarentia. 342
Pulmonem qui ad tabem proclinet. 242, 243
Pulmonem tuberosa consilutio vnde. 242
Pulmonis tuberculum. 243
Pulmones venarum calentes applicati in convulsione. 160
In phrenitide. 169
In abscissu cerebri declinatione. 170
In fluxu hæmorrhoidum podici admitti. 191
Pulmo bordinis calens admotus in dolore hæmorrhoidum. 364
Pulmonem defendentia à variolarum naça. 442
Pulsatio in sinistro hypochondrio in melancholia hypochondriaca. 271, 276
vnde. 271

Index Rerum:

<i>Pulsus durus in pleuritide rade.</i>	233	<i>Quartana intermittens in consuetum mutata cur periculosa.</i>	ibid.
<i>Pulsus magnus, longus & molli in peripneumonia.</i>	236	<i>ibid.</i>	
<i>Pulsus in febre pestilenti cur tunc variè immutatur.</i>	428	<i>Quartana qua dysenteria salutaris.</i>	ibid.
<i>Quis periculis.</i>	429	<i>Cur hamorrhagia è moribus pestina.</i>	ibid.
<i>Pulsus intermittens est semper letalis in invase in febre pestilenti.</i>	ibid.	<i>Quartana cur epilepsiam soluit.</i>	ibid.
<i>Pulsaetes cerebrum roborantes.</i>	149. 177	<i>Quartana reparum in scilum vtilissimum.</i>	ibid.
<i>Pulsus digestus.</i>	152. 256	<i>in Quartana cur parit bibendum.</i>	420
<i>Pulsus dulcis.</i>	257	<i>Quartana cur benignioribus medicamentis initio tractanda.</i>	ibid.
<i>Pulsaetes de gutta descriptio.</i>	164	<i>Quartanensis cur ha moribundum fluxus salutaris.</i>	ibid.
<i>Pulsus in epistaxis puerorum.</i>	ibid.	<i>An saluata felix.</i>	ibid.
<i>Pulsus ad oculorum vicera.</i>	195	<i>Quando theriaca exhibenda.</i>	421
<i>Pulsaetes cur in vulva relictas commodiores, quatu gargarismi.</i>	224	<i>Quartana cur ferè non curetur.</i>	420
<i>Pulsaetes ad spatium sanguinis.</i>	241	<i>Quarta species.</i>	421
<i>Ad phthysim.</i>	242	<i>Quarta continua essentia & causa.</i>	405
<i>Pulsus ad singultum.</i>	267	<i>Signa diagnostica.</i>	407
<i>Ad vomitum.</i>	267	<i>Prognostica.</i>	408
<i>Ad vomitum sanguinis.</i>	268	<i>Quarta in febribus cur sanguis minori copia mittendus.</i>	409
<i>Ad ventriculi viciis.</i>	371	<i>qualia incidentia, attenuantia, & experientia comenians.</i>	
<i>In dysenteria.</i>	386		
<i>Pulsus astringens in diarrha.</i>	382	<i>Quarta intermittens sedet.</i>	418
<i>Pulsaetes ad lumbos.</i>	393	<i>Signa diagnostica.</i>	ibid.
<i>Pulsus ex chalybe decostruens.</i>	394		
<i>Pulsus ad hydropem.</i>	390		
<i>Pulsus in melancholia hypochondriaca.</i>	397		
<i>Pulsaetes ad calculum.</i>	422		
<i>Ad praeservationem à calculo.</i>	330. 331		
<i>Ad nictam sanguinis.</i>	339		
<i>Pulsus ad incontinentiam urinae.</i>	342		
<i>Pulsaetes ad menses suppressos.</i>	350		
<i>Ad immodicè fluxus.</i>	352		
<i>Ad suffocationem.</i>	361		
<i>In vieni prolapsu.</i>	373		
<i>Ad vieni roborandum & stimulam deacem.</i>	377		
<i>Pulsus ad signum morbum excludendum.</i>	381		
<i>Ad locum fluxum inmodicum.</i>	382		
<i>Ad tinnitum puerorum.</i>	387		
<i>Pulsaetes ad vieni refectum in febribus continuis.</i>	411		
<i>Pulsus epilepticus de gutta ad commotionem in febribus continuis.</i>	413		
<i>Pulsaetes alexipharmaci.</i>	415		
<i>Pulsaetes dolor proprius membrarum.</i>	416		
<i>Pulsus dilatationis causa.</i>	187		
<i>Pulsus in febre pestilenti causa.</i>	ibid.		
<i>Purgatio in gravidis cur bodie frequentior & tutior.</i>	379		
<i>Et praecipue medicamentis mensibus.</i>	ibid.		
<i>Purpura macularum in febre pestilenti differentia.</i>	425		
<i>Ab exanthematis.</i>	ibid.		
<i>Purpura macula in sint signum pathognomonicum febris pestilenti.</i>	427		
<i>Purpura macularum causa.</i>	429		
<i>Purpura macula aliquando critica, aliquando symptomatice.</i>	430		
<i>Purpura macula cur in pectore, & dextro praecipue apparet.</i>	439		
<i>Purpura macula quid ex purgatione.</i>	438		
<i>Purpura macula procedens cur melius coctum, quam quid à vesica.</i>	439		
<i>Purpura macula in ore apparetur nota.</i>	442		
<i>In Purpura vulgaris veniens qualitas pestilenti febris non consistit.</i>	441		
	442		
	443		
	444		
	445		
	446		
	447		
	448		
	449		
	450		
	451		
	452		
	453		
	454		
	455		
	456		
	457		
	458		
	459		
	460		
	461		
	462		
	463		
	464		
	465		
	466		
	467		
	468		
	469		
	470		
	471		
	472		
	473		
	474		
	475		
	476		
	477		
	478		
	479		
	480		
	481		
	482		
	483		
	484		
	485		
	486		
	487		
	488		
	489		
	490		
	491		
	492		
	493		
	494		
	495		
	496		
	497		
	498		
	499		
	500		

R

<i>R. Anala quid.</i>	217
<i>Quae tumoris species.</i>	ibid.
<i>Reparum plus frequens oculis reddit acutiores.</i>	180
<i>Reparum decoctum secundum quartana vtilissimum.</i>	419
<i>Ratocatio an ladi possit non lase imaginatione.</i>	167
<i>Rataphione quid.</i>	
<i>Ratocatio.</i>	175
<i>Ratocatio in febribus continuis praecutio.</i>	411
<i>Refrigerantia topica in phrezaque cautè adhibenda.</i>	168
<i>Regius morbus.</i>	
<i>Vide l. Cereus.</i>	
<i>Regius effectus.</i>	
<i>Regius qui conferat ad generationem calculi.</i>	331
<i>Regius inflammations causa commota.</i>	317
<i>Causa antecedentes.</i>	ibid.
<i>Signa diagnostica.</i>	336
<i>Reum inflammationis quomodo à coli inflammatione digna scatur.</i>	ibid.
<i>Reum inflammationis cur periculosa.</i>	ibid.
<i>Reum inflammationis initio cur purgatio non conveniat.</i>	ibid.
<i>Reum inflammationis cur diaretica non conveniant.</i>	317
<i>Reum vicia qua curabilia.</i>	319
<i>Qua symptomata continentur.</i>	ibid.
<i>Reum in viciis cur purgatio conveniat.</i>	ibid.
<i>Qualia vomitoria.</i>	340
<i>Reum inflammationis cur diuretica non conveniant.</i>	317
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	326
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	328
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	329
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	330
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	331
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	332
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	333
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	334
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	335
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	336
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	337
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	338
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	339
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	340
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	341
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	342
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	343
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	344
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	345
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	346
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	347
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	348
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	349
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	350
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	351
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	352
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	353
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	354
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	355
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	356
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	357
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	358
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	359
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	360
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	361
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	362
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	363
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	364
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	365
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	366
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	367
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	368
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	369
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	370
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	371
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	372
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	373
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	374
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	375
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	376
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	377
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	378
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	379
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	380
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	381
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	382
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	383
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	384
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	385
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	386
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	387
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	388
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	389
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	390
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	391
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	392
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	393
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	394
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	395
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	396
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	397
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	398
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	399
<i>Reum inflammationis in ischuro dolore cur non conveniant.</i>	400

Index Rerum:

Rheumatismi quomodo differat ab arthritide.
A catarrho.
Rheumatismus ab Hippoc. & Gal. delinatus.
Rheumatismi signa diagnostica.
Prognostica.
In Rheumatismo & quo brachio sanguis detrahendus.
Cur ex frequenti vena sectione vires non deiciantur.
Cur purgatio in principio augmentetur a noxia.
Vt & Jodorfica.
In Rheumatismi curacione portum principum & totius corporis
roborationis necessitas.
Rheumatismi prophylaxis.
Rhyades curatio.
Rigores frequentes sine typo in phthisicis vnde.
Rigorum in fluxu praestantissima in fluxu hepatico.
Rigorum in fluxu ad tripar refrigerationem.
In febris biliosa.
Ruboris generum in peripneumonia causa.

377
ibid.
398
ibid.
399
ibid.
ibid.
ibid.
300
ibid.
ibid.
397
245
390
399-400
403
236

S

Abulosa in Aphor. 59. et 64. quid significant.
Accursum & mel an iuniores generent.
Accursum reatum visissimum phthisicis.
Accidit oleum ad asthma.
Sacculi vesicularum calefacientes.
Roborantes.
Aescopi in tenebris.
Salsi viridi vomitu vsus in pueris comate affectis.
Salsi Saturni vsus in opthalmia.
In dysenteria.
Sales varij ad hydropem.
Sales tertari vsus in scorbutis.
In vena suppressione.
In causa scorbutici calidissimi.
Sales ad calculi exclusionem.
Ad suppressionem mensium.
Sal obfuscat ad tertianam intermittentem longiorem.
Salis prunella laus.
Salustella an tendenda in lienis inflammatione.
In quartana legitima.
Sanguinis fluxus copioso superneque communi lethali.
Sanguinis profluvium moderatum in die critico an salutare.
Sanguis em fluxum cohibentis.
Sanguis fluxus in farteque frigus specificus ad sistendum hemorroidum.
Sanguis cruent & symptomaticus sunt interdum ex gingivis.
Sanguis stilla & nobis mala.
Sanguis nutriendus initio pleuritidis febribus, pueris, gravidis.
Puerperis in mensibus purgationibus.
Sanguis puerperis an tantum ad pulmonem.
Sanguinem concretum dissolvenda.
Ad sanguinis copia corpus emagari potest.
Sanguinis congelationis causa.
Sanguinem fluxum cohibentis.
Sanguinem fluxum an signum parvorum morborum plenitudinis.
Sanguis columbinus ad suffusionem.
Sanguis ferulidis in fluxu in dysenteria.
In fluxu hamorrhoidum inmodico.
Sanguis buccinus ad dissolvendum calculum renum.
Pescia.
Sanguis in fluxu causa.
P de Mictus sanguinis.
Sanguis frigus astringit. posca tepida potus.
Sanguis penuria non semper adeji in extenuatione.
Sanguinis morus praeposterus in suppressione mensium quomodo
curandus.
Sanguis vultione frequentis a vires non deiciantur in re-

334
391
246
372
373
380
288
112
192
285
314
312
344
388
326-327
310
318
434-433
313
410
159
114
212 & seq.
214
223
312
334
240
241
243
242
312 & seq.
233
288
278
310
316
317
333
349
350

matismo.
Sanguis detrahitur usque ad animi deliquium cur non obsole-
at.
Sanguis cum impetu fluens in putridis febribus replurimum pu-
tridus esse solet.
Sanguis ad mutationem coloris in febribus continuis quando mi-
tendus.
Sanguis in febribus pestilentis per vena sectionem eductus si pueris
cur periculosus.
Sanguis an mittendus ad pestilentis febris precautionem.
Sarcoma quid.
Sarcomatis causa.
Curatio.
Sassafras decoctum ad ventriculum frigidum.
Scleritidis quid.
Scleritidis aduersus sterilitatem.
Scammomy noxa in febribus continuis.
Scorificationes in hydropse cur non celebranda.
Scorbutus apud nos varius ad scorbuticam quendam affectionem satis
frequenter.
Scorbutus quid.
Scorbutus cum melancholia hypochondriaca in quo comitatus.
Scorbuti signa principia.
Scorbutici articulum dolores in quo ab arthriticis differant.
Scorbutus cur curatio difficilis.
Scorbutici multo deplorati videntur.
Scorbuti remedia specifica.
Scorbuticus fere in omnibus pancreatis tumoribus generatur.
Scorbutum oleum ad calculum.
Secundina retentionis causa.
Diagnosus.
Secundinam retentam quam praevis symptomata sequantur.
Semen
Semen contra vermes laus & vitendi modus.
Seminis copia, artemisia & feruor supra modum furorem rite-
runt excitant.
Semen calefacientia & efferantia.
Refrigerantia & extinguentia proprietate specifica.
Seminis excreta in furore vterino an procuranda.
Semen cur ad vtero non recipitur.
Non retinetur.
Corruptum.
Non conformatur.
Semen viridis & summi in proportio conceptionem frustratur.
Semicupium ex emollientium decocto in adhesionem alai.
In tenebris.
Semicupium in hepatis cirrho.
In melancholia hypochondriaca.
In calculo renum.
In vena incontinentia.
In fluxu mensium inmodico.
In furore vterino.
In hydropse vterino.
In vteri prolapso.
Ad vterum excipandum.
Semitentia ex quibus febribus componitur.
P de Hemorrhoidibus.
Senes cur a senectute aperi per eundem in media aetate consti-
tuit.
Senectus opinio circa partem merentem in fluxione arthritica
constatur.
Serosus humor principia doloris dentium causa.
Serum lactis refrigerat, humectat & obstructions aperit.
Quomodo preparatur.
Seri lactis capillis vsus in ardore vtrina.
Seri lactis vsus in praeparatione ad calculum renum.
In ulceribus caui.

499
401
402
409
ibid.
412
ibid.
416
418
318
377
418
311
345
319
310-321
ibid.
ibid.
322
317
330
384
ibid.
384
356
317
318
358-364
372
374
ibid.
371
364
373
423
384
390
319
399
ibid.
316
312
340

Index Rerum.

<i>In biliosis febribus.</i>	409	<i>mittentis.</i>	418
<i>Serosa materia quibus dactibus ab hepate in abdominis capaci-</i>	308	<i>Splenis bonis decoctum ad suppressas mentes.</i>	311
<i>tatem feratur.</i>	308	<i>Sputosus sanguis an tantum a pulmone.</i>	247
<i>Serosus humor immediata arthritis causa.</i> 308. <i>et</i> <i>rheuma-</i>	398	<i>Sputum euentum an sit signum pathognomonicum pleuritidis.</i>	233-
<i>tismus.</i>	398	<i>Stercus paucis specificum in vertigin.</i>	165
<i>Setacei laus in epilepsia.</i>	161	<i>Stercus porcinum & asinum in hemorrhagia flenda.</i>	214
<i>In phibis.</i>	144	<i>Equinum & galline in pleuride.</i>	236
<i>Sinapium vtilius in paralyti.</i>	117	<i>Equinum item in colica.</i>	276
<i>Sine a dietitione cur male.</i>	206	<i>Stercus asineris & album gallinae exsecutum ad ileum.</i>	306
<i>Singultus motus communis potius est quam consensio.</i>	183	<i>Stercoris fluxus.</i>	280
<i>Singultus causa.</i>	ibid.	<i>Sterilitatis causa.</i>	374-375
<i>Singultum quomodo excitare possis in initio.</i>	163	<i>Sterilitas ab improportione seminum quomodo dignoscatur.</i>	ibid.
<i>Singultus qui periculosus.</i>	ibid.	<i>Quomodo qua ab occultis dispositionibus dependet.</i>	376
<i>Singultus vomitus superueniens salutaris.</i>	164	<i>Sterilitatem vel fecunditatem famina probantia.</i>	ibid.
<i>Singultus cur malus in hepatis inflammatione.</i>	301	<i>Sterilitatem viri indicantia.</i>	ibid.
<i>Singultus in febribus curatio.</i>	414	<i>Sterilitatem a fascino dissoluta.</i>	ibid.
<i>Sitis deprauata differentia.</i>	160	<i>ad Sterilitatem curandum specifica.</i>	ibid.
<i>Sitis nulla causa & differentia.</i>	ibid.	<i>Sternutatorum formula.</i>	148
<i>Sitis qua a granibus & periculosis morbis dependet periculosa.</i>	161	<i>In catarro.</i>	176
<i>Sitium exabusa in diabete causa.</i>	341	<i>Sternutatio oris conueniant in apoplexia.</i>	172
<i>Sitium in febribus sedatio.</i>	413	<i>Sternutationis causa.</i>	109, 210
<i>Solida corporis vel diffidilis deglutiantur.</i>	108	<i>Sternutatio aliquando symptomatica.</i>	100
<i>Somni longi praeteritum a cibo pium generant.</i>	146	<i>Sternutationis curatio quando necessaria est.</i>	210
<i>Somni praeternaturalis differentia.</i>	149	<i>Sternutatio hysterica superueniens cur salutaris.</i>	361
<i>Somni consuetudo.</i>	162	<i>Sternutationem in partu difficili excitantia.</i>	387
<i>Somni grauis ac profundus in virginibus chlorosis laborantibus</i>	348	<i>Sternutatio in pestilenti febre an salutaris.</i>	450
<i>uide.</i>	348	<i>Stomatica medicamenta.</i>	212
<i>Sonus per apertum os quomodo excipitur.</i>	199	<i>Strabismus quid.</i>	158
<i>Sonitus atriarii causa.</i>	202	<i>Stranguria quid.</i>	343-344
<i>Differentia.</i>	202	<i>Stranguria causa.</i>	348
<i>Soporosi affectus.</i>	142	<i>Serum laborantium mesenterium replurimum glandulis refer-</i>	144-180
<i>Cur in senibus valde periculosi.</i>	150	<i>tum.</i>	391
<i>Soporosum affectum curatio.</i>	150	<i>Stapha humida in arthritis.</i>	328
<i>Spasmus cynicus.</i>	158	<i>Stupor curati a directo renis laborantis calculi signum.</i>	336
<i>Specilla visum conseruantia.</i>	249	<i>Ita & inflammati renis.</i>	149
<i>Spasmus cerebri.</i>	195	<i>Subeth Aethera.</i>	415-416
<i>Sphincteris vesicae affectus causa.</i>	341	<i>Substantia creta quomodo mala dici possint.</i>	164
<i>Spica uari specificia ad hemorrhagiam sistendam.</i>	211	<i>Succum nili oleum in epilepsia.</i>	179
<i>Spiritus flatuosus consensu causa.</i>	158	<i>In dolore capitis.</i>	214
<i>Spiritus congelantis vis & affectus.</i>	160	<i>Sulfuris in ventriculo sensum impediens.</i>	179
<i>Spiritus vnde maligna qualitate afficiuntur.</i>	173	<i>Sulfurificorum vtilitas ad cerebrum intemperem frigidam humi-</i>	148
<i>Spiritus tenebrosus in melancholia.</i>	173	<i>dam.</i>	179
<i>Spiritus vini belloboratus singularis in furiditate.</i>	197	<i>In caphalis.</i>	163
<i>Spiritus cum magna copia ad partem aliquam deferitur & sangui-</i>	215	<i>In epilepsia.</i>	182
<i>ne secum trahitur.</i>	148	<i>In gutta serena.</i>	240
<i>Spirituum de fecibus causa in syncope.</i>	158	<i>In hydropo pulmonis.</i>	158
<i>Spiritus dissoluens causa boum a ex Hermetico.</i>	263	<i>Sudores mouentia.</i>	218
<i>Spirituum dissolutum vis.</i>	242	<i>Sudores nocturni phibici replurimum diuerantur.</i>	425
<i>Spirituum congelantium & fixantium vis ex Spaghyis.</i>	158	<i>Sudores in febre pestilenti qui prauis qu salutaris.</i>	412
<i>Spiritus tartari in paralyti.</i>	277	<i>Sudores symptomatici quando exhibendi.</i>	381
<i>Spiritus sulphuris & vitrioli vtilis in fluxionibus.</i>	251	<i>Sudorifica an surpanda in praegestibus.</i>	389
<i>In arthritis.</i>	251	<i>Qualis conueniant arthritis.</i>	400
<i>Contra vermes.</i>	252	<i>Rheumaticis.</i>	311
<i>Spiritus vini famem caninum soluit.</i>	166	<i>Sudorifica an hydropici conueniant.</i>	340
<i>In vomitu.</i>	393	<i>Ad vici renem.</i>	312
<i>Aduersus leuoricos.</i>	260	<i>Ad vici incontinentiam.</i>	312
<i>Spiritus subuolans ex Hermetico causa sitis morbose.</i>	178	<i>In chlorosi.</i>	312
<i>Spiritus vini ad fotum in ilico a flatibus.</i>	311	<i>Qualis in febrium continuorum declinatione conueniant.</i>	413
<i>Spiritus salis laus in hydropo.</i>	311	<i>Suffusus in corrigenda frigida humida cerebri intemperie.</i>	202
<i>In calculo renum.</i>	311-334	<i>In corpe.</i>	219
<i>In urae suppressione.</i>	345	<i>Suffusus in iuris surditate.</i>	351
<i>Spiritus tartari in obstructionibus continuacibus.</i>	311	<i>Suffusus ad merces suppressa.</i>	316
<i>In hydropo.</i>	304	<i>Ad immodece plures.</i>	364
<i>Spiritus vitrioli in obstructionibus.</i>	321	<i>Ad vici vici.</i>	384
<i>In scorbutica affectione.</i>	329	<i>Ad vici fatus explodendo.</i>	301
<i>In calculo renum.</i>	411	<i>Ad fatus marium et xeludendum.</i>	247
<i>Cum aqua frigida in astu febris continua.</i>	408	<i>Suffusio cephalica.</i>	317
<i>Spiritus vitrioli & sulphuris cur frequenter surpantur in febri-</i>	409	<i>In vici pulmonis.</i>	317
<i>bis putridis.</i>	408	<i>Suffusio ad viciurum exsicccandum & roborandum.</i>	317
<i>Quibus morbi noxii.</i>	409		
<i>Spiritus sulphuris cum aqua portulacae in astu tertiana inter-</i>			

<i>Suffragio quid.</i>	184	<i>Tabella triacentalis in diarrhoea.</i>	323
<i>Suffragio curatio.</i>	185	<i>Tabella ex chalybe deobstruente hepatis.</i>	304
<i>Sulphuris spiritus in fluxionibus.</i>	174	<i>Tabella in melancholia hypochondriaca.</i>	318
<i>Sulphuris oleum in oris & linguae vicibus.</i>	118	<i>Tabella ad praeservationem d calculo.</i>	321
<i>Sulphuris spiritus in affluente.</i>	131	<i>Ad praeservationem abortus.</i>	381
<i>Sulphuris flores in pituita.</i>	247	<i>Tabes d quo humore.</i>	175-176
<i>Sugillatio in oculo curatio.</i>	190	<i>Tabifici pulmonum.</i>	242-243
<i>Suppositoria ad dolorem haemorrhoidum.</i>	327	<i>Tabifica conformatio.</i>	162
<i>Suppurationes in thorace causa & signa.</i>	337	<i>Tabes differentia.</i>	242
<i>Suppuratio quae evadant.</i>	238	<i>Signa.</i>	244
<i>Sordi ab oris curatio.</i>	199	<i>Tabidis autumum cur malis.</i>	242
<i>Sordidatio causa.</i>	104	<i>Talibus symptomatica.</i>	245
<i>Curatio.</i>	100	<i>Tamarindorum laes inter purgationem in haemorrhoidum fluxu.</i>	324
<i>Sordidati conferri spiritus vini bellobratus.</i>	101		324
<i>Vinguedo angustia.</i>	101	<i>Tapi barbatu vsus in haemorrhoidum dolore.</i>	297
<i>Sordidati cur apertio ore loquendum serones exsurgunt.</i>	199	<i>Taraxi quid.</i>	190-191
<i>Symptomatica febres quoniam.</i>	400	<i>ex Tartero remedia ad obstructions inestertat.</i>	304
<i>Syncope haemorrhagia cubitina.</i>	223	<i>Ad hydropem.</i>	313
<i>Syncope quid.</i>	323	<i>In scorbica affluente.</i>	314
<i>Quid differat ab asphyxia.</i>	101	<i>In suppositione mensium.</i>	311
<i>Synopes curatio.</i>	250-311	<i>Tartari crystallus quomodo fraudetur ab impostoribus.</i>	300
<i>Synopes morte subsequens a bystoria notabilis in nobili virgine.</i>	242	<i>Tartari crumen cur medicamentis purgationibus addendis in febrium intermissionibus curatio.</i>	316
<i>Atropisidiosi.</i>	101	<i>Tartari vitriolus composicio & vsus.</i>	303
<i>Et in alia sanguine circa congelato.</i>	101	<i>In calculo renum.</i>	312
<i>Syncope quae magis odiosa.</i>	407	<i>In suppositione.</i>	311
<i>Synopis febres essentia causa & differentia.</i>	101	<i>Tempus in ajustendis alimentis praepositi ventriculi coctionem vitiat.</i>	361
<i>Signa.</i>	414	<i>Tenebris cum ingenti cupiditate cur adei in vesica calculi.</i>	329
<i>Synopis curatio.</i>	401		329
<i>Synopis simplex longitudo vsusque ad animi deliquium cur aboleat.</i>	101	<i>Tenebris cur abortum facit.</i>	380
<i>Et aqua frigida exhibitio.</i>	101	<i>Tenebris quid.</i>	320
<i>Synopis putrida differentia & cause.</i>	101	<i>In quo differat d dysenteria.</i>	101
<i>In Synopis putrida an sanguis miscendus vsusque ad animi deliquium.</i>	409	<i>Cur gravidis abortum facit.</i>	101
<i>Synopis diarrhoea causa.</i>	380	<i>Terebinthinae extraxum remedium in epilepsia.</i>	163
<i>Syrupus magistralis cephalicus.</i>	148	<i>Terebinthinae vsus in affluente.</i>	321
<i>In capitis dolore.</i>	170	<i>In empyema.</i>	242
<i>Syrupus de peso ad epilepsiam.</i>	163	<i>In ventriculo expurgando.</i>	372
<i>Syrupus ad sistendum diarrhoeam.</i>	181	<i>In inflammatione ventriculi.</i>	308
<i>Syrupus ad asthma.</i>	130	<i>Terebinthina preparatio & vsus in scirrhi hepatis.</i>	199
<i>Ad haemoptem.</i>	240-241	<i>In vicibus renum & vesicae.</i>	300
<i>Ad pleuriam.</i>	246	<i>In viceri vena.</i>	319
<i>Syrupus in ventriculo frigido.</i>	156	<i>Terebinthina cyprina laudes.</i>	319
<i>In ventriculo plethorico.</i>	171	<i>Terebinthinae cur frequentius vsus non vocat, ut alia dicitur.</i>	331
<i>Syrupus de abstinendo deceptio.</i>	101	<i>Terebinthina variis utendi modis in praeservatione d calculo renum.</i>	101
<i>Syrupus in diarrhoea biliosa.</i>	181	<i>nam.</i>	405
<i>In dysenteria.</i>	180	<i>Tertianae continua essentia & causa.</i>	409
<i>Syrupus corallorum ad secur roborandum & fluxum cohibendum.</i>	190	<i>Tertianis in continuis phlebotomia utilitates.</i>	417
<i>Syrupus ex chalybe deobstruens & purgans.</i>	304	<i>Tertianae intermittens sedes & differentia.</i>	101
<i>Syrupus ad hydropem.</i>	310	<i>Tertianae exposita signa.</i>	417
<i>Syrupus a morbo descriptio & vsus in anafira.</i>	311	<i>Tertianae intermittens an semper periculi expertes.</i>	417
<i>Syrupus magistralis in melancholia hypochondriaca.</i>	317		417
<i>Syrupus de alioquin in promptu parabitur.</i>	319	<i>Tertianae solutio certior per alia fluxu.</i>	415
<i>Syrupus magistralis ad praeservationem d calculo.</i>	330	<i>In Tertianae excessione cur aliquando alimentum exhibendum.</i>	416
<i>Ad chlorosim.</i>	330	<i>Tertianis intermittens cur vomitoria conveniunt.</i>	101
<i>Syrupus ad suffocationem hysterica.</i>	363		101
<i>Syrupus magistralis ad vicia vteri.</i>	366	<i>Tertianae intermittens longioris causa.</i>	101
<i>Syrupus dulces ut violaceus in bis tenui & valde acri saltem solum.</i>	401	<i>Tetanus terristrum preparatio pro bellicis.</i>	158
<i>cur non exhibendi.</i>	401		158
<i>Syrupus de papavere in ischiadico dolore.</i>	327	<i>Tetanus quid.</i>	159
<i>Syrupus magistralis ad prophylaxiam rheumatismi.</i>	401	<i>Tetani prognos.</i>	159
		<i>Tetaria vsus in fene canina.</i>	169
		<i>In cholera morbo.</i>	411
		<i>Tetaria in quartana quando exhibenda.</i>	413
		<i>In febre pestilenti.</i>	413
		<i>Thermis sulphurea, nitrosa & bituminosa in cerebri interperie.</i>	149
		<i>frigida humida.</i>	179
		<i>In cephalgia.</i>	199
		<i>In sordidati.</i>	257
		<i>In ventriculo frigido.</i>	Thermis

T Abaci chis dentes obsterge & deobster.
 Tabella in mania.
 Ad asthma.
 In haemoptem.
 In ventriculo frigido.

Index Rerum.

<i>Altera fulphorea ad singulum.</i>	264	<i>V. flalis an purgata conueniat.</i>	ibid.
<i>Ad chlorosim.</i>	349	<i>V. a. arum erupitionem adiuuanti.</i>	ibid.
<i>Ad fluxum multivorem.</i>	351	<i>V. a. larum nimis impetuam erupitionem cohibenti.</i>	ibid.
<i>Aduerfus fecunditatem.</i>	372	<i>V. a. larum nexis quomodo defendendus pulmo.</i>	443
<i>Ad atropis in arthritide roborandas.</i>	395	<i>Interitus.</i>	ibid.
<i>Thoracis morbi.</i>	332	<i>Quod si mores facies.</i>	443-443
<i>Thoracis praxa conformata ad tabem.</i>	344	<i>Papis breuis vsus.</i>	268
<i>Thymi quid.</i>	391	<i>Pena sanguine referta omnes vias interiores angustiores efficere solet.</i>	169
<i>Thlipsis refozum ad formem syrupi redacta praestantissima fluxu hepatico.</i>	190	<i>Penas per epiploicas & gastropiploicas serofus humor & vni in abdomen fertur.</i>	318
<i>Thlipsis anarum diuturnus in suis diem degenerat.</i>	201	<i>Pentecostis quid in mania.</i>	120
<i>Thonica motus quati.</i>	158	<i>Pentosa qualitates in hysterica passione agnoscente.</i>	148
<i>Topica non enacata toto corpore non adhibenda.</i>	205	<i>Pentis non diffusis aer facile corrumpitur.</i>	425
<i>Tergum in puerperis causa.</i>	386	<i>Pentecostis affectus.</i>	214
<i>Curatio.</i>	ibid.	<i>Pentecostis calida intemperie laborantis curatio.</i>	356
<i>Transfluxio omnia in corpore viuentis.</i>	318	<i>Pentecostis purgante.</i>	ibid.
<i>Transfiguratione inossu quati fiat euacuatio.</i>	171	<i>Pentecostis coelestianis & roborantis.</i>	356-357
<i>Transpiratio cur aliquando deficiente respiratione sufficiat.</i>	358	<i>Pentecostis coctio a quibus causis latatur.</i>	243
<i>Transiti qui.</i>	173	<i>Pentecostis motus expulsi triplices.</i>	268
<i>Tremor quid.</i>	163	<i>Pentecostis motus natus si versus pylorum & intestina, mortis praeternaturalis causa.</i>	264
<i>Tremor causa.</i>	166	<i>Pentecostis curatio a videribus vocatur.</i>	270
<i>Tripharmacum electuarium vnum ex roborantibus in rheumatismo.</i>	158	<i>Pentecostis doloris causa.</i>	ibid.
<i>Trismus quid.</i>	167	<i>Pentecostis dolor cur variis temporibus exacerbatur.</i>	270-271
<i>Tristitia incommoda.</i>	176	<i>Pentecostis dolor quando minuetur periculum.</i>	271
<i>Truchesi caput exsiccantes.</i>	241	<i>Pentecostis doloris curatio.</i>	ibid.
<i>Truchesi ad vlcus ventriculi.</i>	310	<i>Pentecostis phlegmonis causa & signa.</i>	273
<i>Truchesi de rebabbaro ad hydropem.</i>	338	<i>Pentecostis phlegmonis quando in abscessum degenerat.</i>	ibid.
<i>Truchesi Geronii & de carabe ad miltum sanguinis.</i>	341	<i>Pentecostis vlcum causa & prognos.</i>	273
<i>Ad vlcera venarum & vesicae.</i>	344	<i>Pentecostis inflammatio in purgatione.</i>	274
<i>Truchesi de carabe ad vlcus suppreffionem.</i>	350	<i>Pentecostis vlcis curatio.</i>	274
<i>Truchesi de myrrha ad mensum suppreffionem.</i>	345	<i>Pentecostis quomodo sui causa melancholia hypochondriaca.</i>	317
<i>Truchesi altheae ad ardorem vtrius.</i>	366	<i>in Purcatio apthas facit succi limonum incanis vsus.</i>	330
<i>Ad vlcus vteri.</i>	433	<i>Pentecostis quomodo ex vlcis in hysterica passione afficiatur.</i>	339
<i>Truchesi viperinum vsus apud Monspelienfes in febre pestilenti.</i>	359	<i>Pentecostis inuolutio ex vnguento de arthritide & vlcis curatio in lambibus.</i>	292
<i>Tuba Fallopiiana quid.</i>	354	<i>Pentecostis vlcis ex principis arthritide causa.</i>	390
<i>Tub. renium pulmonis duplex.</i>	351	<i>Pentecostis aliqua doloris dentium causa.</i>	241
<i>Tuberculum in pulmonem a tectis prope cor palpitantis & in serie causa in Antipatro medico.</i>	409	<i>Pentecostis vlcis.</i>	289
<i>Turgescit in hominibus quid.</i>	410	<i>Pentecostis vlcis ex vlcis in infantibus lactentibus generatur.</i>	ibid.
<i>Quomodo cognoscatur.</i>	ibid.	<i>Pentecostis curatio.</i>	ibid.
<i>in Turgescit cur phlebotomia potius quam purgatio vsuatur.</i>	333	<i>Pentecostis affectus quibus expugnandi.</i>	291-292
<i>ibid.</i>	199	<i>Pentecostis quid.</i>	264-265
<i>Tartari preparatio ad mensis immodici fluxum.</i>	313	<i>Pentecostis causa proxima.</i>	164
<i>Tartari cur exsiccatur dum auris interior repletur.</i>	ibid.	<i>Pentecostis causa signa.</i>	165
<i>Tympanitis causa.</i>	238	<i>Pentecostis quid in monentem epilepsiam praesagit.</i>	ibid.
<i>Tympanem an salus statim efficiat.</i>	153	<i>Pentecostis affectus.</i>	335
<i>Tympanitis causa efficiens.</i>	ibid.	<i>Pentecostis extremum proprium materia multilogiosa.</i>	335
<i>Tympanitis quid.</i>	336	<i>Pentecostis calculi materialis & efficientis causa eadem ac calculi renium.</i>	336
V		<i>Pentecostis calculi puri, seu calculi renium cur magis idonea.</i>	336
<i>Alterna sylvesteris radices laus in coelestia.</i>	163-164	<i>Pentecostis calculi cur periculosa.</i>	336
<i>Papae occulta qualitate molesta inter causas palpitantis.</i>	127	<i>Pentecostis inflammatio causa communis ibid. causa antecedens.</i>	336
<i>ut curat.</i>	154	<i>Pentecostis signa duoglossa.</i>	336
<i>Papae melancholicorum vltimum causa erythrae.</i>	178	<i>Pentecostis inflammatione cur phlebotomia de parte dextra cur.</i>	336
<i>Papae melancholicorum in hypochondriis varia symptomata.</i>	ibid.	<i>ibid. ibid. ibid. cur purgatio in principio non conuenit.</i>	336
<i>Papae malignas & venenatas hysterica suffocationis causa.</i>	439	<i>Pentecostis dolores glandes & noduli lenientes.</i>	337
<i>Papae melancholicos superuenientes saluantes.</i>	ibid.	<i>Pentecostis vlcis causa.</i>	339
<i>Papae a morbilis differentia.</i>	ibid.	<i>Pentecostis pur procedens quae.</i>	ibid.
<i>Papae & morbilis an sint morbi nati.</i>	ibid.	<i>Pentecostis vlcis quae curabilis.</i>	ibid.
<i>Papae causa.</i>	ibid.	<i>Pentecostis vlcis exsiccans, detergentis & consolidantis.</i>	340
<i>Papae eruptio cur tamdiu differtur.</i>	ibid.	<i>Pentecostis vlcis in catarrho scapulis curat & pone aures.</i>	175
<i>Papae quibus in partibus si curare apparent.</i>	ibid.	<i>Pentecostis vlcis in capitis arce.</i>	175
<i>in Papae eruptio erupitio obliuio aliquando perfellenda aliquando delectanda.</i>	ibid.	<i>Pentecostis vlcis in gule ieremae.</i>	181
<i>Papae duo tempora, vnum ebullitionis, alterum eruptionis.</i>	ibid.	<i>Pentecostis vlcis in gule ieremae.</i>	181
<i>ibid.</i>	ibid.	<i>Pentecostis vlcis in gule ieremae.</i>	181
<i>Papae signa diagnostica & prognostica.</i>	ibid.	<i>Pentecostis vlcis in gule ieremae.</i>	181
<i>in Papae signa diagnostica & excretionis cur Lebales.</i>	440	<i>Pentecostis vlcis in gule ieremae.</i>	181
<i>in Papae quae aetate mueritans sanguis pueris tenuis.</i>	441	<i>Pentecostis vlcis in gule ieremae.</i>	181

- va. 195. in angina. 117. in peripneumonia. 137
 Veficatoria in hystericis dolore. 197
 Veficatoria in febribus pestilentialibus quibus corporis partibus applicanda 433 quo tempore morbi. 435
 Vires dulcesque & amarae & extraordinarias habet natura. 108
 Vires in eadem cribus defensorum quid indicent. 439
 Viscerum nom. 147
 Viscitas & delinqua sedentia. 410
 Viscerum aquarum laus in obstruccionibus referenda. 318
 Viscum belluborum in mania. 173
 Viscum an conueniat in gulta serena. 181
 Viscum euphorasium. 184
 Viscum an opthalmicis conueniat. 193
 Viscum purgans in affluente. 213
 Viscum ablutum in ventriculo frigido. 206
 Viscum in vasa in ventriculo semper frigida. 184
 Viscum mectatum saniem cutim amoluit. 259
 Viscum chalybeatum in obstruccionibus conuulsibus soluendis. 101
 101. 101. in hydropse. 711
 Viscum purgans ad hydropem. 311-312
 Viscum alkerengi ad calculum. 327. 328. ad suppressionem venae. 344
 Viscum aciduli laus in praeservatione calculi. 412
 Viscum arithriticum maxime noxium. 395
 Viscum in febre pestilenti an exhibendum. 410-415
 Viscum syrupus & alij dulces cur in bile tenui & valde acri saltem soli non exhibendi. 410
 Viscum carapae & bepar exsiccata. virtute possent alexipharmica. 435
 Viscum quomodo effeminanda. vt apta reddantur generatiua. 376
 Viscum chlorosi laborantibus cur familiaris pica. 419
 Viscum pectoris sunt clysteres vicius praescribendi. 312
 Viscum magis obnoxium sunt angina quam serena. 214
 Viscum imbecillitas in quo differat a syncope. 245
 Viscum obstruccionum signum hypochondriarum grauitas seu fatietas. 302-303
 Viscum quercinus speciemus in epilepsia. 161
 Viscum obiecta cur duplicata apparent visu deprauato. 181
 Viscum conueniat in specula. 187
 Viscum humoris effectum. 181-183
 Viscum in oculis inflixionibus. 177
 Viscum visum & varioli alij vsus in sistenda haemorrhagia. 114-121.
 Viscum oleum ad variola oris & linguae. 217
 Viscum oleum seu spiritum ad obstruccionem viscerum conueniat. 304. 305. in hydropse. 311. 312. in scorbutica affectione. 311. 312. calculi remou. 310
 Viscum mensus laus in obstruccionibus illiusque praeparatio. 118
 in mensus immodice fluentibus. 312. in epilepsia hystericis. 153
 Viscum album & sal vitrioli visum Chymicis vomitoria in tertiana intermittente. 416
 Viscum laus in omni putredine & malignitate. 434
 Viscum phagedonica qua. 176
 Viscum viciis curatio. 207
 Viscum articulatam cur non claud sursi ab ortu. 199
 Viscum ad spumam dorsi inuigendam in paralyti. 157
 Viscum mercurialis cataracta curata. 186. opthalmia depresta. 194
 Viscum magistrale in contrahendo. 186
 Viscum varia in opthalmia. 192
 Viscum ventriculorum roboret. 215
 Viscum in elui sinu. 282
 Viscum de arbutis pro inuisione totius ventris in vermibus. 293
 Viscum bepar refrigerantia. 129-131
 Viscum bepar deobstruens. 131
 Viscum ad reuocandum vomitum. 116
 Viscum ad reuocandum vomitum. 116
 Viscum ad abortum praecauendum. 381. ad sudores excitandum. 383. ad dolorem asynochicum. 398. ad sudores
 symptomaticos cohibendos. 444
 Viscum oculi causa. 198. curatio. 184
 Viscum cur appellatur illos. 276
 Viscum pulmonum derespense rupta multos & modis fistula. 243
 Vomitoria in affectibus soporosis an conueniant. 151. paralyti. 457
 Vomitoria. 151
 Vomitus differentia. 164. causa. 219
 Vomitus conuulsus signa. 184
 Vomitus longi alius profusio superueniens bonum. 184
 Vomitus siccus & impermixtus in acutus febribus cur variis. 263
 Vomitus curatio. 184
 Vomitus quando vomitus curatur. 184
 Vomitus debentissimum leuandum cum pilulis euclyps. 184
 Vomitus cohibenda. 184
 Vomitus sanguinis causa. 266
 Vomitus sanguis d quibus partibus mactare potest. 184
 Vomitus sanguinis cur periculosus. 268
 Vomitus sanguinis cohibenda. 270
 Vomitus sanguinis quae purgantis conueniant. 268
 Vomitorum neperitis doloris multo an conueniant. 318
 Vomitorum differentia. 410
 Vomitoria quae quantitate liquoris exhibenda. 184
 Vomitoria quae conueniant in arthritide. 491
 In hystericis. 396
 Vomitus cur conueniat in principio febrium pueridarum. 410. 411
 tertiana intermittente. 416-417
 Vomitus in gravidis fere aliter curatur ac in non gravidis. 379
 Vrina cur in phrenitide aliquando supprimitur. 184
 Vrinam promouendi. 184
 Vrinam critica profusio quibus contingat. 281
 Vrina paucitas in hydropicis mala. 309
 Vrina mouentia hydropicis cur magis proficiunt quibus calida purgantis. 310
 Vrina a cruentarum causa. 317
 Vrina incontinentia morbofa causa. 312
 Vrina incontinentia in senibus cur non curatur. 184
 ad Vrina incontinentiam specifica 184. topica. 342
 Vrina suppressionis causa. 343-344
 Vrina suppressio cur valde periculosa. 344
 Vrina suppressio curatio. 344-345
 Vrina ardoris causa. 346-347
 Vrina ardori quae purgantis conueniant. 345
 Quae vomitoria. 184. quales emulsiões. 346
 Vrina profusio a cerebro promoueri potest. 389
 Vrinam promouentia in febris continua declinatione. 412
 Vrina iuxta iniquitatem bona. 412
 Vrina in febre pestilenti cur infusa. & maxime sanorum seminis. 414
 430
 Vritus viridibus membrum resolutum percutiendum. 357
 Vritus succus ad sistendum sanguinem. 214-240
 Vritus confusa maxilla admodum cito dentium dolorem soluit. 357
 197
 Vritus succus ad menstrua immodice fluentia. 353
 Vritus colica in sanguine pubis regioni admodum ad fluxum menstruum. 350
 Vritus quomodo crassescit in praenatiuitate. 356
 Vritus proprius excrementum est liquor. 356
 Vritus proprius. vide Fluor mulieris. 357-359
 Vritus inhiuiturum arum arum in muliere grauida. 318-359
 Vritus an ad vmbilicum & viciis ascendat. 318
 Vritus inflammatio. 364
 Vritus inflammationis causa. 365. signa diagnostica. 364
 Vritus inflammatio fere sensilis. 184
 Maxime erysipelatosus in muliere grauida. 184
 Vritus inflammationis curatio. 184
 Vritus inflammationis vena poplitae & malleoli quando aperienda. 184
 Vritus inflammatio quae cathartica conueniant. 365
 184

Index Rerum:

<i>An vomis ita.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vteri hydrops vomitoria cur consulant.</i>	371
<i>Vteri vlcis causa. ibid. differentia. ibid. signa diagnostica.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vterus qualis est in mulieribus dale vti plurimum reliquam cor-</i>	<i>ibid.</i>
<i>prognostica. 366. curatio.</i>	<i>ibid.</i>	<i>pus.</i>	372
<i>Vteri scirrhi causa antecedentes. 363. signa.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vteri status explosi suffus nucis moscata.</i>	441
<i>curatio.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vteri p. olapsus causa.</i>	372
<i>Vteri cuncti differentia.</i>	387	<i>Vteri prolapsus qua incommoda sequantur.</i>	372
<i>Vteri cancer cur incurabilis.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vterus prolapsus quomodo reponendus. ibid. quomodo continen-</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vteri cancer curatio palliativa.</i>	<i>ibid.</i>	<i>das.</i>	372
<i>Vteri cancro specifica.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vteri clausura causa.</i>	373
<i>Vteri gangrena causa.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vteri clausura qua curabilis.</i>	382
<i>Vtero ablato vita consistere potest.</i>	369	<i>Vteri clausura curatio.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vteri gangrena curata exemplum insigne.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vterus cur semen non excipit. 374. cur non retinet.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vteri inflatio in quo differat ab hydropo.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vterum vi specifica roborantia conceptionem adiuuantia, & ad</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vteri hydrops duplex.</i>	<i>ibid.</i>	<i>venetrem stimulantia.</i>	376.
<i>u Vteri cauitate quomodo statim & humores continentur.</i>		<i>Vterum expurgantia. 377. & efficacissima & roborantia.</i>	<i>ibid.</i>
<i>ibid.</i>		<i>Vteri acetabula dissoluentia.</i>	386
<i>Vteri inflationis & hydrops causa.</i>	370	<i>Vterus disruptus ex partu laborioso.</i>	383
<i>Vteri hydrops quomodo ab alijs hydropis speciebus & tumoribus</i>	370-371	<i>Vena tunica affectus.</i>	387
<i>distinguitur.</i>	167	<i>Vulvaris pelvis ventrem calefacit.</i>	357
<i>Vteri hydrops quis periculosior.</i>		<i>Vulua relaxata causa & curatio.</i>	314



F I N I S.